

Tubenöffnungen fehlen. Finger kurz, der dritte nur  $1\frac{1}{3}$  so lang wie der zweite, an den Spitzen nicht verbreitert; Zehen mäßig verlängert, an der Basis frei, die Spitzen in undeutliche ovale Haftscheiben verbreitert; die Spitzen der Finger und Zehen mit feinen, krallenartigen, zugespitzten Hautzipfeln. Der innere Metatarsalhöcker undeutlich oder fehlend, der äußere viel deutlicher, rundlich; auf dem Tarsus proximal in  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{4}$  seiner Länge eine eckige Hervorragung. Werden die Hintergliedmaßen nach vorn gelegt, so erreicht das Tibiotarsalgelenk den Hinterrand des Auges. Schnauze, Orbitalgegend und Körperseiten mit zahlreichen feinen Wärzchen; eine undeutliche Hautfalte zieht vom Auge zur Schulter.

Oben rothgrau mit an den Seiten zahlreicheren schwarzen symmetrischen Flecken und Zeichnungen und mit ziegelrothen Wärzchen; eine dreieckige, mit ihrer Basis nach vorn abschneidende schwarze Makel zwischen den Augen ist constant; Lippen und Gegend um die Insertion der Vordergliedmaßen reichlicher schwarz gefleckt; Gliedmaßen mit zahlreichen, aber schmalen und unregelmäßigen Querbinden. Unterseite graulich, Kehle und Umkreis des Unterkiefers immer, Umkreis des Bauches und Unterseite der Gliedmaßen meist schwarzgrau gefleckt, punctiert oder gewölkt. Bei jungen Stücken von etwa 13 mm Kopfrumpflänge zeigt sich oft jederseits eine tiefschwarze, von der Schnauze durch das Auge bis zur Insertion der Hintergliedmaßen ziehende Seitenbinde und manchmal auch eine feine, helle Rückenlinie; ein Stück von 9 mm Kopfrumpflänge ist oben braunschwarz und besitzt jederseits einen breiten, über dem Auge beginnenden weißen Dorsolateralstreifen.

Maße: Länge von der Schnauze bis zum After 18—19 mm.

Fundort: Auf den Seychellen in Anzahl in alten Wäldern unter feuchtem Laub, ebenfalls von Herrn Dr. Aug. Brauer gesammelt (Typen im Museum Senckenberg).

Neben diesen beiden neuen Arten wurden noch gefunden: *Chamaeleon tigris* Kuhl, *Lycognathopsis sechellensis* (Schlg.), *Boodon geometricus* (Schlg.); *Megaliralis seychellensis* (Tschudi), sowie *Hypogeophis rostratus* (Cuv.) auf Mahé, Silhouette und Île aux frégates und *Hypogeophis alternans* Stej. auf der letztgenannten Insel.

## II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

### The Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

June 23rd, 1896. — Rev. H. C. McCook, D.D. reported a series of observations on the California Trap-door Spider, *Cteniza californica*, made by Dr. Davidson who had been able to determine the time required for the construction of the burrow in confinement and other matters connected with the life-history of the animal. It had taken ten hours to construct the nest

with its hinged door, another spider having made a hole large enough to conceal itself in two hours. The method of digging was the same in the main as that described by the speaker for the tarantula. The young when they emerge at once build their own miniature nests which are renewed every spring until they reach the full size. Based on the study of a Lycosid the speaker had predicted that the enemy of the trap-door spider would be found to be a diurnal wasp. Dr. Davidson had established the fact that such is the case and that the attacking species is *Parapompilus planatus* Fox. — Mr. H. C. Mercer made a report on his recent exploration of certain caves in Tennessee which he had been able to prosecute under the patronage of the University of Pennsylvania, mainly through the liberality of Dr. William Pepper. In Zirkel's cave on Dumpling Creek, Jefferson County, Tennessee, crusts of breccia projected from the walls and hung from the roof. From this material the teeth of the tapir, peccary, etc., projected, while in the cave earth below were found bones, nuts, two pieces of Indian pottery and fragments of mica, probably indicating Indian cave burial. There were, therefore, two ages indicated: one ancient, by the breccia, and the other, the cave earth, comparatively recent. All the fossil remains belonged to the breccia and there was no association between them and the indications of human life. Another cave on the Tennessee River, under Lookout Mountain, Hamilton County, Tennessee, presented a floor of two layers, the black top one of three or three and a half feet in thickness composed of Indian remains and another of yellow earth containing a few animal remains but no indication of human existence. *Mylodon* and *Tapirus* fragments found some-time ago close to the bottom of the upper layer had probably been scraped up from the lower. Neither, therefore, did this cave present any certain data for the advancement of the date of Man's antiquity. On the contrary the evidence supported the belief that pleistocene or paleolithic Man had not existed in that region. On penetrating the forbidding entrance of Big Bone Cave, near Caney Fork River, Van Buren County, Tennessee, he had found nine hundred feet in, the bones of *Megalonyx* still bearing articular cartilages. Fragments of torches were found beneath the sloth bones probably buried by burrowing rats. — Prof. E. D. Cope commented on the fossil bones collected in the caves described by Mr. Mercer. The presence of cartilages on the *Megalonyx* bones indicated for them an age certainly not more remote than the existence of Man on this continent. Other bones belonging to young individuals were larger than corresponding ones found at Port Kennedy indicating the validity of the two species: *Megalonyx Wheatleyi* and *M. Jeffersonii*. Mr. Mercer had also collected remains of fifteen or twenty species of birds, six fishes, one batrachian, four tortoises, one rattlesnake and nineteen mammals. The special value of Mr. Mercer's careful work was commented on. The peccary is found in Zirkel's cave although no trace of it appears in the Lookout Mountain cave. Several undescribed species were indicated.

### III. Personal-Notizen.

Herr Dr. A. C. Oudemans, Lehrer am Gymnasium und an der Höheren Bürgerschule zu Sneek, Friesland, Niederlande, ist zum Lehrer ernannt worden an der Höheren Bürgerschule zu Arnheim. (Neue Adresse: Boulevard, 82, Arnheim.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [The Academy of Natural Sciences of Philadelphia  
351-352](#)