

auch fehlt der olivenfarbene Schimmer. Brust gleichfalls lang behaart, etwas heller, Bauch nackt, Schwanz 5 cm lang, mit Haar 10 cm, oben gelbbraun, unten weiß mit schwarzer Spitze. Hals etwas heller gelbgrau, vorn mehr röthlich gelb. Das Haar der Unterseite ist gelbgrau, nicht geringelt, wie bei *O. sallator*. Das kurze erhaltene Stück der Beine mehr graubraun, hinter dem Ellbogen und Hinterschenkel innen weißlich.

5) *Canis hadramauticus*. Vgl. Zool. Anz. No. 540, 1896. Nach zwei lebenden Exemplaren ♂ und ♀ im Berliner Zoologischen Garten.

Kleiner Wolf mit breitem Kopf und auffallend kräftigen Vorderbeinen und Vorderfüßen, der weder mit *Canis pallipes*, noch mit *anthus*, noch mit einer Schakalart identisch ist. Die l. c. angegebene Beschaffenheit des Ohres ist bei den erwachsenen Exemplaren nicht mehr erkennbar. Die Färbung ist ein helles Graugelb (sandfahl), Scheitel und Hinterseite des Ohres mehr röthlich, das Ohr ohne dunklen Rand, innen schwärzlich grau, um die Augen grau. Nase röthlich, die Oberseite mit tief schwarzbraunen, sich nach hinten zuspitzendem Längsstreif, Vorderbeine röthlich, Hinterbeine falb, an den ersten das Ellbogengelenk und die beiden Pfoten sehr kräftig. Das Haar des über das Sprunggelenk reichenden Schwanzes ist wellig mit bräunlichrother Spitze. Das große Auge ist dunkel, der Gesichtsausdruck dem des Dingo ähnlich.

Die ganzen Bewegungen sind die eines Wolfes, das Wesen scheu, doch spielen die Thiere gern mit einander.

Ich wahre mir bezüglich der sämtlichen hier besprochenen Thiere die Priorität.

II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

Linnean Society of New South Wales.

July 28th, 1897. — 1) On the Occurrence of the Genus *Palaechinus* in the Upper Silurian Rocks of New South Wales. By John Mitchell. The author describes and figures a fragmentary specimen comprising the middle portion of an interambulacral area showing four rows of plates; from the Middle Trilobite Bed, Bowning Village, N.S.W. — 2) Ethnographical. — 3) New Australian Lepidoptera. By Oswald B. Lower, F.E.S. Eighteen species, chiefly referable to the *Oecophoridae* and *Gelechiadae*, are described as new. — 4) Botanical. — 5) On the Rhopalocera of Lord Howe Island. By G. A. Waterhouse. The late Mr. A. S. Olliff enumerated ten species as occurring on the Island [“Lord Howe Island,” &c. Memoirs of Australian Museum. No. ii. p. 98, 1889]. The number is now increased to eighteen species, of which eight were not previously recorded. All the species are known to occur on the Australian Continent. — 6) Ethnological.

III. Personal-Notizen.

Genf. Dr. Nik. von Adelung, bisher Assistent am Musée d'histoire naturelle in Genf, ist nach St. Petersburg gegangen als Conservator am zoolog. Museum der kais. Academie der Wissenschaften. Seine Adresse ist St. Petersburg, Petersburger Seite, Sjesjinskaja ulitza, No. 9, Quart. 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc. 368](#)