

## 2. Analytische Tabelle der Gattungen der Chloropiden-Subfamilie Oscinosominae.

Von Dr. Günther Enderlein, Stettin.

eingeg. 18. März 1911.

- 1) Abdomen aus etwa 5—6 Segmenten bestehend . . . . . 2.  
- nur aus 2 Segmenten bestehend.  
Oberfläche des Abdomen mit erhabenen Linien, Thorax  
mit langen Borsten . . . . . *Anatrichus* Loew. 1860.  
(Typus: *A. erinaceus* Loew 1860. Südafrika u. Ägypten.)
- 2) Scutellum mit 4—6 kräftigen, zahnartigen Fortsätzen . . . 3.  
Scutellum ungezähnt . . . . . 4.
- 3) Scutellum quer rechteckig, hinten mit vier dornartigen  
Zähnen . . . . . *Acanthopeltastes* nov. gen.  
(Typus: *A. spineus* nov. spec. Südbrasilien.)  
Scutellum lang dreieckig, mit sechs dreieckigen Zähnen  
*Onychaspidium* nov. gen.  
(Typus: *O. sexdentatum* nov. spec. Südbrasilien.)
- 4) Fühlerborste nicht verdickt . . . . . 5.  
- verdickt . . . . . 26.
- 5) Fühlerborste gefiedert . . . . . *Gaurax* Loew. 1863.  
(Typus: *G. festivus* Loew 1863. Nordamerika.)  
Fühlerborste nackt oder kurz pubesziert . . . . . 6.
- 6) Schienenendsporn der Hinter- und Mittelbeine oder nur  
letzterer lang, kräftig und gekrümmt . . . . . 7.  
Schienenendsporne stark reduziert . . . . . 9.
- 7) Rückenschild ungefurcht . . . . . 8.  
- mit 5 oder 4 Längsfurchen. Untergesicht  
ohne Mediankiel . . . . . *Olecanabates* nov. gen.  
(Typus: *O. strigatus* nov. spec. Südbrasilien.)
- 8) Untergesicht vorgezogen, mit Mediankiel *Hippelates* Loew. 1863.  
(Typus: *H. nobilis* Loew 1863. Nordamerika.)  
Untergesicht nicht vorgezogen, ohne Mediankiel *Hippelatinus* n. g.  
(Typus: *H. calcaratus* nov. spec. Südbrasilien.)
- 9)  $r_1$  endet etwa in der Flügelmitte (Untergesicht mit media-  
nem Längskiel) . . . . . 10.  
 $r_1$  endet etwa am Ende des 1. Flügeldrittels . . . . . 11.
- 10) Stirn vorgezogen. Medianer Längskiel des Untergesichts  
sehr breit, oben zwischen den Fühlern nasenartig vorge-  
zogen. Pubescenz von Kopf und Thorax dicht, anliegend,  
gekämmt und lang. . . . . *Lipara* Meig. 1803.  
(Typus: *L. lucens* Meig. 1830. Europa.)

- Stirn nicht vorgezogen. Medianer Längskiel des Untergesichts sehr breit, oben zwischen den Fühlern nicht vorgezogen. Pubescenz von Kopf und Thorax kurz, abstehend, nicht gekämmt . . . . . *Calamoncosis* nov. gen.  
(Typus: *C. rufitarsis* [Loew. 1858] Europa.)
- 11) Vorderschenkel stark verdickt . . . . . 12.  
- nicht - . . . . . 13.
- 12) Von schmaler Gestalt. Schulterbeulen stark vortretend  
*Siphonellopsis* Strobl 1896.  
(Typus: *S. lacteibasis* Strobl 1896, Spanien.)  
Von gewöhnlicher Gestalt . . . . . *Epimadixa* Beck, 1910.  
(Typus: *S. rugosa* [de Meij.] Kamerun.)
- 13) Untergesicht nicht vorgezogen, meist rückweichend . . . 14.  
- mehr oder weniger spitz, vorgezogen . . . 28.
- 14) Thoraxrücken abgeflacht. Hintere Querader steil. Drittes Fühlerglied annähernd kreisrund. (Matt gefärbte, ziemlich nackte, düster gefärbte, schmal gebaute Arten) *Epibolus* Beck. 1910.  
(Typus: *E. sudeticus* Beck. 1910.)  
Thoraxrücken wie gewöhnlich gewölbt . . . . . 15.
- 15) Abdomen mehr oder weniger länglich . . . . . 16.  
- scheibenförmig, dünn, dorsoventral zusammengedrückt; beim ♂ kreisförmig, beim ♀ oval; die beiden ersten Tergite nimmt eine rundliche, flache Vertiefung fast ganz ein, die rostgelb gefärbt ist . . . . . 25.
- 16) Rückenschild mit 3—2 Längsfurchen . . . . . 17.  
- ohne Längsfurchen . . . . . 18.
- 17) Untergesicht mit medianem Längskiel . . . *Tricimba* Lioy 1864.  
(= *Notonaulax* Beck. 1903).  
(Typus: *Tr. lineella* [Fall. 1820] Europa.)  
Untergesicht ohne Längskiel . . . . . *Notaulacella* nov. gen.  
(Typus: *N. armillata* nov. spec. Südbrasilien.)
- 18) Hinterschenkel verdickt . . . . . *Meroscinis* de Meij. 1908.  
(Typus: *M. scutellata* de Meij. 1908 Java.)  
Hinterschenkel nicht verdickt . . . . . 19.
- 19) Hintere Querader senkrecht zu den Längsadern oder nur etwas schräg gestellt . . . . . 20.  
Hintere Querader stark schräg gestellt *Oscinomorpha* Lioy 1864.  
(Typus: *O. obliqua* [Macq 1835] Europa.)
- 20) Thoraxrücken mit deutlich ausgebildeten, reihenförmigen Dorsocentral- und Acrosticalborsten, verhältnismäßig lang behaarte Arten . . . . . *Lasiopleura* Beck. 1910.  
(Typus: *L. longepilosa* [Strobl] Mitteleuropa.)

- Thoraxrücken gleichmäßig dicht und kurz, nicht reihen-  
förmig behaart . . . . . 21.
- 21) Kopf geschwollen, mit auffallend kleinen Augen und brei-  
ten Backen, dem Helomyceinen-Typus *Eccoptomera* Loew  
entsprechend geformt . . . . . *Oedesiella* Beck. 1910.  
(Typus: *O. discolor* Beck. 1910. Sarepta.)  
Kopf nicht so gebildet . . . . . 22.
- 22) Stirn ziemlich breit (ohne jedes Scheiteldreieck)  
*Aprometopis* Beck. 1910.  
(Typus: *A. flavofacies* Beck. 1910, Afrika.)  
Stirn nicht besonders breit . . . . . 23.
- 23) Untergesicht mit medianem Längskiel . . *Tropidosecinis* nov. gen.  
(Typus: *Tr. lüderwaldti* nov. spec. Südbrasilien.)  
Untergesicht ohne Längskiel . . . . . 24.
- 24) Scutellum kurz, meist breit abgerundet  
*Oscinosoma* Liroy 1864. (= *Oscinis* Latr. 1804).  
(Typus: *O. cognata* Meig. 1830. Europa.)  
Scutellum schmal, langgestreckt dreieckig und nach hinten  
zu stark verjüngt . . . . . *Leptopeltastes* nov. gen.  
(Typus: *L. longiscutellata* nov. spec. Südbrasilien.)
- 25) Rückenschild mit fünf kräftigen, gekörnten Längsfurchen  
*Pentanotaulax* nov. gen.  
(Typus: *P. virgulata* nov. spec. Südbrasilien.)  
Rückenschild ohne Längsfurchen (nur zuweilen mit drei  
Längslinien eingestochener Punkte . . . . . 26.
- 26) Untergesicht mit medianem Längskiel. (Hintere Querader  
senkrecht zu den Längsadern oder nur etwas schräg ge-  
stellt, Rückenschild nur zuweilen mit 3 Längslinien einge-  
stochener Punkte) . . . . . *Discogastrella* nov. gen.  
(Typus: *D. grünbergi* nov. spec. Südbrasilien.)  
Untergesicht ohne Längskiel . . . . . 27.
- 27) Hintere Querader senkrecht zu den Längsadern oder nur  
etwas schräg gestellt . . . . . *Coryphisopteron* nov. gen.  
(Typus: *C. flavipes* nov. spec. Südbrasilien.)  
Hintere Querader stark schräg gestellt, nahezu parallel  
zum Flügelrande . . . . . *Loxobathmis* nov. gen.  
(Typus: *L. obliquans* nov. spec. Südbrasilien.)
- 28)  $r_{2+3}$  meist sehr kurz, nahe an dem Ende von  $r_1$  mündend  
(der Abstand der Enden von  $r_1$  und  $r_{2+3}$  ist kürzer als der  
von  $r_{2+3}$  und  $r_{4+5}$ , meist viel kürzer) . . . . . 29.  
 $r_{2+3}$  lang, das Ende ist mehr  $r_{4+5}$  genähert (der Abstand

- der Enden von  $r_1$  und  $r_{2+3}$  ist so lang oder länger als der von  $r_{2+3}$  und  $r_{4+5}$ . . . . . 30.
- 29) Thorax mit 3 Längsfurchen . . . . . *Microneurum* Beck. 1903.  
(Typus: *M. maculifrons* Beck. 1903. Ägypten.)  
Thorax ohne Längsfurchen . . . . . *Liomicroneurum* nov. gen.  
(Typus: *L. funiculum* [de Meij. 1908] Java.)
- 30) Thorax mit 3 Längsfurchen . . . . . *Ocella* nov. gen.  
(Typus: *O. mendoxana* nov. spec. Argentinien.)  
Thorax ohne Längsfurchen . . . . . 31.
- 31) Hintere Querader senkrecht zu den Längsadern oder nur etwas schräg gestellt . . . . . *Siphonella* Macq. 1835.  
(Typus: *S. oscinina* [Fall. 1820] Europa.)  
Hintere Querader stark schräg gestellt, nahezu parallel zum Flügelrande  
*Scoliophthalmus* Beck. 1903. (= *Anacamptoneura* Beck. 1903.)  
(Typus: *S. trapezoides* Beck. 1903. Ägypten.)
- 32) 3. Fühlerglied queroval (sackförmig nach unten hängend) oder beilförmig . . . . . 33.  
3. Fühlerglied normal . . . . . 34.
- 33) Thoraxrücken glatt, ohne Längsfurchen. Fühlerborste an der oberen Ecke des querovalen, sackförmig nach unten hängenden, 3. Fühlergliedes. Untergesicht ohne Längskiel . . . . . *Gampsocera* Schin. 1862.  
(Typus: *G. numerata* [Heeg. 1888] Europa.)  
Thoraxrücken dicht und fein punktiert, mit ein paar seichten Längsfurchen. 3. Fühlerglied beilförmig  
*Mepachymerus* Speiser 1910.  
(Typus *M. baculus* Speis. 1910, Deutsch-Ostafrika.)
- 34) Thorax verlängert, die Punkte zu deutlichen Längsreihen angeordnet. Seta lang und mäßig dick. Scutellum trapezförmig, stark genarbt, mit 2—6 Randborsten auf warzenförmigen Höckern. (Flügel zuweilen verkürzt oder rudimentär.) . . . . . *Elachiptera* Macq. 1835.  
(Typus: *E. brevipennis* [Meig. 1830] Europa.)  
Thorax kurz, quadratisch, oben glatt oder sehr fein punktiert. Seta kurz und sehr dick. Scutellum halbkreisförmig gewölbt, mit 2—4 gewöhnlichen Borsten, ohne warzenförmige Höcker *Melanochaeta* Bezzi 1906 (= *Pachychaeta* Bezzi 1895.)  
(Typus: *M. aterrima* [Strobl 1880] Südeuropa, Steiermark.)  
Die ausführlichen Beschreibungen finden sich in Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1911.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Enderlein Günther

Artikel/Article: [Analytische Tabelle der Gattungen der Chloropiden-Subfamilie Oscinosominae. 10-13](#)