

7 Haarporen. Hinterer Napf nicht verkleinert, fast so groß wie der mittlere, beide größer als der Vordernapf.

Anus spaltartig, ohne starken Chitinring.

Fundort: Färöer. Dr. A. Dampf. 1912.

2) *Hygrobatas longipalpis insulana* n. subsp.

In Größe und Gestalt wie *H. longipalpis* (Herm.).

Haut mit feinen Poren ausgestattet.

Palpe im 3. Gliede dorsoventral relativ schwächer, im 4. Gliede kürzer als bei Hermanns Art. Insertionsstelle der Beugeseitenhaare des 4. Gliedes in der Mitte des Gliedes, nicht distal davon. Palpenzapfen (am 2.) mehr wulstartig, breitbasig und niedrig.

4. Epimeren außen breiter als innen; hintere Innenecke der Platten nicht breit gerundet, sondern etwas abgeflacht, weil die Innenseitenmitte medianwärts schwach ausgezogen.

Beine im Vergleich mit denen der Art kürzer, auch die Borsten absolut und relativ kürzer, an den mittleren Gliedern der 3. und 4. Beine z. B. nicht länger als $\frac{1}{3}$ der Länge des jeweils folgenden Segments.

Genitalplatten kürzer als die Vagina. Hinterer Innennapf meist größer als der benachbarte äußere, in der Form länglich. Vorderer Napf meist klein.

Fundort: Färöer. Dr. A. Dampf. 1912.

II. Personal-Nachrichten.

Am 2. Februar 1918 starb in Genf der o. Professor und Direktor des Zoologischen Instituts der Universität Dr. Emil Yung im Alter von 63 Jahren.

Breslau — Halle.

Prof. Georg Wetzell, Prosektor am Anatomischen Institut in Breslau, wurde zum Abteilungsvorsteher am Anatomischen Institut und a.o. Professor in Halle (als Nachfolger von Prof. W. Gebhardt) ernannt.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zoologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Personal-Nachrichten. 32](#)