

Bibliotheca marchica historica-naturalis.

Verzeichnis der auf die Mark Brandenburg bezüglichen naturkundlichen Schriften und Karten vom Jahre 1906 — 1907 (mit Nachträgen aus früheren Jahren).

I. Geologie und Mineralogie.

Vom Geh. Bergrat Professor Dr. K. Keilhack-Wilmersdorf (Berlin).

Abkürzung:

Jb. für: Jahrbuch der Kgl. Preussischen Geologischen Landesanstalt.

Deutsches Bäderbuch, bearbeitet unter Mitwirkung des Kaiserl. Gesundheitsamtes. 4°. 535 S. Leipzig 1907.

Deutschlands Kalibergbau. Festschrift z. 10. Allg. Deutschen Bergmannstage. Herausgeg. von der Kgl. Preuss. Geol. Landesanstalt. Berlin 1907. Mit 11 Taf. und 5 Karten und Profilen.

Brinkmann, Walter. Die Braunkohlenformation im Nordosten der südlichen Neumark mit besonderer Berücksichtigung der Frage nach der Entstehung der in ihr auftretenden Störungen. Braunkohle, Jahrgang 6, 1907. No. 7, S. 109—113 und No. 8, S. 126—132.

Bruhns, W. Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche. 8°. Berlin 1906. 859 S. mit einer Karte.

Credner. Geol. Karte des Königr. Sachsen. 1:250 000. Leipzig 1907. Greift auf den südlichen Teil der Provinz über.

Elbert, Johannes. Die Entwicklung des Bodenreliefs von Vorpommern und Rügen, sowie der angrenzenden Gebiete der Uckermark und Mecklenburgs während der letzten diluvialen Vereisung. Aus dem 8. Jahresber. der geogr. Ges. zu Greifswald (1900—1903). 1904. S. 141—243, mit 6 kleinen Karten, 20 Tafeln und mehreren Textfig.

- Friedel, E. Über neuerliche Mammut-Funde. *Brandenburgia*, Monatsbl. XIII (1904/05) S. 330—333, 383.
- Mammut oder Nichtmammut. *Brandenburgia*, Monatsbl. XIV (1905/06), S. 465—468.
- Merkwürdiger Mammutfund. *Brandenburgia*, Monatsbl. XIV (1905/06), S. 514—516.
- Gagel, C. Über die stratigraphische Stellung des Glin-dower Tons. *Z. d. D. Geol. Ges.* Bd. 57. 1905. S. 33—35. 2 Abb.
- Über die untereocänen Tuffschichten und die paleocäne Transgression in Norddeutschland. Mit 2 Taf. *Jb.* 1907. XXVIII, Heft 1, S. 150—160.
- Geinitz, F. E. Die Eiszeit. 198 S. mit 25 Abb., 3 Taf. und 1 Tabelle. 8°. Braunschweig 1906.
- Hucke, K. Foraminiferen und Ostrakoden in glazialen Ablagerungen. *Helios*, Bd. 22. Berlin 1905. S. 82—85.
- Kaunhoven, F. Das geologische Profil längs der Berliner Untergrundbahn und die Stellung des Berliner Diluviums. Mit 1 Taf. *Jb.* Bd. 27, 1907. H. 3, S. 375—398.
- Keilhack, K. Geologische Beobachtungen während des Baues der Brandenburgischen Städtebahn. Mit 3 Taf. *Jb.* für 1903. S. 1—21.
- Ergebnisse von Tiefbohrungen, II. — *Jb.* für 1904. Bd. XXV, S. 847—1016. — III. ebenda für 1905. Bd. XXVI, S. 495—662. Beide Lieferungen enthalten die Profile zahlr. Tiefbohrungen aus der Provinz Brandenburg.
- Die geologische Geschichte der Niederlausitz. Vortrag, gehalten am 9. und 10. März im Volksbildungsverein in Cottbus. 23 S. 8°. Cottbus 1905.
- Sur le régime des eaux souterraines dans les dépôts quaternaires et tertiaires de l'Allemagne du Nord. *Congrès international des mines, Siège* 1905, S. 125—142.
- Klein, C. Handbuch für den Deutschen Braunkohlenbergbau. 504 S. mit einer geol. Karte, 13 Taf. u. 204 Abb. im Text. 8°. Halle a. S. 1907. Auf die Provinz Brandenburg beziehen sich die Abschnitte 3, Geologie der Braunkohle und 4, XIV, Die Braunkohlenformation in der Provinz Brandenburg, beide von K. Keilhack verfasst.

- Klose, H. Beitrag zur Kenntnis des Geröllmaterials in den Miocänablagerungen Norddeutschlands. Mitt. aus d. Nat. V. f. Neuvorpommern und Rügen. 36. 1904. S. 121—136.
- Krause, Paul Gustaf. Das Vorkommen von Fazettengeschieben in Ost- u. Westpreussen. Z. d. Geol. Ges., 57, 1905. Monatsber., No. 12, S. 460—462.
Führt auch Funde von Fazettengeschieben aus Brandenburg an.
- Einige Bemerkungen zur Geologie der Umgegend von Eberswalde und zur Eolithenfrage. Z. d. D. Geol. Ges., Bd. 58, 1906. Monatsber. Nr. 7, S. 197—209.
- v. Linstow, O. Über Verbreitung und Transgression des Septarientones (Rupeltones) im Gebiet der mittleren Elbe. Jb. f. 1904, S. 295—322. Mit 2 Prof. im Text und 1 Taf.
- Anstehendes Silur in der Mark Brandenburg und in der Provinz Sachsen. Centralbl. f. Min. usw. 1907. No. 7, S. 193—199.
- Menzel, P. Über die Flora der Senftenberger Braunkohlenablagerungen. Abh. d. Kgl. Pr. Geol. Landesanst. Neue Folge, Heft 46. 176 S. mit 6 Fig. im Text und 9 Taf. Berlin 1906.
- Menzel, Hans. Über die erste (älteste) Vereisung bei Rüdersdorf und Hamburg und die Altersstellung der Paludinschichten der Berliner Gegend. Centralbl. f. Min. 1906, No. 6, S. 181—189.
- Meyn, E. Aufnahmeergebnisse aus dem südlichen Fläming. Bericht über die Aufnahme der Blätter Straast und Hundelust. Jb. für 1904. XXV, S. 688—696. Berlin 1906.
- Nickel. Geologische Ausflüge in Frankfurt a. O. und seine Umgebung nebst Ergänzungen aus der Geologie des norddeutschen Flachlandes. Beilage zum Jahresber. des Realgymn. zu Frankfurt a. O., Sonderabdruck in 8°, 60 S. mit mehreren Abbild. 1906.
- Noppe. Das Braunkohlenvorkommen und der Betrieb der Grube „cons. Preussen“ bei Müncheberg in der Mark. Braunkohle, 5. 1906. S. 555—559. Mit 5 Textfig.
- Potonié, H. Über Kalkgyttja aus dem Bäketal, aufgeschlossen durch den Bau des Teltowkanals bei Berlin. Englers Bot. Jahrb. 1903. Bd. 33, H. 3.

- Potonié, H., Die Fichte als Moorbaum und über unsere Moore. Nat. Wochenschr. 1906. Bd. 21, S. 305—310.
- Raab, O. Neue Beobachtungen aus dem Rüdersdorfer Muschelkalk und Diluvium. Mit 2 Taf. Jb. für 1904. Bd. XXV, S. 205—217.
- Range, P. Der Untergrund des Patholog. Instituts der Kgl. Charitee in Berlin. Jb. für 1907. Bd. 28, H. 3, S. 457—461.
- Reichhelm, K., Die Riesenblöcke des Flämings. Mit 13 Abbild. Brandenburgia, Archiv XII, 1907, 230—242.
- Schröder, H. Hyaena aus märkischem Diluvium. Jb. f. 1904. XXV, S. 336—341.
- Schröder, H. und Stoller, J. Wirbeltierskelette aus den Torfen von Klinge bei Cottbus. Jb. für 1905, Bd. XXVI. Berlin 1906. S. 418—435.
- Solger, Fr. Über fossile Dünenformen im norddeutschen Flachlande. Verh. des 15. Deutschen Geographentages in Danzig. S. 159—172. Berlin 1905.
- Über interessante Dünenformen in der Mark Brandenburg. Monatsber. d. D. Geol. Gesellsch. Bd. 58, 1905. No. 4, briefl. Mitt., S. 179—190.
- Die Entstehung des brandenburgischen Odertales. Z. d. D. g. G. 1907. Ber. S. 230—253. Mit 5 Textfig.
- Zur Morphologie des Baruther Haupttales in seinem brandenburgischen Anteil. Mit Karte. Brandenburgia, Archiv XII, 1907. S. 165—193.
- Wahnschaffe, F., Gräbner, P., u. Dahl, Fr. Der Grunewald bei Berlin, seine Geologie, Flora und Fauna. Mit e. Anh.: „Kultureinflüsse auf Sumpf und Moor“ von H. Potonié. Jena, G. Fischer.
- Wahnschaffe, F. Die Seenrinne des Grunewalds und ihre Moore. Naturwiss. Wochenschr., N. F., Bd. 6 (d. g. R. 22). 1907. No. 21, S. 321—330.
- Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgeg. von der Kgl. Pr. Geol. Landesanst. 1906. Lief. 118. 4 Blätter nebst Erläuterungen und Übersichtskärtchen, sowie 1 Nebenkarte der Braunkohlenflöze.
- | | | |
|--------------|---|-------------------------|
| Blatt Massin | } | bearbeitet von J. Korn. |
| „ Hohenwalde | | |
| „ Vietz | | |
| „ Költzchen | | |

Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgeg. von der Kgl. Pr. Geol. Landesanst. 1907. Lief. 132. 1:25 000.

Blatt Görzke, bearbeitet von K. Keilhack und Th. Schmierer.

Blatt Belzig	}	bearbeitet von K. Keilhack.
„ Brück		
„ Stackelitz	}	bearbeitet von K. Keilhack und O. v. Linstow.
„ Klepzig		
„ Niemegek		

II. Zoologie.

Von Prof. Dr. C. Matzdorff, Berlin-Pankow.

Verhoeff, K. W. Über Isopoden. 10. Aufsatz: Zur Kenntnis der Porcellioniden (Körnerasseln). Sitzgsber. Ges. Natf. Fr. Berlin, 1907, S. 229—281. — Verhoeff entdeckte bei Rüdersdorf unter Steinen und Moos die neue Art Porcellio (Untergattung Euporcellio) balticus. Sie ist auch über einen grossen Teil Österreich-Ungarns verbreitet. Die Propodite der Uropoden sind am Aussenrande ungefähr so lang wie am Hinterrande; dieser steht quer. Der Rücken ist gekörnt, aber nicht flaumig behaart. Der Stirnmittellappen ist gross und kreisförmig nach vorn vorragend. Der Hinterrand des 1. bis 4. Segmentes ist ohne Körnelung. Die Tiere sind schieferschwartz, am Grunde der Epimeren steht jederseits eine Reihe heller Flecke. Länge 8—12 mm.

Bekämpfung der Stechmückenplage. Voss. Ztg. 21. II. 1908. — Behördlicherseits wird die Vertilgung der Stechmücken durch Bedeckung der Brutplätze mit Petroleum oder Sabrol, sowie durch Abbrennen und Ausräuchern der überwinternden Weibchen in Kellern und Schuppen empfohlen.

Vertilgung der Kieferspinnerraupe. Voss. Ztg. 20. II. 1907. — Bei Frankfurt a. O. und Reppen treten die Kieferspinner sehr stark auf.

Vertilgung der Nonne. Voss. Ztg. 22. VIII. 1907. — Bei Oranienburg ist die Nonne, bei Stolzenhagen nördlich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1908-1910

Band/Volume: [24-25](#)

Autor(en)/Author(s): Keilhack K.

Artikel/Article: [Bibliotheca marchica, historica-naturalis. - Geologie und Mineralogie. 158-163](#)

