

### 3. Nachtrag

zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig.

Vierte Auflage 1894.

Von **Th. Jenner**, Braunschweig.

---

#### Vorrede zum Nachtrag.

Die mancherlei botanischen Notierungen nutzbar zu machen, namentlich eine größere Anzahl der mir gütigst von Herrn Apotheker Bodenstab überwiesenen aus dem Amte Calvörde und dem angrenzenden Kreise Neuhaldeleben, der als Nachbargebiet hier mit eingezogen wird, veranlassen mich schon jetzt, einen dritten Nachtrag den ersten beiden von 1904 und 1909 folgen zu lassen. Auch werden wiederum einige häufig kultivierte Pflanzen den bereits aufgezählten angereiht werden.

Zugleich erlaube ich mir, an dieser Stelle allen Herren, welche bereitwilligst ihre Angaben zur Verfügung stellten, namentlich Herrn Apotheker Bodenstab, Herrn Lehrer Bode, Herrn Forstassessor Volger, Herrn Zahntechniker Paul, meinen Dank auszusprechen. Die Abkürzung dieser Namen geschieht in bekannter Weise.

Braunschweig, im Mai 1912.

## Samenpflanzen.

1. **Clematis Vitalba L.** Waldungen bei Calvörde, Neuhaldensleben, Walbeck und Weferlingen. (Bst.)  
Kalksteinbruch bei Nordsteimke. (B.)
2. **Thalictrum flavum L.** Ohrewiesen bei Calvörde. (Bst.)  
**Thalictrum angustifolium Jacq.** Ohrewiesen bei Calvörde. (Bst.)  
Rieden bei Vorsfelde. Poliz bei Brechtorf, Wendeschott, Kiefholz bei Grafhorst, Hühlinger Holz. (B.)
4. **Pulsatilla vulgaris Miller.** Berge bei Calvörde. (Bst.)  
**Pulsatilla pratensis Miller.** Berge bei Calvörde. (Bst.)  
**Pulsatilla vernalis Miller.** Frühlingskuhschelle. Untere Blätter einfach gefiedert, Blättchen eiförmig, dreispaltig, Zipfel ungeteilt oder zwei- bis dreizählig. April bis Mai. Eyssselheide zwischen Isenbüttel und Gifhorn, links vom Bahndamm. (Pl.)  
**Pulsatilla patens Miller.** Ausgebreitete Kuhschelle. Untere Blätter dreizählig, Blättchen meist dreiteilig, Zipfel länglich, an der Spitze eingeschnitten, zwei- bis dreizählig oder vierspaltig. Sonnige Hügel, Heiden. April bis Mai. Hagen bei Neuhaldensleben. (Bst.)
5. **Anemone nemorosa L.** Var.: *minutiflora Kretzer*. Hoher Weg am Beddinger Holze. (Pl.)  
**Anemone silvestris L.** Am Nußberge bei Braunschweig verschwunden, dagegen mehrfach bei Alfeld a. d. Leine. (Volger.)  
Waldungen bei Weferlingen und Walbeck. (Bst.)
6. **Adonis aestivalis L.** Auf Äckern bei Walbeck. (Bst.)  
**Adonis flammeus Jacq.** Sülzeberg bei Kl.-Bartensleben. (Bst.)  
**Adonis vernalis L.** Kalkberg bei Ermsleben a. d. Selke. (Th. J.)  
Olve-Bevortal bei Neuhaldensleben, stellenweis häufig. (Bst.)
7. **Myosurus minimus L.** Am hohen Wege vor dem Beddinger Holze und bei Kneitlingen am Elm. (Pl.)  
Feuchter Acker bei Calvörde. (Bst.)
8. **Batrachium hederaceum E. M.** Bäche bei Velstorf, Flechtingen, Böddensell. (Bst.)  
Unweit Reislingen. (B.)  
**Batrachium fluitans Wimmer.** Bäche der Ohreniederung. (Bst.)

- Batrachium divaricatum** Wimmer. Brüche an dem Steinbruchteiche, Viehtränke. (Bst.)  
Unweit Kästorf und Ehra. (B.)
- Batrachium aquatile** Koch. Var.: *capillaceum* Rollier. Blätter sämtlich haarfein. Graben am Reinhardtsteich, Schapenbruch. (Pl.)
- Batrachium Petivéri** Koch mit und ohne Schwimmblätter. Drömlingsgräben. (B.)
9. **Ranunculus Lingua** L. Pawelsches Holz, Kaulenteich an der Buchhorst. (Th. J.)  
Unweit Wolfsburg und Poliz. (B.)
- Ranunculus sardous** Crantz. Calvörde, Flechtingen, Ohrewiesen usw. (Bst.)
- Ranunculus polyanthemus** L. Waldränder und Lichtungen bei Calvörde. (Bst.)
- Ranunculus arvensis** L. Ackerland bei Calvörde. (Bst.)
12. **Trollius europaeus** L. Bei Bischofswald, Spitzbergwiesen, Krähenwiesen, Sülzewiesen bei Bartensleben und Bodendorf. (Bst.)
14. **Helleborus viridis** L. Sackwald bei Alfeld. (Volger.)  
**Helleborus foetidus** L. Stinkende Nieswurz. Stengel vielblütig, beblättert. Untere Blätter fußförmig mit sieben bis neun Blättchen, obere dreispaltig. Deckblätter der Äste und Blütenstiele eiförmig. März bis April. Am Elm bei Kneitlingen nach Samleben zu. (Pl.)
15. **Nigella arvensis** L. Lehacker bei der Ziegelei Calvörde. (Bst.)
16. **Aquilegia vulgaris** L. Buchberg bei Walbeck. (Bst.)
18. **Aconitum Lycoctonum** L. Siebenberge bei Alfeld. (Volger.)
19. **Actaea spicata** L. Oberholz am Backofenberge bei Calvörde, unweit Neuwaldensleben. (Bst.)  
Am Butterberge bei Harzburg. (Kretzer.)
20. **Berberis vulgaris** L. tritt in mancherlei verschiedenen Formen auf, von denen außer der gemeinen noch die Form *purpurea de Cand.* mit blutroten Blättern erwähnt werden soll.
21. **Nymphaea alba** L. Wassertümpel in der Ohreniederung. (Bst.)
23. **Papaver dubium** L. Ackerland am Oder, auch am Selter über Greene. (Th. J.)  
Bei Vorsfelde. (B.)

25. **Corydalis intermedia** P. M. E. = *C. fabacea* Pers.  
Wellenberge am Benitz. (Bst.)  
**Corydalis solida** Smith. Beinröder Holz hinter dem  
Forsthause beim Gute Campen. (Pl.)  
**Corydalis pumila** Host. Wellenberge am Benitz. (Bst.)  
**Corydalis claviculata** de Candolle. Wurzel einfach,  
Blätter doppelt gefiedert, Blattstiele in Wickelranken  
endigend. Deckblätter länglich, zugespitzt, gezähnt,  
länger als die Blütenstielchen. Im Dragen bei Station  
Triangel und im Park in Triangel. (Pl. und Th. J.)
26. **Fumaria Vaillantii** Loiseleur. Auf Kalkboden bei  
Walbeck. (Bst.)
27. **Nasturtium officinale** R. Br. Uthmöden, Horstmühle,  
Wieglitz im Amt Calvörde. (Bst.)  
**Nasturtium officinale** R. Br. Var.: *siifolium* Rchb.  
Vereinzelt bei Vorsfelde und Wolfsburg. (B.)  
**Nasturtium anceps** Reichenb. Wiesen bei Uthmöden  
bei Calvörde. (Bst.)
28. **Barbarea stricta** Andrzej. Allerufer, auch bei Vors-  
felde und Wolfsburg. (B.)
29. **Turritis glabra** Linné. Wegränder, Chausseegräben  
bei Calvörde auf Sandboden. (Bst.)  
Unweit Ehra bei Calvörde. (B.)
30. **Arabis Gerardi** Besser. Domberg bei Walbeck. (Bst.)  
**Arabis hirsuta** Scopol. Domberg bei Walbeck, Forsten  
bei Alvensleben. (Bst.)  
**Arabis Halleri** Linné. Feuchte Äcker, Böschungen usw.  
bei Calvörde. (Bst.)  
Am Schlackenplatze der Mathildenhütte bei Harzburg.  
(Kretzer.)  
**Arabis bellidifolia** Jacq. Maßliebenblättrige Gänse-  
kresse. Blätter und Stengel kahl, reichblättrig, Grund-  
blätter rosettig, Stengelblätter eiförmig oder länglich,  
halb stengelumfassend. Krone weiß.  
Steinige Triften am Rieseberge. (W. Bl.)
31. **Cardamine impatiens** Linné. Letzlinger Heide. (Bst.)  
**Cardamine silvatica** Link. Feuchte Wälder, Rohr-  
burg bei Calvörde. (Bst.)  
**Cardamine amara** Linné. Quelle in Isernhagen, nach  
Velsdorf zu, Letzlinger Heide. (Bst.)
32. **Dentaria bulbifera** Linné. Siebenberge bei Alfeld.  
(Volger.)
33. **Sisymbrium pannonicum** Jacq. Auf Bahnhöfen und  
Bahndämmen im Amte Calvörde. (Bst.)

38. *Brassica nigra* Koch. Wüste Plätze im Bürgerpark in Braunschweig. (Th. J.)  
Vorsfelde, Velstove. (B.)
39. *Sinapis alba* Linné. Ackerränder bei Calvörde. (Bst.)
41. *Diplotaxis muralis* de Cand. An Bahndämmen, auf Bahnhöfen. (Bst.)  
Unweit Rothenkamp. (Paeske.)  
Bahnhof Vorsfelde, Weg zum Klieversberge. (B.)
42. *Alyssum calycinum* Linné. Am Klieversberge, Amt Calvörde. (B.)
44. *Lunaria rediviva* Linné. Dünger Berge bei Brunkensen. (Volger.)
47. *Camelina sativa* Crantz. Ackerland bei Calvörde. (Bst.)  
*Camelina sativa* Crantz. Var.: *dentata* Pers. Auf Ackerland, am Bahndamm bei Calvörde. (Bst.)
50. *Teesdalea nudicaulis* R. Br. Auf Sandboden bei Calvörde. (Bst.)
52. *Lepidium campestre* R. Br. Bei Walbeck, Schwanzfeld. (Bst.)  
Am Klieversberge. (B.)
- Lepidium ruderales* Linné. Auf Schutt und wüsten Plätzen bei Calvörde. (Bst.)  
Bahnhof Oebisfelde. (B.)
55. *Coronopus Ruelli* Allioni. In Dörfern, Amt Calvörde zuweilen. Bei Neuwaldensleben häufiger. (Bst.)  
In Vorsfelde. (B.)
62. *Helianthemum vulgare* Gärtner. Trockene, sonnige Berghalden bei Calvörde, häufig. (Bst.)
63. *Viola palustris* Linné. Unweit Calvörde und im Drömling. (Bst.)  
Am Ehraer Teiche. (B.)
- Viola mirabilis* Linné. Auf dem Rieseberge. (Th. J.)  
Bei Bodendorf am Silberstollen. (Bst.)
- Viola stricta* Hornemann. Unweit Zernitz und Pudegrin. (Bst.)
64. *Reseda lutea* L. Calvörder Ziegelei, Walbeck. (Bst.)
65. *Drosera rotundifolia* Linné. Alter Teich bei Vorsfelde, Ehraer Teich, Hühnenburg bei Danndorf. (B.)
- Drosera intermedia* Heyne. Alter Teich bei Vorsfelde, Ehraer Teich, Velstove. (B.)
- Drosera anglica* Huds. Südrand der Knesebecker Forst bei Wahrenholz, Kreis Gifhorn. (Paul.)

- Moorstelle am Allerkanal, Südseite, in der Nähe der Brücke bei Winkel. (Koch.)
67. *Gypsophila muralis* Linné. Sandiger Lehmboden bei Calvörde, Schierholzacker, Schwalbenschwanz. (Bst.)  
Engelhof bei Vorsfelde, Danndorf. (B.)
68. *Dianthus prolifer* Linné. Unweit Hundisburg. (Bst.)  
*Dianthus Armeria* Linné. Westlicher Kreis Neuhaldensleben. (Bst.)  
Klieversberg. (B.)  
*Dianthus Carthusianorum* L. Trockene Berghalden Amt Calvörde. (Bst.)  
Bickelsteiner Heide bei Ehra. (B.)  
*Dianthus superbus* Linné. Schimmerwald bei Harzburg. (Volger.)  
Südseite der Calvörder Berge, Zernitz, Krähenfußwiesen. (Bst.)
69. *Saponaria officinalis* Linné. Zernitz, Amt Calvörde. (Bst.)  
Unweit Wolfsburg. (B.)
- Cucubalus baccifer* L. Beerentragender Hühnerbiß. Stengel schwach kletternd, weitästig; Blätter länglich eiförmig, spitz; Blüten end- und blattwinkelständig; Kelch bauchig-glockig; Kronblätter zweispaltig; Beeren schwarz, glänzend. VII bis IX. Unter Gebüsch in der Börde bei Calvörde. (Bst.)
70. *Silene inflata* Smith. Chausseegräben bei Calvörde. (Bst.)  
*Silene Otites* Smith. Sandige Triften bei Calvörde. (Bst.)  
*Silene nutans* Linné. Calvörder Berge, Isernhagen. (Bst.)
73. *Viscaria vulgaris* Röhe. Calvörder Berge, Bahndamm. (Bst.)
75. *Sagina nodosa* Fenzl. Calvörde, Süpplinger Steinbruch. (Bst.)  
Drömling, Joneck. (B.)  
*Sagina apetala* Linné. Auf Sandboden unweit Calvörde. (Bst.)
76. *Alsine verna* Bartl. Kupferschieferhalden bei Alvensleben. (Bst.)  
Schlackenplatz bei der Mathildenhütte bei Harzburg. (Kretzer.)

80. *Stellaria nemorum* Linné. Rohrburg, Zernitz b. Calvörde. (Bst.)  
 Am Dowesee bei Braunschweig in Menge. (Th. J.)
- Stellaria glauca* Withering. Torfstiche, Drömlingsgräben. (Bst.)  
 Alte Aller bei Vorsfelde, Dämme, Rieden. (B.)
- Stellaria graminea* Linné. Waldungen Amt Calvörde. (Bst.)
- Stellaria uliginosa* Murray. Wassergräben der Ohreniederung. (Bst.)  
 Teichränder bei Riddagshausen. (Th. J.)
83. *Cerastium glomeratum* Thuile. Isernhagen, Zernitz, Schierholz. (Bst.)
84. *Linum catharticum* Linné. Triften und Wiesen im Amt Calvörde. (Bst.)
85. *Radiola millegrana* Smith. Ackerland bei Calvörde und Wegenstedt. (Bst.)  
 Engelhof bei Vorsfelde, Hühnenberg bei Danndorf. (B.)
86. *Malva Alcaea* Linné. Roxförder Kirchhof, Walbeck, Bodendorf. (Bst.)
- Malva rotundifolia* Linné. Unweit Neuhaldensleben, Hillersleben. (Bst.)
89. *Tilia intermedia* de Candolle = *T. vulgaris* Hayne = *T. grandifolia* parvifolia findet sich überall in Anpflanzungen und unter den Eltern. (Th. J.)
90. *Hypericum tetrapterum* Fries. An der Ohre bei Uthmöden. (Bst.)
- Hypericum quadrangulum* Linné. Grieps, Zernitz, Wälder bei Süpplingen. (Bst.)
- Hypericum humifusum* Linné. Am Oder, Pawelschen Holz. (Th. J.)  
 Sandige Triften bei Calvörde. (Bst.)  
 Neuhaus bei Vorsfelde. (B.)
- Hypericum hirsutum* Linne. Feuchte Waldungen bei Calvörde. (Bst.)
- Hypericum pulchrum* Linné. Triften südlich am Oder. (Th. J.)
- Hypericum montanum* Linné. Schwanefeld, Klapperberg, Alvensleber Forst. (Bst.)
- Elatine Alsinastrum* Linné. Quirliger Tännel. Stengel bei der Landform aufrecht, bei der Wasserform schwimmend, röhrenförmig. Blüten fast sitzend, Blumenkrone vierblättrig, achtmännig, Samen fast gerade ☉. 4. Teiche,

- Sümpfe. Juli bis August. Krone grünlichweiß.  
Stengel bei der Landform kaum 0,02, bei der Wasser-  
form 0,15 bis 0,50.  
Emdener Forst, Bever. (Bst.)
95. *Geranium pratense* Linné. Waldränder, Gräben bei  
Calvörde. (Bst.)
- Geranium silvaticum* Linné. Bischofswald, Buchen-  
berg. (Bst.)  
Bei Wendessen, Neuhaus im Solling. (Volger.)
- Geranium palustre* Linné. Waldränder, Gräben un-  
weit Calvörde und Neuholdensleben. (Bst.)
- Geranium sanguineum* Linné. Zernitz, Krähenfuß-  
wiesen, Gothewiesen. (Bst.)
- Geranium columbinum* L. Walbeck, Altenhausen.  
(Bst.)
97. *Impatiens noli tangere* Linné. Rohrberg, Boden-  
dorf, Waldgräben. (Bst.)
98. *Oxalis corniculata* Linné. Bei Veltheimsburg. (Bst.)
104. *Ilex Aquifolium* Linné. Im Sundern bei Rothen-  
kamp. (W. Bl.)  
Als Baum in den Klippen der Neubäuser Schweiz.  
(B.)
105. *Ulex europaeus* Linné. Vorsfelder Heide. (Bst.)  
Langerberg, Neuhaus, Velpke. (B.)
106. *Sarothamnus scoparius* Koch. Sandboden bei Cal-  
vörde. (Bst.)
107. *Genista pilosa* Linné. Sandboden bei Calvörde. (Bst.)  
*Genista germanica* Linné. Isernhagen, Zernitz.  
(Bst.)  
Lindenbruch hinter Bündheim b. Harzburg. (Kretzer.)
- Genista anglica* Linné. Unweit Velstove, Neuhaus.  
(B.)
108. *Laburnum alpinum* Griseb. Alpengoldregen. Hülsen  
kahl. Blätter gewimpert, unterseits kahl. Untere  
Blütenstiele so lang wie die Blüte. Hülsen an der  
oberen Naht geflügelt. Mai bis Juni. Alpengebiete.  
Häufig angepflanzt.
- Colutea arborescens* × *orientalis*. Häufig angepflanzt.
110. *Ononis repens* Linné. Triften, Anger bei Calvörde.  
(Bst.)
111. *Anthyllis Vulneraria* Linné. Chausseegräben bei  
Flechtingen und Calvörde. (Bst.)
112. *Medicago falcata* Linné. Roxförder Kirchhof, Hundis-  
burger Steinbruch, Walbeck. (Bst.)



- Medicago minima** Linné. Felsen der Hühnerküche bei Alvensleben. (Bst.)
- Medicago maculata** Willd. Am Bahndamm bei Großdenkte, Haltestelle. (Pl.)
114. **Trifolium striatum** Linné. Alvensleber Forst, Hühnerküche. (Bst.)  
Unweit Nordhausen. (Osswald.)
- Trifolium alpestre** Linné. Isernhagen, Moosbruch, Zernitz. (Bst.)
- Trifolium rubens** Linné. Emdener Forst, Köpfchenberg. (Bst.)
- Trifolium montanum** Linné. Ith, oberhalb Capellenhagen, verbreitet. (Volger.)  
Böddensell, Moosbruch. (Bst.)
- Trifolium filiforme** Aut. = *T. minus* Smth. Triften und Grabenränder bei Calvörde. (Bst.)
- Trifolium agrarium** Linné. Lichte Wälder, Amt Calvörde. (Bst.)
115. **Lotus uliginosus** Schkuhr. Sumpfige Wiesen, Amt Calvörde. (Bst.)
116. **Tetragonolobus siliquosus** Roth. Krähenfuß- und Gothewiesen. (Bst.)
117. **Robinia Pseudacacia** Linné. Von den vielen Formen seien folgende angeführt:
- |                     |   |                             |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Robinia Pseudacacia | } | amorphifolia, hort.         |
|                     |   | angustifolia, hort.         |
|                     |   | angustifolia elegans Beißn. |
|                     |   | foliis variegatis, hort.    |
|                     |   | monophylla, hort.           |
|                     |   | pendula, hort.              |
|                     |   | tortuosa de Candolle.       |
|                     |   | umbraculifera de Candolle.  |
- Robinia dubia** Fouc. = *R. Pseudacacia* × *viscosa*. Vereinzelt in Anlagen Braunschweigs. (Th. J.)
118. **Astragalus danicus** Retz. Am Heeseberge bei Beierstedt. (W. Bl.)
119. **Coronilla montana** Scopol. Siebenberge bei Alfeld. (Volger.)
- Coronilla varia** Linné. Chausseegräben zwischen Planke und Zackelberg. (Bst.)
120. **Ornithopus perpusillus** Linné. Waldwege auf Sandboden bei Calvörde. (Bst.)

- Ornithopus sativus Brotero.** Destedter Forst, verwildert. (Th. J.)  
Chausseegräben bei Calvörde. (Bst.)
- 123. Vicia pisiformis Linné.** Emdener und Alvensleber Forst. (Bst.)  
**Vicia dumetorum Linné.** Emdener Forst bei Calvörde, vereinzelt. (Bst.)  
**Vicia silvatica Linné.** Im Fallstein. (Pl.)  
Am Silberstollen bei Bodendorf. (Bst.)  
**Vicia cassubica Linné.** Am Allerkanal neben der Schleuse und am Wege nach Leiferde. (Pl.)  
Emdener Forst am Bever. (Bst.)  
**Vicia villosa Rth.** Auf Ackerland bei Calvörde. (Bst.)  
**Vicia tenuifolia Roth.** Walbeck, Bodendorf, Hohlbeck. (Bst.)  
**Vicia lathyroides Linné.** Am Wege von Calvörde nach Flechtingen, Sandgrube bei Dönstedt. (Bst.)
- 126. Lathyrus tuberosus Linné.** Börde bei Wintersbusch und Satuelle. (Bst.)  
**Lathyrus silvester L.** Var.: *ensifolius Buek.* Blättchen schmal. Am Butterberge bei Harzburg. (Th. J.)  
Bodendorf, Emdener Forst. (Bst.)  
**Lathyrus paluster Linné.** Ohrewiesen bei Piepers Steg. (Bst.)  
Kiefholz bei Grafhorst. (B.)  
**Lathyrus vernus Bernh.** Walbeck, Bodendorf. (Bst.)  
**Lathyrus niger Bernh.** Emdener Forst, Waldwiesen, Silberstollen. (Bst.)  
**Lathyrus montanus Bernh.** Krähenfußwiesen, Köpfchenberg. (Bst.)
- 128. Prunus Myrobalana Linné = P. cerasifera Ehrh.** Kirschkpflaume. Blätter unterseits anfangs neben dem untersten Teil der Mittelrippe mehr oder weniger filzig, zuletzt fast kahl. Zweige und Blütenstiele kahl. Blüten einzeln. Früchte kugelig, hängend. April. Hin und wieder angepflanzt.  
Var.: *purpurea Spaeth = P. Pissardi Carr.* Blätter braunrot. Blutpflaume. Häufig angepflanzt.
- 129. Spiraea filipendula Linné.** Sonnige Anhöhen, Moosbruch, Letzlinger Heide. (Bst.)
- 130. Geum rivale Linné.** Nasse Wiesen bei Calvörde. (Bst.)  
**Waldsteinia geoides Willd.** Station Triangel, verwildert. Kelch glockig, 2 bis 4 kurz gestielte Fruchtknoten und abfallende Griffel. (Pl.)

131. *Rubus saxatilis* Linné. Gehölz bei Neuhaus a. d. Aller, nach Gifhorn zu am Holzrande. (Pl.)  
 Emdener Forst. (Bst.)  
 Unweit Poliz. (B.)  
*Rubus fissus* Lindl. Busch zwischen Althaldensleben und Hundisburg. (Bst.)  
*Rubus odoratus* Linné. Stammt aus Nordamerika, hier häufig angepflanzt. Triebe, Blatt- und Blütenstiele dicht stieldrüsiger, Nebenblätter länglich bis lanzettlich. Blätter bis 30 cm breit, tief herzförmig, drei- und fünfspaltig, ungleich bis doppelt gesägt, unterseits grün. Blüten rot, selten weiß, bis 4 cm breit. Kelchzipfel lang geschweift, Kelchbecher innen rauh-zottig. Mitte Juni bis August.
132. *Fragaria collina* Ehrh. Calvörder Berge. (Bst.)  
*Fragaria elatior* Ehrh. Bei Bischofswald und Hüsig. (Bst.)
133. *Comarum palustre* Linné. Gräben und Sumpfwiesen im Kreise Gifhorn. (Th. J.)  
 Drömling, Dämme, Rieden, Alter Teich. (B.)
134. *Potentilla alba* Linné. Moosbruch, Benitzwiesen. (Bst.)  
*Potentilla fragariastrum* Ehrh. Waldungen im Amte Calvörde und im Kreise Neuhaldensleben. (Bst.)  
*Potentilla supina* Linné. Böddensell vor der Schule, bei Emden und Altenhausen. (Bst.)  
*Potentilla procumbens* Sibthorp. Moosbruch, Hilgesdorf, Pudegrin. (Bst.)  
*Potentilla arenaria* Borkh. Hundisburger Steinbruch. (Bst.)  
*Potentilla opaca* Linné. Calvörder Berge. (Bst.)
135. *Alchemilla arvensis* Scopol. Feuchter Acker vor dem Benitz. (Bst.)
136. *Sanguisorba officinalis* Linné. Wiesen vor Hilgesdorf, Neuhaldensleber Schützenhauswiesen. (Bst.)
137. *Agrimonia odorata* Linné. Germersleber Wiesen, am Walde, Ivenrode. (Bst.)
138. *Rosa tomentosa* Smith. Isernhagen, Domberg in Walbeck. (Bst.)  
*Rosa rubiginosa* Linné. Klosterberg bei Walbeck. (Bst.)
139. *Crataegus coccinea* Linné. Scharlachfrüchtiger Weißdorn. Alle Zweige kahl. Dornen 3 bis 5 cm lang. Blattstiele  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  so lang wie die Spreite, sparsam

und scharf doppelt-drüsig gesägte Lappenpaare. Oberseits anliegend kurzhaarig, unterseits kahl oder zerstreut zottig. Dolden sieben- bis zehnbütig, Blütenstiele und Becher zottig, innen mit grün bleibendem Diskus. Kelchzipfel zweimal so lang wie die Becher, auf der Frucht aufrecht abstehend, die Frucht scharlachrot. Mai. Vaterl.: Nordamerika. Sehr häufig angepflanzt.

- 143. Pirus.** Zweige schräg nach oben gerichtet, dadurch Krone mehr oder weniger pyramidal. Griffel frei, Blütenblätter weiß. Frucht länglich, zuweilen kugelig, in dem Fruchtsiel vorgezogen. Rinde der Stämme längsrissig, nicht abblättern.

**Pirus communis Linné.**

- a) *P. communis silvestris* Beißn. Wilder Birnbaum, Holzbirne.  
b) *P. communis sativa* de Candolle. Kultivierter Birnbaum.

**Malus.** Zweige meist wagerecht gestreckt, dadurch die Krone unregelmäßig ausgebreitet. Griffel am unteren Ende zusammengeklebt. Blütenblätter an der Außenseite meist rot oder rötlich. Frucht mehr oder weniger kugelig. Fruchtsiel in trichterförmiger Vertiefung. Rinde des Stammes abblättern.

**Malus silvestris Miller,** nicht mehr *Pirus Malus* Linné.

- a) *M. silvestris austera* Wenz. (= *acerba*). Säuerling.  
b) *M. silvestris mitis* Wallr. Süßling.

**Malus paradisiaca Medicus.** Hauptstammart unserer zahllosen Apfelsorten, häufig als Zierstrauch kultiviert. Triebe anfangs filzig. Blätter auf filzigen oder rauh-zottigen Stielen, eiförmig, eilänglich oder elliptisch, kerbig gesägt bis stark eingekrümmt gesägt, wenigstens unterseits dauernd weichhaarig-filzig, glanzlos. Blütenstiele 8 bis 35 mm lang, wie die Blütenbecher und Kelchzipfel weißfilzig, oder der oberste Teil des Blütenbeckers nebst den Kelchzipfeln außen kahl. Blumenblätter etwa 20 bis 23 mm lang mit kurzem Stiel. Griffel über der Trennungsstelle mehr oder weniger behaart. Frucht länger als der Stiel, angenehm säuerlich bis süß. Höhe etwa 10 m. Mai bis Juni.

**144. Sorbus torminalis Crantz.** Emdener Forst. (Bst.)

**145. Epilobium hirsutum Linné.** Vor dem Rohrberge  
a. d. Bever. (Bst.)

- Epilobium parviflorum Schreb.** Wiesen, Gräben, Waldränder bei Calvörde. (Bst.)
- Epilobium roseum Schreb.** Etingen bei Calvörde. (Bst.)
- Epilobium obscurum Reichenb.** = *E. virgatum* und *chordorrhizum* Fries. Wintersbusch bei Calvörde. (Bst.)
- Epilobium palustre Linné.** Torfstiche, Wassertümpel der Ohreniederung. (Bst.)
146. **Oenothera biennis Linné.** Unweit Vorsfelde. (B.)
147. **Circaea lutetiana Linné.** Feuchte, lichte Waldungen bei Calvörde. (Bst.)
149. **Isnardia palustris Linné.** Moorwassergraben bei Wahrenholz an der Bahn nach Süden zu. (Pl.)
150. **Myriophyllum verticillatum Linné.** Wassergräben bei Triangel b. Wahrenholz, der Bahn entlang. (Pl.)  
Wassergräben, Horstmühle bei Calvörde. (Bst.)  
Alte Aller bei Warmenau, Rieden. (B.)
- Myriophyllum alterniflorum de Candolle.** Im Graben vom Hillerseschen Kulk nach Didderse zu. (Pl.)  
Aller bei Vorsfelde, Dämme. (B.)
151. **Hippuris vulgaris Linné.** Apenteich bei Freden. (Volger.)  
Mündung des Kahngrabens in die Ohre. (Bst.)  
Emdener Teiche, Papenteich. (B.)
152. **Callitriche vernalis Kütz.** Var.: *minima*. In ausgetrockneten Wassertümpeln bei Querum hinter Wilhelmsblick. (Pl.)  
**Callitriche hamulata Kütz.** Wassertümpel neben der Windmühle bei Riddagshausen. (Pl.)
153. **Lythrum Hyssopifolia Linné.** Feuchter Acker vor Piepers Steg, Velsdorfer Weide. (Bst.)
154. **Peplis Portula Linné.** Rohrberg, Stellbahn. (Bst.)  
Engelhof bei Vorsfelde, Velstove, Neuhaus. (B.)
155. **Ceratophyllum demersum Linné.** Dämme, Rieden bei Vorsfelde. (B.)  
**Ceratophyllum submersum Linné.** Im tauben Loch westlich von Brenneckenbrück. (Pl.)
- Philadelphus coronarius Linné.** Gemeiner Pfeifenstrauch. Blätter elliptisch, zugespitzt, gesägt, gezähnt, Blüten achselständig, die obersten in dreiteiligen Trugdolden, Griffel tief vierspaltig, kürzer als die Staubfäden, zweijährige Rinde in großen Stücken

- sich lösend. Vaterland: Südeuropa. Mai bis Juni.  
Häufig gepflanzt.
- 156. Bryonia alba Linné.** An Hecken bei Zeseritz, Süd-  
seite. (Bst.)  
Kreis Gifhorn und Vorsfelde. (B.)
- 157. Montia minor Gmelin.** Grabenrand links der Bahn  
Isenbüttel—Leiferde. (Pl.)  
Velsdorfer Weide, Wannenäcker Calvörde. (Bst.)
- Montia rivularis Gmel.** In Gräben im schwarzen  
Pfuhl. (Bst.)  
Wassergraben südöstlich vor Goslar. (Th. J.)
- Portulaca oleracea Linné.** Lübberitzer Garten, Masch-  
gärten. (Bst.)
- Portulaca sativa Haw.** Baumschulen in Neuholdens-  
leben. (Bst.)
- Claytonia perfoliata Donn.** Forststeinbruch bei Hundis-  
burg. (Bst.)  
Durchwachsene Claytonie. Stengel mehrere, aufrecht  
mit einem Paare rundlicher, spitzer, am Grunde breit  
verwachsener Blätter, grundständige Blätter, lang ge-  
stielt, rhombisch, oval, spitz. Krone klein, weiß. Mai,  
Juni. Höhe = 0,10 bis 0,20 m. Vaterland: Nord-  
amerika.
- 158. Corrigiola littoralis Linné.** Auf Sandboden zwischen  
Gifhorn und Brenneckenbrück mit Illecebrum zu-  
sammen in Menge. (Th. J.)  
Grieps, im Forstgarten. (Bst.)  
Bei Engelhof unweit Vorsfelde. (B.)
- 159. Herniaria glabra Linné.** Sandige Triften bei Calvörde.  
(Bst.)
- Herniaria glabra Linné.** Var.: *puberula Peterm.* Süd-  
lich von Wahrenholz, am Wege der Bahn entlang.  
(Pl.)  
Engelhof, Danndorf, Jembke. (B.)
- 160. Illecebrum verticillatum Linné.** Auf Sandboden  
zwischen Gifhorn und Brenneckenbrück mit Corrigiola  
zusammen in Menge. (Th. J.)  
Sandige Triften bei Calvörde, Isernhagen, Velsdorf,  
Wegenstedt. (Bst.)  
Engelhof, Ziegelei Vorsfelde, Velstove, Brackstedt.  
(B.)
- 162. Spergula Morisonii Boreau.** Sandboden bei Calvörde.  
(Bst.)  
Velstove, Brackstedt, Heßlingen. (B.)

- 165. *Sedum hispanicum* Linné.** Spanische Fetthenne. Stengel einfach oder ästig, ziemlich kahl; Blüten sechszählig; Kronblätter lanzettlich, viermal so lang wie der Kelch, weiß mit rötlichem Rücken. Mai, Juni. Eysselheide, am Allerkanal von Isenbüttel nach Winkel. (Pl.)
- Sedum purpurescens* Koch.** Auf einer Mauer in Schackensleben. (Bst.)
- Sedum album* Linné.** Kirchhofsmauer in Alvensleben. (Bst.)
- Sedum reflexum* Linné.** Auf einer Mauer bei Remlingen a. d. Asse. (Pl.)  
Calvörder Berge, Isernhagen. (Bst.)
- Sedum rupestre* Linné.** Vorsfelde, am Wege nach dem alten Teich. (B.)
- 166. *Sempervivum tectorum* Linné.** Auf einer Mauer in Dönstedt, Süplingen. (Bst.)
- 167. *Ribes alpinum* Linné.** Wellenberge, Detzel, Neuhaldensleben. (Bst.)
- Ribes rubrum* Linné.** Wintersbusch bei Calvörde. (Bst.)
- Ribes nigrum* Linné.** Wintersbusch bei Calvörde und Rohrburg. (Bst.)
- Ribes aureum* Pursh.** Echte Goldtraube. Junge Triebe, Blattstiele, Traubenachse behaart, Blätter kurz gewimpert, Kelchröhre 10 bis 14 mm, Zipfel 5 bis 8 mm lang. Staubblätter kaum so lang oder kürzer als Blumenblätter. Beeren glänzend schwarz. Mai. Vaterland: Kalifornien bis Felsengebirge. Häufig kultiviert.
- Ribes sanguineum* Pursh.** Rotblütige Johannisbeere. Blätter wenig seicht gelappt, unterseits anfangs grau, weiß-weichhaarig, später grünlich. Traube hängend, reichblütig. Kelchröhre wenig länger als breit, so lang wie die Zipfel, dunkelrot bis weiß. Beeren schwarz, weiß bereift. Ende April bis Mai. Vaterland: Nordamerika. Häufig angepflanzt.
- Ribes aureum* × *sanguineum* = *R. Gordonianum* Lemaire.** Häufig angepflanzt.
- 168. *Saxifraga granulata* Linné.** Am linken Allerufer unterhalb Brenneckenbrück. (Pl.)  
Vor dem Rieden, Reislingen, Steimker Berg. (B.)
- Saxifraga tridactylites* Linné.** Wolfskuhle bei Alvensleben, Steinbruch bei Emden. (Bst.)

169. **Chrysosplenium alternifolium** Linné. Nasse Plätze  
im Walde bei Calvörde. (Bst.)  
**Chrysosplenium oppositifolium** Linné. Bei Vels-  
dorf und Isernhagen. (Bst.)  
Am oberen Philosophenwege im Radautale und im  
Gläßkental bei Harzburg. (Kretzer.)
170. **Parnassia palustris** Linné. Sumpfwiesen der Aller-  
niederung bei Winkel. (Pehnt.)  
Feuchte Wiesen hinter dem Gestüt bei Harzburg.  
(Th. J.)  
Teufelskückenwiesen und Wiesen bei Calvörde.  
(Bst.)
171. **Hydrocotyle vulgaris** Linné. Drömling, Jemke, Wolfs-  
burg. (B.)  
Nasse Wiesen bei Calvörde. (Bst.)
172. **Sanicula europaea** Linné. Isernhagen, Rautenhorst  
bei Calvörde. (Bst.)
173. **Astrantia major** Linné. Im Kalten Tal bei Wernige-  
rode. (Pl.)
174. **Eryngium campestre** Linné. Triften bei Hundisburg.  
Trendelberg, Papenberg. (Bst.)
175. **Cicuta virosa** Linné. Torfstiche, Detzelkulk, Pax.  
(Bst.)
178. **Helosciadium inundatum** Koch. Am Bahnhofshotel  
bei Wahrenholz, Knesebecker Forst und Wiese. (Pl.)  
Drömling, kleines Moor. (B.)  
**Helosciadium repens** Koch. Papenteich bei Emden.  
(Bst.)
179. **Falcaria Rivini** Host. Auf Kalkboden bei Alfeld  
a. d. Leine. (Volger.)  
Trendelberg, Dönstedt. (Bst.)
183. **Pimpinella magna** Linné. Ohrewiesen, Pudegrin.  
(Bst.)
186. **Bupleurum longifolium** Linné. Siebenberge bei Al-  
feld. (Volger.)  
**Bupleurum falcatum** Linné. Butterberg bei Harz-  
burg. (Volger.)
199. **Archangelica officinalis** Hoffm. Allerufer bei Vors-  
felde, Teich bei der Bude. (B.)
200. **Peucedanum Cervaria** Cusson. Bodendorf bei Süpp-  
lingen und bei Neuhaldensleben, Burgwiesen. (Bst.)
201. **Thysselinum palustre** Hoffm. Drömling, Kiefholz  
bei Grafhorst, Polzig. (B.)  
Fürstenauer Forst. (Th. J.)



208. **Laserpitium latifolium** Linné. Gebüsche neben dem Fußwege von Harzburg nach Oker hinter den Gestüts- wiesen. (Th. J.)
214. **Chaerophyllum hirsutum** Linné. Radautal, Riefen- bachtal und auf der Bleiche bei Harzburg. (Kretzer.)  
**Chaerophyllum aureum** Linné. Riddagshäuser Teich- ränder, Buchhorst. (Th. J.)
216. **Conium maculatum** Linné. Dowesee bei Braunschweig. Neben der alten Saline in Salzdahlum. In Wahle bei Vechelde häufig. (Th. J.)  
 Allerbrücke bei Vorsfelde. (B.)
219. **Cornus alba** Wangenh. = *C. stolonifera* Mish. Weißer Hartriegel. Stengel niedergebeugt, wurzelnd. Die ellip- tischen Blätter unterseits hell, grünlichgrau. Blüten weiß, trugdoldig. Steinfrucht kugelig, weiß. Zweige im Herbst blutrot. Mai bis Juli. Angepflanzt und verwildert.
220. **Viscum album** Linné. In Hedwigsburg auf den ver- schiedensten Bäumen in Menge. (Th. J.)  
 Bei Ivenrode und in der Kolbitzer Heide auf Eichen, Pappeln usw. (Bst.)
221. **Adoxa Moschatellina** Linné. Isernhagen, Wellen- berge. (Bst.)  
 Klieversberg, Steimker Berg. (B.)
222. **Sambucus Ebulus** Linné. Schloßgarten in Wolfsburg, verwildert. (B.)
223. **Viburnum Opulus** Linné. Var.: *roseum* L. = sterile Schmidt. Kultivierter Schneeball mit unfruchtbaren Blüten. Häufig angepflanzt.
- Diervilla florida** S. et Z. Schönblütige Weigelia. Triebe zweistreifig behaart, Blätter nur am Grunde gewimpert, auf dem Mittelnerven oberseits behaart, unterseits wollfilzig, an den Seitennerven weniger behaart, auf der Fläche fast kahl. Kelchzipfel die Hälfte der Kron- röhre erreichend, ziemlich kahl. Mai bis August. Vaterland: Nordchina. Häufig angepflanzt.
- Diervilla hortensis** S. et Z. Gartenweigelia. Triebe behaart bis kahl. Blätter oberseits an dem Mittel- nerven und zuweilen in dessen Nähe, kurzhaarig, unter- seits dicht graufilzig. Blumenkrone nur am Grunde kurzhaarig. Kapsel geschnäbelt. Mai bis Juni. Vater- land: Japan. Häufig angepflanzt.
227. **Asperula cynanchica** Linné. Calvörder Berge. (Bst.)  
**Asperula tinctoria** Linné. Kuhlager, Alvensleben, Dönstedt. (Bst.)

228. *Galium boreale* Linné. Schierholz nach Calvörde zu.  
(Bst.)  
*Galium uliginosum* Linné. Wassergräben, Torfstiche  
bei Calvörde. (Bst.)  
*Galium tricorne* With. Auf Ackerland bei Walbeck.  
(Bst.)  
*Galium silvestre* Pollich. Unweit Calvörde. (Bst.)
229. *Valeriana officinalis* L. Var.: *angustifolia* Koch. Am  
Bahndamm bei Wittmar und Remlingen. (Pl.)
231. *Dipsacus silvester* Miller. Unweit Hundisburg.  
(Bst.)  
*Dipsacus pilosus* Linné. Gärten bei Neuhaldensleben.  
(Bst.)
234. *Scabiosa columbaria* Linné. Anhöhen, Calvörder  
Berge. (Bst.)  
Bei Königslutter am Elm. (Paeske.)  
*Scabiosa ochroleuca* Linné. Calvörder Kirchhof, am  
Bahndamm. (Bst.)  
*Scabiosa suaveolens* Desf. Im Olvetal. (Bst.)
235. *Eupatorium cannabinum* Linné. Am Rohrberg, bei  
Bodendorf. (Bst.)
237. *Petasites albus* Gärtn. in den Formen: *alba* L., zwei-  
geschlechtliche Pflanze mit eiförmigem Strauß, und  
*ramosa* Hoppe, weibliche Pflanze mit länglich eiför-  
migem Strauß, im Kalten Tal bei Wernigerode. (Pl.)  
An der Molkenhaus-Chaussee beim Philosophenwege.  
(Kretzer.)
238. *Aster Amellus* Linné. Im Gebüsch bei Walbeck.  
(Bst.)  
*Aster leucanthemus* Desf. Schunterniederung am  
Querumer Holze bei Braunschweig. (Volger u. Th. J.)
241. *Erigeron acer* Linné. Auf Blößen im Oberholz, Klink-  
graben. (Bst.)
242. *Solidago Virga aurea* Linné. Var.: *alpestris* W. & K.  
Fürstenaauer Forst. (Th. J.)
243. *Inula Conyza* de Candolle. Sonnige Höhen bei Cal-  
vörde und Walbeck. (Bst.)  
*Inula Helenium* Linné. Hinter Forsthaus Stulfelde  
bei Warmenau und Fallersleben. (Pl.)  
In Gärten in Calvörde. (Bst.)  
*Inula germanica* Linné. Am Ufer der Olve. (Bst.)  
*Inula salicina* Linné. Calvörder Amtsgarten, Teufels-  
küche, Moosbruch. (Bst.)  
Krähenfußwiesen und Gothewiesen.

- Inula britannica** Linné. Am Schwalbenschwanz.  
(Bst.)  
Allerniederung, Grafhorst. (B.)
244. **Pulicaria vulgaris** Gärtn. Calvörder Amtsgarten und  
Holzlager. (Bst.)  
**Pulicaria dysenterica** Gärtn. Calvörder Amtsgarten.  
(Bst.)  
Steimker Kalksteinbruch, Klieversberg. (B.)
245. **Xanthium strumarium** Linné. Gänseanger bei Cal-  
vörde. (Bst.)
247. **Bidens tripartitus** Linné. Gräben bei Calvörde.  
(Bst.)  
**Bidens cernuus** Linné. Torfstiche, Wassertümpel.  
(Bst.)  
**Bidens cernuus** Linné. Var.: *minimus* Linné. Bier-  
halle, Lehmgruben. (Bst.)  
Ändert ab: *Coreopsis Bidens* L. Blütenköpfe mit großen  
Strahlblüten. Torfstich vor Lössowitz. (Bst.)
249. **Filago germanica** Linné. Sandige Halden, Calvörder  
Berge. (Bst.)  
**Filago arvensis** Linné. Sandige Ackerflächen, Amt  
Calvörde. (Bst.)  
**Filago minima** Fries. Sandige Triften, Calvörder Berge.  
(Bst.)
250. **Gnaphalium silvaticum** Linné. In Waldungen: Grieps,  
Schierholz. (Bst.)  
**Gnaphalium luteo-album** Linné. Grieps, Schierholz,  
Calvörder Teufelsküche. (Bst.)  
Drömling, kleines Moor, Brackstedt. (B.)
251. **Helichrysum arenarium** de Candolle. Häufig auf  
sandigen Triften im Kreise Gifhorn, auch die Var.:  
*aurantiacum* Bolle. (Th. J.)  
Wendeschoth, Sandkrug, Vorsfelde. (B.)
252. **Artemisia pontica** Linné. Pontischer Beifuß. Stengel  
aufrecht, oberwärts rispig, fast rutenförmig, Blätter  
unterseits fast weißlich-filzig, doppelt fiederteilig mit  
linealischen Zipfeln. Köpfchen fast kugelig, grau  
behaart. Juli bis August. Krone gelb. Gipshütte  
bei Vahldorf. (Bst.)  
**Artemisia campestris** Linné. Wegränder bei Gif-  
horn usw. (Th. J.)  
Trockene Wege bei Calvörde. (Bst.)  
Bei Barwedel. (B.)

254. *Anthemis tinctoria* Linné. Bei Walbeck, am Dorn.  
(Bst.)  
Bei Weferlingen. (B.)
255. *Matricaria discoïdea* de Candolle. Wegränder, Triften  
im Amt Calvörde. (Bst.)  
Vorsfelde, Brackstedt. (B.)
257. *Leucanthemum corymbosum* Gr. et Godr. Bei  
Zernitz, Bodendorf, Walbeck. (Bst.)
258. *Doronicum Pardalianches* Linné. Am Wellenberg  
bei Calvörde einzeln. (Bst.)
260. *Arnica montana* Linné. Grieps, Moosbruch, Bödden-  
sell, Hilgersdorf usw. (Bst.)  
Waldwiesen bei Gifhorn. (Paeske.)
261. *Senecio vernalis* Waldst. et Kit. Acker- und Weg-  
ränder bei Calvörde. (Bst.)  
*Senecio erucifolius* Linné. Gipshütte bei Vahldorf,  
Samswegen. (Bst.)  
*Senecio aquaticus* Huds. Unweit Neuhaus. (B.)  
*Senecio paludosus* Linné. Kiefholz, Kalberlah, Dämme,  
Rieden. (B.)  
*Senecio Fuchsii* Gmel. Rohrberg, Bodendorf a. d. Hohl-  
beek. (Bst.)
263. *Cirsium silvaticum* Tausch. Waldblößen im Oder.  
(Th. J.)  
*Cirsium eriophorum* Scopoli. Auf dünnen Hügeln  
bei Calvörde. (Bst.)  
*Cirsium bulbosum* de Candolle. Krähenfußwiese bei  
Bodendorf; häufig. (Bst.)  
*Cirsium oleraceum* × *canum*. Wiese bei Neuholdens-  
leben. (Bst.)
264. *Silybum Marianum* Gärtln. In Gärten und auf Schutt-  
haufen. (Bst.)
266. *Onopordon Acanthium* L. In Roxförde und Nachbar-  
dörfern. (Bst.)  
Wolfsburg, Heßlingen. (B.)
267. *Lappa major* Gärtln. Lichte Waldstellen bei Velsdorf.  
(Bst.)  
*Lappa macrosperma* Wallr. Rohrberg, Isernhagen.  
(Bst.)
268. *Carlina vulgaris* Linné. Trockene Berghalden bei  
Calvörde. (Bst.)
269. *Serratula tinctoria* Linné. Spitze Wiese, Porphy-  
wiesen. (Bst.)

- Wiese im Fürstenauer Forst. (Th. J.)  
 Vorsfelde, Giebel im Drömling. (B.)
270. *Jurinea cyanoides* Reichenb. Calvörder Berg vor  
 d. Zernitz, Trendelberg. (Bst.)
271. *Centaurea phrygia* Linné. Phrygische Flockenblume.  
 Blätter länglich, elliptisch und lanzettlich, gesägt,  
 gezähnt. Anhängsel der Hüllblättchen pfriemlich,  
 zurückgekrümmt, fiederig gefranst, die der drei inneren  
 Reihen rundlich, rissig gezähnt, über die äußeren hinaus-  
 ragend. Federkelch dreimal kürzer als die Achäne.  
 Köpfchen eiförmig. Höhe = 0,30 bis 0,60 m. Juli  
 bis August. Zernitz, Pudegrin. (Bst.)  
 (*Centaurea maculosa* Lam.) Roxförder Kirchhof.  
 (Bst.)
273. *Arnoseris pusilla* Gärttn. Auf Ackerland bei Calvörde.  
 (Bst.)
275. *Thrinicia hirta* Roth. Horstmühlenwiesen, Hillersleben.  
 (Bst.)  
 Bei Brackstedt und Jembke. (B.)
276. *Leontodon hastilis* Linné. Bachufer, Wiesenränder.  
 (Bst.)
277. *Picris hiracioides* Linné. Calvörde, am Holländer.  
 (Bst.)  
 Ufer der Wabe bei Lucklum. (Th. J.)
279. *Tragopogon major* Linné. Chausseegräben bei Wal-  
 beck, Anhöhen. (Bst.)
280. *Scorconera humilis* Linné. Moosbruch, Krähenfuß-  
 wiese. (Bst.)  
 Velstove, Brackstedt. (B.)
281. *Podospermum laciniatum* de Cand. Sülzeberg bei  
 Kl.-Bartensleben. (Bst.)
282. *Hypochaeris maculata* Linné. Krähenfußwiese bei  
 Bodendorf. (Bst.)  
*Hypochaeris glabra* Linné. Im Ohregebiet unter Ge-  
 treide. Amt Calvörde und Kreis Neuhaldensleben.  
 (Bst.)  
 Bei Jembke. (B.)
284. *Chondrilla juncea* Linné. Trockene Triften bei Erms-  
 leben a. Harz und bei Sinsleben. (Th. J.)  
 Calvörder Kirchhof. (Bst.)  
 Sandkrug bei Vorsfelde. (B.)
286. *Lactuca Scariola* Linné. Reislingen, Ziegelei. (B.)
287. *Sonchus arvensis* Linné. Auf Kulturboden, Amt Cal-  
 vörde. (Bst.)

- Sonchus arvensis** Linné. Var.: *maritimus* Linné. Unweit Polzig. (B.)
- Sonchus paluster** Linné. An der Ohre, im Drömling. (Bst.)  
Bei Polzig. (B.)
289. **Crepis foetida** Linné. Triften bei Walbeck. (Bst.)
- Crepis biennis** Linné. Wegränder bei Lucklum. (Th. J.)
- Crepis tectorum** Linné. Wegränder bei Lucklum. (Th. J.)  
Auf Ackerland, Amt Calvörde. (Bst.)
- Crepis succisifolia** Tausch. Pudegrin, Krähenfußwiese. (Bst.)
290. **Hieracium Auricula** Linné. Auf feuchtem Sandboden bei Calvörde. (Bst.)
- Hieracium aurantiacum** L. Vereinzelt bei Oderbrück i. Harz und im Mühlbachtal bei Wernigerode. (Th. J.)
- Hieracium collinum** Gochnat. Rautenhorster Wiesen. (Bst.)
- Hieracium praealtum** Villars. Rautenhorster Wiesen. (Bst.)
- Hieracium laevigatum** Willd. Rautenhorst. (Bst.)
- Hieracium umbellatum** Linné. Am langen Berge bei Isernhagen. (Bst.)
292. **Jasione montana** Linné. Sandige Anhöhen bei Isernhagen. (Bst.)  
Vorsfelde, Velstove, Ehra. (B.)
293. **Phyteuma nigrum** Schmidt. Zernitz, Wismoor, Hilgersdorf. (Bst.)
- Phyteuma orbiculare** Linné. Gothewiesen, bei Süpplingen. (Bst.)
294. **Campanula persicifolia** Linné. Isernhagen, Benitz, Emdener Forst. (Bst.)
- Campanula bononiensis** Linné. Olvetal, Kirchhof in Alvensleben. (Bst.)
- Campanula Cervicaria** Linné. Köpfchenberg, Krähenfußwiesen, Bartensleben, Eschenrode. (Bst.)
- Campanula glomerata** Linné. Walbeck, Winters Busch, vor dem Moosbruch. (Bst.)
296. **Vaccinium Vitis idaea** L. Ehraer Teich, Bikelsteiner Heide. (B.)
- Vaccinium uliginosum** Linné. Moorwiesen usw., Amt Calvörde. (Bst.)

- Vaccinium Oxycoccus Linné.** Torfausstiche, Gräben,  
Wiesen mit *V. uliginosum* häufig zusammen. (Bst.)  
Alter Teich, Eischott, Ehraer Teich. (B.)
298. **Erica Tetralix L.** mit weißer Blüte. Schafteich bei  
Warmenau, Ehraer Teich. (B.)
299. **Ledum palustre Linné.** Im Gebüsch an der Aller  
zwischen Gifhorn und Brenneckenbrück, ferner bei  
Wahrenholz und Wesendorf, am Knesebecker Holze.  
(Pl.)  
Unweit Jaenitz, Letzlinger Heide. (Bst.)
300. **Andromeda polifolia Linné.** Gehölz am großen Graben  
zwischen Diddlese und Hillerse. (Pl.)  
Am Ehraer Teiche. (B.)
301. **Arctostaphylos uva ursi Spreng.** Kiebitzmoor bei  
Grußendorf, Ehraer Teich. (B.)
302. **Pirola uniflora Linné.** Schierholz? (Bst.)  
**Pirola rotundifolia Linné.** Süpplinger Wiesen, am  
Papenberge, Zernitzwiesen. (Bst.)  
**Pirola minor Linné.** Isernhagen, Klapperberg bei  
Schwanefeld. (Bst.)  
**Pirola secunda Linné.** Papenberg im kühlen Grunde.  
(Bst.)
303. **Monotropa Hypopitys Linné.** Schierholz, Isernhagen,  
Zernitz, Oberholz, Emdener und Alvensleber Forst.  
(Bst.)  
Klieversberg. (B.)
304. **Ligustrum obtusifolium S. et Z.** Stumpfblättrige  
Rainweide. Junge Zweige kurzhaarig. Blätter auf  
sehr kurzen Stielen aus abgerundetem Grunde breit  
länglich oder elliptisch, stumpf oder spitzlich, oft mit  
Stachelspitze. Rispen klein, schmal und dicht, ziem-  
lich reichblütig. Staubbeutel etwa zur Hälfte aus dem  
Schlunde ragend. Juni bis Juli. Vaterland: Japan.  
Häufig angepflanzt.
307. **Vincetoxicum officinale Moench.** Walbeck, Boden-  
dorf, Oberholz, Köpfchenberg. (Bst.)
308. **Vinca minor Linné.** Forstgarten in der Buchhorst.  
(Th. J.)  
Kirchhof in Walbeck, Sinngrünberg bei Flechtingen,  
wüste Dorfstellen, Benitz. (Bst.)
309. **Menyanthes trifoliata Linné.** Moorige Wiese im Amt  
Calvörde und Kreis Neuholdensleben. (Bst.)  
Ehraer Teich, Jambke. (B.)

- 310.** *Gentiana campestris* Linné. Schakensleber Stübusch,  
am Ufer des Bever. (Bst.)  
Anger im Felde nördlich von Barum. (Th. J.)  
*Gentiana germanica* Willden. Alvensleber Hühner-  
küche. (Bst.)  
*Gentiana Amarella* Willden. Holzrand des Knese-  
becker Forstes nach der Ise zu, südlich der Station  
Wahrenholz. (Pl.)  
*Gentiana ciliata* Linné. Im Elm bei der Elmwarte  
am Holze. (Pl.)  
Butterberg bei Harzburg. (Kretzer.)  
*Gentiana cruciata* Linné. Unweit Alfeld. (Volger.)  
*Gentiana Pneumonanthe* Linné. Anmoore im Kreise  
Gifhorn. Fürstenauer Forst. (Th. J.)  
Moosbruch, Saalauwiesen bei Lössewitz. (Bst.)  
Ehraer Teich, Giebel, Brackstedter Mühle, Velstove.  
(B.)
- 312.** *Erythraea Centaurium* Pers. Bodendorf, Kuckucks-  
berg, Schierholz. (Bst.)  
Velstove, Nordsteimke. (B.)  
*Erythraea pulchella* Fries. Velsdorfer Weide, Horst-  
mühlentrift. (Bst.)
- 314.** *Collomia grandiflora* Dougl. Hundisburger Stein-  
bruch. (Bst.)
- 316.** *Cuscuta Epithymum* Linné. Eyselheide bei Isen-  
büttel. (Th. J.)  
Moosbruch bei Calvörde. (Bst.)
- 318.** *Solanum alatum* Moench. Geflügelter Nachtschatten.  
Stengel und Äste fast flügelartig-kantig, auf den Kanten  
mit stärkeren zahnartigen Höckern. Blattstiele dichter  
behaart. Blätter meist tiefer buchtig. Beeren mennig-  
oder blaßrot, sonst wie *nigrum*. Nach Moschus duftend.  
Schutt, Wege. Juli bis Oktober. Schackensleben,  
Manendorf, Gutenswegen. (Bst.)  
*Solanum miniatum* Bernhard. Steinbruch bei Hundis-  
burg, Dönstedt, Alvensleben. (Bst.)  
*Solanum Dulcamara* Linné. Teichränder in Riddags-  
hausen, feuchte Gebüsche im Kreise Gifhorn. (Th. J.)  
Feuchte Gebüsche bei Vorsfelde. (B.)
- 322.** *Hyoscyamus niger* Linné. Var.: *agrestis* Kit. Ein-  
jährig, niedriger, Blätter weniger buchtig. Asse unter-  
halb der Bismarcksäule. (Pl.)  
*Hyoscyamus niger* Linné. Var.: *pallidus* Kit. Ein-  
farbige, blaßgelbe Blüten. Asse über Wittmar. (Pl.)



323. *Datura Stramonium* Linné. Selten an Hecken und  
in Dörfern, Amt Calvörde. (Bst.)
325. *Asperugo procumbens* Linné. An der alten Mühle  
in Hillerse. (Pl.)  
Amtsgerichtsgarten in Calvörde. (Bst.)
326. *Lappula Myosotis* Moench. Steinbruchhalden, Kirch-  
hofsmauer in Emden. (Bst.)
327. *Cynoglossum officinale* Linné. Velsdorfer Weide,  
Trendelberg. (Bst.)
330. *Anchusa officinalis* Linné. Roxförder Kirchhof,  
Trendelberg. (Bst.)  
Bahnhof Vorsfelde. (B.)
331. *Nonnea pulla* de Candolle. Unweit Alfeld. (Volger.)  
Walbeck und Eschenrode. (Bst.)
335. *Lithospermum officinale* Linné. Unweit Alfeld.  
(Volger.)  
Unweit Calvörde. (Bst.)  
*Lithospermum purpureo-coeruleum* L. Siebenberge  
bei Alfeld. (Volger.)  
Klepperberg bei Kl.-Bartensleben. (Bst.)
336. *Myosotis caespitosa* Schulz. Auf den Wabewiesen  
am Orth = Holz. (Th. J.)  
Allerwiesen bei Wendeschott. (B.)  
*Myosotis versicolor* Smth. Sandiger Acker, Amt  
Calvörde. (Bst.)  
*Myosotis silvatica* Hoffm. Waldungen bei Zernitz,  
Pudegrin. (Bst.)  
*Myosotis sparsiflora* Mikan. Schloßabhang in Hundis-  
burg. Wellenberge. (Bst.)
338. *Mentha Pulegium* Linné. Nordufer des Papenteiches  
und bei Flechtingen. (Bst.)  
*Mentha silvestris* Linné. Var.: *candicans* Crantz.  
Weiß aussehende Form. Zwischen Didderse und  
Hillerse. (Pl.)
340. *Salvia silvestris* Linné. Bei Walbeck, Ivenrode, Mühl-  
stelle. (Bst.)  
*Salvia verticillata* Linné. Hinter Bündheim nach der  
Rennbahn. (Kretzer.)
343. *Calamintha Acinos* Clairville. Isernhagen, Hundis-  
burg, Bodendorf. (Bst.)
346. *Nepeta Cataria* Linné. Neuenhofe, Bahnübergang zur  
Flora. (Bst.)  
Neudorf-Platendorf in der Nähe des Bahnhofs. (B.)

349. *Lamium hybridum* Villars. Acker am alten Teiche,  
Vorsfelde. (B.)
351. *Galeopsis ochroleuca* Lamarck. Vorsfelde, Weg zum  
alten Teich, Kästorf. (B.)  
*Galeopsis versicolor* Curtis. Vorsfelde, Velstove,  
Wendschott. (B.)
352. *Stachys germanica* Linné. Hühnerküche bei Alvens-  
leben, Walbeck. (Bst.)  
*Stachys arvensis* Linné. Ackerland unweit Calvörde.  
(Bst.)  
*Stachys annua* Linné. Ackerland bei Calvörde. (Bst.)  
*Stachys recta* Linné. Isernhagen, Roxförde, Damm-  
mühle. (Bst.)
353. *Betonica officinalis* Linné. Spetzewiesen, Zernitz,  
Bodendorf. (Bst.)
354. *Marrubium vulgare* Linné. Drömling, Bevertal, Glüsig,  
Olvetal. (Bst.)  
Kirchhof in Heßlingen. (B.)  
Bienrode bei Braunschweig. (Th. J.)
356. *Leonurus Cardiacus* Linné. Schlackenplatz der  
Mathildenhütte bei Harzburg. (Kretzer.)
358. *Scutellaria galericulata* Linné. Bullenteich bei Braun-  
schweig. (Th. J.)  
Rieden bei Vorsfelde. (B.)  
*Scutellaria hastifolia* Linné. Meseberg, Hillers-  
leben, Wolmirstedt. (Bst.)
359. *Brunella grandiflora* Jacq. Am Althaldensleber Teiche  
und am Papenteiche bei Emden. (Bst.)
360. *Ajuga genevensis* Linné. Calvörder Berge, Planken.  
(Bst.)  
*Ajuga pyramidalis* Linné. Im Schiefental im Harz  
vor Einmündung in das Selketal. (Th. J.)
361. *Teucrium Scorodonia* Linné. Rauten, Winters Busch,  
Bischofswald. (Bst.)  
*Teucrium Botrys* Linné. Walbeck, Schwanefelder  
Höhe. (Bst.)  
*Teucrium Scordium* Linné. Poliz, Kaiserwinkel,  
Breitenrode. (B.)
362. *Verbascum Thapsus* Linné. Velsdorf, Oberholz, Detzel-  
berge. (Bst.)  
*Verbascum thapsiforme* Schrad. Festplatz in Heß-  
lingen. (B.)  
*Verbascum phlomoides* Linné. Oberholz, Planken.  
(Bst.)

- Verbascum Lychnitis Linné.** Graningen, Velsdorf,  
Oberholz. (Bst.)
- Verbascum nigrum** × **thapsiforme.** Gebüsch an der  
Aller bei Winkel. (Th. J.)
- Verbascum phoeniceum Linné.** Gläsig, Backofen-  
berg. (Bst.)
- Verbascum Blattaria Linné.** Allerufer zwischen Groß-  
Bartensleben und Schwanefeld. (Bst.)
363. **Scrofularia alata Gilib.** Feuchte Waldungen, Gräben,  
Amt Calvörde. (Bst.)
364. **Antirrhinum Orontium Linné.** Auf Kulturboden bei  
Calvörde am Holländer. Bei Neuhofen häufig.  
(Bst.)
365. **Linaria Cymbalaria Miller.** Vor Kneitlingen am Elm  
an der langen Mauer. (Pl.)  
An Felsen in Flechtingen. Steinbruch Pinkernelle bei  
Alvensleben. Bei Hundisburg, Bodendorf und Wolfs-  
burg. (Bst.)
- Linaria Elatine Miller.** Bei Hillersleben. (Bst.)
- Linaria minor Desf.** Acker bei Isernhagen und Schakens-  
leben. (Bst.)
- Linaria arvensis Desf.** Acker vor dem Papenberge.  
(Bst.)
366. **Mimulus luteus Linné.** Bei Barwedel und Jembke.  
(B.)
- Gratiola officinalis Linné.** Am Ufer der Ise, Dragen  
bei Gifhorn in Menge. (Th. J.)  
Calvörder Graben zur Ohre, Flechtinger Teich, Bullen-  
graben. (Bst.)  
Kalberlah, Oslos. (B.)
368. **Limosella aquatica Linné.** Velsdorfer Weide, Flech-  
tinger Teichausfluß. (Bst.)
369. **Digitalis purpurea Linné.** Oberholz am Pulverturm,  
Zackelberg. (Bst.)
- Digitalis ambigua Murr.** Siebenberge bei Alfeld.  
(Volger.)  
Planken im Lindengebiet. (Bst.)
370. **Veronica scutellata Linné.** Sumpfstellen am Mast-  
bruch bei Braunschweig. (Th. J.)  
Sumpfstellen und Gräben bei Calvörde. (Bst.)
- Veronica prostrata Linné.** Roxförder Kirchhof, Pulver-  
turm. (Bst.)
- Veronica latifolia Linné.** Walbeck, früher Wellen-  
berge. (Bst.)

- Veronica longifolia** Linné. An der Aller, unterhalb Brenneckenbrück. (Pl. u. Th. J.)  
Vor dem Erbke, am Waldrande. (Bst.)
- Veronica longifolia** Linné. Var.: *media* Koch. An der Aller, unterhalb Brenneckenbrück. (Bst. u. Pl.)
- Veronica longifolia** Linné. Var.: *maritima* Linné. Blätter schmal, am Grunde abgerundet. An der Aller unterhalb Brenneckenbrück. (Pl.)
- Veronica spicata** Linné. Calvörder Berg, Neuhaus. (Bst.)  
Trockene Triften bei Lauingen, unweit Königslutter. (Paeske.)
- Veronica triphyllos** Linné. Sandige sonnige Wege und Acker bei Calvörde. (Bst.)
- Veronica praecox** Allioni. Am Föhrenkamp bei Veltenhof und auf dem Münzberge. (Th. J.)  
Auf Acker bei Alvensleben. (Bst.)
- Veronica Tournefortii** Gmelin. Kulturboden bei Calvörde. (Bst.)
- Veronica agrestis** Linné. Kulturboden bei Calvörde. (Bst.)
- Veronica polita** Fries. Acker, Wegränder bei Neuhaldensleben. (Bst.)
371. **Melampyrum cristatum** Linné. Zernitz, Oberholz. (Bst.)
- Melampyrum arvense** Linné. Unweit Walbeck. (Bst.)
- Melampyrum nemorosum** Linné. Laubwälder im Amt Calvörde. (Bst.)
- Melampyrum silvaticum** L. Form: *saxosum* Baumgart. Die Blätter am Grunde breiter, jederseits mit zwei Zähnen. Auf dem Brockenfelde im Harz. (Th. J.)
373. **Alectorolophus angustifolius** Koch. Bei Wendeschott. (B.)  
Böschungen an der Ohre. (Bst.)
374. **Euphrasia lutea** Linné. Hühnerküche, Alvensleben, Rottmersleben. (Bst.)
- Euphrasia Odontites** Linné. Wiesen und Äcker bei Calvörde. (Bst.)
- Euphrasia Odontites** Linné. Var.: *serotina* Lam. Benitz. (Bst.)
375. **Lathraea squamaria** Linné. Zernitz, Niewaldshagen, Rautenhorst. (Bst.)
376. **Orobanche caryophyllacea** Smith. Wellenberge bei Alvensleben. (G. Maaß.)

- Orobanche rubens** Wallr. Unweit Walbeck. (Bst.)  
**Orobanche coerulea** Villars. Auf *Achillea Millefolium*  
 am Scheerenberge bei Harzburg zwischen Bündheim  
 und Schlewecke. (Kretzer.)
377. **Pinguicula vulgaris** Linné. Moorfleck auf den Wiesen  
 hinter dem Gestüt in Harzburg. (Th. J.)  
 Wiesen zwischen Wahrenholz und dem Walde im Kreise  
 Gifhorn. (Pl.)  
 Im Lindenbruche, Krähenfuß- und Gothewiesen.  
 (Bst.)
378. **Utricularia vulgaris** Linné. Torfstiche bei Lössewitz,  
 Zobbenitz, Olve- und Ohregebiet. (Bst.)  
 Alte Aller, Dämme. (B.)  
**Utricularia minor** Linné. Kleines Moor hinter der  
 Plantage bei Königslutter. (Volger.)  
 Ehraer Teich. (B.)
379. **Trientalis europaea** Linné. Isernhagen, Wellenberge,  
 Wegenstedt, Eickdorf, Brand. (Bst.)
380. **Lysimachia thyrsoflora** Linné. Winters Busch. (Bst.)
381. **Anagallis coerulea** Schreb. Unweit Walbeck. (Bst.)
382. **Centunculus minimus** Linné. An der Rautenhorst,  
 nach Wiegelitz zu, und am Eselsberge. (Bst.)
385. **Hottonia palustris** Linné. Torfstiche und Wasser-  
 gräben im Ohregebiet. (Bst.)
386. **Samolus Valerandi** Linné. Wiesen vor Uthmöden.  
 (Bst.)
387. **Glaux maritima** Linné. Grabenränder bei Horst-  
 mühle. (Bst.)
391. **Amarantus retroflexus** Linné. An Wegrändern vor  
 Isenbüttel. (Paeske.)
394. **Salicornia herbacea** Linné. Salzwiese bei Eilsleben.  
 (Maaß.)
395. **Chenopodium Vulvaria** Linné. Flechtingen, Gips-  
 hütte, Glüsig, Altenhausen, Alvensleben. (Bst.)  
**Chenopodium glaucum** Linné. Böddensell bei der  
 Schule. (Bst.)  
**Chenopodium hybridum** Linné. Auf Kulturboden  
 im Amt Calvörde. (Bst.)  
**Chenopodium murale** Linné. In Ortschaften bei Cal-  
 vörde. (Bst.)  
**Chenopodium urbicum** Linné. Ivenrode, Hösingen.  
 (Bst.)  
**Chenopodium rubrum** Linné. Auf Schutt und dem  
 Dorfanger bei Calvörde. (Bst.)

- Chenopodium Botrys Linné.** Weichhaariger Gänsefuß. Ganze Pflanze drüsig, weichhaarig, klebrig. Blätter länglich, fast fiederspaltig-buchtig, obere ganzrandig. Trugdolden in verlängerter, nur am Grunde beblätterter Traube ☉. Unbebaute Orte. Juli bis August. Höhe = 0,15 bis 0,30 m. Glüsig, Alvensleben. (Bst.)
- 399. Atriplex salina Waller.** Salzwiese bei Eilsleben. (Maaß.)
- 400. Rumex maritimus Linné.** Ohreniederung. (Bst.)  
**Rumex aquaticus Linné.** Ohreniederung. (Bst.)
- 401. Polygonum Bistorta Linné.** Feuchte Wiesen bei Calvörde. (Bst.)  
**Polygonum amphibium Linné.** Wassertümpel der Ohreniederung. (Bst.)
- 402. Daphne Mezereum Linné.** Bartensleber Forst. (Bst.)  
 Florealbo in Braunschweig, Roonstraße. (Th. J.)  
 In Harzburg, Lindenstraße, Heycke. (Kretzer.)
- 403. Thesium alpinum Linné.** Bodendorf, unter Kiefern. (Maaß.)
- 405. Aristolochia Clematitis Linné.** Jeseritz, Roxförde. (Bst.)
- 406. Asarum europaeum Linné.** Wälder bei Alfeld, häufig. (Volger.)  
 Bodendorf a. d. Hohlbeek. (Bst.)
- 409. Euphorbia dulcis Jacq.** Bei Wenden. (Pl.)  
**Euphorbia Gerardiana Kl. et Garcke.** Gerards Wolfsmilch. Blätter bläulichgrün, lineal, lanzettlich, ganzrandig, ganz kahl. Vorblätter dreieckig-eiförmig, quer breiter, stachelspitzig. Hügel, Wege auf Kalk, Sand, zerstreut. Juni bis Juli. Höhe = 0,15 bis 0,30 m.ASSE bei Remlingen. (Pl.)
- 411. Urtica pilulifera Linné.** Weferlingen, Amtshof und Garten. (Bst.)
- 412. Parietaria officinalis Linné.** Acker am Isernhagen. (Bst.)
- 415. Morus alba Linné.** Roxförder Kirchhof. (Bst.)  
**Morus alba L.** Var.: *rosea* Ser. Bürgerpark in Braunschweig. (Th. J.)  
**Morus nigra Linné.** Amtsgarten in Calvörde, Wedringen, Neuholdensleben. (Bst.)
- 416. Platanus occidentalis Linné.** Amerikanische Platane. Borke in kleinen Schuppen abblätternd. Äste aufrecht, Tuten gezähnt. Die in den Blattstiel vor-

gezogenen Blätter länger als breit, Blattlappen lang ausgespitzt. Vaterland: Nordamerika. Kultiviert.

**Platanus acerifolia Willd.** = *Pl. occidentalis* × *orientalis*. Blätter am Grunde gestutzt oder herzförmig, fünfnervig, fünfflappig, mit großen breiten, dreieckigen, gezähnten Lappen. Kultiviert.

417. **Ulmus effusa Willd.** Wild und angepflanzt im Amt Calvörde. (Bst.)

**Ulmus montana Smith.** Im Harz über Harzburg wild. Häufig angepflanzt. (Th. J.)

423. **Alnus incana de Candolle.** Pawelsches Holz, Querumer Holz usw. (W. Bl.)

**Alnus glutinosa** × *incana*. Okerufer in Braunschweig, auch sonst unter den Eltern. (Th. J.)

**Alnus serrulata Willd.** Haselerle. Blätter rundlich eiförmig oder verkehrt eiförmig-spitzlich, fein gesägt, unterseits fast rostfilzig. Kätzchen der männlichen Blüten sehr lang. Fruchtkätzchen gestielt; Schuppen abwechselnd abstehend und eingedrückt. März bis April. Höhe 3 bis 15 m. Krähenfußwiese bei Bodendorf. (Bst.)

**Alnus silesiaca Fiek.** = *A. glutinosa* × *rugosa* Callier oder *A. glutinosa* × *serrulata* Schlesisch. Gesellsch. Strauchartig, in der Tracht der *A. serrulata* ähnlich, Knospenschuppen zerstreut behaart, Blätter undeutlich verkehrt eiförmig mit abgerundetem, zuweilen gestutztem oder schwach herzförmigem Grunde, mit kurzer Spitze und vorn meist etwas gelappt, einfach gesägt, unterseits blasser; auf den Nerven locker und licht rostfarben behaart, in den Aderswinkeln bärtig, auf der Blattfläche mit zerstreuten Haaren. Die Fruchtzapfen seitlich, so lang gestielt wie bei *serrulata*, Fruchtlügel undeutlich. März bis April. Im Ölper Holz bei Braunschweig. (W. Bl.)

424. **Betula nana Linné.** Bei den Feuersteinklippen im Harz bei Schierke. (Pt.). Nach Lühmann 1910 jetzt nicht wieder aufzufinden.

**Betula pubescens Ehrh.** Auf Moorboden im Gebiet der Ohre. (Bst.)

425. **Salix pentandra Linné.** Im Mühlenkulk in Hillerse. (Pl.)

Saalau, Lossewitz, Moosbruch. (Bst.)

Giebel, Eischott, Rieden. (B.)

- Salix nigricans** Smith. Moosbruch, neben Torfstichen im Ohregebiet. (Bst.)
426. **Populus balsamifera** Linné. Kreis Neuahaldensleben, Bodendorf. (Bst.)
- Populus serotina** Hart., welche *P. nigra* immer mehr verdrängt, gilt als Bastard = *P. angulata* × *canadensis*. Durch den sehr späten Laubausschlag leicht zu erkennen. Häufig angepflanzt, namentlich bei Riddagshausen. (Th. J.)
427. **Myrica Gale** Linné. Blüte im Mai. Höhe = 0,30 bis 1,25 m. Dragen bei Gifhorn, Isetal; häufig. (Th. J.)
428. **Stratiotes aloides** Linné. Wassertümpel der Ohreniederung. (Bst.)  
Alte Aller, Dämme. (B.)
429. **Hydrocharis Morsus ranae** Linné. Wassertümpel der Ohreniederung. (Bst.)  
Alte Aller, Dämme. (B.)
430. **Elodea canadensis** Richard. In der alten Aller in großer Menge. (B.)
432. **Alisma Plantago** Linné mit bandförmigen Wasserblättern. Wassertümpel an der Aller, nördlich von Fallersleben. (Pl.)
- Alisma Plantago** Linné. Var.: *angustifolium* Ehrh. Im Graben des Dragen bei Triangel. (Pl.)
- Alisma Plantago** Linné. Var.: *graminifolium* Ehrh. In der Aller bei Vorsfelde und Wolfsburg. (Pl.)
- Alisma ranunculoides** Linné. Sümpfe, überschwemmte Stellen bei Brechtorf. (B.)
- Alisma natans** Linné. Wassertümpel an der Aller bei Vorsfelde. (Pl.)  
Vogelmühle, Barwedel, Schafteich bei Warmenau, Knesebeck am Bahnhof. (B.)
433. **Butomus umbellatus** Linné. Ufer an der Ohre. (Bst.)
- Scheuchzeria palustris** Linné. Wassergräben bei Wahrenholz, welche zur Ise führen. (Pl.)  
Ehraer Teich. (B.)
434. **Triglochin maritimum** Linné. Wannewe, Uthmöden. (Bst.)
- Triglochin palustre** Linné. Wannewe und Feldweg nahe dem Holländer. (Bst.)
435. **Potamogeton natans** Linné. Var.: *prolixus* Koch. Allerkanal bei Isenbüttel. (Pl.)



- Potamogeton fluitans Roth.** Ohre bei Uthmöden.  
(Bst.)
- Potamogeton alpinus Bulbis.** Alpensamkraut. Stengel ästig, untergetauchte Blätter sitzend, häutig, länglich, lanzettlich, stumpflich, am Rande glatt; schwimmende lederartig, lanzettlich, spatelförmig, in den kurzen Stiel verschmälert. Ährenstiel gleich dick. Früchte linsenförmig zusammengedrückt, mit scharf gekieltem Rücken. Juli bis August. Schunter zwischen Querum und Hondelage. (Pl.)  
Ohre bei Bülstringen. (Bst.)  
Aller bei Vorsfelde. (B.)
- Potamogeton plantagineus du Croz.** Aller über Brenneckenbrück und Allerkanal hinter der Schleuse. (Pl.)
- Potamogeton gramineus Linné.** Wassergraben vor Lössewitz. (Bst.)  
Im tauben Loch an der Oker bei Volkse. (Pl.)
- Potamogeton lucens Linné.** In der Ohre, Amt Calvörde. (Bst.)  
In der Aller bei Vorsfelde. (B.)
- Potamogeton perfoliatus Linné.** In der Aller bei Warmenau. (Pl.)  
In der Aller bei Vorsfelde. (B.)  
In der Ohre, Amt Calvörde. (Bst.)
- Potamogeton praelongus Wulfen.** Graben neben der Bahn von Triangel zum Moor. (Pl.)  
In der Ohre, Saschauer Graben. (Bst.)
- Potamogeton pectinatus Linné.** Var.: *scoparius Wallr.*  
In der Schunter Querum—Hondelage. (Pl.)
- Potamogeton compressus Linné.** Wassertümpel bei Altenhausen. (Bst.)
- Potamogeton acutifolius Link.** Im Schapenbruchteich und Lümschteich. (Pl.)  
Im Kanal vor Vorsfelde. (B.)
- Potamogeton obtusifolius M. et K.** Wassertümpel bei Altenhausen. (Bst.)
- Potamogeton pusillus Linné.** Im Wassergraben vor Lössewitz. (Bst.)  
In der Aller bei Vorsfelde. (B.)
- 436. Zannichellia palustris Linné.** In der Wabe bei Erkerode. (Th. J.)  
Am Sülzeberge bei Kl.-Bartensleben, bei Emden und dem Finkenberge. (Bst.)

437. *Lemna gibba* Linné. Rohrburgteich, Ohregräben.  
(Bst.)  
*Lemna polyrrhiza* Linné. Wassertümpel in der Ohreniederung.  
(Bst.)  
Bei Neuhaus. (B.)
439. *Calla palustris* Linné. Großes Moor am Knüppeldamm, südlich von Wahrenholz, in großer Menge.  
(Pl.)  
Emmerlun bei Knesebeck. (B.)
440. *Acorus Calamus* Linné. Allerufer bei Brenneckenbrück. (Th. J.)  
Wassertümpel am Elsebeek, Paxförde, Dammühle.  
(Bst.)  
Oslop, Weyhausen. (B.)
441. *Typha latifolia* Linné. Wassertümpel im Kreise Gifhorn, Wassergraben am Bahnhof Heerte. (Th. J.)  
Alter Teich, Dämme. (B.)  
*Typha angustifolia* Linné. Kaulenteich in der Buchhorst bei Riddagshausen, Wassergraben am Bahnhof Heerte, und zwar:  
Forma: *genuina Hallier*, kaum über meterhoch, Blätter sehr schmal und rinnig, im Schapenbruchteiche.  
Forma: *elatior Bönningh*, bis über 2 m hoch, Blätter nicht rinnig und breiter, Kolben weniger voneinander entfernt. Riddagshäuser Teiche. (Th. J.)
442. *Sparganium simplex* Huds. Wassergräben in der Ohreniederung. (Bst.)  
Kleines Moor im Drömling. (B.)  
*Sparganium minimum* Fries. Im tauben Loch an der Aller vor Warmenau. (Pl.)  
Erdfall am Angerspring. (Bst.)
443. *Orchis purpurea* Huds. Unweit Delligsen und Alfeld. (Volger.)  
Bei Walbeck im Rehm. (Bst.)  
*Orchis militaris* Linné. Unweit Alfeld. (Volger.)  
*Orchis purpurea* × *militaris*. Unweit Alfeld. (Volger.)  
*Orchis ustulata* Linné. Moosbruch bei Calvörde. (Bst.)  
Gebirgswiese bei Rübeland im Harz. (Th. J.)  
*Orchis coriophora* Linné. Uhlenburg- und Wellenbergswiesen. (Bst.)  
*Orchis Morio* Linné. Auf Sandboden in der Ohreniederung. (Bst.)

- Orchis mascula* Linné. Walbecker Domberg, Krähenfußwiesen. (Bst.)
- Orchis incarnata* Linné. Bei Flechtingen, auf den Spetzewiesen im Amt Calvörde. (Bst.)
- Orchis maculata* Linné. Waldungen bei Zernitz und Bischofswalde. (Bst.)
444. *Anacamptis pyramidalis* Rich. Im Ith. (Volger.)
445. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Unweit Brunkensen und Alfeld. (Volger.)  
Spetzewiesen, Moosbruch bei Hilgesdorf. (Bst.)  
Am Papenberge bei Harzburg. (Kretzer.)
446. *Platanthera bifolia* Reichenb. Isernhagen, Rohrberg, Moosbruch. (Bst.)
- Platanthera chlorantha* Cust. Zwischen Bischofswalde und Behnsdorf. (Bst.)
- Platanthera viridis* Lindl. Bei Bischofswalde, Spitzenberg. (Bst.)  
Wiesen am Papenberge bei Harzburg. (Kretzer.)
447. *Ophrys muscifera* Huds. Unweit Alfeld. (Volger.)
- Ophrys apifera* Huds. Unweit Brunkensen. (Volger.)
449. *Epipogon aphyllus* Swartz. Duinger Berge bei Brunkensen. (Volger.)
450. *Cephalanthera ensifolia* Rich. Wiesen am Papenberge bei Harzburg. (Kretzer.)
- Cephalanthera rubra* Rich. Bei Ottenstein und bei Alfeld häufig. (Volger.)
451. *Epipactis palustris* Crantz. Torfwiesen bei Zobbenitz, Krähenfußwiesen, Gothewiesen. (Bst.)
- Epipactis microphylla* Swartz. Siebenberge bei Alfeld. (Volger.)
- Epipactis latifolia* Allioni. Rautenhorst, Schwalbenschwanz, Planken. (Bst.)
- Epipactis rubiginosa* Gaud. Bei Ottenstein und bei Alfeld häufig. (Volger.)
452. *Listera ovata* R. Br. Rautenhorst, Bodendorf. (Bst.)
454. *Spiranthes autumnalis* Rich. Triften nördlich von Altenhausen, auch Krähenfußwiesen. (Bst.)
458. *Cypripedium Calceolus* Linné. Bei Brunkensen und Koppengrave. (Volger.)
- Gladiolus communis* Linné. Gemeine Siegwurz. Faserhaut der Wurzelknollen aus dichten, starken, parallelen Längsfasern bestehend, nur oberwärts schmal maschig. Kapsel verkehrt eiförmig, achtkantig, an der Spitze eingedrückt, die Kanten nach oben gekielt. Mai bis

- Juni. Höhe = 0,40 bis 0,80 m. Wiesen hinter Alvensleben. (Bst.)
459. *Iris sibirica* Linné. Moosbruch, Gothewiesen, Pudegrin, Süpplingen, Krähenfußwiese, Lehndorfer Wiesen, Bischofswald. (Bst.)
460. *Narcissus Pseudonarcissus* Linné. Isernhagen. (Bst.)
- Narcissus Pseudonarcissus* Linné. Form: *bicolor hort.* Häufig kultiviert. (Th. J.)
461. *Leucojum vernum* Linné. Wiesen bei Bodendorf, Bischofswald, Germersleben. (Bst.)
463. *Gagea saxatilis* Koch. Hühnerküche bei Alvensleben, Beverufer. (Bst.)
- Gagea arvensis* Schultes. Auf Ackerland bei Isernhagen. (Bst.)
- Gagea pratensis* Schultes. Acker- und Chausseeränder im Ohregebiet. (Bst.)
- Wolfsburg, Reislingen, Steimkerberg. (B.)
- Gagea minima* Schultes. Am Hundisburger Zechenhaus. (Bst.)
- Gagea spatacea* Salisb. Auf den Wellenbergen. (Bst.)
464. *Lilium Martagon* Linné. Siebenberge bei Alfeld. (Volger.)
- Bodendorf, Wellenberge, Pudegrin, Forsthaus Eiche. (Bst.)
465. *Anthericum Liliago* Linné. Letzlinger Heide, Calvörder Berge. (Bst.)
- Anthericum ramosum* Linné. Calvörder Berge nach Lemsell zu. (Bst.)
- Ehraer Holz. (B.)
467. *Allium carinatum* Linné. Riddagshäuser Teichdämme neben der Gartenmauer. (Dr. v. Alten.)
- Allium ursinum* Linné. Rehm bei Walbeck. (Bst.)
- Allium fallax* Schult. Emdener Forst in der Nähe der Krähenfußwiese. (Bst.)
- Allium vienale* Linné. Roxförder Kirchhof. (Bst.)
- Allium oleraceum* Linné. Flechtingen, Hassell. Chaussee nach Wedringen. (Bst.)
469. *Paris quadrifolia* Linné. Osterode am Fallstein und am Schiffgraben. (Pl.)
- Am Schiffgraben die fünfblättrige Form. (Pl.)
- Rautenhorst, Bodendorf, Zernitz. (Bst.)
470. *Polygonatum multiflorum* Allioni. Waldungen am Isernhagen. (Bst.)

- Polygonatum officinale Allioni.** Zernitz, Pudegrin,  
Emdener Forst. (Bst.)
- Polygonatum verticillatum Allioni.** Am Butterberge  
und am Gläsekenberge bei Harzburg. (Kretzer.)
475. **Colchicum autumnale Linné.** Wiesen bei Süpplingen,  
am Bullengraben, an der Bülstringer Chaussee reichlich.  
(Bst.)
476. **Juncus filiformis Linné.** Am Ehraer Teiche. (B.)
- Juncus squarrosus Linné.** Spetzwiesen bei Bödden-  
sell. (Bst.)
- Rieden, Velstove, Brechtorf, Ehraer Teich. (B.)
- Juncus Gerardi Loisel.** Salzquelle bei Moorsleben.  
(Bst.)
- Juncus capitatus Weigel.** Unweit Calvörde. (Bst.)
- Juncus supinus Moench.** Var.: *fluitans* Lam. Lehn-  
grube am Grieps. (Bst.)
- Ehraer Teich. (B.)
478. **Cyperus flavescens Linné.** Velsdorfer Weide. (Bst.)
- Cyperus fuscus Linné.** Ohreniederung bei Uthmöden  
nach Piepersteg. (Bst.)
479. **Schoenus nigricans Linné.** Sumpfwiesen an der  
Aller bei Brennecknbrück am Wege nach Leiferde.  
(Pl.)
480. **Rhynchospora alba Vahl.** Unweit Zernitz. (Bst.)
- Eischott, Schafteiche bei Warmenau, Ehra, Vogelmühle  
bei Barwedel. (B.)
- Rhynchospora fusca Roemer et Schultes.** Ehraer  
Teich, Vogelmühle. (B.)
482. **Scirpus ovatus Roth.** Graben bei Warmenau. (B.)
- Scirpus caespitosus Linné.** Moorwiesen im Kreise  
Gifhorn. (Paeske.)
- Ehraer Teich. (B.)
- Scirpus acicularis Linné.** Vordere Drömlingsgräben,  
Giebel. (B.)
- Scirpus compressus Persoon.** Wiesen bei Bregen-  
stedt. (Bst.)
- Scirpus setaceus Linné.** Velsdorfer Weide. (Bst.)
- Wendschott. (B.)
- Scirpus Tabernae montani Gmel.** Wiesen an der  
Hühnerküche bei Alvensleben. (Bst.)
- Dämme bei Vorsfelde. (B.)
- Scirpus maritimus Linné.** Graben am Feldwege nach  
Alvensleben. (Bst.)

- Scirpus silvaticus** Linné. An Bächen im Ohregebiet,  
Calvörde. (Bst.)
483. **Eriophorum vaginatum** Linné. Moorwiesen auf der  
Pax. (Bst.)
- Eriophorum polystachyum** Linné. Moorwiesen der  
Ohreniederung. (Bst.)
- Eriophorum latifolium** Hoppe. Moorwiesen der Ohre-  
niederung. (Bst.)
- Sumpfwiesen am Harz nach Oker zu. (Kretzer.)
484. **Carex pulicaris** Linné. Wiesen bei Böddensell.  
(Bst.)
- Carex disticha** Huds. Wiesen bei Zobbenitz. (Bst.)
- Carex praecox** Schreb. Calvörde, Moosbruch. (Bst.)
- Carex brizoides** Linné. Unweit Zernitz. (Bst.)
- Carex vulpina** Linné. Ohreniederung, namentlich  
Amt Calvörde, gemein. (Bst.)
- Carex teretiuscula** Goodenough. Alenhausen unter  
dem Eselsbett. (Bst.)
- Carex paniculata** Linné. Rohrberg, Torfwiesen. (Bst.)  
Moorfleck unter der Asse (Nordseite). (Th. J.)
- Carex leporina** Linné. Bei Calvörde, gemein, und im  
Ohregebiet. (Bst.)
- Carex echinata** Murr. Lössewitz, Roxförde. (Bst.)
- Carex elongata** Linné. Isernhagen, Uhlenberg. (Bst.)
- Carex remota** Linné. Unweit Isernhagen. (Bst.)
- Carex acuta** Linné. Ufer an der Ohre. (Bst.)
- Carex vulgaris** Fries. Ohreniederung. (Bst.)
- Carex supina** Wahlenbg. Calvörde, Rüsterberg bei  
Alvensleben. (Bst.)
- Carex pilulifera** Linné. Calvörder Berge. (Bst.)
- Carex tomentosa** Linné. Krähenfußwiese. (Bst.)
- Carex montana** Linné. Neuwaldensleben am Exerzier-  
platze, Papenberg. (Bst.)
- Carex umbrosa** Host. Unweit Neuwaldensleben. (Bst.)
- Carex cricetorum** Pollich. Sandige Anhöhen im Amt  
Calvörde. (Bst.)
- Carex verna** Vill. Sandige Anhöhen im Amt Calvörde.  
Ohregebiet. (Bst.)
- Carex digitata** Linné. Kleppersberg bei Bartensleben,  
Singrün bei Hilgersdorf. (Bst.)
- Carex distans** Linné. Salzquelle bei Moorsleben.  
(Bst.)
- Carex Oederi** Ehrh. Moosbruch, torfige Wiesen der  
Ohreniederung. (Bst.)

- Carex Pseudocyperus Linné.** Ohreniederung, Pax,  
Torfstiche. (Bst.)  
Kaiserwinkel, Breitenrode. (B.)
- Carex obtusangula Ehrh.** An den Papenteichen. (Bst.)
- Carex acutiformis Ehrh.** Moorwiesen im Amt Cal-  
vörde, Ohregebiet. (Bst.)
- Carex riparia Curt.** Ufer an der Ohre. (Bst.)
- Carex filiformis Linné.** Ohreniederung, Moosbruch.  
(Bst.)
487. **Panicum sanguinale Linné.** Vor dem Isernhagen.  
(Bst.)
- Panicum lineare Krocker.** Calvörder Berge nach  
Böddensell. (Bst.)
488. **Setaria verticillata P. B.** Papenteich, Emden, Alvens-  
leben. (Bst.)
490. **Anthoxanthum odoratum Linné.** Var.: *villosum*.  
Ehraer Teich, Acker. (B.)
- Anthoxanthum Puelli Lec. et Lamotte.** Knesebeck.  
(B.)
491. **Alopecurus geniculatus Linné.** Ohregebiet, Wiesen  
im Amte Calvörde. (Bst.)
- Alopecurus fulvus Smith.** Rohrberg, am Teiche.  
(Bst.)
492. **Phleum Boehmeri Wibel.** Friedhof in Roxförde, Box-  
wellenberg, Papenmühle. (Bst.)
493. **Oryza clandestina A. Br.** Flechtingen, Velsdorf,  
Kl.-Bartensleben, Bodendorf. (Bst.)
495. **Calamagrostis arundinacea Rth.** Waldungen bei  
Pudegrin. (Bst.)
- Calamagrostis lanceolata Rth.** Feuchte Wiesen im  
Ohregebiet, Teichufer bei Calvörde. (Bst.)
498. **Stipa pennata Linné.** Hundisburger Park, verwildert.  
(Bst.)
- Stipa capillacea Linné.** Bockswellenberg, Emden am  
Papenteich, bei Alvensleben. (Maaß.)
506. **Avena fatua Linné.** Unter Getreide im Amt Calvörde  
und im Kreise Neuahaldensleben. (Bst.)
- Avena strigosa Schreb.** Rauh- oder Sandhafer. Blüten  
und Fruchtrispe locker, ziemlich einseitwendig. Deck-  
spelzen auf dem Rücken stets mit geknieteter Granne,  
an der Spitze mit zwei feinen, etwa 1 cm langen ge-  
raden Grannen. Körner beschalt ☉. Gebaut und  
verwildert. Juli bis August. Gelände im Kreise Gif-  
horn und bei Wiegeltitz. (Th. J. und Bst.)

- Avena caryophyllacea** Weber. Calvörder Berge.  
(Bst.)
- Avena praecox** Palisot et Beauvois. Calvörder Berge,  
Kiefernwaldungen, Wegränder. (Bst.)
507. **Sieglingia decumbens** Bernh. Calvörder Berge, Krähen-  
fußwiese, trockene Raine. (Bst.)
508. **Melica nutans** Linné. Waldungen bei Isernhagen,  
Bodendorf, Süplingen, Försterwiese. (Bst.)
- Melica uniflora** Retz. Isernhagen, Schierholz. (Bst.)
512. **Poa sudetita** Haenke. Bei Bartensleben. Krautwiese  
der Erxlebener Forst. (Bst.)
- Poa compressa** Linné. Wegenstedt bei Calvörde.  
(Bst.)
- Poa bulbosa** Linné. Bei Pudegrin und Bülstringen.  
(Bst.)
514. **Catabrosa aquatica** P. de B. Uhlenburgwiesen bei  
Ivenrode. (Bst.)
518. **Festuca Myurus** Ehrhart. Uhlenburg bei Ivenrode.  
(Bst.)
- Festuca sciuroides** Roth. Eichhornschwanzschwingel.  
Halm oberwärts ohne Blattscheiden, Rispe aufrecht,  
sonst wie vorige. Mai bis Juni. Höhe bis 0,30 m. Alten-  
häuser Porphybruch, Bodendorfer Forst. (Bst.)
- Festuca heterophylla** Lam. Am Isernhagen. (Bst.)
- Festuca rubra** Linné. Sonnige Anhöhen im Amt Cal-  
vörde und im Ohregebiet. (Bst.)
- Festuca arundinacea** Schreb. Rohrberg bei Calvörde,  
Krähenfußwiese. (Bst.)
520. **Bromus arvensis** Linné. Acker bei Calvörde hinter  
der Ziegelei, Hühnerküche. (Bst.)
- Bromus racemosus** Linné. Unweit Calvörde. (Bst.)
- Bromus commutatus** Schrad. Auf Ackerland im  
Roggen bei Uthmöden. (Bst.)
- Bromus inermis** Leysser. Roxförder Kirchhof, Behns-  
dorf. (Bst.)
- Bromus erectus** Huds. Unweit Walbeck. (Bst.)
- Bromus asper** Murray. Bei Walbeck, Hilgesdorfer  
Sinngrünberge. (Bst.)
523. **Elymus arenarius** Linné. Chausseegräben bei Alvens-  
leben und Erxleben. (Bst.)
525. **Lolium perenne** L. Var.: *compositum* Thuill. Emdener  
Teich. (Bst.)
- Lolium italicum** A. Br. Ohregebiet, Wiesen bei Cal-  
vörde. (Bst.)



- Lolium remotum Schrank.** = *linicola* Sonder. Ent-  
ferntähriger Lolch. Ackerland bei Alvensleben. Ob  
jetzt noch? (Bst.)  
**Lolium temulentum Linné.** Im Getreide bei Calvörde,  
Zobbenitz, Clüden, häufiger. (Bst.)  
528. **Juniperus communis Linné.** Triften bei Lübbenitz.  
(Bst.)
- 

### Sporenpflanzen.

532. **Pilularia globulifera Linné.** Okerufer unterhalb der  
Brücke nach Hillerse zu. (Pl.)  
533. **Lycopodium inundatum Linné.** Erxlebener Forst.  
(Bst.)  
Alter Teich, Ehraer Teich. (B.)  
Allerniederung bei Winkel. (Th. J.)  
**Lycopodium annotinum Linné.** Waldstellen bei  
Ottenstein. (Volger.)  
Kleines Moor, Drömling. (B.)  
**Lycopodium alpinum Linné.** Höhen bei Harzburg.  
(Volger.)  
**Lycopodium clavatum Linné.** Lübberitz, Planken,  
Süpplinger Forst. (Bst.)  
Hühnenberg bei Dannorf. (B.)  
**Lycopodium complanatum Linné.** Heide am Aller-  
kanal zwischen Winkel und Brenneckenbrück. (Pl.)  
Heide bei Jembke. (B.)  
535. **Equisetum maximum Lam.** Unweit Alfeld. (Volger.)  
**Equisetum silvaticum Linné.** Am Isernhagen.  
(Bst.)  
**Equisetum hiemale Linné.** Schimmerwald bei Harz-  
burg. (Volger.)  
Kl.-Stöckheimer Forst in Menge. (Th. J.)  
Im Schierholz, Südseite. (Bst.)  
536. **Osmunda regalis Linné.** Bei Walbeck. (Bst.)  
Gebüsch am Allerufer bei Winkel. (Th. J.)  
Osloß, Kalberlah, Kleines Moor im Drömling. (B.)  
537. **Ophioglossum vulgatum Linné.** Allerkanal an der  
Schleuse, Wiese am rechten Ufer. (Pl.)  
Moosbruch, Krähenfußwiese, Gothewiese. (Bst.)

538. **Botrychium Lunaria Swartz.** Im Elm, Wiese am Forsthaus Großen-Rohde und Chausseegraben dem Tetzstein gegenüber. (Pl.)  
Am Plankener Wege. (Bst.)
539. **Polypodium vulgare Linné.** Holzmühlental, Grieps. (Bst.)
540. **Phegopteris Dryopteris Fée.** Emdener Forstschäferei. (Bst.)
541. **Aspidium lobatum Swartz.** Triangel, am Gatter nach der Wildfütterung, dem Braunschweiger Forsthaus zu. (Pl.)  
Am Breitestein bei Rühle, unweit Brunkensen. Bei Ottenstein a. d. Weser am Lumborn. (Volger.)  
Pinkernells Steinbruch und bei Alvensleben. (Bst.)
- Aspidium montanum Aschers.** Emdener Forst, Bischofswalde, Altenhäuser Forst am Jagdhause. (Bst.)
- Aspidium Thelypteris Swartz.** Torfstichwiesen und Grabenränder im Ohregebiet. (Bst.)  
Kieholz bei Grafhorst, Dämme, Neuhaus, Poliz. (B.)
- Aspidium cristatum Swartz.** Bodendorfer Forst. (Bst.)
542. **Cystopteris fragilis Bernhard.** Am Graben des Rittmeisterteiches bei Altenhausen, Abhang der Weidenmühle bei Emden, auch bei Bodendorf. (Bst.)
543. **Asplenium Trichomanes Linné.** Hohlbeek bei Bodendorf, rechtes Beverufer bei Dönnstedt, bei Süpplingen, am Silberstollen. (Bst.)
- Asplenium Ruta muraria L.** Ratsmühle, Stadtmauer in Calvörde, Damm am Papenteich. (Bst.)
- Asplenium Ruta muraria L.** Form: *calcareum* Bck. Burgberg bei Harzburg. (Th. J.)
- Asplenium Ruta muraria L.** Form: *microphyllum* Wall. Friedhof in Wolfenbüttel. (Th. J.)
547. **Scolopendrium vulgare Smith.** Unweit Brunkensen. (Volger.)
548. **Blechnum Spicant Withering.** In den westlich gelegenen Waldungen bei Hilgersdorf. (Bst.)
-

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig](#)

Jahr/Year: 1909-1912

Band/Volume: [17\\_1909-1912](#)

Autor(en)/Author(s): Jenner Theodor

Artikel/Article: [3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig 83-124](#)

