

2005) Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell
Thompson PS, Baines D, Coulson IC, Longrigg G (1994): Age at first breeding, philopatry and breeding site-fidelity in the Lapwing *Vanellus vanellus*. Ibis 136: 474–484
Weiß I (2017) Ermittlung der Toleranzen von Wiesenbrütern gegenüber Gehölzdichten, Schilfbeständen und Wegen in ausgewählten

Wiesenbrütergebieten des Voralpenlandes. Bayerisches Landesamt f. Umwelt
Wübbenhorst J, Bairlein F, Hennig F, Schottler B, Wolters V (2000): Bruterfolg des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in einem trocken-kalten Frühjahr. Vogelwelt 121: 15–25

Eingegangen am 11. Dezember 2017

Angenommen nach Revision am 2. April 2018



Dr. Uwe Bauer, Internist, avifaunistische Erhebungen im Raum Augsburg, ab 2006 vorwiegend im Landkreis Aichach-Friedberg, ab 2012 auch in den Wiesenbrütergebieten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Faunistische Erhebungen auch von Amphibien, Heuschrecken und Libellen. Erstellen von Schutzkonzepten für ausgewählte Arten und Biotope.