

Publikationsliste 1991-2010

- Bieringer G. (1991): Mai/Juni-Beobachtung einer Trauerente (*Melanitta nigra*) am Schönauer Teich. Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich 2(4): 25-26.
- Bieringer G. & Berg H.-M. (1995): Steinfeld. In: Dvorak M. & Karner E.: Important Bird Areas in Österreich. Umweltbundesamt Monographien Bd. 71: 110-120.
- Berg H.-M., Bieringer G., Sauberer N. & Zuna-Kratky T. (1996): Verbreitung und Ökologie der Großen Plumpschrecke (*Isophya costata* BRUNNER v. WATTENWYL, 1878) an ihrem westlichen Arealrand (Österreich). Articulata 11(2): 33-45.
- Bieringer G. (1997): Die Brutvögel des Naturschutzgebietes Schönauer Teich (NÖ). Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich 8/2: 44-49.
- Bieringer G. (1997): *Helicopsis striata austriaca* GITTENBERGER 1969 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) im südöstlichen Niederösterreich. Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft 5: 23-26.
- Berg H.-M. & Bieringer G. (1998): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde zur Heuschreckenfauna Niederösterreichs (Österreich). Articulata 13(2): 163-172.
- Bieringer G. & Laber J. (1999): Erste Ergebnisse von Greifvogel-Winterzählungen im pannonischen Raum Niederösterreichs. Egretta 42: 30-39.
- Bieringer G. & Rotter D. (2001): Verzeichnis der österreichischen Heuschrecken-Belege (Orthoptera: Ensifera und Caelifera) der Sammlung Wilhelm Kühnelt (1905-1988). Beiträge zur Entomofaunistik 2: 15-47.
- Bieringer G. (2001): „Vor 100 Jahren ...“ - das Steinfeld in historischen Schilderungen und Ansichten. Stapfia 77: 5-8.
- Bieringer G. & Sauberer N. (2001): Der Naturraum Steinfeld. Stapfia 77: 9-27.
- Bieringer G. & Sauberer N. (2001): Ein kurzer Abriß der botanischen und zoologischen Forschung im Steinfeld. Stapfia 77: 29-32.
- Sauberer N. & Bieringer G. (2001): Wald oder Steppe? Die Frage der natürlichen Vegetation des Steinfeldes. In Stapfia 77: 75-92.
- Bieringer G. & Grinschgl F. (2001): Von der Steppe zum Ballungsraum. Stapfia 77: 93-100.
- Bieringer G. & Berg H.-M. (2001): Die Heuschreckenökosen (Orthoptera) des zentralen Steinfelds im Vergleich mit ausgewählten Trockenrasen des pannonischen Raums in Ostösterreich. Stapfia 77: 175-187.
- Bieringer G. (2001): Verbreitung, Lebensraumsprüche und Gefährdung der Österreichischen Heideschnecke (*Helicopsis striata austriaca* Gittenberger 1969). Stapfia 77: 205-210.
- Berg H.-M. & Bieringer G. (2001): Vorkommen und Bestandsgröße von Steppenvogelarten im niederösterreichischen Steinfeld. Stapfia 77: 211-231.
- Bieringer G. & Sauberer N. (2001): Die Auswirkungen von Stickstoff-Immissionen auf die Vegetation der Großmittler Trockenrasen. Stapfia 77: 235-242.
- Bieringer G. & Sauberer N. (2001): Feuer - Entwertung oder Erneuerung der Großmittler Trockenrasen? Stapfia 77: 243-249.
- Bieringer G. & Zulka K.P. (2001): Die ökologischen Folgen von Aufforstungen im nördlichen Steinfeld. Stapfia 77: 251-259.
- Berg H.-M. & Bieringer G. (2001): Sind Truppenübungsplätze die besseren Naturschutzgebiete? Naturschutz auf militärischen Übungsflächen im Steinfeld. Stapfia 77: 285-291.
- Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (2001): Ein Leitbild für ein Natura 2000-Gebiet „Steinfeld“. Stapfia 77: 305-313.

- Bieringer G. & Zulka K.P. (2003): Shading out species richness: edge effect of a pine plantation on the Orthoptera (Tettigoniidae and Acrididae) assemblage of an adjacent dry grassland. *Biodiversity and Conservation* 12(7): 1481-1495.
- Bieringer G. (2002): Response of Orthoptera species to wildfires in a Central European dry grassland. *Journal of Orthoptera Research* 11(2): 237-242.
- Sauberer N., Zulka K.P., Abensperg-Traun M., Berg H.-M., Bieringer G., Milasowszky N., Moser D., Plutzer Ch., Pollheimer M., Storch Ch., Tröstl R., Zechmeister H. & Grabherr G. (2004): Surrogate taxa for biodiversity in agricultural landscapes of eastern Austria. *Biological Conservation* 117: 181-191.
- Abensperg-Traun M., Wrba T., Bieringer G., Hobbs R., Deininger F., Main B.Y., Milasowszky N., Sauberer N., Zulka K.P. (2004): Ecological restoration in the slipstream of agricultural policy in old and newly-impacted landscapes. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 103 (3): 601-611.
- Berg H.-M., Bieringer G. & Zechner L. (2005): Rote Liste der Heuschrecken (Orthoptera) Österreichs. Pp. 167-209 in Zulka K.P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band 14/1. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Böhlau-Verlag, Wien.
- Bieringer G. (2008): Auswirkungen der Beweidung auf die Heuschreckenfauna (Orthoptera) im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. *Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Österreich* 37: 145-153.
- Suske W., Bieringer G. & Ellmauer T. (2009): Natura 2000 und Artenschutz. Empfehlungen für die Planungspraxis beim Bau von Verkehrsinfrastruktur. ASFINAG, Wien, 142 pp.
- Bieringer G. (2009): Steinfeld. In: Dvorak M. (Hrsg.): Important Bird Areas in Österreich – Die wichtigsten Gebiete für den Vogelschutz in Österreich. Verlag Naturhistorisches Museum Wien, Wien: 166-175.
- Bieringer G. (2009): Auswirkungen von Straßenlärm auf die Brutvögel eines Auwaldes. *Vogelwarte* 47 (4): 356-357.
- Zuna-Kratky T., Karner-Ranner E., Lederer E., Braun B., Berg H.-M., Denner M., Bieringer G., Ranner A. & Zechner L. (2009): Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs. Verlag Naturhistorisches Museum Wien, Wien. 304 pp.
- Bieringer G., Kollar H.P. & Strohmayer G. (2010): Straßenlärm und Vögel. *Straßenforschung Heft 587*, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien. 85 pp.
- Bieringer G. & Sauberer N. (2010): Postburn species richness patterns of vascular plants and Orthoptera (Insecta) in a steppe grassland. *Denisia* 29: 45-54.