

541: Dist. Hindalgrah Nauriti
1650 m, 5.7.62

Von Savannenrasen gebildet
mit von krautigen Pflanzen reich
Gebirge

Laubbäumen abends am Licht

linge Carabiden mit Staphyliniden
Gesamt

Famie monoh

Blac coton sots (Amuroviji)

OA2 Benth Prius Windlinkgrat
Nairobi 5.7.62

5.762

- a) Gerüche aus Rasen + etwas
verpötheten Kaut

- b.) Ziemlich nur einfaches Bauteil mit
Mantel kratzige Repetition.

In blue cotton soil under Casen (Savanna)

1. *Pithecellectus* 1 Grobe grüne Carab.
1 *Brachyphala* (good ?) 1 Topodeum
1 cf *Falagria*
1 ? *Lasius*
3-4 *Onthodendron* (spotted)
1 *Aphididion* (orange)
1 *Stenothorus*
1-2 *Colletes*

Paran.iformis
Beetle's den

Unter dem Bauteil: 10-15 cm Bodenschutt,

- 1 Cetoside (moss)
1 bl. Pterophide under Euphrasia
Acheta
Philosiden 1 Ectopside

- 1 Chilopode
1 Termitenkast
grün
(keine Waben!)

klippinger (harvax)

043 Straße nach Thika
bei Jentz Lindenbergstr. Markt Nairobi.
6.7.62.

Gewerbe unter Gebäuden an der
Straße gegenüber dem Nationalpark.
an 2 Stellen 3 Gewerbebereiche!

Rinnschaps sind Coccolithiden am
Rande getrafft, aber always spherically

Große Cisternfische
 Batrachoidei (?) zahlr.
 Sigmanus
 Eucynus
 Spinthripide
 Arthropoden
 Geophila
 Kapslarven
 Eurypteren (wenig)
 Schnecken
 Pseudoscorpion
 Fische
 10 p. l. r. m. d.

am 10. September
(Stuhl. Nachrichten)

OA4 Wald mittels Kajiado,
an der Straße nach Naivasha
8.7.62

Leichter Acacia-Wald, an
Bach mit Unterwuchs, sandig.
Streu + Boden gerollt
1 1/2 Gerichsäcke.

OA5 Oldonyo-Sambu
Schicht bei Farm D. Ernst
8.7.62

Gerichte aus Juans und
Schichten am ^{st.} Kellertunde

07.6. Schicht in Oldmoo - Saubri
bei Farm D. Ernst. 8.7.62

~~Gerste aus Füllgut und sandiger
Erde zu hängen, wie oben~~

~~Gerste aus Bodenmasse~~
Gerste aus Füllgut und sandiger
Erde zu hängen wie obenwenn
stellen, 3 Gerstesäcke!

07.6. Im freien aus Gerste ausgewählt.
Auf dem neuen kleinen Felder Laufband
Dumfries, Bergklee, Staphyliniden,
1 Scarites unter mochnen Holz in der Erde
1 Tipula f beim Ablegen der Erde in der
Fülle der aus Boden zu hängen
Einige Tiere von Pflanzen, 1 Geilhorn von
? großer Leguminose
Aphiden von ... (brautige Maule an
Feldmaule)

Coccinelliden samt Larven an von
Coccinella septempunctata

OA7 N-Hang des Mt Meru
von Olthokola aufwärts
2600 - 3000m, 9.7.62

auf *Crotalaria* sp. graue Thron.
Z.T. in Copula

Obtusa auf Korken *Sonchis* sp
Malabide auf Dicken
kl. graue Thron. auf Dicken

Zu OA8: sehr wenig Oribatiden, etwas
mehr Collembolen, schwarzgrüne Chorde-
mide, viele Bilobidenlarven, Geophit,
Staphyl. wenige Nitren, wenig Psaloph. Staphyden.
Tredius...

Grieskanten, sehr feine, wäss. Organe, untypische
Pantel.

OA8. Mount Meru N-Hang
cca 3000m, Hagencwald,
leht, steht mit Moos bedeckt
9.7.62

4 *Gerobeside* und etwas in

Gelände eingekoren

am Fuß des Hagenc, in

Nischen Stämmen, Vorwiegend

Feinmoos und Moos,

auf etwas Mineralboden

relativ feucht

in 3 Automaten ausgeordnet. Viele Psaloph.,
Syzon., Staphyl., Geophiten, Fritiden, Zepoden,
einige Campodea, viele Oribatiden, wenig Collemb.,
Opiliones, Ginnien, Eurythriden (große & kleine),
wenige kl. Agnathosomen, wenige Schnecken,
sehr wenig kleine Araneen.

In Pinokulas einzelne Nussstücken gesehen
Mineralhöhlen teils blank, teils graue Kalk-
klinge, einzelne feine Mineral

OA 9. Meru W. Kany
bei OA 8. aber von
den Bäumen, Moos, Moos,
Fallaub, Rinde
(rel. trocken)

OA 10. Schult am Aufstieg
von Ophobola zum Meru ca
2000m. Wassergut, nach,
9.7.62

Geschie aus Farnen,
Selaginella, Fallaub.

Herrnbesuch
wenig Milben, Kanarien(?)
Linsen, Terebr. T. wie in oberer
Lage (OA 8)

1 Eutommia ♂ nov. spec.

OA 11 Meru N-Hang
oberhalb Jeep-Parkplatz
im Regenwald gerodet,
9.7.62.

1 Geruchsbach
massenhaft Moosen!
Blechnarien, Cephnerien
rel. trocken, oxytelen

OA 12 Weg unterhalb
Olivakola, ca 2100m
Regenwald mit Lianen
etc. 9.7.62.

Gesetze 2 Sacke, Taubkorn,
Rinde, rot färbt.
Felland, hinter
5cm Feinwald, dann
schraube, färbt 4.
etwas tiefer folgende Pflanze

A, 0-80(100cm) unterhalb
Feinkörniger humoser
Sand, dicht durchwurzelt

AC 80/100, 111(130) allmählich
steiler humos, etwas
dichter, nur mit Nadeln

deutlich zu sehen

C₁ 170 (130) - 130 (150)

auf demselben Feld
(westlich der Anlage) Tuff

C₂ ab 130 (150) leicht verfestigt
Tuff

Flötenspiegels (Glockenringel)

Nachkommer (Horn) (Horn)

Zweigeschichte

Büschelholz

Kiefer (Archie) ~~als~~ als Schornstein (Pegels)

Pyrethrum

Hein

Birds of Eastern and north eastern Africa

(African Handbook of Birds Series I, Vol. 1)

London, Green and Co. 1952

Al. Grün Papageier Agapornis

Endwolf

Bismarck: Großer Kimmel
Lohle Attopodenecker, 1910
Münster

OT 12_n am Wege bei OT 12
Gesammelt, Wand des Weges
durchwinktes

Wald

ad OT 12: viele Wälder (nur kleine
Teil gesammelt) Eucalyptiden

04 13^o Farm J. Ernst
in Obolongo Sambu 8.-11. 7. 62

In der Umgebung der Farm
gesammelt

Probe 1, Probierklay an Straße
Namanga - Anashe Kuppe

Probe aus 5-20cm und 60-70cm
(5-20cm Kernprobe)

A₁ 0-25cm locker, hellgrün
(fast bräunlichgrün) oberfläch-
mittelbräunlich, ständig anfeuch-
tiges Sand, schwarz bis mittel-
braun, gut durchwurzelt

steinfrei
A₂ 25-120 durchlöcherig, ziemlich
hartlagernd, das von feinen
Wurzelkanälen durchzogen
auskohlendes Sand, sehr ver-
einzelte kleine Steinchen
im deutlich großblöckig bräunend

A₃ 120-140cm etwas dunkler, sonst
wie A₂

A₄ ab 140 cm dunkler A₂
Felsen stein, keine Knötchen

Prof 2 Fissurenllage,
N-Kamp E, 4-5m niedriger
als Prof. 1, flacher Hang,
etwa 2 m höher tiefer, Flach
diese fast eben auf etwa
300m Entfernung, flache
von Berg herabgehende
Ansammlung, sieht dann
vielleicht Aufbruch an
Prof 2

A 0-15 cm hellgrün, feink
körnlich, anliegend
flach. grobes Sand
mit schwarzen Gersteinen,
ein feine Lavabrocken

A₂ 25-60 cm kaum dunkler
als A, strukturer, deutl. stift,
der gut durchwurzelt, Holz
stärker sichtbar, sehr
zahlr. Holzbohlen, die hier und
einzelne Knochenreste,
bis 65 cm, einzelne Stein (Lava)
A₃ 65-100 cm tiefer wie A₂ aber
ohne Holzbohlen.
Fissuren gut, einzelne
Knöchelchen

Bohlen aus 60-70 cm
und 5-20 cm (kleinere)

OK 14 Lacati River,
Vasefall am Mont
Monduli, 11.7.62

Gesteine aus Detritus und
Farnen am fliegenden Schilf
schwarzer Moder, sehr feucht,

1 Gerdhede

Fauna arm und monoton

OK 15 Lacati River
wenig unterhalb des
Vasefalls, höhere
Terrasse, über Fluss, 11.7.62
Gesteine aus massigen Kiesel,
am Fallrand, — Moder
und bräunliche Erde
unter Basaltblöcken

OK 14a^u nahe nach OK 16

OK 16 Lacati River
Mont Monstali,
nahe Parkplatz, 11.7.62

Gesamtheit am Ende
und im Inneren eines
großen Fieles,
Nadel (Nadeln) stark
farkt.

Viele Haptyliden, kaum Pteridien
und Symplocariden

Blauwälder

Blau cotton Soil,
2. Wert Anula. mit Kalk-
konstruktion (Plots!)

OK 14a in Tal des
Lacati-River gesammelt.

Lomelina unter anderem Holz
Tupula an Forstenden
Cistaceen im 2. T. an großer
Brennholz.

Wetter (Katharinenzeit) Ende 1961.
Lohnhöhe Schneefang aber unregelmäßig
1.2.62, meiste Schneefang schon früher.
(mehr als das Doppelte)
bis zum Dorfenden - heute überall fast.
84 Schillinge für 30 Tage bei 45% Voller

OA 17. Aufstieg v.
Karangan zum Kolimangjara
Epiphyten am Ficus sp.
neben Bad, ca. 2400 m.
13.7.62

Etwa halbwegs zw. Kito-Hotel
und Primarkhütte

OA 18. Bei OA 17
Gerste aus Moos, Faltblatt
und Erde, sowie Moos an
Lavablöcke 13.7.62

beim Bad.

Nur die Holzwasserschnecke des Baues
ein Apertium of. nippes.

Im Boden der Gerbestellen
Regenwürmer.

OA 18a Spinnen am Seilofen

0419 Wald oberhalb
Marang, am Weg
zur Dismahütte,
cca 2000m 13.7.52.
nächst 0417.

Bedsgrünwald in höherer
Lage als der Wald
vorwiegend *Ficus spec.*
(goldblühend).

Bestandesabfall + Moder,
(sehr stark von Lärchen
durchwurzelt, sehr fein

gerade Wurzeln
von 5-10cm Durchmesser

1 Gerbstock im Gelände
ausgeworfen, 1 Saft mitge-
nommen. Vorw. um alte
Bäume gerollt. Zwischen diesen
etwa fingerdicke, niedrigere
Bäume & Sträucher, von langen
Flechten behangen.

Bestand dorthin, aber doch
leicht begehbar.
Krautige Unterwuchs eine
einige Pflanze, rosa blühende

2. Laborato.

OA. 20. Aufstieg von Morsang
gegen Ostmarkhütte, 13.7.62
von Pflanzen gesammelt

auch unter loser Rinde gefallte
Tanne (Myriophyten hier)
Aphiden auf Leguminose (Strand)
~~Ragwortwiese nördlich der~~

OA 21: Morsang - 1. Lager
am Kib, cca 2500 m
16.7.62

Aufstieg bei Regen, Lamellenröhre
mit Stein auf Deschampsia / Poa,
Carbidem unter Rinde und

Moss an liegenden Baumstämmen
1 Pals nahe Morsang
alle anderen Dipteren nahe
Lager I

Wald: unterste Stufe Laubwald mit
Baumfarnen
mittlere Stufe Laubwald
ohne Baumfarnen
obere Stufe Laubwald mit
Ericaceen.

OA 22 1. Lager am Kibo
17. 7. 62

Geschie aus Moos (Hylocomium
Splachnum etc. mit Erica sp.
Lageria und sp. Lanthorn.
Lichte Bestand, viel moosige
Holz, mäßig hoher bis
Pohlmanns anlage.

Geschie in Gelande aufgegeben.
Götter Kopf leigend oder
mit Moos aus moosigen
Stämmen - sehr feucht

Kolonien von Lichen etc. hoch
Laminaria, Collemb., Chordea
Miden, Pseudoscorp., Spinnen
große Eurypt. (Dale) Staphyl.

1 Eurypterus, 1 Psocoptide, viele Anisotoma
keine Ameisen?

OA 23: Aufstieg von Lager 1
zu Lager 2 am Kibo, (Lager 2
ca 2800m)

Von Felsen Grotte, Malakide,
Stomaria, Longitarsus (Lamin.)
von Grasern und Kräutern höher
oben grüne Hallicide.
mit Steinern hl. Carabiden

zu OA 23 (hinter OA 30)

OA 24. Lager 2. am
Kilimangaro, 7.7.62

Gerabe aus Rasen

ungef. Tipula bei unterlaufend

In Rasen grünes ? Agrostis,
Coccinellide.

zu OA 25

Gerabe unter Erica mit Moos
(mit viel braunem Eucormus)

Gerabe unter großer Umbellifera
(mit schwarzem Eucormus)

Gerabe unter faulenden Senecio
(hier v. Staphyliniden)

OA 25. Oberhalb Lager
2 am Kilimangaro,
in der Senecio-Zone.

keine Ameisen!

Gerabe im Gelände ausgehen

Eucormus, Pteraphora, viele

Staphyliniden, Phyllophora

Eurythraea, Anneliden,

wenig Lichene, Chorodactylus

haben vorhanden, auch Anneliden,

aber nicht gesammelt.

Unter Erica trockenster Boden mit
Moosdecke,

Wilde Rüsselkäfer, Lathridien,

Cryptophagiden, rote Lichene besonders

mit abgestorbenen Senecio-Blättern

Zahl, ungefügte Phaeococcidiaceae

08.26. Aufstieg vom Lager
2 zum Lager Müller und
zum Kibo SW-Hang zum
Weru-Heru-Gletscher

18.7.62

Tippeliden bis Grenze der
Zwergsträucher (erschaltete
gelbe Compositae)
braunes Rindenschaf hoch oben,
wo Senecio fast allein & Moose,
hier auch (*Anacardium* L.)
bis Zwergsträucherzone Liliaceen,
Dietrich, große Umbelliferae
ab Lager Müller kaum (Cereus)
und grünes Agave
Grenze etwa 3800 m Seehöhe!

08.27. Am Fuß des Weru -

Weru Gletscher

Gerste aus Palomovermoos
(vom Frost gesprungte Moospolster)
und aus Rauhe unter
gelbem Senecio und Erstblümen.
1 Rahmen 0-4 cm aus Moos
1 Rahmen 0-4 cm (nach Zerstörung
der Vegetation und Streuung
mit Senecio und Erstblümen)

0A 28 Am Barhup, nördl
Lager 2 am Kilimangjaro
Geräte aus Moos etc. an
des steilen Aufstiegs ca 3000m
19. 7. 62. ca 3000m

Im Gelände aufgestellt
viele Keltiden, große
Oxygordiden mit kleiner
Rückenplatte

0A 29. Lager 2 am Kilimangjaro
Nest von Tachyoryctes
19. 7. 62

Geräte aus Gras, Excrementen
etc.

Wormspind Onychiurus
(viele Tausende)

keine spez. Käfer.

Lycoriiden, Gharociden,
Paranthorax, Lepen Wurm

OA 30, Lager 2 Senecio-
zone oberhalb, am Weg
zum Kolo 19. 7. 62

Gerste aus Moos, flach
und Rinde von ~~Wiedergabe~~
Senecio, flach,
zweiig, sehr dünn
ist sehr mächtig

1 Rahmen unter
Erica, Moder nach
Entfernung der Stein-
und Ag.

Großer Caralide unter
Stein nahe Lager -

zu OA 23:

Abstieg von Lager 2 über
Lager 1 nach Marianne
Bodenprobe bei Lager 1

Profil bis 20cm

A 0-40cm schwarz,
stark dünn, wenn
feucht schlammig, wenn
trocken steinbeid
(Fossilien)

(B) 40-60cm grauer
lehmiger Sand bis
anlehmiger Sand

C Lava

Erica scheint zu lange
allein vorhanden zu sein
als Ficht häufig enthält

100-200m über Lager 1
Hortlandien (Succisa etc.)
+ Hagenia sind bald
darüber andere Bäume
In Hortlandien viele
Dipteren, wie bei uns

OA 31. Hortwald unterhalb

Lager 1, 20.7.62

Erica, Hagenia, Podocarpus
mit große Laubbäume
Stämme mit Moos stark
bewachsen.

Gewebe aus Moos
an Stämmen
(mäßig feucht.) Flechtens

OA 32. Wie OA 31, aber

Flechten und Moos am
Boden und um Baum-
Stämme gewickelt.

Von Boden mit etwas
Laubstreu Moder genommen
0-4cm nach Ent-
fernung von 0,5cm
Laubstreu.

mäßig feuchte Stelle mit
jung, krautige Vegetation
2m von altem Baum

OP 31 a: Unter Moos und
Rinde im Gelände gesammelt
(auch Trübe)

8A 33. Krimmanger,
halbwegs v. Leizer 1 zu
Waldrand bei Karlau,
20.7.62.
Regenwald mit Baumfarnen
sehr nass, neblig.

Geschiebe eines mächtigen
Moderschnitt am Boden

1 Rahmen ohne 0,5cm Strunk
Zwischen relativ hoher Surgen-
vegetation 2m von altem
Baum genommen

Laubstreu, Moder und Bodenmoos
1 Plastikwanne für Tubellarien,
Cepheiden + 2 Larven!!

VA 34. bei VA 33
Koss: Rinde von
Stämmen,
kleines Geruch

Sodenprobe:

Boothofkapeln mit 5-8 cm

(südlich Bäumen
wenig mit gut festem
Feinmoos bei Bäumen
Grünmoos)

41 Humose schluffige Leh-
humus mit
grünem / rötlich braun-
lichem

(B) gelbbraunes schluffiges Leh-
moos, mit deutl. Flecken.
Jugendstadien allein vor allem
oberflächlich sehr dicht zu sein.
C. art. Lärche, nicht verwirrt

~~Matthias~~

Matthias, Daniel / Chagga

Sodenprobe oberhalb Lärchen
gelbbraun 7 1/2 Jhr bis 5 Jhr, bindig
als Grünmoos höher oben,
wenig nach, sehr rötlich.

4-Horizont 15-20 cm
(Küsterzone)

UA 35. Kilimangjaro

Zwischen Lager 1 und Marlaue.

20.7.62

Dipterengrubentier mit Lager 1

kl. Elefanten (schwarz) gelblich

von Lager 1 abwärts. grün, mit

Bunte Heltiden auf Kiebelkuppe

ebenso Lila

Oberrückenlinie grünlich. tief

Mit Mafu oberh. Marlaue

rote Caranlye. mit Pfanden

an Untergrenze des Farnwaldes.

(Silberstamm)

Parantiformes von Mithofen

UA 36 Marlaue - Arusha

21.7.62

Ctormin von gelb bleibenden
Leguminosen (Sträucher)

nicht. Marlaue,

kl. Prallkopf von Kränken ebenso

Savanne zw. Mithofen und Arusha

Offenbar sehr trocken.

OA 37. Steppe mit *Acacia*
nördl. *Oldenya* *fambii*,
an angebrochnen Felsen
21. 7. 62

Rande Fauna:

Skorpion, Solpuga, Spinnen,
Collemb., Trombidiformes,
Käfer, Ameisen, Asseln,
Tausendfüßler, Lepismatide,
Grille, Termiten.

OA 38 Trocheneurwald mit
Acacia nördl. *Namanga*,
21. 7. 62

Boden sandig, klotzig,
von Termiten vor allem um
die Baume verlegt.

Insekten um ältere Akazien
sind mit der Rinde um-
geben, nahrungssuchende Akazien
die von Termiten gefressen ist.

Lepismatiden, Ameisen, Käfer,
Collembolen (z. B. *Eutoma*) gesehen

PA 39. Narvik, Nationalpark,

22.7.62

Selbe Aphiden an Blüthen
von *Arctia* sp.

Viele Insekten an Blüthen
bei der Einfahrt

PA 40 Rotorua-Hill

Aberdare - Mountains, 24.7.62

7000 ft

Mischwald an Bach, Beginn
des Baumrinneles
~~Gesicht~~ außerhalb des
Nationalparks, Forest
Dept.

Sorbe unter häufiger
Vegetation und mehreren
Stamm ca 112 m vom
Bach. Stamms hoch
wenig Krümmung,
Vollkronen bei Wund
Gesicht. Krümmung auf

Sandigen Roten.
Stark bewaldet (Puffel)

OA 41 Rohorini,
Aberdare Berge,

Bambuswald mit
einzelnen Bäumen,
kleiner Talan mit
7500 ft. fast,

einzelne Farn

1 Geruchsalb bei Baum
unter unter moosden, Kote
Purles an fall, Syden, Niliden,
Stephyllinden (Cylindropsis?) —
zahlreiche Eucornis

OA 42 Aberdare-Berge,
ca 8000 ft, 24.7.02

Podocarpus-Wald mit
viel Bambus,
kein Podocarpus geruch,
von Elefanten stark zertritten
Geruch trocken; Moos
mit mäßiger Streuung von
Podocarpusblättern
mit Moos von Stämmen.

Im Unterwuchs Selaginellen, etc.
Wenig Syden. & Psaloph., wenig Niliden,
wenig Stephyllinden.
Viel Geophyten, viel Glyceridenlarven.
Viel Kaka.

OA 43 Riongi-Hill

Aberdeen. Sept 22.7.42

Waldfreie Fläche

von *Alseumilla* n.
gestrichelte Rinde und
braunes Malarkide,
roter. Capside,
grünes Hatticoid (klein)
grünes Hatticoid auf Gras
Agonisciden (34 Capite) mit
gelber Composita.
Ameisen unter Steinen
Curculioniden ebenso
Dacnysiden am Wasser

OA 43 h: Unter morschem
Bambusstamm am Weg unter
Waldgrenze; viele Puppen und Imagines

OA 44 Riongi-Hill.

Hagecien-Bestand mit Euphorbia
und Stibi 24.7.42
über 300m.

Lebter Bestand, viel totes Holz
Jasche am Hagecien und
unter altem Holz, 2 Larve
nearly fertig

OA 44a unter Holz gesammelt
Rote Carabiden, Myrmeciden,
Lamellicornia, Isopoden, Curculioniden

ad OA 44: Zahl. of. *Carabidae* (Pennis & Graham)
Zahl. kleinste *Phenidae*, sehr kl. *Scydma.*
Scaphididen, *Staphyl.*, kl. braune *Psyll.*
vont. *Pteromalidae*. Viele *Wespen*
Scydmaiden, *Asseln*, *Chordeumoniden*
Ameisen fliegend, *Sciaride*
(*Epitaphius*?)

OA 45 Gekururu River
Plateau der Abardare-Berge
24.7.62

Philippiabestand zwischen
Grasland ca 1000 ft.

Geschiebe unter Philippia
aus Moränen, krautige
Vegetation und A1-Horizont
Humusform Mull (3)

1 Geschiebeband (bis 5 cm)

1 Rahmen 0-4 cm

zahlr. kl. Rüsselkäfer, (Hornvorn),
Motte Pschaphiden und Sichel 3
Kleine Curculioniden (Acalle) 5
Staphyliniden, Scaphiolen von OA 44

Bräunliche A 0-100 cm oberhalb
unten am A
Lumpen allseitig
abgeleitet in
(K) rotbraun-schwarz
auch schluffige Lehm, 8000 ft.

OA 46. Magura-River, Vorpall
Abardare-Berge 24.7.62

Geschiebe unter Philippia
und Riesensecciden
9500 ft.

Kleines Geschiebe, Mor. Mor.

nicht ausgelesen.
4 Rüssel, braunrot. Rüsselkäfer, Lössmotten
Tafel

OA 47. Steppe nordl. Nyer,
an der Station nach Namguk
25.7.62.

Basaltlava, darauf Rott. Sand,
sehr trocken,

Mitte Steinen Cactiden,
Tenebrioniden, Staphylinen,
Cicadelliden, Spinnen

Mistkäse und Hirsche an den

Kuhpladen

Schaben, Ameisen

schwarze Schlange gesehen

Niederanlage in der Aberdare - Region

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
Kiamongora Selt						1408				1070			77.0
Roborini Sch													17.0
Magpie Rive													58.00
													461
Kiang					15.0				2563				121.70
Roh.													80.07
Jay													101.00
Treehops fete									~ 60.0				101.00
Kiang						1383	15.97						196.2
Jay							11.00						

OA48 Nacoma-Plain

26.7.62

Farmland, mit
Steinen, Black Cotton
Soil (mit großen Sprüngen)

Kleine Schlange (an Mr.
Vodley gegeben)

geflügeltes großes Carabide

Opilium

diverse Carabiden

Spinne, Lithobius

Beetle

OA49 Aufstieg z. Mt. Kenya

von Fort Stanbury 26.7.62

auf Ruinen d. Othmaniden

auf Corium Halleschen

Dipteren (Cordyliden) auf d. Pflanzen
(wohl in Abhängigkeit von Nistkästen)

Das Moorland ist die Hagiazone

sehr feuchtfüßig mit Phragmites (offenbar

in Wasser begrenztes Moor, in dem großen

Grasbüschen viele tiefe Löcher, in denen z.T.

das Wasser steht - hier nichts außer

Anthomyiden und Phlebotomen? / gefunden

Holzp. Fauna nur auf den Felsböden

unter Steinen.

d. Argemone unter Steinen und Holz neben
ab Landrover-standplatz.

große Lamellicornien (wie Hetero- - Nage)
in Hagiazone

OK 50. Mt. Kenya 26.7.62

11500ft. Beginn des
Nationaltopfens mit hoher
Gerste, Erica, Grasbüsch,
und Succo
(auch trockene Stellen)
8. T. Moos.

Gerstebüsch

11.500:33 = 3
1.60

Unter Steinem braungelbe Leuze
Nachtweide, Vitace
1 Planarie im Wasser unter hl. Gerstebüsch

Gerste: hl. Philiden, Cereus, Carab.

Paraph, Stapyl.

Viele hl. Orkide, wenige Collemb.
wenige Myrioph., Isopod, Spinn.

OK 51. Gerste im lichten
Hagenaubwald. ~~10500ft~~ 10500ft
des Mt. Kenya - V-Hanges
mit gelbblühendem Strauch aus
Moosrasen gewoben 26.7.62

ziemlich tief (Müll!) mächtig
gerstl.
Auch im Hagenaub

2 Gerstebüsche

Reinshage wie OK 50, hl. Carabiden oben
Stapyl., fast keine Paraph & Isopod.
Auch pilz, Euryt.

OA 52. Kenya 26.7.63

~~Heby~~ Kapak (Parkplatz)

9500ft mittelhoch auf mit Station

Dambusbestand mit
einzelnen Podocarpus
wenig krautige Veg.

1 Gerstebesack

Dambus niedrig, Modernholz
wenig mäßig, darunter Löss?
mit großen Regenerien
ziemlich gut durchfeuchtet
(ob nur nach Regen?)

Sch. wenig Sydenh. + Podapl., Staphylinien
bes. kl. gelbe Sipalix od. Exypoda,
aprove Krigen

OA 53. Kenya 26.7.63

Hoher Bambusbestand
mit Podocarpus

cca 8500ft.

Kleiner Talenbruch knapp oberh.

Partial-Brücke.

Trocken, auch Selaginellen

1 Gerstebesack

~~Russelthof wie 450 unter Steinern,
ebenso kl. Lanthaner, Staphyl.,
sagt wie beim Podapl. Sydenh., Staphyl.~~

Affen, Affen (Affen) / große Affen, Carabiden, Reptilien
Nyctop. (Clad), Inop., Geopel., Bawlon., Thys.

GA 54 Kenya 26.7.62

Nara-Mara-Wald

zu Südl. und
nördl. Naro-Mara-River

Mischwald in Taleinschnitt

Geriebe aus tiefen

Nachschritten im

alte Bäume mit

Farnen, 1 Gericheseal

Netowald mit Polocopten

und Bambus

etwas vor dem jüngeren Leoparden
aus Hof bei Aunahung des Vagans
verhoffend, beim Vorbeifahren
sich am Waldrand wiederduckend!

GA 55 Ufer des ^{Thika} Tana-River

bei Thika, 27.7.62

Geriebe unter Gebirg

mit aus Uferde.

(rotekugige Sand).

einzelne Tiere an Pflansen

Teubromide von Karoti

(Vögel, & Insekten)

OASB ~~Stamm~~ mit aufgeben

Phygen an der Straße
Nairobi - Kombasa,
cca 15 km n. v. Nairobi,
östl. des Ath-River.

28.7.62

Unter Alocen,
mit Pflanze.

Gestein unter Alocen
mit Zwergsträucher

1 Röhren-Orchidee unter
Alocen

tocken, rot. gelbes Sand,
tiefe Schatten, leicht verfeuchtet
oben

Gestein, einzelne rote Fossilformen
versteuerte Eutrematiden gesehen
Rote von Fossiliden
1 Psilophide, Myrmecodon
Larve, Larve, Larve, Larve

OASB a

Trümpel mit black cotton soil

nahe bei OASB - von Acacia
umgeben, etwas unbewachsen
auf, nach, auf, nach mit tiefen
Spalten

O 157 Kampala gegen Jinja
(Uganda), 30.7.62

Tropenwaldrest, einige Bäume
außerhalb Kampala neben
kleinen Wassergräben.

Tierl. In alten Bäumen
bes. viel Moos von Lianen
dort dunkelwachsen.

vorr. Ameisen und Termiten
ganze Käse

O 158 Kampala gegen Jinja
(Uganda), 30.7.62

Sumpfwald mit Palmen, Lianen,
am Rande gegen die Straße

Papyrus. Sehr feucht, stellenweise
steht Wasser. Schwarzer Humusboden.
Palmen etc. stehen auf erhöhtem
Sohl. Dort ist mächtiger, feuchter
Moos vorhanden, viele große
Ameisen. Großer Fackelsack,
in Kampala ohne Mikroskop
ausgesehen.

Viele Psocopteren, einige Scydmaeniden,
wenige Phthoriden, einige Staphyliniden,
Chordeumatiden, Geophilen, wenige
Isopoden, Pseudoscorpionen,
heller 2 Tomoceriden.

3 Ex-Gyphocentrus