

Die Schmetterlingssammlung Karl Mannsfelder

CHRISTIAN WIESER

Einleitung

Die Schmetterlingssammlung von Karl Mannsfelder wurde nach seinem Tod im Jahr 1998 durch die Stadtgemeinde Feldkirchen angekauft und dem Museumsverein zur Betreuung übergeben. Nach mehreren Zwischenstationen im Amthof soll die Sammlung nunmehr endgültig ihre Heimat in einem adaptierten Raum im Missoni-Haus (Abb. 1) finden. Vor allem die Kärnten betreffenden lokal faunistisch interessanten Teile der Sammlung wurden durch den Autor bearbeitet und die Daten erhoben, ausgewertet und digital in der Datenbank des Faunistikzentrums des Landesmuseums Kärnten gespeichert.

Karl Mannsfelder

Als Karl Vierbauch in Klausen bei Feldkirchen geboren, widmete sich der Naturliebhaber Karl Mannsfelder nach seiner Gefangenschaft in Russland im Zweiten

Weltkrieg mit größter Passion den Schmetterlingen. Neben vielen Sammelexkursionen im Umfeld von Feldkirchen führten ihn seine Urlaubsreisen vornehmlich nach Friaul, wovon viele Sammlungsstücke aus dem Raum Cornino und Cimano zeugen. Er hat sich nicht nur mit Tagfaltern beschäftigt, sondern sich auch bei den Nachtfaltern neben den Spinnern über recht schwierige Gruppen wie die Eulenfalter und Spanner gewagt. Der Großteil der Sammlung mit Kärnten-



Abb. 2: Karl Mannsfelder mit exotischen Tagfaltern. Aufn. Nachlass Mannsfelder



Abb. 1: Missoni-Haus in Feldkirchen. Aufn. C. Wieser

Bezug stammt aus der Zeit zwischen 1950 und 1980. Durch Tausch, Kauf und Zucht der Larvalstadien hat Herr Mannsfelder auch eine optisch eindrucksvolle Sammlung tropischer Falter (Abb. 2) zu seiner eigenen Erbauung und für Schauzwecke zusammengetragen. Dabei wurde die systematische Abgrenzung der Schmetterlinge nicht strikt eingehalten, sodass sich auch mehrere Laden mit tropischen Käfern und anderen Insekten in der „Exotensammlung“ finden.

Sein Interesse galt aber auch der Mineralogie und als gelerntem Gärtner war ihm die Botanik selbstverständlich nicht fremd und das Wissen darüber war ihm beim Züchten von Schmetterlingsraupen sehr nützlich.

Karl Mannsfelder starb am 15. 1. 1998 im Alter von 87 Jahren.

Die Sammlung

Nach der zur Zeit Mannsfelders gängigen Systematik geordnet, sind die sauber präparierten und fast durchwegs etikettierten Tiere in selbst angefertigten verglasten Laden übersichtlich gesteckt. Diese Schaukästen sind bei der Überarbeitung mehr oder weniger in der ursprünglichen Zusammenstellung mit der alten Nomenklatur verblieben, lediglich einzelne geringfügige durch Determinationskorrekturen nötig gewordene Umstellungen wurden seitens des Autors durchgeführt.

Insgesamt umfasst die Sammlung 49 Schaukästen mit europäischer Schmetterlingsfauna, 25 mit exotischen Insekten.

Schriftliche Aufzeichnungen wie Sammelprotokolle oder Publikationen über die Sammeltätigkeit von Herrn Mannsfelder liegen leider nicht vor.

Räumliche Schwerpunkte der Sammeltätigkeit

Aus den erhobenen Funddaten lassen sich die hauptsächlichen Sammelgebiete des Herrn Mannsfelder gut nachvollziehen. Einerseits stammt viel Material aus dem Umfeld seiner Wohnstätten bei Rottendorf (ca. 630 Belege), Pollenitz (Abb. 3) (ca. 750 Belege) und Feldkirchen (ca. 350 Belege), aber auch die Ortschaften Glan (ca. 230 Belege), Sittich (ca. 50 Belege) oder der Wimitzgraben (ca. 130 Belege) waren beliebte Sammelziele. Andererseits hat er aus seinen Urlaubsdomizilen in Friaul in Cornino (ca. 212 Belege) und Cimano (ca. 470 Belege), aber auch von Martell(o) in Südtirol (ca. 130 Belege) die Sammlung mit südlichen Arten ergänzt. Insgesamt sind aus der Sammlung über 190 verschiedene Fundorte zuordenbar. Darunter befindet sich selbstverständlich auch eine Anzahl Orte von Etiketten eingetauschter Belege, die nicht von Karl Mannsfelder selbst gesammelt wurden.

Artenliste (s. Anhang)

Die Zusammenstellung der Artenliste erfolgte nach der Systematik von „The Lepidoptera of Europe“ (Karscholt 1996) und entspricht nicht der in der Sammlung verwendeten und bereits veralteten Nomenklatur. Insgesamt sind 1105 Taxa aus 21 Schmetterlingsfamilien aufgelistet.

In den neun Fundortspalten wurden die wichtigsten Sammelpunkte angeführt und die jeweils belegten Arten markiert.

Besonders bei den Fundorten Pollenitz (340 Arten), Rottendorf (Abb. 4) (312 Arten) und Feldkirchen (191 Arten) ergibt sich aus den Daten ein guter Überblick



Abb. 3: Pollenitz, Lichtfangplatz von K. Mannsfelder. Aufn. C. Wieser




Abb. 4: Beleuchteter Kirchturm bei Rottendorf, ein beliebter Sammelpunkt. Aufn. C. Wieser

über die Großschmetterlingsfauna vor 50 Jahren. Recht gut dokumentiert ist auch das Urlaubsdomizil von Karl Mannsfelder in Friaul bei Cimano (215 Arten) und Cornino (117 Arten). Von den weiteren Fundorten liegen zu wenig Belege vor, um ein Bild der Schmetterlingsfauna wiedergeben zu können.

Faunistische Besonderheiten

Die, den Daten nach zu schließen, vor 50–100 Jahren in Kärnten verbreitete Geometridae *Cleorodes lichenaria* (Hufnagel, 1767) wurde bereits seit Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen und ist in der Roten Liste gefährdeter Schmetterlinge Kärtents (Wieser & Huemer 1999) als „ausgestorben, ausgerottet oder verschollen“ geführt. Der letzte bekannte Fund stammt von Mannsfelder vom 19. 7. 1964 in Rottendorf, obwohl vor allem in den letzten 20 Jahren auch in potentiellen Lebensräumen intensiv nach der Art gesucht wurde. Weitere Funde aus Kärnten stammen von Pollenitz (11. 7. 1958, 19. 7. 1960; Mannsfelder) und vor 1948 datierende Meldungen von Ulrichsberg, Klagenfurt, Velden am Wörther See, St. Paul im Lavanttal, Wolfsberg (Thurner 1948). Die Art ist in Mitteleuropa sehr lokal in Wäldern verbreitet und lebt im Raupenstadium

an Baum-, Mauer- und Dachflechten. In Fajcik & Slamka 1996 wird auch von Mähren berichtet, dass nur ältere Funde vorliegen.

Ein ähnliches Bild bietet sich auch bei dem Grünwidderchen *Rbagades pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775). Ältere Fundmeldungen sind in Kärnten nur aus dem Raum Klagenfurt belegt. Der Fund im Wimitzgraben ist der vorletzte Nachweis und der nördlichste Verbreitungspunkt der Art im Bundesland.

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775), eine Eulenfalterart, die auch nur von sehr wenigen Fundorten in Kärnten bekannt ist, konnte von Mannsfelder am 17. 9. 1961 in Rottendorf nachgewiesen werden. Nur von G. Stangelmaier stammt ein neuerer Fund aus dem Jahr 1962 aus dem Raum Rosenbach. Ältere Funde wurden aus Klagenfurt und St. Stefan im Lavanttal (Thurner 1948) gemeldet.

Präsentation der Sammlung

Bereits im Jahr 1999 wurden Teile der Sammlung Mannsfelder im Rahmen der Jahresausstellung „Duft und Farbe“ in Feldkirchen präsentiert. Nach der nunmehrigen Bearbeitung der Sammlungsbelege und deren digitaler Erfassung hat sich der Museumsverein



Abb. 5: Grünes Blatt (*Geometra papilionaria*). Aufn. W. Gailberger

Feldkirchen in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Kärnten entschlossen, die Sammlung in einer neuerlichen Ausstellung im Sommer 2005 unter dem Thema „Spinner, Spanner, Schwärmer und anderes flatterhaftes Getier“ zu zeigen. Neben einer Auswahl von etwa 40 Schaukästen aus der Sammlung wurden 4 Bildtafeln mit Kurztexten zu den Themen „Mannsfelder – Leben und Werk“, „Schmetterling – das unbekannte Wesen“, „Formen und Farben – Artenvielfalt ohne Grenzen“, „Lebensräume – Lebensträume“ mit vielen Schmetterlingsaufnahmen (Wilhelm Gailberger) in natürlicher Umgebung zusammengestellt.

Nach der Ausstellung wird die Sammlung in einem neu adaptierten Raum im Missoni-Haus aufbewahrt und steht auch weiterhin wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung.

Literatur

Fajčík, J. & F. Slamka (1996): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flug-

standort – Bionomie. 1. Bd. – Eigenverlag, Bratislava, 113 pp.

Karsholt, O. & J. Razowski (Hrsg.) (1996): The Lepidoptera of Europe. – Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.

Thurner, J. (1948): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols. – X. Sonderheft der Carinthia II, Klagenfurt.

Wieser, C. & P. Huemer (1999): Rote Liste der Schmetterlinge Kärntens (Insecta: Lepidoptera). In: Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens (Rottenburg et al.). – Naturschutz in Kärnten 15, 133–200, Klagenfurt.

Anschrift des Verfassers

Dr. Christian Wieser

Landesmuseum Kärnten

Museumgasse 2

A-9021 Klagenfurt

christian.wieser@landesmuseum-ktn.at

ARTENLISTE

SAMMLUNG MANNSFELDER

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
Zygaenidae										
<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x							x		
<i>Jordanita subsolana</i> (Staudinger, 1862)	x									
<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	x							x		
<i>Adscita manni</i> (Lederer, 1853)	x								x	x
<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x		x		x	x	x
<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	x			x				x		x
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Zygaena occitanica</i> (Villers, 1789)	x									
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	x									
<i>Zygaena exulans</i> (Hohenwarth, 1792)	x									
<i>Zygaena osterodensis curvata</i> Burgeff, 1926	x							x		
<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x		x	x		x		
<i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783)	x									
<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	x								x	x
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					x
<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	x		x	x	x			x		
Thyrididae										
<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	x									
Lasiocampidae										
<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						
<i>Poecilocampa alpina</i> (Frey & Wullslegel, 1874)	x			x						
<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Eriogaster rimicola</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	x			x		x				
<i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Malacosoma franconica</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Malacosoma alpicola</i> Staudinger, 1870	x									
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x	x					x
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x
<i>Streblote panda</i> Hübner, 1820	x									
<i>Pachypasa otus</i> (Drury, 1773)	x									
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	x									x

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	x	x	x						x	
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Gastropacha populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	
<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						x
Endromidae										
<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
Saturniidae										
<i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Graellsia isabellae</i> (Graells, 1849)	x									
<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Saturnia pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	x			x						
<i>Saturnia spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Perisomena caecigena</i> (Kupido, 1825)	x									
<i>Antherea yamamai</i> (Guérin-Méneville, 1861)	x									
Lemoniidae										
<i>Lemonia dumii</i> (Linnaeus, 1761)	x				x					
<i>Lemonia taraxaci</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Lemonia balcanica</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	x									
Brahmaeidae										
<i>Acanthobrahmea europaea</i> (Hartig, 1963)	x									
Sphingidae										
<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								x
<i>Smerinthus ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x						
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x	x				
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	x	x		x						
<i>Hyloicus pinastri</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Hemaris croatica</i> (Esper, 1779)	x									
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x						x	
<i>Daphnis nerii</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	x									
<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Hyles galii</i> (Rottemburg, 1775)	x			x						x
<i>Hyles vespertilio</i> (Esper, 1779)	x									x
<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1793)	x									
<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1779)	x	x								x
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x					x
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x						x	x
<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	x									

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Theretra alecto</i> (Linnaeus, 1758)	x									
Hesperiidae										
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					x
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	x									
<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	x									
<i>Carcharodus floccifera</i> (Zeller, 1847)	x				x					
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	x								x	
<i>Spialia orbifer</i> (Hübner, 1823)	x									
<i>Muschampia proto</i> (Ochsenheimer, 1808)	x									
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	x									
<i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, 1839)	x									
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	x									
<i>Pyrgus cinarae</i> (Rambur, 1839)	x									
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	x								x	
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	x		x					x		
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	x									
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	x	x				x				
<i>Carterocephalus silvicola</i> (Meigen, 1829)	x									
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	x							x		
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	x		x		x	x				
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	x									
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					x
<i>Ochlodes venata</i> (Bremer & Grey, 1853)	x	x	x		x				x	
<i>Gegenes pumilio</i> (Hoffmannsegg, 1804)	x									
Papilionidae										
<i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Zerynthia cerisy</i> (Godart, 1824)	x									
<i>Archon apollinus</i> (Herbst, 1798)	x									
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x				x	
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							x
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	x	x	x							x
<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	x									
Pieridae										
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Leptidea duponcheli</i> (Staudinger, 1871)	x									
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					
<i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869	x									
<i>Anthocharis damone</i> Boisduval, 1836	x									
<i>Anthocharis gruneri</i> Herrich-Schäffer, 1851	x									
<i>Euchloe belemia</i> (Esper, 1800)	x									

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Euchloe simplonia</i> (Boisduval, 1828)	x									
<i>Euchloe tagis</i> (Hübner, 1804)	x									
<i>Euchloe charlonia</i> (Donzel, 1842)	x									
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	x							x		
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x	x					x
<i>Pieris krueperi</i> Staudinger, 1860	x									
<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	x								x	
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Pieris ergane</i> (Geyer, 1828)	x									
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x	x			x	x
<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1806)	x									
<i>Pontia callidice</i> (Hübner, 1800)	x									
<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x		x			x
<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	x									
<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	x									
<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	x	x	x		x				x	
<i>Colias myrmidone</i> (Esper, 1780)	x									
<i>Colias chrysótheme</i> (Esper, 1781)	x									
<i>Colias aurorina</i> Herrich-Schäffer, 1850	x									
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x				x	
<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	x									
Lycaenidae										
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	x		x		x	x		x	x	
<i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	x									x
<i>Lycaena virginae</i> (Linnaeus, 1758)	x		x					x		
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	x		x		x			x		
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	x								x	x
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	x		x		x	x				
<i>Neozephyrus quercus</i> (Linnaeus, 1758)	x		x						x	
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	x									
<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	x		x			x			x	
<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	x									
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	x		x							
<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829)	x									
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	x		x		x			x	x	
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x			x	x	x
<i>Pseudophilotes vicrama</i> (Moore, 1865)	x		x	x	x	x				x

TAXON	SAMML.	ROTTEND.	POLLENITZ	FELDK.	GLAN	SITTICH	WAIERN	WIMITZ	CORNINO	CIMANO
<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	x				x					x
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	x	x	x		x	x				x
<i>Iolana iolas</i> (Ochsenheimer, 1816)	x									
<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x		x		
<i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	x		x	x	x				x	
<i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	x									
<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						
<i>Plebeius pylaon</i> (Fischer v. Waldheim, 1832)	x									
<i>Plebeius argus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x					
<i>Plebeius idas</i> (Linnaeus, 1761)	x				x					
<i>Plebeius argyronomus</i> (Bergsträsser, 1779)	x									
<i>Plebeius optilete</i> (Knoch, 1781)	x									
<i>Plebeius orbitalis</i> (Prunner, 1798)	x									
<i>Aricia eumedon</i> (Esper, 1780)	x							x		
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x		x	x				
<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	x									
<i>Polyommatus semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	x		x		x			x		
<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823)	x									
<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x							x	x
<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)	x									
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	x									
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	x	x	x		x	x			x	x
<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)	x									
<i>Polyommatus daphnis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	x								x	x
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	x								x	x
<i>Polyommatus ripartii</i> (Freyer, 1830)	x									
<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
Nymphalidae										
<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	x									
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x			x		
<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x		x			x	x	x
<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	x				x			x		
<i>Argynnis laodice</i> (Pallas, 1771)	x									
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x			x		
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	x	x			x			x		
<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Brenthis hecate</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x					
<i>Boloria titania</i> (Esper, 1793)	x									
<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x				x	x				
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	x		x					x

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Boloria thore</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Boloria pales</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Boloria napaea</i> (Hoffmannsegg, 1804)	x									
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Vanessa indica</i> (Herbst, 1794)	x									
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	x									
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (Esper, 1781)	x									
<i>Euphydryas cynthis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Euphydryas desfontainii</i> (Godart, 1819)	x									
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	x									
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					x
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x				x				x	x
<i>Melitaea trivia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	x								x	x
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	x	x			x	x				
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	x									x
<i>Melitaea britomartis</i> Assmann, 1847	x									
<i>Melitaea asteria</i> Freyer, 1828	x									
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	x		x		x	x			x	x
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	x								x	
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	x									
<i>Limenitis reducita</i> Staudinger, 1901	x									
<i>Neptis sappho</i> (Pallas, 1771)	x									
<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Charaxes jasius</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x						x	x	
<i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)	x				x				x	
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)	x								x	x
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	x									
<i>Coenonympha corinna</i> (Hübner, 1804)	x									
<i>Coenonympha elbana</i> Staudinger, 1901	x									
<i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782)	x									
<i>Coenonympha leander</i> (Esper, 1784)	x									
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					
<i>Proterebia afra</i> (Fabricius, 1787)	x									
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	x				x				x	

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	x									
<i>Erebia eriphyle</i> (Freyer, 1836)	x									
<i>Erebia claudina</i> (Borkhausen, 1789)	x									
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	x									
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	x									
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	x									
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	x				x			x		
<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x					x		
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	x									
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	x									
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	x									x
<i>Erebia nivalis</i> Lorkovic & Lesse, 1954	x									
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	x									
<i>Erebia stirius</i> (Godart, 1824)	x									x
<i>Erebia styx</i> (Freyer, 1834)	x							x	x	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	x									
<i>Erebia neoridas</i> (Boisduval, 1828)	x									
<i>Erebia melas</i> (Herbst, 1796)	x									
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	x									
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	x									
<i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783)	x									
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x	x		x	x	x
<i>Melanargia lachesis</i> (Hübner, 1790)	x									
<i>Melanargia larissa</i> (Geyer, 1828)	x									
<i>Melanargia occitanica</i> (Esper, 1793)	x									
<i>Melanargia ines</i> (Hoffmannsegg, 1804)	x									
<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	x								x	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	x							x	x	x
<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Hipparchia aristaeus</i> (Bonelli, 1826)	x									
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Hipparchia mersina</i> (Staudinger, 1871)	x									
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	x									x
<i>Hipparchia fidia</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	x									
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	x									
<i>Chazara prieuri</i> (Pierret, 1837)	x									
<i>Pseudochazara anthelea</i> (Hübner, 1824)	x									
<i>Oeneis glacialis</i> (Moll, 1783)	x									
<i>Oeneis jutta</i> (Hübner, 1806)	x									
<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	x									
Drepanidae										
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x					x
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							x

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Tethea ocellaris</i> (Linnaeus, 1767)	x									x
<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							x
<i>Tetheella fluctuosa</i> (Hübner, 1803)	x		x	x						
<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x							x
<i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Polyploca ridens</i> (Fabricius, 1787)	x									
<i>Asphalia ruficollis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Achyela flavigutta</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x		x			
<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x				x				
<i>Watsonalla uncinula</i> (Borkhausen, 1790)	x									
<i>Watsonalla cultraria</i> (Fabricius, 1775)	x									
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x					x
<i>Sabra harpagula</i> (Esper, 1786)	x	x								
<i>Ciliix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	x									
Geometridae										
<i>Archiearis parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	x		x							
<i>Archiearis notha</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Archiearis puella</i> (Esper, 1787)	x									
<i>Abraxas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	x			x					x	x
<i>Calospilos sylvata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x							
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x		x				x
<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)	x		x							x
<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	x									x
<i>Stegania dilectaria</i> (Hübner, 1790)	x									
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x					x	x
<i>Macaria signaria</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	x	x	x							
<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Macaria artesiaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x		x			
<i>Narraga fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767)	x									
<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)	x									
<i>Tephrina arenacearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Neognopharmia stevenaria</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Pygmaena fusca</i> (Thunberg, 1792)	x									
<i>Cephalis advenaria</i> (Hübner, 1790)	x	x					x			x
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x				x			
<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x					x
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	x	x							x	x
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cormino	Cimano
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	x			x						
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Eilicrinia trinotata</i> (Metzner, 1845)	x									
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	x			x			x			
<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x								
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	x		x	x						
<i>Ennomos erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x					x	
<i>Eumera regina</i> Staudinger, 1892	x									
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	x	x		x						
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	x		x						x	x
<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x	x			x			x
<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	x	x								
<i>Dasycorsa modesta</i> (Staudinger, 1879)	x									
<i>Crocallis tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	x									
<i>Crocallis elinguaria</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x						x	
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	x			x	x					
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x					x		x
<i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Apocheima pilosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	x	x		x						
<i>Lycia alpina</i> (Sulzer, 1776)	x									
<i>Lycia zonaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Lycia pomonaria</i> (Hübner, 1790)	x									
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x		x	x					
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						x
<i>Agriopsis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Agriopsis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	x									
<i>Agriopsis marginaria</i> (Fabricius, 1776)	x			x			x			
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	x							x		
<i>Crocota niveata</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Athrolophra pennigeraria</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	x								x	
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	x	x		x	x					
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x						x	x
<i>Peribatodes perversaria</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Peribatodes umbraria</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Selidosema brunnearia</i> (Villers, 1789)	x									
<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x						
<i>Deileptenia ribeata</i> (Clerck, 1759)	x									
<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x				x			
<i>Alcis bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	x							x		

TAXON	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waieren	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Alcis jubata</i> (Thunberg, 1788)	x	x								
<i>Ariachanna melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x							
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Paradarisa consonaria</i> (Hübner, 1799)	x		x							
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x				x
<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x					
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	x	x								
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x							
<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Theria rupicapraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								
<i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	x	x	x							
<i>Campaea honoraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x	x					x
<i>Pungeleria capreolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Gnophos furvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						x
<i>Gnophos obfuscata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Odontognophos dumetata</i> (Treitschke, 1827)	x									x
<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Charissa ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	x									
<i>Charissa pullata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Charissa glaucinaria</i> (Hübner, 1799)	x	x								
<i>Charissa variegata</i> (Duponchel, 1830)	x									
<i>Elophos dilucidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Elophos serotinaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Elophos vittaria</i> (Thunberg, 1788)	x									
<i>Elophos zelleraria</i> (Freyer, 1836)	x									
<i>Elophos caelibaria</i> (Heydenreich, 1851)	x									
<i>Psodos quadrifaria</i> (Sulzer, 1776)	x									
<i>Glacies spizti</i> (Rebel, 1906)	x									
<i>Glacies noricana</i> (Wagner, 1898)	x									
<i>Glacies coracina</i> (Esper, 1805)	x									
<i>Glacies alpinata</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	x								x	
<i>Semiaspilates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	x									
<i>Dyscia innocentaria</i> (Christoph, 1885)	x									
<i>Dyscia raunaria</i> (Freyer, 1851)	x									
<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	x		x							
<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x				x					
<i>Orthostixis cribalaria</i> (Hübner, 1799)	x									
<i>Aplasta ononaria</i> (Fuessly, 1783)	x								x	x
<i>Pseudoterpnia pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x							

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x					
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							x
<i>Antonechloris smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	x									
<i>Hemitea aestivaria</i> (Hübner, 1789)	x		x	x						
<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Chlorissa cloraria</i> (Hübner, 1813)	x		x						x	x
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	x			x						x
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	x									
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Jodis putata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Eucrostes indigenata</i> (Villers, 1789)	x									
<i>Xenochlorodes beryllaria</i> (Mann, 1853)	x									
<i>Cyclophora albocellaria</i> (Hübner, 1789)	x									
<i>Cyclophora quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	x									
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x				x	x
<i>Cyclophora suppunctaria</i> (Zeller, 1847)	x	x			x					x
<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	x	x	x		x					
<i>Timandra griseata</i> W. Petersen, 1902	x	x			x		x			
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x		x			
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	x		x							x
<i>Scopula virgulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							x
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x			x		x	
<i>Scopula submutata</i> (Treitschke, 1828)	x									x
<i>Scopula decorata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x								x
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	x		x	x					x	x
<i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799)	x									x
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Idaea sericeata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	x			x	x					x
<i>Idaea serpentata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x		x	x		x		
<i>Idaea aureolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	x		x							x
<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								
<i>Idaea laevigata</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x							x
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	x									
<i>Idaea virgularia</i> (Hübner, 1799)	x									
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	x						x			
<i>Idaea camparia</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	x									
<i>Idaea pallidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x				x	x
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	x								x	
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	x	x	x							x

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waieren	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Emmiltis pygmaearia</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Problepsis ocellata</i> (Frivaldszky, 1845)	x									
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	x		x							x
<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1786)	x									x
<i>Rhodostrophia tabidaria</i> (Zeller, 1847)	x									
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Cataclysme riguata</i> (Hübner, 1813)	x								x	x
<i>Phibalapteryx virgata</i> (Hufnagel, 1767)	x								x	x
<i>Scotopteryx moeniata</i> (Scopoli, 1763)	x		x							
<i>Scotopteryx coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						x
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x				x	
<i>Scotopteryx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x							
<i>Scotopteryx luridata</i> (Hufnagel, 1767)	x		x						x	x
<i>Orthonama obstipata</i> (Fabricius, 1794)	x		x	x				x		
<i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	x	x				x				
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	x							x		
<i>Xanthorhoe decoloraria</i> (Esper, 1806)	x									
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x	x					
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	x		x					x		x
<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Xanthorhoe incurvata</i> (Hübner, 1813)	x		x							
<i>Catarhoe permixtaria</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	x									
<i>Catarhoe rubidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x				x			
<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x						x	
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	x		x	x				x		
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	x	x	x		x					
<i>Epirrhoe molluginata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x		x	
<i>Entephria nobiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	x									
<i>Entephria flavicinctata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Entephria infidaria</i> (La Harpe, 1853)	x									
<i>Entephria caesiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Larentia clavaria</i> (Haworth, 1809)	x		x							
<i>Anticlea badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								x
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x			x		
<i>Lampropteryx suffumata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x				x		
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x					x		
<i>Nebula salicata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	x									

TAXON	SAMML.	ROTTEND.	POLLENITZ	FELDK.	GLAN	SITTICH	WAIERN	WIMITZ	CORNINO	CIMANO
<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x		x		x			
<i>Eulithis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x				x	x	x
<i>Ecliptopera silacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x		x					
<i>Ecliptopera capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	x	x								
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x	x			x			
<i>Chloroclysta miata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x		x	x			
<i>Chloroclysta citrata</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		x	x		x			
<i>Chloroclysta truncata</i> (Hufnagel, 1767)	x				x					
<i>Cidaria fulvata</i> (Forster, 1771)	x									
<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Pennithera firmata</i> (Hübner, 1822)	x	x	x		x					
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	x	x	x							
<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Thera cognata</i> (Thunberg, 1792)	x									
<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	x				x					
<i>Eustroma reticulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						
<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	x	x								
<i>Colostygia aptata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Colostygia aqueata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Colostygia turbata</i> (Hübner, 1799)	x									
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	x	x	x	x			x			x
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	x	x	x							
<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x			x			
<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x				x				x	
<i>Horisme corticata</i> (Treitschke, 1835)	x									
<i>Horisme radicaria</i> (La Harpe, 1855)	x									
<i>Melanthis procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							x
<i>Melanthis alaudaria</i> (Freyer, 1846)	x									
<i>Pareulypte berberata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x	x		x			x
<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Rheumaptera subhastata</i> (Nolcken, 1870)	x									
<i>Rheumaptera cervicalis</i> (Scopoli, 1763)	x		x	x			x			
<i>Rheumaptera undulata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x	x						
<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	x								x	
<i>Euphyia frustata</i> (Treitschke, 1828)	x									
<i>Euphyia scripturata</i> (Hübner, 1799)	x									
<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								
<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	x	x	x				x			
<i>Operophtera brunata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x			
<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x		x		x		
<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)	x									

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waierm	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Perizoma minorata</i> (Treitschke, 1828)	x									
<i>Perizoma blandiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x					x		
<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x					x	x
<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	x	x	x			x				
<i>Perizoma didymata</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Perizoma sagittata</i> (Fabricius, 1787)	x	x		x						
<i>Perizoma verberata</i> (Scopoli, 1763)	x									
<i>Perizoma parallelolineata</i> (Retzius, 1783)	x	x		x	x			x		
<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781)	x	x	x							
<i>Eupithecia insigniata</i> (Hübner, 1790)	x		x	x						
<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x							
<i>Eupithecia silenicolata</i> Mabille, 1867	x									
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Eupithecia gratiosata</i> Herrich-Schäffer, 1861	x									x
<i>Eupithecia breviculata</i> (Donzel, 1837)	x									x
<i>Eupithecia veratraria</i> Herrich-Schäffer, 1850	x		x							
<i>Eupithecia icterata</i> (Villers, 1789)	x		x							
<i>Eupithecia succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x				
<i>Eupithecia semigraphata</i> Bruand, 1850	x			x						
<i>Eupithecia lanceata</i> (Hübner, 1825)	x		x			x				
<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	x	x								
<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840	x	x	x	x	x					
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	x	x								
<i>Rhinoprora rectangularis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775)	x									
<i>Carsia sororiana</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x			
<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner, 1826)	x	x	x	x						
<i>Aplocera simpliciata</i> Treitschke, 1835	x									
<i>Odezia atrata</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Schistostege decussata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Discoloxia blomeri</i> (Curtis, 1832)	x	x								
<i>Venusia cambrica</i> Curtis, 1839	x									
<i>Eucloea nebula</i> (Scopoli, 1763)	x	x						x		x
<i>Asthena albulata</i> (Hufnagel, 1767)	x				x					x
<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x					x		
<i>Hydrelia sylvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x	x				x		
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x	x	x					
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	x	x	x							
<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	x		x							
Notodontidae										
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Thaumetopoea solitaria</i> (Freyer, 1838)	x									

TAXON	SAMML.	ROTTEND.	POLLENITZ	FELDK.	GLAN	SITTICH	WAIERN	WIMITZ	CORNINO	CIMANO
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Closteria curtula</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						x
<i>Closteria pigra</i> (Hufnagel, 1766)	x		x	x						
<i>Closteria anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						
<i>Closteria anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						x
<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	x								x	
<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	x		x						x	x
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	x	x								x
<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	x	x	x		x					
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	x	x	x	x						
<i>Dicranura ulmi</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Notodontia dromedarius</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x						x
<i>Notodontia torva</i> (Hübner, 1803)	x								x	
<i>Notodontia tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Notodontia ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						
<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x					x	
<i>Drymonia oblitterata</i> (Esper, 1785)	x									
<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	x			x						x
<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1776)	x	x	x		x					
<i>Paradrymonia vittata</i> (Staudinger, 1892)	x									
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	x			x						x
<i>Ptilophora plumigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x				x		
<i>Leucodonta bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	x			x	x					x
<i>Ptilodon cucullina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Odontosia carmelita</i> (Esper, 1799)	x	x								
<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	x									x
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	x		x							x
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								x
<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x							
<i>Spatialia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
Noctuidae										
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	x	x	x							
<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	x	x		x						
<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813)	x			x						x
<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x					x		
<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x						
<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	x			x	x					
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x			x				x	

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Acronicta strigosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Acronicta menyanthidis</i> (Esper, 1789)	x									
<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							x
<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x		x					
<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x			
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x					x	x
<i>Cryphia fraudatricula</i> (Hübner, 1803)	x		x							
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	x	x	x				x			
<i>Cryphia ereptricula</i> (Treitschke, 1825)	x	x	x				x			
<i>Cryphia raptricula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Cryphia domestica</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Idia calvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Simplicia rectalis</i> (Eversmann, 1842)	x									
<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	x								x	
<i>Herminia tarsicrinialis</i> (Knoch, 1782)	x		x							x
<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								x
<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	x				x			x		
<i>Pechipogo plumigeralis</i> (Hübner, 1825)	x									
<i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763)	x								x	x
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	x								x	x
<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Catocala dilecta</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	x			x		x				
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	x	x			x		x			
<i>Catocala elocata</i> (Esper, 1787)	x									
<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791)	x									x
<i>Catocala optata</i> (Godart, 1824)	x									
<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Catocala conjuncta</i> (Esper, 1787)	x									
<i>Catocala conversa</i> (Esper, 1783)	x									
<i>Catocala nymphagoga</i> (Esper, 1787)	x								x	
<i>Catocala hymenaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x							
<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x						x	
<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1773)	x									
<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)	x								x	x
<i>Grammodes bifasciata</i> (Petagna, 1787)	x								x	x
<i>Prodotis stolida</i> (Fabricius, 1775)	x									
<i>Drasteria cailino</i> (Lefèvre, 1827)	x									
<i>Lygephila viciae</i> (Hübner, 1822)	x	x	x							
<i>Lygephila craccae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	
<i>Apopestes spectrum</i> (Esper, 1787)	x									
<i>Autophila dilicida</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Aedia leucomelas</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	x									x
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	x		x						x	
<i>Gonospileia triquetra</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Calyptra thalictri</i> (Borkhausen, 1790)	x								x	x
<i>Rhynchodontodes antiqualis</i> (Hübner, 1809)	x								x	
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x			x		
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Hypena obesalis</i> Treitschke, 1829	x	x	x	x						x
<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, 1813)	x									x
<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x		x					
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	x	x	x							x
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	x	x		x						
<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	x	x		x				x		
<i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								x
<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	x								x	
<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller, 1783)	x									
<i>Euchalcia modestoides</i> Poole, 1989	x									
<i>Euchalcia consona</i> (Fabricius, 1787)	x									
<i>Polychrysia moneta</i> (Fabricius, 1787)	x								x	
<i>Lamprotes c-aureum</i> (Knoch, 1781)	x		x	x						
<i>Panchrysia v-argenteum</i> (Esper, 1798)	x									
<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x
<i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, 1822)	x									x
<i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)	x		x	x						x
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	x	x								x
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x					
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x	x					
<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	x	x				x				
<i>Autographa iota</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x				x
<i>Autographa bractea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Autographa aemula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Plusidia cheiranthi</i> (Tauscher, 1809)	x									
<i>Syngrapha hochenwarthi</i> (Hochenwarth, 1785)	x									
<i>Syngrapha ain</i> (Hochenwarth, 1785)	x	x	x							
<i>Syngrapha interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, 1803)	x									x
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	x	x							x	x
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Abrostola asclepiadis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x	x					

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	x	x		x						x
<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x					
<i>Deltote deceptoria</i> (Scopoli, 1763)	x							x		
<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	x	x			x				x	
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	x								x	x
<i>Pseudeustrotia candidula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x						
<i>Odice arcuinna</i> (Hübner, 1790)	x									
<i>Odice suava</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Odice jucunda</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Calymma communimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Eublemma parva</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	
<i>Metachrostis velox</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Cucullia fraudatrix</i> Eversmann, 1837	x									
<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	x									
<i>Cucullia argentea</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Cucullia lucifuga</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x		x				
<i>Cucullia gnaphalii</i> (Hübner, 1813)	x	x	x							
<i>Cucullia asteris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x	x						
<i>Shargacucullia scrophulariae</i> (Denis & Schiffermüll., 1775)	x		x							x
<i>Shargacucullia lychnitis</i> (Rambur, 1833)	x	x			x					
<i>Shargacucullia prenanthis</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Calophasia platyptera</i> (Esper, 1788)	x									
<i>Calophasia opalina</i> (Esper, 1793)	x									
<i>Omphalophana antirrhini</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Sympistis heliophila</i> (Paykull, 1793)	x									
<i>Callierges ramosa</i> (Esper, 1786)	x									
<i>Copiphana olivina</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	x									
<i>Cleonymia yvanii</i> (Duponchel, 1833)	x									
<i>Amphipyra perlua</i> (Fabricius, 1787)	x	x	x							
<i>Amphipyra livida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x		x					
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	x	x			x			x		x
<i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	x				x					
<i>Brachionycha nubeculosa</i> (Esper, 1785)	x	x						x		
<i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x			x		
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x		x					
<i>Schinia scutosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	x	x							x	x
<i>Heliothis ononis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x			x			
<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						x

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)	x		x							x
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Chazaria incarnata</i> (Freyer, 1838)	x									
<i>Platyperigea albina</i> (Eversmann, 1848)	x									x
<i>Platyperigea kadenii</i> (Freyer, 1836)	x									
<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	x	x	x		x					
<i>Eremodrina gilva</i> (Donzel, 1837)	x									
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	x	x	x	x						
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x						x	
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	x	x								
<i>Atypa pulmonaris</i> (Esper, 1790)	x		x							
<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)	x									
<i>Sesamia cretica</i> Lederer, 1857	x									
<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								x
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	x	x	x							
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	x							x		
<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	x									x
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Phlogophora scita</i> (Hübner, 1790)	x									
<i>Hyppa rectilinea</i> (Esper, 1788)	x	x								
<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	x			x						
<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	x	x								
<i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Callopistria juventina</i> (Stoll, 1782)	x									
<i>Methorasa latreillei</i> (Duponchel, 1827)	x									x
<i>Eucarta amethystina</i> (Hübner, 1803)	x								x	x
<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Enargia paleacea</i> (Esper, 1788)	x	x	x							
<i>Mesogona acetosellae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x								
<i>Mesogona oxalina</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Dicycla oo</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Cosmia diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)	x									
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	x	x	x		x					x
<i>Xanthia aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Xanthia sulphurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x		x		x			

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waieren	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Xanthia gilvago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x		x					
<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	x	x	x	x		x				
<i>Agrochola macilenta</i> (Hübner, 1809)	x		x							
<i>Agrochola nitida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x				x					
<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Agrochola humilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Agrochola litura</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x			x			
<i>Jodia croceago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	x	x								
<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	x			x						
<i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Orbona fragariae</i> (Vieweg, 1790)	x									
<i>Episema glaucina</i> (Esper, 1789)	x									
<i>Dasypolia templi</i> (Thunberg, 1792)	x									
<i>Brachylomia viminalis</i> (Fabricius, 1776)	x							x		
<i>Aporophyla australis</i> (Boisduval, 1829)	x									
<i>Aporophyla lutulenta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	x									
<i>Lithomoia solidaginis</i> (Hübner, 1803)	x	x				x				
<i>Lithophane socia</i> (Hufnagel, 1766)	x	x								
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	x		x							
<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	x				x					
<i>Lithophane consocia</i> (Borkhausen, 1792)	x	x			x					
<i>Xylena vetusta</i> (Hübner, 1813)	x		x			x				
<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Meganephria bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Allophyses oxyacanthalae</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Valeria oleagina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Valeria jaspidea</i> (Villers, 1789)	x									
<i>Dichonia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Dichonia convergens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Dichonia aeruginea</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775)	x	x								
<i>Dryobotodes roboris</i> (Boisduval, 1828)	x									
<i>Anitype chi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x			x		x		
<i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							x
<i>Ammoconia senex</i> (Geyer, 1828)	x									
<i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785)	x									
<i>Polymixis polymita</i> (Linnaeus, 1761)	x		x	x						
<i>Polymixis rufocincta</i> (Geyer, 1828)	x									

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Polymixis gemmea</i> (Treitschke, 1825)	x	x	x		x					
<i>Blepharita satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x	x	x					
<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)	x	x	x							
<i>Mniotype solieri</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	x									
<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x						
<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Apamea furva</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Apamea maillardi</i> (Geyer, 1834)	x				x					
<i>Apamea zeta</i> (Treitschke, 1825)	x									
<i>Apamea rubrirena</i> (Treitschke, 1825)	x									
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	x		x							
<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	x	x	x			x				x
<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	x	x	x							
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	x		x							
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Mesapamea didyma</i> (Esper, 1788)	x	x		x						x
<i>Photedes minima</i> (Haworth, 1809)	x	x	x	x						
<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Luperina dumerili</i> (Duponchel, 1826)	x									
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	x			x						
<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)	x		x				x			
<i>Amphipoea fucosa</i> (Freyer, 1830)	x	x	x	x						
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	x									
<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x						
<i>Gortyna puengeleri</i> (Turati, 1909)	x									x
<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Staurophora celsia</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Celaena haworthii</i> (Curtis, 1829)	x									
<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784)	x			x						
<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Chortodes elymi</i> (Treitschke, 1825)	x									
<i>Discestra trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	x		x	x						
<i>Discestra melanopa</i> (Thunberg, 1791)	x									
<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	x		x			x				
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Lacanobia aliena</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808)	x									x
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x						
<i>Lacanobia suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x					x			x
<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	x		x							
<i>Aetheria dysodea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Aetheria bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766)	x			x			x			x
<i>Hadena luteago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x		x		x		x	
<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Hadena albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	x		x							
<i>Hadena magnoliae</i> (Boisduval, 1829)	x									
<i>Hadena filigrama</i> (Esper, 1788)	x		x						x	x
<i>Hadena caesia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Hadena rivularis</i> (Fabricius, 1775)	x	x		x		x	x			
<i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Sideridis lampra</i> (Schawerda, 1913)	x									x
<i>Heliothis reticulata</i> (Goeze, 1781)	x		x							
<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	x		x	x			x			
<i>Melanchra pisi</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x				
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	x		x							
<i>Polia hepatica</i> (Clerck, 1759)	x									
<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	x		x	x						
<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)	x	x								x
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	x		x							
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	x		x	x	x					
<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							x
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	x									x
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	x				x					x
<i>Mythimna obsoleta</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Mythimna comma</i> (Linnaeus, 1761)	x	x			x					
<i>Mythimna putrescens</i> (Hübner, 1824)	x									
<i>Mythimna litoralis</i> (Curtis, 1827)	x									
<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	x		x						x	
<i>Mythimna andereggii</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Mythimna scirpi</i> (Duponchel, 1836)	x								x	x
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	x								x	x
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	x									

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x	x					
<i>Orthosia opima</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	x	x								
<i>Orthosia munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x						
<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x				x			
<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							
<i>Perigrapha i-cinctum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Hyssia cavernosa</i> (Eversmann, 1842)	x									
<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						
<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x					x		
<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	x	x	x							
<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x	x	x					x
<i>Eriopygodes imbecilla</i> (Fabricius, 1794)	x									
<i>Lasionycta proxima</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	x		x							
<i>Ochropleura musiva</i> (Hübner, 1803)	x		x							
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	x	x								x
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	x		x							
<i>Diarsia dahlii</i> (Hübner, 1813)	x						x			
<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x		x						
<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	x				x		x
<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)	x		x							
<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	x									x
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	x	x	x						x	x
<i>Noctua janthina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x			x					x	x
<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	x								x	
<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Chersotis rectangula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Chersotis ocellina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Chersotis multangula</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Chersotis margaritacea</i> (Villers, 1789)	x									
<i>Chersotis cuprea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Chersotis fimbriola</i> (Esper, 1803)	x									
<i>Rhyacia simulans</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Rhyacia lucipeta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x						x		
<i>Rhyacia helvetica</i> (Boisduval, 1833)	x									
<i>Epipsilia latens</i> (Hübner, 1809)	x		x							
<i>Epipsilia grisescens</i> (Fabricius, 1794)	x	x		x				x		
<i>Standfussiana wiskotti</i> (Standfuss, 1888)	x									
<i>Paradiarsia glareosa</i> (Esper, 1788)	x									
<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Opigena polygona</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)	x	x			x					

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Eugnorisma depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x							
<i>Xestia speciosa</i> (Hübner, 1813)	x									
<i>Xestia alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)	x									
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x						x
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							x
<i>Xestia ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	x									
<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Xestia rhomboidea</i> (Esper, 1790)	x		x							
<i>Xestia castanea</i> (Esper, 1798)	x	x							x	
<i>Xestia ochreago</i> (Hübner, 1809)	x									
<i>Xestia collina</i> (Boisduval, 1840)	x									
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	x									
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	x
<i>Eugrapha sigma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Coenophila subrosea</i> (Stephens, 1829)	x									
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x	x						
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x	x						
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	x		x	x		x				
<i>Actebia praecox</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Euxoa birivia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x								x	
<i>Euxoa decora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	x	x	x							
<i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x		x							
<i>Euxoa cursoria</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Yigoga signifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Yigoga nigrescens</i> (Hofner, 1888)	x									
<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Agrotis ripae</i> (Hübner, 1823)	x									
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	x		x							
<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)	x									
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x						x
<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	x	x								
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x			x					
<i>Agrotis simplonia</i> (Geyer, 1832)	x									
<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x							x	
<i>Agrotis fatidica</i> (Hübner, 1824)	x									
Pantheidae										
<i>Panthea coenobita</i> (Esper, 1785)	x	x	x	x			x			
<i>Trichosea ludifica</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x				x		x
Lymantriidae										
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x		x	x				

Taxon	Sammel.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Ocneria rubea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									
<i>Parocneria detrita</i> (Esper, 1785)	x									
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Dicallomera fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Gynaephora selenitica</i> (Esper, 1789)	x									
<i>Orgyia recens</i> (Hübner, 1819)	x									
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x
<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						
<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	x	x				x				
<i>Penthophera morio</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Laelia coenosa</i> (Hübner, 1808)	x									
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	x			x						x
<i>Arctornis l-nigrum</i> (Müller, 1764)	x		x							x
Nolidae										
<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x								
<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)	x								x	x
<i>Nola chlamitialis</i> (Hübner, 1813)	x								x	
<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1772)	x		x							
<i>Nycteola degenerana</i> (Hübner, 1799)	x	x	x							
<i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	x		x						x	
<i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)	x								x	x
Arctiidae										
<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	x	x	x			x				x
<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x			x		
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x					
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		x	x					
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	x	x	x	x						
<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	x								x	
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	x		x							
<i>Eilema caniola</i> (Hübner, 1808)	x								x	x
<i>Eilema pygmaeola</i> (Doubleday, 1847)	x									
<i>Eilema lutarella</i> (Linnaeus, 1758)	x	x			x			x		
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	x	x	x							
<i>Setema cereola</i> (Hübner, 1803)	x									
<i>Setina irrorella</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Setina flavicans</i> (Geyer, 1836)	x									
<i>Setina roscida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x									x
<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Amata kruegeri</i> (Ragusa, 1904)	x									
<i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	x									
<i>Dysauxes famula</i> (Freyer, 1836)	x									

Taxon	Samml.	Rottend.	Pollenitz	Feldk.	Glan	Sittich	Waiern	Wimitz	Cornino	Cimano
<i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781)	x									
<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	x									x
<i>Coscinia cribaria</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Ocnogyna corsica</i> (Rambur, 1832)	x									
<i>Ocnogyna baetica</i> (Rambur, 1836)	x									
<i>Ocnogyna zoraida</i> (Graslin, 1837)	x									
<i>Chelis maculosa</i> (Gerning, 1780)	x									
<i>Watsonarctia casta</i> (Esper, 1785)	x								x	
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x			x		x	
<i>Phragmatobia luctifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	x	x	x							
<i>Cymbalophora pudica</i> (Esper, 1784)	x									
<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Holoarctica cervini</i> (Fallou, 1864)	x									
<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	x	x		x						x
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x			x			x
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	x									
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	x	x		x	x					
<i>Cycnia luctuosa</i> (Geyer, 1833)	x									
<i>Rhyptaria purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x		x				
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x						x	x
<i>Hyphoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Hyphoraia testudinaria</i> (Fourcroy, 1785)	x									
<i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758)	x									
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x	x	x					
<i>Arctia flavia</i> (Fuessly, 1779)	x									
<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	x							x
<i>Arctia festiva</i> (Hufnagel, 1766)	x									
<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	x		x	x				x		
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	x	x		x					x	x
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	x									x