

Capsidae tres cubanae.

Die drei von Guérin in Ramon de la Sagra's «Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba» beschriebenen Capsiden

neu beschrieben von

O. M. Reuter.

In Ramon de la Sagra's «Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba», Teil VI, 1857, p. 359 ff. ¹⁾ hat Guérin-Ménéville drei Capsiden beschrieben, von denen gegenwärtig die Typusexemplare im k. k. Hofmuseum in Wien sich befinden. Da die Beschreibungen unvollständig sind und die Arten bisher den späteren Entomologen entweder unbekannt oder ungenügend bekannt geblieben sind, die letzte sogar mißgedeutet, ²⁾ finde ich es nützlich, sie hier ausführlich zu beschreiben. Sie gehören alle der Division *Bryocoraria* an, von welcher die erste eine bisher unbeschriebene Gattung bildet.

Notolobus nov. gen.

Corpus oblongo-ovatum, nitidum; capite nutante, basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, a supero viso pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevior, latitudini interoculari aequae longo, inter antennis in angulum acutiusculum producto, vertice aequali, lato; capite ab antico viso latitudine basali cum oculis paullo longiore, a latere viso altitudine basali fere nonnihil longiore, fronte apicem versus sensim modice declivi, clypeo prominente, basi in fronte linea impressa sat leviter terminato ipsa basi mox supra medium capitis a latere visi posita, angulo faciali acuto, genis oculis aequae altis, gula horizontali; oculis laevibus, in lateribus capitis fortiter oblique positis, oblongis, a supero visis minusculis, totis ultra apicem pronoti exsertis, retrorsum ne minime quidem vergentibus; rostro coxas intermedias attingente, sat crasso, articulo primo brevi, basin capitis haud attingente, secundo parallelo, hoc multo longiore et duobus ultimis simul sumtis distincte brevior; antennis sat gracilibus, mox supra tertiam apicalem partem marginis oculorum interioris insertis, articulis primo et secundo pilosis, hoc apicem versus ultimisque subtiliter pubescentibus, primo apicem clypei vix superante, secundo primo parum graciliore et hoc minus quam duplo longiore, versus apicem gracilente; pronoto latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevior, strictura apicali optime discreta, crassa, callis convexis, valde transversalibus, tertiam apicalem partem longitudinis pronoti vix superantibus, usque in margines laterales extensis, medio anguste distantibus, disco pone callos subhorizontali

¹⁾ Die spanische Auflage ist mir unbekannt geblieben.

²⁾ Siehe Reuter, Bemerkungen über nearktische Capsiden, Acta Soc. Scient. Fenn., XXXVI, Nr. 9, 1908, p. 2.

et antice inter callos in lobum obtusum antice declivem prominente, lateribus a basi usque ad callos rectis, dein subparallelis, margine basali medio late truncato; scutello plano, impressione basali triangulari instructo; hemielytris retrorsum levissime ampliatis, embolio lineari, reflexo, cuneo declivi, latitudine basali paullo longiore, incisura fracturae destituto; membrana leviter rugulosa, area magna triangulari; mesosterno brevi, convexiusculo; metastethio orificiis haud distinguendis; coxis anticis medium mesosterni attingentibus, posticis a margine hemielytrorum longissime remotis, pedibus pilosis, femoribus elongatis, tibiis muticis, tarsis articulo primo profunde fissis et secundum usque ad medium ejus includente, tertio apicem versus valde incrassato, aroliis cum unguiculis connexis.

Notolobus dimidiatus (Guér.-Mén.).

Obscure sanguineus, capite cum rostro et antennis, pedibus cum coxis, nec non segmentis genitalibus abdominis nigris; hemielytris obscure cyaneis, clavo dimidio basali corioque aequae late sanguineis; membrana nigro-fusca; antennis articulo secundo latitudine capitis distincte longiore, tertio hoc paullo magis quam $\frac{1}{4}$ brevior; pronoto disco postice crebre subtiliter punctulato; hemielytris sat crebre punctulatis. ♀. Long. 7, lat. hemielytrorum 3 mm.

Capsus dimidiatus Guér.-Mén., l. c., p. 402.

Cuba, 2 sp.

Heterocoris Guér.-Mén.

Corpus sat late ovale, metallicum, pronoto et scutello impresso-punctatis, hemielytris laevibus; capite basi pronoti sat multo angustiore, a supero viso valde transverso, pronoto fere triplo brevior, vertice lato, aequali; capite ab antico viso latitudini interoculari verticis oculique unici aequae longo, a latere viso brevissimo, fronte perpendiculari, planiuscula, basi medio leviter impresso, clypeo verticali, basi a fronte impressione profunda discreto, ipsa basi fere in medio capitis a latere visi posita, gula haud distinguenda; oculis apici pronoti contiguus, modice prominentibus, medium genarum vix attingentibus, orbita interiore parallelis; antennis ad apicem oculorum interne insertis, corpore dimidio (cum hemielytris) vix longioribus, sat gracilibus, articulo primo latitudini interoculari verticis aequae longo, secundo primo parum magis quam dimidio longiore et apice huic aequae crasso; pronoto latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ brevior, lateribus subrectis, apice quam basi circiter dimidio angustiore, limbo apicali punctato, stricturam haud formante, callis transversis, medium pronoti haud attingentibus, medio sulco disjunctis et marginibus omnibus bene impressis, disco pone eos convexo, limbo basali basin scutelli obtegente; hemielytris planiusculis, lateribus arcuato-dilatatis, embolio incrassato-reflexo, cuneo subhorizontali, latitudini basali aequae longo, incisura exteriori fracturae profunda; membrana areola unica instructa, hac apice interiore arcuato-rotundata; pedibus mediocribus, femoribus elongatis, tibiis muticis, tarsis articulo ultimo apicem versus fortiter incrassato.

Genus corpore metallico, pronoto limbo apicali haud stricturam formante punctato structuraque areolae membranae optime distinctum.

Heterocoris dilatatus Guér.-Mén.

Obscure viridi-aeneus, superne dense breviter fusco-pilosus, rostro, antennis pedibusque cum coxis pallide flaventibus, membrana hyalina, venis nigro-fuscis, area obscure

fusca, virescenti-nitente; vertice oculo fere triplo latiore; antennis articulo secundo latitudini capitis aequae longo; pronoto scutelloque crebre sat fortiter impresso-punctatis. ♀. Long. 5, lat. hemielytrorum $2\frac{2}{3}$ mm.

Heterocoris dilatata Guér.-Mén., l. c., p. 403.

Cuba, 1 sp.

Pycnoderes Guér.-Mén.

Vide: Reuter, Caps. in Brasil. coll., in Ann. k. k. naturh. Hofm. Wien, 1907. p. 41.

Pycnoderes quadrimaculatus Guér.-Mén.

Oblongo-ovalis, niger, sat nitidus; capite basi pronoti fere dimidio angustiore, ab antico viso latitudini posticae longitudine subaequali, sordide testaceo, vertice medio vittisque tribus frontis nigris; pronoto latitudini basali longitudine subaequali, crebre fortiter punctato, disco postico sat alte inflato-convexo, medio et lateribus ante angulos obtuse et late impresso, gibbis intermediis valde obtuse rotundatis, margine eorum postico a latere viso late arcuato et illo antico dimidio brevior, margine pronoti basali medio emarginato; scutello bene distincto, punctato; hemielytris nigris, opacis, embolio macula anteriore majore medium haud attingente aliaque minore ante-apicali, cuneo membranaeque albis, margine basali anguloque interiore cunei nec non angulo interiore membranae nigricantibus; rostro antennis pedibusque albis, articulo secundo antennarum latitudini verticis oculique unici fere aequae longo, ultimis fuscis, femoribus posticis ante apicem late nigris. Long. $3\frac{1}{5}$, lat. hemielytrorum $1\frac{1}{2}$ mm.

Pycnoderes quadrimaculatus Guér.-Mén., l. c., p. 404; Reut., Bemerk. nearkt. Caps., Act. Soc. Scient. Fenn., XXXVI, Nr. 9, 1908, p. 2. Typus generis.

Cuba.

P. incurvo Dist. simillimus, gibbis pronoti multo debilioribus et obtusioribus divergens; a *P. dilatato* Reut. corpore distincte minore et angustiore, margine costali embolii levius rotundato, embolio ante apicem macula majore quadrata signato femoribusque posticis ipso apice albis distinguendus.