

Typen der ornithologischen Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Von

August von Pelzeln und Dr. Ludwig von Lorenz.

IV. Theil (Schluss).

Ordo: Scansores.

Familia: *Ramphastidae.*

Rhamphastos osculans.

Ramphastos osculans Gould, P. Z. S. (1835) 156 und Monogr. Rhamphastidae (1835), t. 5. — Gray, Handlist, spec. 7934.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Ribeirao, Borba) gesammelt; Originalexemplare.

Pteroglossus pluricinctus.

Pteroglossus pluricinctus Gould, P. Z. S. (1835) 157 und Monogr. Rhamphastidae (1835), t. 15. — Sturm, Gould's Monogr. Rhamphastidae II (1841), t. 3. — Gray, Handlist, spec. 7940.

Zwei Exemplare von Natterer in Brasilien (Barra do Rio negro) gesammelt; sind die Originale zu Gould's Abbildung und Beschreibung.

Pteroglossus Sturmii.

Pteroglossus Sturmii Natterer, Sturm, Gould's Monogr. Rhamphastidae III (1842), t. 7. — Gray, Handlist, spec. 7953.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; Original-exemplar.

Selenidera Gouldii.

Pteroglossus Gouldii Natterer, P. Z. S. (1837) 44. — Sturm, Gould's Monogr. Rhamphastidae I (1841), t. 8.

Selenidera Gouldii Natterer, Gray, Handlist, spec. 7958.

Zwei Männchen und drei Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba, Pará) gesammelt; Originalexemplare.

Selenidera Nattereri.

Pteroglossus Nattereri Gould, P. Z. S. (1835) 157 und Monogr. Rhamphastidae I (1833), t. 25. *Selenidera Nattereri* Gould, Gray, Handlist, spec. 7961.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien am Rio negro gesammelt; Original-exemplare.

Familia: *Psittacidae*.*Platycercus ulieteanus*.

Society Parrot Latham, Gen. Synops. I (1781), 250.

Psittacus ulieteanus Gmelin, Syst. Nat. I (1789), 328. — Latham, Ind. Orn. I (1790) 103.

Cyanorhamphus ulietanus Gmelin, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 41.

Ein Exemplar von Ulietea, 1806 aus dem Museum Leverianum acquirirt; ist das Original zu Latham's Beschreibung.

Platycercus novae-zeelandiae.

Psittacus novae-zeelandiae Sparrmann (1787), Mus. Carls., t. 28.

Psittacus pacificus Gmelin, Syst. Nat. I (1789), 329. — Latham, Ind. Orn. I (1790), 104.

Cyanorhamphus novae-zeelandiae Sparrmann, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 42.

Ein Exemplar, 1806 aus dem Leverianischen Museum bezogen; ist das Original von *Platycercus pacificus*.

Platycercus tabuensis.

Tabuan Parrot Latham, Gen. Synops. I (1781), 214, t. 7.

Psittacus tabuensis Gmelin, Syst. Nat. I (1789), 317.

Psittacus atropurpureus Shaw, Lev. Mus. (1792) 142.

Platycercus tabuensis Gmelin, Reichenow, Conspect. Psittac.; Journ. f. Orn. (1881) 131.

Ein Exemplar von Tongo-Tabu, 1806 aus dem Museum Leverianum bezogen; ist das Original zu Latham's und Shaw's Beschreibungen und Abbildungen.

Sittace hyacinthina.

Psittacus hyacinthinus Latham, Ind. Orn. (1790) 84.

Psittacus angustus Shaw, Lev. Mus. II (1792), 57.

Sittace hyacinthina Latham, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 265.

Ein Exemplar aus dem Leverianischen Museum 1806 acquirirt; ist das Original von Latham's und Shaw's Beschreibung und des Letzteren Abbildung.

Conurus holochlorus.

Conurus holochlorus Sclater, Ann. Mag. Nat. Hist. (1859) 224. — Sclater et Salvin, Ibis (1860) 44. — Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 276.

Ein authentisches Exemplar aus Guatemala (Dueñas), 1866 durch Salvin erhalten.

Conurus ocularis.

Conurus ocularis Sclater et Salvin, P. Z. S. (1864) 367. — Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 282.

Zwei authentische Exemplare von Arcé in Veragua gesammelt, 1869 und 1871 durch Salvin erhalten.

Conurus Souancei.

Microsittace Souancei Verreaux, Rev. Mag. Zool. (1858) 437.

Pyrrhura Souancei Verreaux, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 288.

Ein Männchen von Rio napo, 1864 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar.

Conurus leucotis.

Psittacus leucotis Lichtenstein, Kuhl, Consp. (1820) 21.

Pyrrhura leucotis Lichtenstein, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 338.

Ein authentisches Exemplar, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Conurus Molinae.

Microsittace Molinae Massena et Souancé, Rev. Mag. Zool. (1854) 73.

Conurus phoenicurus Natterer Mnsrpt., Schlegel, Mus. Pays-bas. Psittac. (1864) 26.

Pyrrhura Molinae Massena et Souancé, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 339.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; sind die Originale zu dessen durch Schlegel publicirtem Synonym.

Conurus rhodogaster.

Conurus rhodogaster Natterer Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1864) 298, t. 24.

Pyrrhura rhodogaster Natterer, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 340.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien (Borba) gesammelt; typische Exemplare.

Brotogerys chrysosema.

Brotogerys chrysosema Natterer Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1864) 298.

Brotogerys chrysoptera subsp. *chrysosema* Natterer, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 344.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio Madeira) gesammelt; typische Exemplare.

Coryllis stigmata.

Psittacus stigmatus Müller et Schlegel, Verh. Land- en Volkenk. (1841) 108.

Coryllis stigmata Müller et Schlegel, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 231.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Celebes von Boué und Rosenberg gesammelt, 1865 aus dem Leydener Museum erhalten; wohl als authentisch zu betrachten.

Trichoglossus pygmaeus.

Pygmy Paraket Latham, Gen. Synops. I (1781), 256.

Psittacus pygmaeus Gmelin, Syst. Nat. I (1788), 330. — Latham, Ind. Orn. I (1790), 106.

Trichoglossus pygmaeus Gmelin, Pelzeln, Ibis (1873) 31. — Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 150.

Ein Exemplar von einer der Südseeinseln, 1806 aus dem Museum Leverianum acquirirt; Type und einziges bekanntes Exemplar.

Trichoglossus Massena.

Trichoglossus massena Bonaparte, Rev. Zool. (1854) 157. — Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 157.

Trichoglossus Deplanchei Verreaux et des Murs, Rev. Zool. (1860) 388.

Ein Männchen aus Neu-Caledonien, 1864 von Verreaux acquirirt; Original zu *Trichoglossus Deplanchei*.

Eclectus Riedeli.

Eclectus Riedeli Meyer A. B., P. Z. S. (1881) 917. — Sclater, Ibid. (1883) 195, t. 26.

Ein typisches Exemplar von Timorlaut, 1884 von Herrn Resident Riedel durch Meyer's Vermittlung erhalten.

Nestor norfolcensis.

Nestor norfolcensis Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLI (1860), 322, Fig. 1 (Kopf).

Die Art beruht auf der von dem berühmten Thier- und Pflanzenmaler Ferdinand Bauer, welcher die Reise von Capitän Flinders zu Beginn dieses Jahrhunderts mitmachte, auf der Insel Norfolk 1805 angefertigten Zeichnung. Nach derselben und der Bauer'schen Farbentabelle wurde von Herrn Th. Zimmermann eine schöne im Hofmuseum befindliche Abbildung angefertigt. Unter den 1827

aus dem Nachlasse Bauer's acquirirten Vögeln befand sich nach dem Kataloge der Sammlung ein als *Psittacus Nestor* var. bezeichnetes Exemplar von der Insel Norfolk; dasselbe ist jedoch nicht mehr vorhanden.

Nestor meridionalis.

Southern Brown Parrot, Latham, Gen. Synops. I (1781), 264.

Psittacus meridionalis Gmelin, Syst. Nat. I (1788), 333.

Nestor meridionalis Gmelin, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 20.

Ein Exemplar, 1806 aus dem Museum Leverianum acquirirt; ist das Original von Latham's und Shaw's Beschreibungen.

Geoffroyus timorlaoensis.

Geoffroyus timorlaoensis Meyer A. B., Isis (Dresden 1884), Heft I.

Zwei authentische Exemplare von Timorlaut, 1884 von Herrn Resident Riedel durch Meyer's Vermittlung erhalten.

Pionias haematotis.

Pionus haematotis Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 300 et Ibis (1860) 401, t. 3.

Eucinetus haematotis Sclater et Salvin, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 355.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1868 von Salvin erhalten; authentische Exemplare.

Chrysotis Guatemalae.

Chrysotis guatemalae Hartlaub, Mus. Brem. — Sclater et Salvin, Ibis (1860) 44.

Androglossa guatemalae Hartlaub, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 367.

Drei Exemplare durch Salvin (1866) und Sclater (1871) erhalten; können als authentische betrachtet werden.

Chrysotis Nattereri.

Chrysotis Nattereri Finsch, Journ. f. Orn. (1864) 411.

Androglossa Nattereri Finsch, Reichenow, Journ. f. Orn. (1864) 411.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien (am Rio Mamoré) gesammelt; Originalexemplar.

Psittacula cyanicollis.

Psittacus cyanicollis Müller, Verh. Land- und Volkenk. (1839—1844) 108.

Rhodocephalus cyanicollis Müller, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 248.

Drei Männchen und ein Weibchen, 1863 aus dem Leydener Museum durch Schlegel erhalten; sind als authentisch zu betrachten, da die Art auf Exemplare des genannten Museums begründet wurde. Drei andere Exemplare aus Amboina als *Psittacula Geoffroy* (Vieill) 1823 vom Leydener Museum erhalten.

Cacatua Goffini.

Lophochroa Goffini Finsch, Nederl. Tijdschr. Dierk. Berigt (1863) XXIII.

Plissolophus sanguineus subsp. *Goffini* Finsch, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 26.

Ein authentisches Exemplar, durch Finsch' Handschrift als solches bezeichnet, 1870 von Sclater erhalten.

Calyptorhynchus Solandri.

Psittacus Solandri Temminck, Trans. Linn. Soc. XIII (1819), 113.

Calyptorhynchus Solandri Temminck, Reichenow, Journ. f. Orn. (1881) 33.

Ein junges authentisches Exemplar, 1822 durch Temminck erhalten.

Familia: *Capitonidae*.*Pogonorhynchus diadematus*.*Laemodon diadematus* Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 299.*Pogonorhynchus diadematus* Heuglin, Gray, Handlist, spec. 8429.

Ein Männchen aus dem Lande der Kidj-Neger, 1856 von Heuglin erhalten; typisches Exemplar.

Tricholaema hirsuta.*Pogonias hirsutus* Swainson, Zool. Ill. II (1821—1822), t. 72.*Tricholaema hirsutus* Swainson, Gray, Handlist, spec. 8431.*Laimodon flavipunctatus* Verreaux J. et Ed. Rev. Zool. (1855) 555, t. 14.Ein authentisches Exemplar für das Synonym *Laimodon flavipunctatus*, 1857 von Verreaux acquirirt.*Megalaima chrysopogon*.*Bucco chrysopogon* Temminck, Pl. Col., t. 285.*Megalaima chrysopogon* Temminck, Gray, Handlist, spec. 8435.

Ein authentisches Exemplar aus Sumatra (Padang), 1833 vom Leydener Museum erhalten.

Megalaima mystacophanos.*Bucco mystacophanos* Temminck, Pl. Col., t. 315.*Megalaima mystacophanos* Temminck, Gray, Handlist, spec. 8436.

Ein authentisches Exemplar aus Borneo, 1833 vom Leydener Museum acquirirt.

Megalaima armillaris.*Bucco armillaris* Temminck, Pl. Col., t. 80, Fig. 1.*Megalaima armillaris* Temminck, Gray, Handlist, spec. 8438.

Ein authentisches Exemplar, 1822 vom Leydener Museum acquirirt.

Megalaima Duvaucelii.*Megalaima Duvaucelii* Lesson, Gray, Handlist, spec. 8450.*Bucco frontalis* Temminck, Pl. Col., t. 536, Fig. 1.Ein authentisches Exemplar von *Bucco frontalis* aus Borneo, 1833 durch das Leydener Museum acquirirt.*Megalaima corvina*.*Bucco corvinus* Reinwardt, Bataviasche courant (Februar 1820). — Temminck, Pl. Col. (1833), t. 522.*Megalaima corvina* Reinwardt, Gray, Handlist, spec. 8454.Ein authentisches (?) Exemplar aus Java, 1821 vom Leydener Museum als *Bucco grandis* erhalten.*Megalaima Duchailloi*.*Megalaima Duchailloi* Cassin, Gray, Handlist, spec. 8464.*Barbatula formosa* Verreaux J. et Ed., Rev. de Zool. (1755) 218, t. 6.Ein Männchen von Gaboon, 1857 durch Verreaux als *Barbatula formosa* erhalten; authentisches Exemplar für dieses Synonym.*Xylobucco scolopaceus*.*Xylobucco scolopaceus* Temminck (Mus. Lugd.), Bonaparte, Consp. Gen. Av. I (1850), 141. —

Gray, Handlist, spec. 8473.

Ein authentisches Exemplar von der Goldküste, 1862 aus dem Leydener Museum erhalten.

Gymnobucco Bonapartei.

Gymnobucco Bonapartei Verreaux, Hartlaub, Journ. f. Orn. (1854) 410. — Verreaux J. et Ed., Ibid. (1855) 102. — Gray, Handlist, spec. 8478.

Ein authentisches Exemplar, 1857 von Verreaux acquirirt.

Trachyphonus margaritatus.

Bucco margaritatus Mus. Frankf. und Rüppell, Atlas (1826) 30, t. 20.

Trachyphonus margaritatus Rüppell, Gray, Handlist, spec. 8483.

Zwei authentische Exemplare aus Abyssinien, 1831 vom Frankfurter Museum erhalten.

Trachyphonus purpuratus.

Trachyphonus purpuratus Verreaux J. et Ed., Rev. de Zool. (1851) 260. — Gray, Handlist, spec. 8484.

Ein Männchen aus Gaboon, 1857 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar.

Trachyphonus Goffini.

Capito Goffini Schlegel, Mus. Pays-bas I Buccones (1862) 72.

Trachyphonus Goffini Schlegel, Gray, Handlist, spec. 8485.

Ein authentisches Exemplar von der Goldküste, 1863 aus dem Leydener Museum erhalten.

Psilopogon pyrolophus.

Bucco pyrolophus Temminck, Pl. Col., t. 597.

Psilopogon pyrolophus Temminck, Gray, Handlist, spec. 8487.

Ein authentisches Exemplar aus Sumatra, 1841 vom Leydener Museum erhalten.

Familia: *Picidae.*

Picumnus Borbae.

Picumnus Borbae Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 241, 334. — Gray, Handlist, spec. 8512.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien am unteren Madeira gesammelt; Originalexemplare.

Picumnus aurifrons.

Picumnus aurifrons Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 241, 334. — Gray, Handlist, spec. 8519.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Matogrossa und Madeira) gesammelt; Originale.

Picumnus leucogaster.

Picumnus leucogaster Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 241, 335. — Gray, Handlist, spec. 8524.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (Rio branco und Rio Cauamé) gesammelt; Originalexemplare.

Picumnus fuscus.

Picumnus fuscus Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 242, 335. — Gray, Handlist, spec. 8527.

Ein Weibchen von Natterer in West-Brasilien (Rio Guaporé) gesammelt; Original.

Picus assimilis.

Picus assimilis Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. I (1861), 69, t. 19, Fig. 1, 2. — Gray, Handlist, spec. 8546.

Ein Männchen aus Kaschmir, 1839 von Baron Hügel acquirirt; Original.

Picus kisuki.

Picus kisuki Temminck und Schlegel, Faun. Jap. (1849) 74, t. 37.

Picus kisuki Siebold, Gray, Handlist, spec. 8585.

Ein Weibchen, 1841 vom Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Campephilus validus.

Picus validus Temminck, Pl. Col. 378 und 402.

Campephilus validus Temminck, Gray, Handlist, spec. 8631.

Ein Männchen und ein Junges, 1822 und 1823 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare.

Dryocopus galeatus.

Picus galeatus Natterer Mnsrpt., Temminck, Pl. Col. 171.

Dryocopus galeatus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8640.

Drei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

Dendropicus cardinalis.

Picus fulviscapus Illiger, Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 11.

Dendropicus cardinalis Gmelin, Gray, Handlist, spec. 8649.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1834 durch Lichtenstein erhalten; authentische Exemplare.

Hemicercus concretus.

Picus concretus Temminck, Pl. Col., t. 90, Fig. 1, 2.

Hemicercus concretus Temminck, Gray, Handlist, spec. 8667.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1822 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare.

Gecinus avokera.

Picus avokera Temminck, Pl. Col., t. 585.

Gecinus avokera Temminck, Gray, Handlist, spec. 8672.

Ein Männchen, 1841 vom Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Gecinus vittatus.

Gecinus vittatus Vieillot, Gray, Handlist, spec. 8683.

Picus dimidiatus Temminck, Pl. Col., Beschreibung nach *Picus leucogaster*, t. 501.

Drei authentische Exemplare von *Picus dimidiatus*, 1821 und 1822 durch Temminck erhalten.

Gecinus mentalis.

Picus mentalis Temminck, Pl. Col., t. 384.

Gecinus mentalis Temminck, Gray, Handlist, spec. 8686.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1823 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare.

Campethera notata.

Picus notatus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823).

Campethera notata Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 8697.

Ein Männchen und ein Weibchen aus dem Caffernlande, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Celeus lugubris.

Picus lugubris Natterer in Mus. Vind., Malherbe, Pic. II (1862), 19, t. 54.

Celeus lugubris Natterer, Gray, Handlist, spec. 8717.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; typische Exemplare. Malherbe erwähnt übrigens, dass er auch ein Individuum dieser Art aus dem Pariser Museum untersucht hat.

Celeus grammicus.

Picus grammicus Natterer, Malherbe, Pic. II (1862), 18, t. 51.

Celeus grammicus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8725.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt.

Celeus undatus.

Picus multifasciatus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 16, t. 50, Fig. 4, 5.

Celeus undatus Gmelin, Gray, Handlist, spec. 8727.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; typische Exemplare von *Picus multifasciatus*.

Brachypternus bengalensis.

Picus bengalensis Linné, Syst. Nat. X, 113, ♀.

Picus aurantius Linné, Syst. Nat. XII, 174, ♂.

Picus bengalensis var. *thibetanus* Natterer, Malherbe, Pic. II (1862), 93.

Brachypternus aurantius Linné, Gray, Handlist, spec. 8744.

Ein Weibchen durch Natterer, 1839 in London acquirirt; Original von

Picus thibetanus.

Chloronerpes capistratus.

Chloropicus capistratus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 140, t. 83.

Crangasus capistratus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8782.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; typische Exemplare.

Chloronerpes leucolaemus.

Chloropicus leucolaemus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 145.

Crangasus leucolaemus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8784.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; typische Exemplare.

Campias murinus.

Mesopicus murinus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 62, t. 58.

Dendrobates murinus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8801.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplare.

Campias olivinus.

Mesopicus olivinus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 65, t. 59.

Eleopicus olivinus Natterer, Gray, Handlist, spec. 8804.

Zwei Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Melanerpes formicivorus.

Melanerpes formicivorus Swainson, Gray, Handlist, spec. 8816.

Picus melanopogon Lichtenstein Mnsrpt., Temminck, Pl. Col., t. 451.

Ein authentisches Exemplar von *Picus melanopogon*, 1826 aus dem Berliner Museum erhalten.

Melanerpes chrysauchen.

Melanerpes chrysauchen Salvin, P. Z. S. (1870) 213. — Gray, Handlist, spec. 8823 a.

Ein Männchen und ein Weibchen von Arcé in Veragua gesammelt, 1871 durch Salvin erhalten; authentische Exemplare.

Melanerpes pulcher.

Melanerpes pulcher Sclater, P. Z. S. (1870) 328. — Gray, Handlist, spec. 8823 b.

Ein Weibchen aus Bogota, 1871 von Sclater erhalten; authentisches Exemplar.

Melanerpes melanocephalus.

Melanerpes melanocephalus Natterer Mnsrpt., Malherbe, Pic. II (1862), 195.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; typisches Exemplar.

Colaptes Stolzmanni.

Colaptes Stolzmanni Taczanowski, P. Z. S. (1880) 209.

Colaptes rupicola Sclater et Salvin, P. Z. S. (1878), 140.

Ein Weibchen aus Peru, 1880 durch Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

Familia: *Cuculidae*.

Indicator Sparmanni.

Indicator Sparmanni Stephens, Gray, Handlist, spec. 8853.

Indicator albirostris Temminck, Pl. Col., 367.

Ein authentisches Exemplar, 1833 durch Temminck erhalten.

Indicator minor.

Indicator minor Stephens, Gray, Handlist, spec. 8856.

Cuculus apivorus Krebs im Mus. Berol. und Mus. Hein., Cabanis (1863) 5.

Ein authentisches Exemplar von *Cuculus apivorus*, 1826 aus dem Berliner Museum erhalten.

Indicator barianus.

Indicator barianus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 300. — Gray, Handlist, spec. 8857.

Ein typisches Exemplar aus dem Lande der Bari-Neger, 1856 durch Heuglin erhalten.

Coou cristata.

Coou cristata Linné, Gray, Handlist, spec. 8886.

Coou cristata var. *pyropyga* Grandidier, Rev. de Zool. (1867) 86.

Ein Männchen von Madagascar, 1873 durch Grandidier erhalten; authentisches Exemplar von der angeführten Varietät.

Coou Coquereli.

Coou Coquereli Grandidier, Rev. de Zool. (1867) 86. — Gray, Handlist, spec. 8891.

Ein Weibchen von Madagascar, 1873 durch Grandidier erhalten; authentisches Exemplar.

Geococcyx mexicanus.

Geococcyx mexicanus Gmelin, Gray, Handlist, spec. 8900.

Diplopterus viaticus Lichtenstein, Boie, Isis (1831) 541 (keine Beschreibung).

Ein authentisches Exemplar von *Diplopterus viaticus*, 1826 aus dem Berliner Museum erhalten.

Saurothera Vieilloti.

Saurothera Vieilloti Bonaparte, Gray, Handlist, spec. 8898.

Saurothera Vieilloti var. *rufescens* Bryant, Proc. Bost. Soc. N. H. (1866), Jan.

Ein authentisches Exemplar von Bryant's Varietät aus Porto-Rico, 1870 durch die Smithsonian Institution erhalten.

Drymococcyx pavoninus.

Drymococcyx pavoninus Natterer Msript., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 270.

Drymococcyx phasianellus Burmeister (nec Spix), Thiere Bras. II (1856), 260. — Gray, Handlist, spec. 8909.

Ein Männchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplar.

Cuculus gularis.

Cuculus ruficollis Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856) 300.

Cuculus gularis Stephens, Heuglin, Orn. Nordostafrika I (1869—1874), 781. — Gray, Handlist, spec. 8986.

Ein typisches Exemplar des *Cuculus ruficollis* aus dem Bari-Negerlande, 1856 von Heuglin erhalten.

Cuculus prionurus.

Cuculus prionurus Illiger, Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 9.

Cuculus flabelliformis Latham, Gray, Handlist, spec. 9020.

Ein authentisches (?) Exemplar, 1823 aus dem Berliner Museum erhalten.

Cuculus tymbonomus.

Cuculus tymbonomus Müller S., Verh. nat. Gesellsch. overz. Bezt. 177. — Gray, Handlist, spec. 9024.

Ein Männchen von Ternate, 1862 durch Schlegel aus dem Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Eudynamys melanorhyncha.

Eudynamys melanorhyncha Müller S., Verh. nat. Gesellsch. nederl. Bezt. 176. — Gray, Handlist, spec. 9075.

Ein Männchen und ein Weibchen von Celebes, 1865 durch Schlegel aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

Ordo: Columbæ.

Familia: *Columbidae.**Treron psittacea.*

Columba psittacea Temminck, Pigeons (1811), Colombars, 28, t. 4.

Treron psittacea Temminck, Gray, Handlist, spec. 9084.

Ein Männchen von Timor, 1833 aus dem Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Treron olax.

Columba olax Temminck, Pl. Col., t. 241.

Osmotreron olax Temminck, Gray, Handlist, spec. 9095.

Ein Männchen aus Sumatra, 1833 vom Leydener Museum acquirirt; authentisch.

Treron Capellei.

Columba Capellei Temminck, Pl. Col., t. 143.

Butreron Capellei Temminck, Gray, Handlist, spec. 9102.

Ein Männchen aus Java, 1823 vom Leydener Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Treron oxyura.

Columba oxyura Reinwardt, Temminck, Pl. Col., t. 240.

Sphenocercus oxyurus Reinwardt, Gray, Handlist, spec. 9107.

Zwei authentische Exemplare aus Java, 1830 vom Leydener Museum acquirirt.

Ptilonopus roseicollis.

Lamprotreron roseicollis Wagler, Gray, Handlist, spec. 9160.

Columba porphyrea Reinwardt, Temminck, Pl. Col., t. 106.

Ein authentisches Exemplar, 1830 durch Temminck erhalten.

Ptilonopus cinctus.

Columba cincta Temminck, Pigeons (1811), Colombes, 58, t. 23.

Leucotreron cinctus Temminck, Gray, Handlist, spec. 9161.

Ein authentisches Exemplar, 1833 vom Leydener Museum erhalten.

Ptilonopus Sganziini.

Fuvingus Sganziini Verreaux, Mnsrpt., des Murs, Encycl. d. Hist. Nat. Ois. VI, 32. — Gray, Handlist, spec. 9166.

Ein authentisches Exemplar von Madagascar, 1868 durch Verreaux erhalten.

Ptilonopus Bernsteinii.

Ptilopus Bernsteinii Schlegel, Nederl. Tijdschr. Dierk. (1863) I, 59, t. 3, Fig. 1.

Megaloprepia Bernsteinii Schlegel, Gray, Handlist, spec. 9220.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1863 vom Leydener Museum acquirirt; authentische Exemplare.

Ptilonopus flavovirescens.

Ptilopus flavovirescens Meyer A. B., Sitzungsber. Ges. Isis (1884).

Drei authentische Exemplare von Timorlant, 1884 durch Meyer's Vermittlung von Resident Riedel erhalten.

Carpophaga pacifica.

Columba pacifica Gmelin, Syst. Nat. II (1788), 773.

Carpophaga pacifica Gmelin, Salvadori, Orn. Papuas III (1882), 72. — Gray, Handlist, spec. 9178.

Carpophaga Frauenfeldii Pelzeln, Noyarareise, Vögel (1865) 106.

Typisches Exemplar von Pelzeln's Synonym.

Carpophaga bicolor.

Myristicivora bicolor Scopoli, Gray, Handlist, spec. 9187.

Columba littoralis Temminck, Pigeons (1811), Colombes, 15, t. 7.

Ein authentisches Exemplar zu dem Synonym *Columba littoralis*, 1823 durch Temminck erhalten.

Carpophaga luctuosa.

Columba luctuosa Reinwardt, Temminck, Pl. Col., t. 247.

Myristicivora luctuosa Temminck, Gray, Handlist, spec. 9188.

Ein authentisches Exemplar, 1823 durch Temminck erhalten.

Carpophaga badia.

Ducula badia Raffles, Gray, Handlist, spec. 9192.

Columba capistrata Temminck, Pl. Col. 165.

Ein Junges aus Java, 1823 durch Temminck erhalten; authentisch für das citirte Synonym.

Carpophaga lacernulata.

Columba lacernulata Temminck, Pl. Col., t. 164.

Ducula lacernulata Temminck, Gray, Handlist, spec. 9193.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1823 durch Temminck erhalten.

Columba maculosa.

Columba maculosa Temminck, Fig. et Gallin. I (1813), 113. — Gray, Handlist, spec. 9267.

Columba maculipennis Lichtenstein, Mus. Berol.

Ein Männchen aus Monte Video, 1824 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar für Lichtenstein's Benennung.

Columba plumbea.

Chloroenas plumbea Vieillot, Gray, Handlist, spec. 9275.

Columba infuscata Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 66.

Ein Männchen aus Bahia, 1824 vom Berliner Museum acquirirt; authentisch für Lichtenstein's Synonym.

Columba Bollii.

Columba Bollii Godman, Ibis (1872) 217.

Columba bouvyi Bonaparte (?), Bolle, Journ. f. Orn. (1857) 329.

Ein Männchen von Teneriffa, durch Godman gesammelt, 1878 von Salvin erhalten; authentisches Exemplar.

Macropygia ruficeps.

Columba ruficeps Temminck, Pl. Col., t. 561.

Macropygia ruficeps Temminck, Gray, Handlist, spec. 9297.

Ein Männchen und ein Junges aus Java, 1830 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar.

Turtur rupicolus.

Turtur rupicolus Pallas, Gray, Handlist, spec. 9313.

Columba gelastis Temminck, Pl. Col., t. 550.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Japan, 1841 vom Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare von *Columba gelastis*.

Peristera cyanopsis.

Peristera cyanopsis Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 277, 336. — Gray, Handlist, spec. 9367.

Zwei Männchen und ein Weibchen durch Natterer aus Brasilien erhalten; Originale..

Leptoptila ochroptera.

Leptoptila ochroptera Natterer, Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 278. — Gray, Handlist, spec. 9389.

Ein Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Leptoptila Reichenbachii.

Leptoptila Reichenbachii Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 279, 337. — Gray, Handlist, spec. 9390.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Original-Exemplare.

Geotrygon chiriquensis.

Geotrygon chiriquensis Sclater, P. Z. S. (1856) 143. — Sclater et Salvin, Exot. Orn. (1869) 123. — Gray, Handlist, spec. 9395.

Ein authentisches Exemplar aus Veragua, 1869 von Salvin erhalten.

Caloenas nicobarica.

Caloenas nicobarica L. var. *pelewensis* Finsch, Journ. Mus. Godeffr. VIII (1875), 27 (Separ.).

Ein authentisches Exemplar der von Finsch unterschiedenen Varietät, auf einer der Pelew-Inseln durch Kubary gesammelt, 1876 aus dem Museum Godeffroy erhalten.

Leucosarcia picata.

Columba melanoleuca Latham, Ind. Orn. II, Suppl. (1801) LIX, 1.

Columba picata Latham, l. c., LIX, 2.

Leucosarcia picata Latham, Gray, Handlist, spec. 9431. — Pelzeln, Ibis (1873) 35.

Ein Exemplar von der Insel Norfolk, 1806 durch Fichtel als *Columba melanoleuca* erhalten, ist möglicher Weise eines von Latham's Originalen.

Goura coronata.

Goura coronata var. *minor* Schlegel, Nederl. Tijdschr. Dierk. III (1866), 192.

Ein Weibchen von Waigeou, 1865 aus dem Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar von Schlegel's Varietät.

Ordo: Gallinae.

Familia: Pteroclididae.

Pterocles fasciatus.

Pterocles fasciatus Scopoli, Gray, Handlist, spec. 9458.

Pterocles quadricinctus Temminck, Fig. et Gall. III (1815), 252.

Ein Männchen vom Senegal, 1821 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar von *Pterocles quadricinctus*.

Pterocles exustus.

Pterocles exustus Temminck, Pl. Col., t. 354, 360. — Gray, Handlist, spec. 9469.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1821 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare.

Pterocles senegallus.

Pterocles senegallus Linné, Gray, Handlist, spec. 9470.

Pterocles guttatus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 64.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Nubien, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentische Exemplare von *Pterocles guttatus*.

Familia: Cracidae.

Penelope ochrogaster.

Penelope ochrogaster Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 282, 337. — Gray, Handlist, spec. 9487.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Penelope kujubi.

Penelope Cujubi Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXXI (1858), 328; Orn. Bras. (1871) 284. — Gray, Handlist, spec. 9491.

Ein Männchen durch Natterer aus Brasilien erhalten; Original.

Penelope Grayi.

Penelope Grayi Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 284. — Gray, Handlist, spec. 9493.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. III, Heft 1, 1888.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Chamaepetes unicolor.

Chamaepetes unicolor Salvin, P. Z. S. (1867) 159. — Gray, Handlist, spec. 9521.

Ein authentisches Exemplar von Costa Rica, 1871 durch Salvin erhalten.

Crax Pinima.

Crax Pinima Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 287, 341. — Sclater, Trans. Zool. Soc. IX (1873), 281. — Gray, Handlist, spec. 9526.

Ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originalexemplar.

Crax Daubentoni.

Crax daubentoni Gray, List of Gall. (1867) 15. — Sclater, Trans. Zool. Soc. IX (1873), 276.

Crax Mikani ♂ Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 287, 343. — (Gray, Handlist, spec. 9528.)

Ein typisches Exemplar von *Crax Mikani* ♂ durch Mikani lebend nach Wien gebracht.

Crax Alberti.

Crax alberti Fraser, P. Z. S. (1850) 246, t. 27. — Sclater, Trans. Zool. Soc. IX (1873) 280.

Crax Mikani ♀ Pelzeln, Orn. Bras. (1871) 287, 343.

Ein typisches Exemplar von *Crax Mikani* ♀ Pelzeln.

Familia: *Megapodidae.*

Megapodius Duperreyi.

Megapodius Duperreyi Lesson, Salvadori, Orn. Papuas. III (1882), 219, 220.

Megapodius rubripes Temminck, Pl. Col., t. 411.

Zwei authentische Exemplare von *Megapodius rubripes* aus dem Leydener Museum 1823 und 1833 erhalten.

Familia: *Phasianidae.*

Phasianus Soemmeringii.

Phasianus Soemmeringii Temminck, Pl. Col., t. 487. — Gray, Handlist, spec. 9584.

Ein Männchen und ein Weibchen aus Japan, vom Leydener Museum 1833 acquirirt; authentische Exemplare.

Phasianus chrysomelas.

Phasianus chrysomelas Severtzow, Journ. f. Orn. (1875) 224, 225.

Ein Männchen von Severtzow am Amur Daria erbeutet, 1883 durch Menzbier acquirirt; authentisches Exemplar.

Gallus bankiva.

Gallus bankiva Temminck, Fig. et Gall. II (1813), 87.

Zwei Männchen aus Java, 1823 und 1833 durch Temminck erhalten; authentische Exemplare. Ob der continental-indische *Gallus ferrugineus* Gmel. nur als Rasse oder aber als Art sich von *Gallus bankiva* unterscheidet, mag hier dahingestellt sein.

Gallus varius.

Gallus varius Shaw, Gray, Handlist, spec. 9620.

Gallus furcatus Temminck, Pl. Col., t. 483.

Ein Männchen, 1830 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar.

Numida ptilorhyncha.

Numida ptilorhyncha Lichtenstein, Rüppell, Syst. Uebers. Nordostafrika (1845) 102, 105, t. 39. — Gray, Handlist, spec. 9632.

Ein authentisches Exemplar, 1826 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Tetraonidae.**Caloperdix oculea.*

Perdix oculea Temminck, Fig. et Gall. III (1815), 408.

Caloperdix oculea Gray, Handlist, spec. 9728.

Ein Männchen aus Java, 1823 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar.

Odontophorus leucolaemus.

Odontophorus leucolaemus Salvin, P. Z. S. (1867) 161. — Gray, Handlist, spec. 9763.

Ein authentisches Exemplar von Arcé in Veragua gesammelt, 1869 von Salvin erhalten.

Tetrao Mlokosiewiczzi.

Tetrao mlokosiewiczzi Taczanowski, P. Z. S. (1875) 266.

Ein Männchen aus dem Kaukasus, 1876 durch Taczanowski erhalten; typisches Exemplar.

Ordo: Struthiones.

Familia: *Tinamidae.**Tinamus robustus.*

Tinamus robustus Sclater, P. Z. S. (1860) 253.

Crypturus robustus Sclater et Salvin, Exot. Orn. (1869) 87, t. 44. — Gray, Handlist, spec. 9861.

Ein authentisches Exemplar in Süd-mexico von Salvin gesammelt, 1864 durch diesen erhalten.

Tinamus guttatus.

Tinamus guttatus Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft Wien (1863) 1126 und Orn. Bras. (1871) 292. — Gray, Handlist, spec. 9864.

Zwei Männchen, ein Weibchen und ein Junges von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Tinamus meserythrus.

Tinamus meserythrus Sclater, P. Z. S. (1859) 392.

Crypturus meserythrus Sclater et Salvin, Exot. Orn. (1869) 93, t. 47. — Gray, Handlist, spec. 9875.

Ein authentisches Exemplar von Salvin gesammelt, durch diesen 1864 erhalten.

Tinamus Boucardi.

Tinamus boucardi Sallé Mnsrpt., Sclater, P. Z. S. (1859) 391.

Crypturus boucardi Sallé, Sclater et Salvin, Exot. Orn. (1869) 91, t. 46. — Gray, Handlist, spec. 9884.

Ein authentisches Exemplar von Salvin gesammelt, 1864 erhalten.

Tinamus brevirostris.

Tinamus brevirostris Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft Wien (1863) 1128 und Orn. Bras. (1871) 294. — Gray, Handlist, spec. 9890.

Zwei Männchen von Natterer in Brasilien (Barra do Rio Negro) gesammelt; Originale.

Tinamus erythropus.

Tinamus erythropus Natterer Msript., Pelzeln, Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft Wien (1863) 1127 und Orn. Bras. (1871) 293. — Gray, Handlist, spec. 9893.

Vier Männchen und zwei Weibchen von Natterer in Brasilien (am Rio negro) gesammelt; Originalexemplare.

Ordo: Grallae.

Familia: *Otididae.**Otis caffra.*

Otis caffra Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 69.

Eupodotis caffra Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 9918.

Ein authentisches Exemplar, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Otis senegalensis.

Eupodotis senegalensis Vieillot, Gray, Handlist, spec. 9924.

Otis semitorquata Heuglin, Journ. f. Orn. (1863) 162.

Ein authentisches Exemplar der *Otis semitorquata* von Heuglin, welcher diese Art selbst wieder eingezogen hat (siehe Orn. Nordostafrika), 1856 erhalten.

Familia: *Charadriidae.**Oedicnemus capensis.*

Oedicnemus capensis Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 69. — Gray, Handlist, spec. 9941.

Ein authentisches Exemplar, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Chettusia gregaria.

Chettusia gregaria Pallas, Gray, Handlist, spec. 9953. — Heuglin, Orn. Nordostafrika II (1873), 996.

Vanellus pallidus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien (1856) 307.

Ein junges Männchen von Heuglin in Nordostafrika (Kedaref) gesammelt, 1856 acquirirt; Originalexemplar.

Lobivanellus lobatus.

Chettusia lobata Latham, Gray, Handlist, spec. 9961.

Vanellus gallinaceus Temminck, nach Wagler, Syst. Av. (1827) bei *Charadrius* Nr. 50.

Ein Weibchen aus Celebes, 1823 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar von *Vanellus gallinaceus*.

Charadrius modestus.

Charadrius modestus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 71. — Gray, Handlist, spec. 9996.

Ein authentisches Exemplar, 1823 vom Berliner Museum acquirirt.

Aegialitis hiaticula.

Aegialitis hiaticula Linné, Gray, Handlist, spec. 9998.

Charadrius hiaticuloides Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 308.

Ein authentisches Exemplar des *Charadrius hiaticuloides* von Heuglin in Nordostafrika (Qalabat) gesammelt, 1856 acquirirt.

Aegialitis tricollaris.

Aegialitis tricollaris Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10002.

Aegialites cinereicollis Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 308.

Ein Weibchen (authentisches Exemplar) von *Aegialitis cinereicollis* durch Heuglin am Tanasee in Abyssinien gesammelt; 1856 acquirirt.

Aegialitis falklandicus.

Aegialitis falklandicus Gmelin, Gray, Handlist, spec. 10006.

Charadrius trifasciatus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 71.

Ein junges Weibchen, 1823 vom Berliner Museum acquirirt; authentisch für das Synonym *Charadrius trifasciatus*.

Aegialitis pecuarius.

Charadrius pecuarius Temminck, Gray, Handlist, spec. 10015.

Charadrius longipes Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 308.

Zwei authentische Exemplare vom Synonym *Charadrius longipes*, durch Heuglin bei Chartum gesammelt; 1856 acquirirt.

Familia: *Glareolidae.**Glareola grallaria.*

Glareola grallaria Temminck, Man. Orn. II (1820), 503. — Gray, Handlist, spec. 10032.

Ein authentisches Exemplar, 1823 durch Temminck erhalten.

Familia: *Psophiidae.**Psophia ochroptera.*

Psophia ochroptera Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXIV (1857), 371 und Orn. Bras. (1871) 298. — Gray, Handlist, spec. 10073.

Vier Original Exemplare von Natterer in Brasilien gesammelt.

Psophia obscura.

Psophia obscura Natterer Mnsrpt., Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XXIV (1857), 373 und Orn. Bras. (1871) 299. — Gray, Handlist, spec. 10076.

Ein Männchen und ein Weibchen von Natterer in Brasilien gesammelt; Originale.

Familia: *Gruidae.**Grus vipio.*

Grus vipio Pallas, Gray, Handlist, spec. 10080.

Grus leucochen Temminck, Pl. Col., t. 449.

Ein Männchen aus Japan, 1833 vom Leydener Museum acquirirt; authentisches Exemplar von *Grus leucochen*.

Familia: *Rhynchoetidae.**Rhynchoaetus jubatus.*

Rhynchoaetus jubatus Verreaux et des Murs, Rev. de Zool. (1860) 440, t. 21. — Gray, Handlist, spec. 10098.

Ein Männchen aus Neu-Caledonien, 1864 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar.

Familia: *Ardeidae.**Ardea alba.*

Ardea alba Linné, Gray, Handlist, spec. 10108.

Ardea flavirostris Temminck, Wagler, Syst. Av. (1827), Ardea Nr. 9.

Zwei authentische Exemplare für den Namen *Ardea flavirostris*, 1823 und 1830 durch Temminck erhalten.

Ardea garzetta.

Ardea garzetta L. Gray, Handlist, spec. 10113. — Schlegel, Mus. Pays-Bas V, Ardeae (1863) Nr. 12, 14.

Ardea nigripes Temminck, Man. d'Orn. IV (1840), 377.

Ein authentisches Exemplar von *Ardea nigriceps*, 1830 durch Temminck aus dem Leydener Museum acquirirt.

Ardea Novae Hollandiae.

Ardea Novae Hollandiae Latham, Ind. Orn. II (1790), 701. — Pelzeln, Ibis (1871) 120. — Gray, Handlist, spec. 10117.

Ein Exemplar durch Fichtel aus dem Leverianischen Museum acquirirt; ist vielleicht Latham's Type.

Ardea gularis.

Ardea gularis Bosc, Gray, Handlist, spec. 10122.

Ardea schistacea Lichtenstein, Hemprich et Ehrenberg, Symb. Phys., t. 6.

Drei authentische Exemplare von *Ardea schistacea* aus Arabien, wahrscheinlich von Ehrenberg's Reise herrührend, 1826 aus dem Berliner Museum erhalten.

Ardea ardesiaca.

Ardea ardesiaca Wagler, Gray, Handlist, spec. 10123.

Ardea concolor Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 310.

Ein Männchen vom Sobatflusse, 1856 durch Heuglin erhalten; Original von *Ardea concolor*.

Ardea Idae.

Ardea sp. nov. Pelzeln, Naum. (1858) 497.

Ardea Idae Hartlaub, Journ. f. Orn. (1860) 167 und Vög. Madag. (1877) 303. — Gray, Handlist, spec. 10139.

Ardea elegans Verreaux, Hartlaub, Vög. Madag. (1861) 166.

Ardea xanthopoda Pelzeln, Hartlaub, Journ. f. Orn. (1860) 166.

Ardea leucoptera var. *Idae* Hartlaub, Alph. Milne-Edwards et Grandidier, Hist. de Madagascar XII (1879), 556.

Das junge Exemplar, auf welches diese Art begründet wurde, ist von der bekannten Reisenden Frau Ida Pfeiffer, das erwachsene, welches als *Ardea xanthopoda* beschrieben wurde, von Verreaux acquirirt worden.

Ardea Sturmii.

Ardea Sturmii Wagler, Gray, Handlist, spec. 10145. — Heuglin, Orn. Nordostafrika (1873) 1078.

Ardetta pusilla Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856) 311.

Ein Männchen von den Schilluk-Inseln, von Heuglin 1856 acquirirt; Original der *Ardetta pusilla*.

Nycticorax griseus.

Nycticorax nycticorax Linné, Gray, Handlist, spec. 10171.

Nycticorax guttatus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 311.

Ein junges Männchen von Heuglin 1856 acquirirt, als *Nycticorax griseus* beschrieben.

Familia: *Ciconiidae.**Ciconia Abdimii.*

Ciconia Abdimii Hemprich et Ehrenberg, Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 76. — Gray, Handlist, spec. 10189.

Ein authentisches Exemplar vom Berliner Museum acquirirt; wahrscheinlich von Ehrenberg's Expedition herrührend.

Mycteria australis.

Mycteria australis Latham, Ind. Orn. II, Suppl. (1801) LXIV, 1. — Gray, Handlist, spec. 10192.

Ein Exemplar, 1806 durch Fichtel acquirirt; ist wahrscheinlich Latham's Type.

Leptoptilos javanicus.

Leptoptilos javanicus Horsfield, Gray, Handlist, spec. 10196.

Ciconia capillata Temminck, Pl. Col., t. 312.

Ein Weibchen aus Java, 1830 durch Temminck erhalten; authentisch für *Ciconia capillata*.

Familia: *Tantalidae.**Tantalus lacteus.*

Tantalus lacteus Temminck, Pl. Col., t. 352. — Gray, Handlist, spec. 10209.

Zwei authentische Exemplare aus Java, 1830 und 1833 aus dem Leydener Museum acquirirt.

Geronticus melanocephalus.

Geronticus melanocephalus Linné, Gray, Handlist, spec. 10222.

Ibis leucon Temminck, Pl. Col., t. 481.

Ein authentisches Exemplar von *Ibis leucon*, 1833 aus dem Leydener Museum erhalten.

Geronticus comatus.

Geronticus comatus Ehrenberg, Rüppell, Syst. Uebers. Vög. Nordostafrika (1845) 119, t. 45.

— Gray, Handlist, spec. 10231.

Ein authentisches Exemplar, 1826 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Scolopacidae.**Limosa Novae Zealandiae.*

Limosa novae zealandiae Gray, Handlist, spec. 10262.

Limosa Baueri Natterer Msncrpt., Pelzel, Sitzungsber. k. Akad. Wien XII (1860) 326. — Naumann, Vög. Deutschl. VIII (1836), 429, Anmerk.

Ein authentisches Exemplar von *Limosa Baueri* 1826 erhalten, auf der Insel Norfolk von Bauer gesammelt.

Himantopus autumnalis.

Himantopus autumnalis Hasselquist, Gray, Handlist, spec. 10292.

Himantopus minor Natterer Msncrpt., Hartlaub, Journ. f. Orn. (1860) 170.

Himantopus candidus Bonnaterre, Hartlaub, Vög. Madagascar (1877) 328.

Ein Männchen von Madagascar, 1827 acquirirt; Original zu dem Synonym *Himantopus minor*. Ob dieser in der That zu *Himantopus autumnalis* gehört oder artlich verschieden ist, muss hier noch zweifelhaft bleiben.

Micropalama himantopus.

Micropalama himantopus Bonaparte, Gray, Handlist, spec. 10298.

Totanus multifasciatus Lichtenstein, Gray l. c.

Totanus multistriatus (Lichtenstein), Gray et Mitchell, Gen. Birds III (1849), 578.

Ein Exemplar aus Mexico mit der Bezeichnung *Totanus multifasciatus*, 1827 aus dem Berliner Museum bezogen.

Tringa platyrhyncha.

Tringa platyrhyncha Temminck, Gray, Handlist, spec. 10305.

Tringa frenata Lichtenstein, Mus. Berol.

Ein Exemplar als *Tringa frenata*, 1824 aus dem Berliner Museum acquirirt.

Tringa schinzii.

Tringa schinzii Brehm, Beitr. III (1822), 355. — Naumann, Vög. Deutschl. VII (1834), 453, t. 187.

Tringa cinclus Linné, Gray, Handlist, spec. 10310.

Ein Männchen und ein Weibchen von der Insel Rügen, 1828 durch Ch. L. Brehm erhalten; authentische Exemplare.

Tringa salina.

Tringa salina Pallas, Gray, Handlist, spec. 10313.

Tringa brevirostris Kuhl, Schlegel, Mus. Pays-Bas V, Scolapaces (1864) 48, 49.

Ein Männchen aus Java, 1830 durch Temminck erhalten; authentisches Exemplar von *Tringa brevirostris*.

Gallinago frenata.

Scolopax frenata Illiger, Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 75.

Gallinula frenata Illiger, Gray, Handlist, spec. 10338.

Ein Männchen aus Brasilien, 1819 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Gallinago andina.

Gallinago andina Taczanowski, P. Z. S. (1874), 561 und Orn. Peru III (1886), 375.

Ein Männchen aus Cutervo (Peru), 1880 von Taczanowski erhalten; authentisches Exemplar.

Gallinago gigantea.

Scolopax gigantea Natterer, Temminck, Pl. Col., t. 403.

Gallinago gigantea Natterer, Gray, Handlist, spec. 10340.

Original-Exemplare von Natterer in Brasilien gesammelt.

Rhynchaea semicollaris.

Rhynchaea semicollaris Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10359.

Rhynchaea curvirostris Lichtenstein, Mus. Berol. — Giebel, Thes. III (1877), 432.

Ein Männchen aus Paraguay, 1826 vom Berliner Museum als *Scolopax curvirostris* acquirirt.

Familia: *Rallidae*.*Hypotaenidia australis*.

Hypotaenidia australis Pelzeln, Ibis (1873) 42, 43.

Rallus pectoralis Gould (nec Cuvier), Birds Austral. VI, t. 76.

Ein Männchen und ein Weibchen von Zelebor während der Novara-Expedition gesammelt; Originale.

Rallina fasciata.

Rallina fasciata Raffles, Gray, Handlist, spec. 10390.

Gallinula eurizonia Temminck, Pl. Col., t. 417.

Ein authentisches Exemplar zu Temminck's Synonym, 1830 aus dem Leydener Museum erhalten.

Rallina rubiginosa.

Gallinula rubiginosa Temminck, Pl. Col., t. 357.

Rallina rubiginosa Temminck, Gray, Handlist, spec. 10395.

Ein authentisches Exemplar aus Java, 1833 vom Leydener Museum acquirirt.

Rallus rythirhynchus.

Pardirallus rythirhynchus Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10422.

Aramides Zelebori Pelzeln, Novara-Expedition I, Vögel (1865) 133.

Das typische Exemplar zu Pelzeln's Synonym wurde von Zelebor bei Rio Janeiro erbeutet.

Corethrura rubra.

Corethrura rubra Sclater et Salvin, P. Z. S. (1860) 300.

Aramides rubra Sclater et Salvin, Gray, Handlist, spec. 10434.

Ein authentisches Exemplar aus Vera Paz, 1866 von Salvin erhalten.

Ortygometra egregia.

Ortygometra egregia Peters, Gray, Handlist, spec. 10456. — Heuglin, Orn. Nordostafrika II (1873), 1240.

Ortygometra fasciata Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 316.

Ein typisches Exemplar von *Ortygometra fasciata*, 1856 von Heuglin acquirirt.

Ortygometra quadristrigata.

Ortygometra quadristrigata Horsfield, Gray, Handlist, spec. 10464.

Gallinula mystacina et superciliosa Temminck, Mus. Pays-Bas V, Ralli (1865) 32 bei *Porzana cinerea*.

Drei Exemplare unter obigen Benennungen Temminck's, 1823, 1830 und 1833 aus dem Leydener Museum erhalten.

Familia: *Gallinulidae.*

Notornis alba.

Fulica alba White, Journal of a Voyage to New-South-Wales (1790) 238 c. tab.

Notornis (?) *alba* White, Pelzeln, Sitzungsber. k. Akad. Wien XLI (1860), 328; Ibis (1873) 44 (Synonymie) und Mittheil. Orn. Ver. Wien 1877. — Salvin, Ibis (1873), 295, t. 10. — Newton, Encycl. Brit. 732.

Das im Hofmuseum befindliche, aus dem Leverianischen Museum stammende Exemplar ist das Original zu White's Beschreibung und Abbildung. Der Vogel scheint ausgestorben, da Hill's Bemerkung über einen weissen perlhuhnartigen Vogel auf Lord Howe's Insel (Ibis 1871) zu unbestimmt ist, um eine gegentheilige Ansicht zu begründen. Der von Newton (Ibis, 1866, pag. 159, Anmerk.) erwähnte, aus Bullock's Sammlung stammende, nunmehr im Museum zu Liverpool befindliche Vogel ist nach Dawson Rowley (Ornith. Misc., London 1875) keine *Notornis*, sondern wurde von ihm als *Porphyrio Stanleyi* bezeichnet. Das Exemplar des Wiener Museums ist somit das einzige bekannte.

Gallinula haematopus.

Gallinula haematopus Temminck, Schlegel, Mus. Pays-Bas V, Ralli (1865) 44. — Gray, Handlist, spec. 10497.

Ein Männchen aus Celebes, 1865 vom Leydener Museum erhalten; authentisches Exemplar.

Gallinula pumila.

Gallinula pumila Sclater, Ibis (1859), 249, t. 7. — Gray, Handlist, spec. 10498.

Ein Männchen von P. Natal, 1865 durch Sclater erhalten; authentisches Exemplar.

Fulica leucopyga.

Fulica leucopyga Lichtenstein, Oken's Isis (1831) 516. — Gray, Handlist, spec. 10516.

Ein Weibchen aus Brasilien, 1839 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Familia: *Parridae*.*Parra melanopygia*.

Parra melanopygia Sclater, P. Z. S. (1856) 283. — Sclater et Salvin, P. Z. S. (1864) 372. — Gray, Handlist, spec. 10533.

Zwei authentische Exemplare von Paraiso Station (Isthmus von Panama), 1868 durch Salvin erhalten.

Ordo: Anseres.

Familia: *Anatidae*.*Anser Temminckii*.

Anser Temminckii Boie, Isis (1822), 882.

Anser brevirostris Heckel, Isis (1828) 844, 845.

Anser erythropus Linné, Gray, Handlist, spec. 10568.

Ein Männchen und ein Weibchen, das erstere aus Aspern (1828), das andere von Seefeld (1824); dürften die Typen zu Heckel's Synonym sein.

Cygnus chionis.

Cygnus chionis Illiger, Gray, Handlist, spec. 10606.

Ein wahrscheinlich authentisches Exemplar aus Paraguay, 1826 vom Berliner Museum erhalten.

Anas Bernieri.

Querquedula Bernieri Verreaux J., Hartlaub, Journ. f. Orn. (1860) 173.

Anas gibberifrons var. *Bernieri* Milne-Edwards et Grandidier, Ois. de Madagascar (1879) 726.

Anas capensis Gmelin, Gray, Handlist, spec. 10640.

Ein Weibchen aus Madagascar, 1844 von Verreaux acquirirt; authentisches Exemplar.

Anas scutulata.

Anas scutulata Müller, Schlegel, Mus. Pays-Bas VI, Anseres (1866) 64.

Anas scutellata Müller, Gray, Handlist, spec. 10645.

Ein authentisches Exemplar von Diard in Java gesammelt, 1865 vom Leydener Museum erhalten.

Querquedula cyanooptera.

Querquedula cyanooptera Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10657.

Pterocyanea coeruleata (Lichtenstein) Gray, Gen. Birds III (1849), 617.

Ein Männchen, 1827 von Berliner Museum als *Anas coeruleata* acquirirt; authentisch für dieses Synonym.

Querquedula versicolor.

Querquedula versicolor Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10659.

Anas maculirostris Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 84.

Ein Männchen und ein Weibchen, 1824 und 1826 vom Berliner Museum acquirirt; Typen von *Anas maculirostris*.

Querquedula gibberifrons.

Anas gibberifrons Müller, Schlegel, Mus. Pays-Bas VI, Anseres (1866) 58.

Querquedula gibberifrons Müller, Gray, Handlist, spec. 10663.

Zwei Männchen und ein Weibchen von Rosenberg auf Celebes gesammelt, 1865 aus dem Leydener Museum erhalten; authentische Exemplare.

*Fuligula peposaca.**Aythya peposaca* Vieillot, Gray, Handlist, spec. 10695.*Anas albipennis* Lichtenstein, Gray, Gen. Birds III (Appendix), 28.Ein authentisches Exemplar von *Anas albipennis*, 1826 aus dem Berliner Museum acquirirt.*Podiceps bicornis.**Colymbus bicornis* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 88.*Podiceps bicornis* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 10742.

Ein authentisches Exemplar aus Paraguay, 1826 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Uruidae.**Brachyrhamphus Wumizusume.**Uria Wumizusume* Temminck, Pl. Col., t. 579.*Brachyrhamphus Wumizusume* Temminck, Gray, Handlist, spec. 10813.

Ein authentisches Exemplar, 1841 vom Leydener Museum acquirirt.

*Uria Mandtii.**Uria Mandtii* Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 88. — Gray, Handlist, spec. 10817.

Ein authentisches Exemplar, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Procellariidae.**Puffinus leucomelas.**Procellaria leucomelas* Temminck, Pl. Col., t. 587.*Puffinus leucomelas* Temminck, Gray, Handlist, spec. 10829.

Ein authentisches Exemplar, 1841 aus dem Leydener Museum erhalten.

*Puffinus tenebrosus.**Puffinus tenebrosus* Natterer Mnsrpt., Pelzel, Ibis (1873) 47—51, Fig. 1.

Ein typisches Exemplar, 1806 aus dem Leverianischen Museum durch Fichtel acquirirt.

*Procellaria pelagica.**Procellaria pelagica* Linné, Gray, Handlist, spec. 10851.*Thalassidroma lugubris* Natterer teste Bonaparte, Act. Ital. Mediolan. 1844 und Compt.-rend. 1856.Ein typisches Exemplar von *Thalassidroma lugubris* durch Fichtel 1807 acquirirt.Familia: *Laridae.**Larus melanocephalus.**Larus melanocephalus* Natterer Joh., Isis (1818) 816 und in Temminck, Man. d'Orn. II (1820), 777. — Saunders, P. Z. S. (1878) 199.

Ein Männchen (1817) und ein Weibchen (1815) bei Triest erlegt; Original-Exemplare.

*Larus Franklini.**Larus Franklini* Richardson et Swainson, Faun. Bor. Am., Birds (1831) 424, t. LXXI. — Saunders, P. Z. S. (1878), 195.*Larus cucullatus* Lichtenstein, Mus. Berol.Ein authentisches Exemplar von *Larus cucullatus*, 1827 aus dem Berliner Museum erhalten.

Larus leucophthalmus.

Larus leucophthalmus Lichtenstein, Temminck, Pl. Col., t. 366. — Saunders, P. Z. S. (1878) 193.

Zwei authentische Exemplare, 1824 und 1826 vom Berliner Museum acquirirt.

Larus gelastes.

Larus gelastes Lichtenstein, Thienemann, Fortpfl. Vög. Eur. V (1838), 22. — Saunders, P. Z. S. (1878) 191.

Larus subroseus Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 321.

Ein Männchen im Golf von Suez erlegt, 1856 von Heuglin erhalten; Original von *Larus subroseus*.

Sterna Bergii.

Sterna Bergii Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 80. — Saunders, P. Z. S. (1876) 657.

Ein Männchen, 1824 vom Berliner Museum acquirirt; authentisches Exemplar.

Sterna macrura.

Sterna macrura Naumann, Isis (1819) XII, 1847 und Vög. Deutschl. X (1840), 115. — Saunders, P. Z. S. (1876) 650.

Sterna argentata Brehm, Beiträge III (1822), 692.

Ein Männchen, 1828 von Ch. L. Brehm als *Sterna argentata* erhalten.

Sterna albigena.

Sterna albigena Lichtenstein, Nomenclator (1854) 98. — Saunders, P. Z. S. (1876), 648.

Ein authentisches Exemplar, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Hydrochelidon hybrida.

Sterna hybrida Pallas, Zoogr. Rosso-As. II (1811), 338.

Hydrochelidon hybrida Pallas, Saunders, P. Z. S. (1876) 640.

Sterna leucopareia Natterer, Temminck, Man. d'Orn. (1820) 746.

Vier Männchen von Joh. Natterer, 1809 und 1810 gesammelt; Originale zu dem Synonym *Sterna leucopareia*.

Rhynchops flavirostris.

Rhynchops flavirostris Vieillot, Gray, Handlist, spec. 11094.

Rhynchops albirostris Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 80.

Ein authentisches Exemplar zu Lichtenstein's Synonym aus Nubien, 1824 vom Berliner Museum acquirirt.

Familia: *Pelecanidae.**Sula plumigula.*

Sula plumigula Natterer Jos., Pelzeln, Ibis (1873) 52.

Ein typisches Exemplar, 1840 acquirirt.

Graculus sinensis.

Graculus sinensis Shaw, Gray, Handlist, spec. 11115.

Carbo capillatus Temminck et Schlegel, Faun. Jap. (1849), t. 83, 83b.

Zwei authentische Exemplare von *Carbo capillatus*, 1841 aus dem Leydener Museum erhalten.

Graculus lucidus.

Haliens lucidus Lichtenstein, Doubl.-Verz. (1823) 86.

Graculus lucidus Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. 11116.

Ein junges authentisches Exemplar, 1824 vom Berliner Museum erhalten.

*Graculus bicristatus.**Graculus bicristatus* Pallas, Gray, Handlist, spec. III 29.*Graculus Bairdii* Gruber Mnsrpt., Cooper, Proc. Acad. Philad. (1865) 5.

Ein Männchen von Farallone Island, 1864 durch Gruber erhalten; authentisch für dessen Synonym.

*Pelecanus mitratus.**Pelecanus mitratus* Lichtenstein, Gray, Handlist, spec. III 53.*Pelecanus megalophus* Heuglin, Sitzungsber. k. Akad. Wien XIX (1856), 324.Ein Männchen, von Heuglin 1856 acquirirt, ist das Original von *Pelecanus megalophus*. Heuglin hat diesen Namen später selbst unter die Synonyme von *Pelecanus mitratus* gestellt.

Nachträge.

*Gyps himalayensis.**Gyps himalayensis* Hume, Rough Notes I (1869), 14. — Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. I (1874), 8.*Gyps nivicola* Severtzow, Turkest. Jevotn. (1873) III, t. VII.Ein Weibchen vom Tian-schan, 1887 durch Menzbier aus Severtzow's Nachlass bezogen; authentisches Exemplar von *Gyps nivicola*.*Phaëtornis Nattereri.**Phaëtornis Longemareus* Pelzeln nec Lesson, Orn. Bras. (1871) 27.*Phaëtornis Nattereri* Berlepsch, Ibis (1887) 289.

Drei Männchen aus Caiçara und Engenho do Cpt. Gama durch Natterer aus Brasilien erhalten; Originalexemplare (ein Männchen aus Caiçara wurde an Grafen Berlepsch im Tausch abgegeben). Da die Unterscheidung dieser Art in Folge Untersuchung sämtlicher vier Exemplare erfolgt ist, so wären dieselben alle als Typen zu betrachten.

*Sitta albifrons.**Sitta albifrons* Taczanowski, Bulletin Soc. Zool. d. Fr. (1882) 385.

Ein authentisches Exemplar, 1887 durch Dybowski erhalten.

*Troglodytes pallescens.**Anorthura pallescens* (Steineger Mnsrpt.) Ridgway, Pr. U. S. Nat. Mus. (1883) 93.*Troglodytes pallescens* Ridgway, Steineger, Bull. U. S. Nat. Mus. (1885), Nr. 29.

Ein junges Exemplar von Copper Island, 1887 durch Steineger erhalten; authentisch.

*Parus rufipectus.**Parus ater* var. *rufipectus* Severtzow, Faun. Turkest. (1873) 66, 134.*Parus rufipectus* Severtzow (Subspec.), Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 44.

Ein Männchen von Turkestan, 1887 aus Severtzow's Nachlass durch Menzbier acquirirt.

*Parus songarus.**Parus songarus* Severtzow, Turkest. Jevotn. (1873) 134. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 48.

Ein Männchen aus Turkestan von Severtzow's Sammlung durch Menzbier acquirirt; authentisches Exemplar.

Aegithalus macronyx.

Aegithalus macronyx Severtzow, Turkest. Jevotn. (1873) 137, t. 9, Fig. 8 ad ♂. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 69.

Aegithalus rutilans Severtzow, ibid.

Ein Männchen vom Syrflusse, 1887 aus Severtzow's Nachlass durch Menzbier acquirirt; authentisches Exemplar.

Aegithalus coronatus.

Aegithalus coronatus Severtzow, Turkest. Jevotn. (1873) 136, t. 9, Fig. 3, ♂ ad. — Gadow, Cat. Birds Brit. Mus. VIII (1883), 68.

Ein Männchen aus Taschkent von Severtzow gesammelt, 1887 durch Menzbier acquirirt; authentisches Exemplar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von, Lorenz von Libernau
Ludwig

Artikel/Article: [Typen der ornithologischen Sammlung des k.k. naturhistorischen Hofmuseums. IV. Theil Schluss\) 37-62](#)