

Schedae ad Cryptogamas exsiccatas,

editae a Museo historiae naturalis Vindobonensi.

Auctore

F. Petrak.

Nach längerer Pause gelangen jetzt wieder zwei Zenturien der „Cryptogamae exsiccatae“ zur Ausgabe, welche nur Pilze enthalten, weil diese unter den vorhandenen Vorräten am zahlreichsten vertreten sind. Es wird beabsichtigt, in Zukunft jedes Jahr eine Zenturie des Exsikkates auszugeben, vorausgesetzt, daß die erforderlichen Beiträge an Material dazu einlaufen. Deshalb werden alle Mitarbeiter ersucht, alljährlich entsprechende Beiträge, besonders auch Moose, Flechten und Algen einzusenden, die in dem Exsikkatenwerke noch nicht zur Ausgabe gelangt sind. Pilze sind besonders aus außereuropäischen Ländern erwünscht und brauchen nicht bestimmt zu sein.

Die Bestimmungen der in den vorliegenden Zenturien enthaltenen Pilze röhren, wo nichts anderes angegeben ist, vom Herausgeber her oder wurden von ihm überprüft.

Cent. XXXIII.

Unter Mitwirkung der Herren:

B. Augustin	† F. von Höhnel	K. Miethlich	J. Schmoranzer
† G. Beck	L. Hollos	G. von Moesz	H. Smith
J. Bornmüller	A. Hürzeler	J. A. Nannfeldt	K. von Schoenau
† J. F. Brenckle	H. Huber	F. Petrak	K. Starcs
† F. Bubák	K. Keissler	J. Piskov	† S. Stockmayer
† J. C. Constantineanu	† F. Krasser	M. Ramos	† P. Strasser
A. U. Däniker	Lau Shau Yan	K. Rechinger sen.	† E. Treub
H. Diedicke	J. Lind	K. H. Rechinger fil.	W. T. Tsang
J. Dörfler	H. Lohwag	M. Reichel	† W. Voss
K. Egner	† J. Lütkemüller	J. Riniker	† T. Vestergren
C. F. E. Erichsen	B. Lyngé	G. Samuelsson	A. Walter
F. Greinich	A. Magocsy-Dietz	† G. Schellenberg	† R. von Wettstein
† F. Hanausek	F. Matouschek	H. Schinz	† A. Zahlbruckner
			† H. Zimmermann

herausgegeben

von der botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien.

Fungi (Decades 122—131).

3201. *Cystopus candidus* (Pers.) Lév.

Hungaria: in foliis caulibusque vivis *Capsellae bursae pastoris* ad Szekszárd, m. Majo. leg. et det. L. Hollós.

3202. *Peronospora dipsaci* Tul.

Austria inf.: in foliis vivis *Dipsaci silvestris* loco „Wolfsgraben“ dicto pr. Tullnerbach in montibus „Wienerwald“, m. Jul. leg. et det. K. Keissler.

3203. *Peronospora lunariae* Gäum.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: in foliis vivis *Lunariae redivivae* pr. Koknese in fruticetis, m. Oct. leg. et det. K. Starcs.

3204. *Peronospora matthiolae* Gäum.

Moravia, Sternberg: in foliis vivis *Matthiolae incanae* cult. in horto, m. Aug. leg. J. Piskor, comm. F. Petrak.

3205. *Peronospora Schleideni* Ung.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: in foliis vivis *Allii cepae* pr. Vestiena, m. Aug. leg. et det. K. Starcs.

3206. *Peronospora stachydis* Sydow.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: in foliis vivis *Stachydis palustris* ad Vestiena, m. Sept. leg. et det. K. Starcs.

3207. *Peronospora viciae-sativae* Gäum.

Hungaria: in foliis vivis *Viciae villosae* ad Szerednye, com. Ung, m. Majo. leg. A. Magocsy-Dietz.

3208. *Chrysomyxa abietis* (Wallr.) Ung.

Moravia orient.: in foliis vivis *Piceae excelsae* in silvis montis Čab pr. Wsetin, m. Majo. leg. F. Petrak.

3209. *Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév.

In foliis vivis *Tussilaginis farfarae*.

a) Moravia austr.: ad lacum „Mühlteich“ pr. Eisgrub, m. Sept. leg. H. Zimmermann.

b) Helvetia, Kant. Zürich: loco dicto Heuried pr. Zürich, m. Nov. leg. A. U. Däniker, E. Schmid, J. Bär.

3210. *Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacqu.) D. C.

Romania, distr. Neamt: ad folia fructusque *Crataegi monogyniae* in monte „Cozla“ pr. Piatra, m. Jul. leg. J. C. Constantineanu.

3211. **Melampsora allii-fragilis** Kleb.

a) Fungus aecidiosporifer in foliis *Allii ursini*, m. Majo.

b) Fungus teleutosporifer in foliis *Salicis fragilis*, m. Aug.

Dania: Bornholm, Gudhjem. leg. et det. J. Lind.

3212. **Puccinia angelicae** (Schum.) Fuck.

Suecia, Gotland: ad folia viva *Angelicae litoralis* ad Lummellunds-bruk in litore maris, m. Jul. leg. et det. T. Vestergren.

3213. **Puccinia antirrhini** Diet. et Holw.

In foliis vivis *Antirrhini majoris* cult.

a) Austria inf., Wien: in horto quodam ad Penzing, m. Sept.
leg. et det. K. Keissler.

b) Thuringia, Weimar, in horto „Friedhofsgärtnerei“, m. Oct.
leg. et det. J. Bornmüller.

3214. **Puccinia ari-phalaridis** Kleb.

Helvetia, Kant. Zürich: Aecidia ad folia viva *Ari maculati* pr. Ellikon, m. Majo. leg. K. Miethlich, comm. H. Schinz.

3215. **Puccinia arrhenatheri** (Kleb.) Erikss.

Moravia austr.: Aecidia ad folia viva *Berberidis vulgaris* in horto „Eisgruber Park“ dicto, m. Apr. leg. H. Zimmermann.

3216. **Puccinia calthae** Link.

In foliis vivis *Calthae palustris*.

a) Romania, distr. Neamt: in pratis paludosis apud Brates in valle Tarcău, m. Aug. leg. J. Constantineanu.

b) Montenegro: Gornja Bukovica ad Savniki, m. Aug.
leg. et det. F. Bubak.

3217. **Puccinia cirsii** Lasch.

a) Romania, distr. Suceava: in foliis vivis *Cirsii oleracei* ad margines rivuli Neagra-Brosteni, m. Jul. leg. J. C. Constantineanu.

b) Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: in foliis vivis *Cirsii heterophylli* in pratis ad Vestiena, m. Sept. leg. K. Starcs.

c) Hungaria: in foliis vivis *Cirsii cani* in pratis ad Aranyosmarót, com. Bars, m. Aug. leg. et det. G. de Moesz.

3218. **Puccinia cirsii-eriophori** Jacky.

Romania, distr. Neamt: in foliis vivis *Cirsii furrientis* in collibus aridis montis „Grintiesu-mare“, m. Aug.

leg. J. C. Constantineanu.

3219. **Puccinia dioicae** P. Magn.

Austria inf.: Aecidia in foliis vivis *Cirsii rivularis* in pratis prope pagum „St. Andrä“, m. Jun. leg. G. Beck.

3220. **Puccinia Harioti** Lagerh.

Syria, Antilibanon: in foliis vivis *Stachydis niveae* ad Sahrat Dimâs, ca. 1000 m, m. Majo. det. H. Sydow, leg. G. Samuelsson.

3221. **Puccinia hypocoeridis** Oud.

Carinthia: in foliis vivis *Hypochoeridis maculatae* in monte Straža ad Veldes, m. Aug. leg. W. Voss.

3222. **Puccinia Komarovii** Tranzsch.

Bavaria, München: ad folia viva *Impatientis parviflorae* in horto botanico, m. Oct. leg. et det. K. von Schoenau.

3223. **Puccinia nigrescens** Kirchn.

a) Hungaria: in foliis vivis *Salviae verticillatae* pr. Szekszárd, m. Sept. leg. et det. L. Hollós.

b) Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: ad folia viva *Salviae leoniae* in horto botanico universitatis Rigensis, m. Jul.

leg. et det. K. Starcs.

3224. **Puccinia smyrnii-olusatri** (DC.) Lindr.

Syria, Amanus: in foliis vivis *Lecockiae creticae* ad pag. Saouk Olouk, m. Majo. det. H. Sydow, leg. G. Samuelsson.

3225. **Puccinia taraxaci** (Reb.) Plowr.

Austriae inf.: ad folia viva *Taraxaci officinalis* pr. Sonntagberg, m. Nov. leg. P. Strasser.

3226. **Puccinia taraxaci-serotini** Picbauer.

Romania, distr. Jassy: ad folia viva *Taraxaci serotini* in locis aridis prope pagum Carlig, m. Aug.

leg. J. C. Constantineanu.

3227. **Puccinia thalictri** Chev.

Suecia, Uppland: ad folia viva *Thalictri flavi* ad Hemö in taeniis Bergbo paroec. Möja, m. Jul. leg. et det. T. Vestergren.

3228. **Puccinia thesii** (Desv.) Chaill.

Austria inf.: Aecidia ad folia viva *Thesii linophylli* in collibus ad pag. Gumpoldskirchen pr. Wien, m. Majo.

leg. J. Lütkemüller.

3229. **Puccinia tinctoriicola** P. Magn.

Romania, distr. Jassy: ad folia viva *Serratulae radiatae* in pratis silvaticis apud Carlig, m. Jun. leg. J. C. Constantineanu.

3230. **Uromyces Bornmüllerii** P. Magn.

Syria, Libanon: ad folia viva *Bongardiae chrysogoni* in reg. subalpinis jugi Sanin, m. Jun.

det. P. Magnus, leg. J. Bornmüller.

3231. **Uromyces fabae** (Pers.) de Bary.

Italia, Triest: in foliis vivis *Orobi nigri* ad Boschetto, m. Majo.
leg. F. Krasser.

3232. **Uromyces phaceae-frigidae** (Wahlbg.) Har.

Norvegia, Dovre: in foliis vivis *Phacae frigidae* ad Vaarstien,
m. Jul. leg. et det. B. Lyngé.

3233. **Uromyces thapsi** (Opiz) Bub.

a) Austria inf.: in foliis vivis *Verbasci* spec. ad Thernberg pr.
Scheiblingkirchen, m. Aug. leg. M. Reichel et J. Dörfler.

b) Romania, distr. Botosani: ad folia viva *Verbasci phlomoides* in
locis sterilibus dumetorum prope pagum Siminicea, m. Jul.
leg. J. C. Constantineanu.

3234. **Cintractia lejoderma** (Lagerh.) Cif.

Moravia orient.: in ovariis vivis *Caricis brizoides* ad pag. Ribař
pr. Mähr.-Weißkirchen, m. Jun. leg. F. Petrák.

3235. **Cintractia luzulae** (Sacc.) Clint.

Germania, Silva Hercynica: in ovariis vivis *Luzulae pilosae* in
pinetis et fagetis ad „Rothesütte“, m. Jul.
leg. H. Diedicke, comm. J. Bornmüller.

3236. **Cintractia pratensis** Syd.

Styria super.: in ovariis vivis *Caricis glaucae* ad Haberteuer pr.
Mariazell, m. Jul. leg. G. Beck.

3237. **Sphaeclotheca spermophora** (Berk. et Curt.) Moesz.

Hungaria: in ovariis vivis *Eragrostidis minoris* ad Soroksár pr.
Budapest, m. Aug. leg. et det. G. de Moesz.

3238. **Tolyposporium leptideum** Syd.

Hungaria: in ovariis vivis *Chenopodii albi* pr. Nagybaracska, m.
Sept. det. G. de Moesz, leg. F. Greinich.

3239. **Tuburcinia anemones** (Pers.) Liro.

Bohemia: ad folia viva *Anemones nemorosae* ad Poděbrad, m.
Majo. leg. F. Bubák.

3240. **Tuburcinia hepaticae-trilobae** (DC.) Liro.

Thuringia: ad folia viva *Hepaticae trilobae* in silvis pr. Berka a.
Ilm, m. Majo et Jun. leg. J. Bornmüller.

3241. **Tuburcinia ranunculi** (Lib.) Liro.

Romania, distr. Prahova: in foliis petiolisque vivis *Ranunculi re-*
pentis ad Azuga, m. Aug. leg. J. C. Constantineanu.

3242. **Ustilago lychnidis-dioicae** (DC.) Liro.
Carinthia: in antheris vivis *Melandrii rubri* ad Greifenberg, m. Aug. leg. F. von Höhnel.
3243. **Ustilago nuda** (Jens.) Kell. et Swingle.
Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: in ovariis vivis *Hordei vulgaris* in agris ad Vestiena, m. Jul. leg. et det. K. Starcs.
3244. **Ustilago panici-glauei** (Wallr.) Wint.
Styria: in ovariis vivis *Setariae glaucae* ad Judenau, m. Sept. leg. G. Beck.
3245. **Ustilago scorzonerae** (Alb. et Schwein.) Schroet.
Helvetia, Kant. Zürich: in capitulis *Scorzonerae humilis* in pratis „Friesenberg am Uto“ pr. Zürich, m. Majo. leg. A. Hürzeler, comm. A. U. Däniker.
3246. **Ustilago stellariae** (Sow.) Liro.
Suecia, Torne Lappmark, Juckasjärvi sn: in antheris vivis *Stellariae calycanthae* pr. Abisko in reg. subalp., m. Jul. leg. H. Smith.
3247. **Aleurodiscus amorphus** (Pers.) Rabh.
Austria inf.: in ramis emortuis *Abietis pectinatae* ad Beernau pr. Arbesbach, m. Aug. leg. A. Zahlbrückner.
3248. **Auricularia mesenterica** (Dicks.) Pers.
Austria inf.: in truncis emortuis ad Unterwaltersdorf, m. Oct. leg. S. Stockmayer.
3249. **Coriolus abietinus** (Dicks.) Quél.
Austria inf.: in truncis *Abietis pectinatae* ad Neustift pr. Scheibbs. det. V. Litschauer, leg. K. H. Rechinger fil.
3250. **Craterellus cornucopioides** (L.) Fr.
Moravia orient.: ad terram in silvis *Piceae excelsae* pr. Mähr.-Weißenkirchen, m. Aug. leg. F. Matouschek.
3251. **Grandinia Brinkmanni** (Bres.) Bourd. et Galz.
Austria inf.: ad corticem *Betulae* spec., Neustift pr. Scheibbs, m. Mart. det. V. Litschauer, leg. K. H. Rechinger fil.
3252. **Merulius porinoides** Fr. sec. Bresadola in litt ad Bourdot.
Austria sup.: ad truncum *Laricis europaea* pr. Windischgarsten, m. Aug. det. V. Litschauer, leg. K. H. Rechinger fil.
3253. **Polyporus spumeus** (Sow.) Fr.
Austria inf.: Vindobonae, ad truncum in horto „Host'scher Garten“ dicto, m. Oct. leg. et det. H. Lohwag.

3254. **Polystictus crenatus** (Berk.) Fr.

China, Kwantung, Tsungfa-Lungmoon distr.: Sam Kok Shan ad truncum emortuum, m. Majo.

det. H. Lohwag, leg. W. T. Tsang.

3255. **Stereum hirsutum** (Willd.) Pers.

Salisburgia: ad trunco arborum frond. in monte Geisberg pr. Salzburg, m. Oct.

leg. J. Dörfler.

3256. **Trametes badia** Berk.

China, Lingnan: ad trunco emortuo *Eucalypti* spec., m. Jun.

det. R. Heim, leg. Lau Shau Yan.

3257. **Trametes rubescens** (Alb. et Schw.) Fr.

Austria inf.: in trunco *Salicis* spec. pr. Ebenfurt, m. Oct.

leg. A. Walter, comm. H. Huber.

3258. **Tulostoma mammosum** Mich.

Austria inf.: in agris et silvis ad terram pr. Fischau, m. Dec.—Mart.

leg. et det. H. Huber.

3259. **Taphrina lapponica** Juel.

Austria inf., Torne Lappmark, Jukkasjärvi sn.: in foliis vivis *Betulae tortuosae* pr. Abisko, m. Jul.

leg. et det. J. A. Nannfeldt.

3260. **Taphrina Sadebeckii** Johans.

Dania, Sjælland: ad folia viva *Alni glutinosae* pr. Lyngby, m. Aug.

leg. et det. J. Lind.

3261. **Asterina pemphidioides** Cooke.

Ins. Philippinenses, Prov. Rizal, Antipolo: in foliis vivis *Eugeniae Cumini*, m. Aug.

leg. M. Ramos.

3262. **Diaporthe leiphaemia** (Fr.) Sacc.

Moravia orient., Mähr.-Weißkirchen: in ramis emortuis *Quercus roboris* pr. pagum Hrabuvka, m. Sept.

leg. F. Petrák.

3263. **Diaporthe Robergeana** (Desm.) Niessl.

Germania, Austria inf.: in ramis emortuis *Staphyleae pinnatae* in silvis inter pagos Pfaffstätten et Gumpoldskirchen non procul ab urbe Vindobona, m. Majo.

leg. F. Petrák.

3264. **Erysiphe artemisiae** (Wallr.) Grev.

Latvia, Prov. Vidzeme, distr. Riga: in foliis vivis *Artemisiae vulgaris* loco „Zemitanī“ dicto pr. Riga, m. Sept.

leg. K. Starcs.

3265. **Erysiphe depressa** (Wallr.) Schlecht.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: ad folia viva *Arctii tomentosi* in incultis pr. Lidere, m. Jul.

leg. K. Starcs.

3266. **Erysiphe Martii** Lév.

Insula Rhodos: in foliis vivis *Onobrychidis* spec. ad pag. Salakos.
leg. K. H. Rechinger fil.

3267. **Mycosphaerella brideliae** Syd.

Ins. Philippinenses, prov. Rizal, Antipolo: in foliis vivis *Brideliae stipularis*, m. Aug.
leg. M. Ramos.

3268. **Mycosphaerella taeniographa** Petr.

Moravia orient., Mähr.-Weißkirchen: in caulis emortuis
adhuc stantibus *Conii maculati* prope pagum Skalička, m. Majo.

Specim. originale. leg. F. Petrak.

3269. **Mycosphaerella tussilaginis** (Rehm) Lindau.

Moravia orient.: in foliis emortuis *Tussilaginis farfarae* ad pag.
Czernotin pr. Mähr.-Weißkirchen, m. Majo. leg. F. Petrak.

In Gesellschaft dieses Pilzes findet sich zuweilen *Phyllostictina tussilaginis* Petr. und eine junge Pleosporacee, welche zu *Metasphaeria* gehören dürfte.

3270. **Pleomassaria siparia** (Berk. et Br.) Sacc.

Polonia, Galicia: in ramis emortuis *Betulae albae* in silvis ad pag.
Podhorce pr. Stryj, m. Apr. leg. F. Petrak.

In Gesellschaft des Schlauchpilzes findet sich zuweilen die zugehörige Nebenfruchtform *Prosthemium betulinum* Kunze.

3271. **Pleospora trichostoma** (Fr.) Fuck.

Hungaria: in culmis emortuis *Secalis cerealis* pr. Sükösd, m. Jul.
det. G. von Moesz, leg. F. Greinich.

3272. **Polystigma ochraceum** (Wahlb.) Sacc.

Carinthia: in foliis vivis *Pruni padi* pr. Greifenburg, m. Sept.
leg. et det. F. von Höhnel.

3273. **Rhopographus clavisporus** (Cooke et Peck) Sacc.

America bor., North Dakota: in culmis emortuis *Phragmites communis* ad. Northville, m. Mart.

leg. J. F. Brenckle, comm. F. Petrak.

3274. **Rosellinia aquila** (Fr.) de Not.

Helvetia, Zürich: in ramis arborum var. in horto botanico Universitatis, m. Apr. leg. G. Schellenberg.

3275. **Scirrhia aspidiorum** (Lib.) Bub.

Moravia orient.: in petiolis emortuis *Aspidii filicis maris* pr. pag.
Heinrichswald, m. Mart. leg. F. Petrak.

3276. *Spilosticta cephalariae* (Auersw.) Petr.

Syn.: *Sphaerella cephalariae* Auersw. in Mycol. Europ. V—VI. p. 14, fig. 67 (1869). — *Laestadia cephalariae* Sacc. Syll. Fung. I. p. 425 (1882). — *Stigmatea cephalariae* Ranoj. in Annal. Mycol. XII. p. 396 (1914). — *Spilosticta cephalariae* Petr. in Annal. Mycol. XXIII. p. 57 (1925).

Hungaria: in foliis caulibusque vivis *Cephalariae transsilvanicae* pr. Budapest, m. Aug. leg. et det. G. von Moesz.

3277. *Valsa translucens* (de Not.) Ces. et de Not.

Tirolia orient.: ad ramulos emortuos *Salicis purpureae* pr. Sillian, m. Jun. leg. K. Keissler.

Auf manchen Stücken kommt der Pilz auch als *Valsella*-Form vor.

3278. *Ascochyta viburni* (Roum.) Sacc.

Latvia, Prov. Vidzeme, distr. Riga: ad folia viva *Viburni lentiginis* in hortis urbis Riga, m. Sept.

det. H. Sydow, leg. K. Starcs.

3279. *Botryodiplodia pandani* (Lév.) Petr. et Syd.

Insula Java: ad fructus emortuos *Pandani spec.* pr. Buitenzorg, m. Majo. leg. Treub.

Eine vollständige Zusammenstellung der Synonyme dieser Art wurde von Petrák und Sydow in Repert. Spec. Nov. Reg. Beiheft XLII. p. 168 (1927) mitgeteilt.

3280. *Cheilaria urticae* Lib.

Polonia, Galicia: ad caules emortuos *Urticae dioicae* pr. Stryj, m. Nov. leg. F. Petrák.

3281. *Darluca filum* (Biv.) Cast.

Romania, distr. Jassy: in aecidiis *Pucciniae silvaticae* ad folia viva *Taraxaci officinalis* in pratis subhumidis ad Ungheni, m. Majo.

leg. J. C. Constantineanu.

3282. *Lichenoconium lecanoracearum* (Vouaux) Petr. et Syd.

Germania, Schleswig-Holstein, Kreis Lauenburg: in apotheciis *Lecanorae pityreae* Erichs. ad corticem *Pini* pr. Lehmrade, m. Sept. leg. et det. C. F. E. Erichsen.

3283. *Marssonina Kriegeriana* (Bres.) P. Magn.

Moravia, Sternberg: in foliis vivis *Salicis viminalis* ad ripas fl. March pr. Stefanau, m. Sept. leg. J. Pisková, comm. F. Petrák.

3284. *Myxofusieoccum prunicolum* (Sacc. et Roum.) Died.

Moravia orient., Mähr.-Weißkirchen: in ramis emortuis *Pruni spinosae* ad margines pascuorum pr. pag. Welka, m. Apr.

leg. F. Petrák.

3285. *Naemospora microspora* Desm.

Austria inf.: ad trunco morientes *Carpini betuli* pr. pag. Katzelsdorf ad Wiener-Neustadt, m. Nov.

leg. K. Egner, comm. H. Huber.

3286. *Phoma solidaginis* Cooke.

Austria inf.: ad caules emortuos *Solidaginis serotinae* pr. Klosterneuburg, m. Apr. leg. F. Petrak et K. H. Rechinger fil.

3287. *Phyllosticta aegopodii* (Curr.) Allesch.

Salisburgia: in foliis vivis *Aegopodii podagrariae* pr. Grödig, m. Oct. leg. J. Dörfler.

Kommt oft in Gesellschaft von *Septoria podagrariae* Lasch vor und gehört mit dieser in den Entwicklungskreis von *Mycosphaerella podagrariae* (Roth.), deren junge Perithezien auch oft in Gesellschaft der beiden genannten Nebenfruchtformen anzutreffen sind. Petrak.

3288. *Rabenhorstia tiliae* Fr.

Austria inf.: in ramis dejectis emortuis *Tiliae* spec. pr. Sonntagberg, m. Mart. leg. P. Strasser.

Auf dem vorliegenden Material kommt der Pilz zuweilen in Gesellschaft von *Pseudomassaria chondrospora* (Ces.) Jacz. vor.

3289. *Sarcophoma Miribellii* (Fr.) v. Höhn.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: ad folia emorta *Buxi semper-virentis* in hortis urbis Riga, m. Oct. leg. et det. K. Starcs.

3290. *Septoria dianthi* Desm.

Austria inf.: in calycibus caulibusque *Dianthi* spec. cult. pr. Sonntagberg, m. Nov. leg. P. Strasser.

Diese Kollektion wird von Strasser im siebenten Nachtrage zur Pilzflora des Sonntagberges (Verh. Zool. Bot. Ges. LXIX, 1919, p. 377) als *Rhabdospora carthusianorum* (West.) v. Höhn. (syn. *Septoria carthusianorum* West.) angeführt und dazu bemerkt: „Nach v. Höhn el eigentlich nur eine kleinere Form von *Rhabdospora dianthi* (Desm.) v. Höhn.“

Der vorliegende Pilz hat dunkeloliven- oder schwarzbraune, parenchymatische Gehäuse und 12—38 μ lange, 2—4 μ breite Konidien. Es handelt sich hier in der Tat nur um eine Spätherbstform der *Septoria dianthi*, von welcher *S. carthusianorum* West. gewiß nicht verschieden ist. In Gesellschaft des Pilzes wachsen verschiedene dematioide Hyphomyzeten und *Vermicularia dianthi* West., die wohl nur eine Substratform von *V. herbarum* West. sein wird. Petrak.

3291. *Septoria cannabis* (Lasch) Sacc.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: in foliis vivis *Cannabis sativae* cult. in horto botanico Universitatis Rigensis, m. Jul.

leg. et det. K. Starcs.

3292. **Septoria heraclei** Lib.

Salisburgia: in foliis vivis *Heraclei sphondylii* in pratis pr. Grödig, m. Oct. leg. J. Dörfler.

Findet sich stets in Gesellschaft unreifer Perithezien der zugehörigen Schlauchform *Mycosphaerella heraclei* (Fr.).

3293. **Septoria melissae** Desm.

Hungaria, Budapest: in foliis vivis vel languescentibus *Melissae officinalis* in horto „Gyogynövény telep“, m. Nov.

det. G. von Moesz, leg. B. Augustin, comm. G. von Moesz.

Wie bei den meisten auf Labiaten wachsenden *Septoria*-Arten sind auch hier viele Flecken ganz steril. Pykniden sind nur zufällig und ganz vereinzelt anzutreffen.

3294. **Septoria robiniae** (Lib.) Desm.

Hungaria: in foliis vivis *Robiniae pseudacaciae* pr. Aranyosmarót, m. Aug. leg. et det. G. von Moesz.

3295. **Stagonospora brachypodii** Died.

Moravia: in foliis emortuis *Brachypodii silvatici* pr. Sternberg, m. Majo. leg. J. Piskorč, comm. F. Petrák.

3296. **Arthrobotryum caudatum** Syd.

Ins. Philippinensis, Antipolo, prov. Rizal: in foliis vivis *Anacardii occidentalis*, m. Aug. leg. M. Ramos.

3297. **Cercospora fraxini** (DC.) Sacc.

Austria inf.: in foliis vivis vel languescentibus *Fraxini excelsioris* pr. Drösing, m. Oct. leg. K. Rechinger sen.

In Gesellschaft der *Cercospora* finden sich auf allen Blättern auch schon die jungen Perithezien der zugehörigen Schlauchfruchtform *Mycosphaerella fraxini* (Niessl.).

3298. **Cercospora litseaë-glutinosae** Syd.

Ins. Philippinenses, prov. Rizal, Antipolo: in foliis vivis *Litseaë glutinosae*, m. Aug. leg. M. Ramos.

3299. **Cristulariella depraedans** (Cooke) v. Höhn.

Thuringia: in foliis vivis *Aceris pseudoplatani* in monte „Inselsberg“, m. Sept. leg. J. Bornmüller.

3300. **Papularia sphaerosperma** (Pers.) v. Höhn.

Italia: in culmis emortuis *Phyllostachydis mitis* pr. Meran, m. Dec. leg. E. Schmoranz.

Addenda.

815. **Coleosporium campanulae** (Pers.) Lév.

b) *Helvetia*, Zürich: in foliis vivis *Michauxiae campanuloidis* cult.
in horto botanico Universitatis, m. Aug. leg. H. Schinz.

40. **Puccinia arenariae** (Schum.) Wint.

c) *Helvetia*, Zürich: in foliis vivis *Dianthi barbati* in hortis, m.
Aug. leg. J. Riniker.

31. **Puccinia bullata** (Pers.) Wint.

c) *Thuringia*: in foliis vivis *Silai pratensis* in pratis ad pag.
Ehringsdorf pr. Weimar, m. Sept. leg. et det. J. Bornmüller.

2713. **Puccinia bupleuri-falcata** (DC.) Wint.

b) *Romania*, distr. Jassy: ad folia viva *Bupleuri rotundifolii* in
pratis silvaticis prope pag. Carlig, m. Jun.

leg. J. C. Constantineanu.

924. **Puccinia carduorum** Jacky.

b) *Austria* inf.: ad folia viva *Cardui crispis* in fructicetis ad pag.
Weidlingau pr. Wien, m. Jul. leg. et det. F. von Höhnel.

2306. **Puccinia centaureae** Mart.

c) *Thuringia*: in foliis vivis *Centaureae scabiosae* ad vias pr.
Weimar, m. Sept. leg. et det. J. Bornmüller.

1121. **Puccinia chaerophylli** Purt.

b) *Germania*, Montes Rhön: in foliis vivis *Chaerophylli aurei* ad
pag. Stetten, m. Aug. leg. J. Bornmüller.

2714. **Puccinia coronifera** Kleb.

b) *Romania*, distr. Ilfov: ad folia viva *Arrhenatheri elatioris* in
horto botanico Bucuresti-Cotroceni, m. Oct.

leg. J. C. Constantineanu.

Die vorliegende Kollektion entspricht der Form *f. arrhenatheri* Kleb.

2104. **Puccinia dispersa** Er. et Henn.

b) *Dania*, Själland: Aecidia ad folia viva *Lycopsis arvensis* pr.
Lyngby, m. Aug. leg. J. Lind.

2004. **Puccinia festucae** Plowr.

b) *Tirolia austr.*: Aecidia ad folia viva *Lonicerae nigrae* in reg.
subalp. montis Latemar, Karersee, m. Jul.

leg. et det. J. Bornmüller.

1405. **Puccinia epilobii** D. C.

b) *Suecia*, Lapponia tornensis: in foliis vivis *Epilobii palustris* pr.
Abisko, m. Jul. leg. et det. T. Vestergren.

2307. **Puccinia involvens** (Voss) Syd.

b) Romania, distr. Suceava: Aecidia ad folia viva *Myricariae germanicae* ad ripas rivulorum Borca et Burnar, m. Jul.

leg. J. C. Constantineanu.

915. **Puccinia iridis** (DC.) Wallr.

c) Bohemia, Senftenberg: ad folia viva *Iridis pumilae* in hortis, m. Sept.

leg. F. Hanausek.

2909. **Puccinia lampsanae** (Schultz.) Fuck.

b) Suecia, Södermanland: Aecidia ad folia viva *Lampsanae communis* pr. Nacka, m. Majo.

leg. et det. T. Vestergren.

38. **Puccinia liliacearum** Duby.

b) Austria inf.: ad folia viva *Ornithogali umbellati* ad ripas fl. Traisen pr. Traismauer, m. Majo.

leg. et det. K. Keissler.

1305. **Puccinia Magnusiana** Koern.

c) Hungaria: in foliis *Ranunculi repentis* pr. Nagy Györ, Com. Ung, m. Aug.

leg. A. Magocsy-Dietz.

808. **Puccinia oreoselini** (Strauss) Fuck.

b) Bavaria: in foliis vivis *Peucedani oreoselini* pr. Mittenwald, m. Jul.

leg. et det. J. Bornmüller.

26. **Puccinia porri** (Sow.) Wint.

b) Helvetia: ad folia viva *Allii schoenoprasii* in horto botanico Universitatis Zürich, m. Oct.

leg. A. U. Däniker.

805. **Puccinia retifera** Liro.

b) Suecia, Stockholm: Aecidia in foliis vivis *Chaerophylli bulbosi* in plantis subsppontaneis ad Experimentalfältet, m. Jun.

leg. et det. T. Vestergren.

2715. **Puccinia silvatica** Schröt.

b) Carinthia: Aecidia ad folia viva *Senecionis Fuchsii* in valle „Kötschachtal“, m. Jun.

leg. G. Beck.

1409. **Puccinia violae** (Schum.) DC.

b) Austria inf.: Aecidia ad folia viva *Violae austriacae* pr. Unterwaltersdorf, m. Majo.

leg. S. Stockmayer.

c) Thuringia: ad folia viva *Violae odoratae* in pratis pr. Weimar, m. Sept.

leg. et det. J. Bornmüller.

1133. **Pucciniastrum abieti-chamaenerii** Kleb.

b) Romania, distr. Gorj: Aecidia ad folia viva *Abietis pectinatae* in alpe Zanoaga, m. Aug.

leg. J. C. Constantineanu.

Die Unterscheidungsmerkmale der auf *Abies* lebenden Äzidien werden in den mykologischen Handbüchern nicht scharf genug hervorgehoben.

Die Sporen des vorliegenden Pilzes unterscheiden sich von dem nächstverwandten *Aecidium* der *Melampsorella symphyti* Bub. durch geringere Größe, größere Unregelmäßigkeit — sie sind nämlich mehr oder weniger stumpfleckig und kantig — durch etwas kleinere Warzen und durch ein dünneres Epispor.

Petrak.

1702. ***Uromyces aconiti-lycoctoni* (DC.) Wint.**

b) Romania, distr. Suceava: ad folia viva *Aconiti moldavici* in umbrosis silvaticis ad Hâravaia pr. Brosteni, m. Jul.

leg. J. C. Constantineanu.

909. ***Uromyces daetylidis* Otth.**

b) Dania: Aecidia ad folia viva *Ranunculi repentis* pr. Lyngby, m. Jun.

leg. et det. J. Lind.

35. ***Uromyces junci* (Desm.) Tul.**

b) Styria: in foliis culmisque *Junci tenuis* loco dicto „Laßnitzhöhe“ pr. Graz, m. Sept.

det. H. Sydow, leg. G. von Moesz.

3101. ***Uromyces limonii* (DC.) Liro.**

b) Romania, distr. Ilfov: in foliis caulibusque subvivis vel emortuis *Statices latifoliae* in horto botanico Bucuresti-Cotroceni, m. Oct.

leg. J. C. Constantineanu.

2902. ***Uromyces onobrychidis* (Desm.) Lév.**

b) Romania, distr. Vlasca: ad folia viva *Onobrychidis sativae* in pratis ad Vidra, m. Oct.

leg. J. C. Constantineanu.

1103. ***Uromyces valerianae* (Schum.) Wint.**

b) Germania, Montes Rhön: ad folia viva *Valerianae dioicae* in fageticis montis „Rother Berg“ prope pagum Roth, m. Aug.

leg. et det. J. Bornmüller.

901. ***Ustilago perennans* Rostr.**

b) Austria inf.: in ovariis vivis *Arrhenatheri avenacei* in pratis secus viam ferream inter Tullnerbach et Preßbaum, m. Jun.

leg. et det. F. von Höhnel.

320. ***Peniophora quercina* (Fr.) Cooke.**

b) Austria inf.: in ramis emortuis *Quercus roboris* in monte Hermannskogel pr. Wien, m. Oct.

det. F. von Höhnel, leg. K. Rechinger sen.

2919. ***Pleurotus ostreatus* (Jacqu.) Sacc.**

b) Austria inf.: ad truncum *Aceris campestris* in horto „Rathauspark“ dicto in urbe Wien, m. Nov. leg. et det. K. H. Rechinger fil.

1806. ***Septobasidium Carestianum* Bres.**

c) Austria inf.: ad ramulos vivos *Salicis purpureae* pr. Sonntagsberg, m. Sept.

det. J. Bresadola, leg. P. Strasser.

515. **Diatrype disciformis** (Hoffm.) Fr.

b) Moravia orient., Montes „Beskiden“: in ramis emortuis *Fagi silvaticae* in monte Javornik, m. Aug. leg. F. Matouschek.

2117. **Gnomoniella tubaeformis** (Fr.) Sacc.

b) Polonia: ad folia emortua putrescentia *Alni glutinosae* in silva „Werschetitzer Wald“ pr. Luck, m. Apr. leg. O. von Müller.

Bei dieser Art wird gewöhnlich Tode als Autor zitiert, was aber ganz falsch ist. In Fung. Mecklenb. Select. Fasc. II. pag. 51 (1791) werden für *Sphaeria tubaeformis* Tode als Nährpflanzen *Fagus*, *Carpinus* und *Betula* angeführt. *Alnus* wird überhaupt nicht genannt. Daraus folgt mit Sicherheit, daß Tode unter seiner *Sph. tubaeformis* den Pilz auf *Alnus* nicht verstanden hat. Todes Pilz ist wahrscheinlich mit *Gnomonia errabunda* (Rob.) Auersw. identisch.

Für die Feststellung der Nomenklatur unserer Art ist zunächst Fries Syst. Mycol. II./2. p. 516 (1823) maßgebend. Die hier angeführte *Sphaeria tubaeformis* soll auf *Alnus*, *Betula*, *Fagus*, *Corylus*, *Carpinus*, *Ulmus* und *Liriodendron* wachsen, ist also noch eine ärgere Mischart als der von Tode beschriebene Pilz. Es ist aber klar, daß spätere Autoren sich gerade durch den Umstand, daß Fries an erster Stelle *Alnus* als Nährpflanze anführt, bestimmen ließen, unseren Pilz als *Sphaeria tubaeformis* zu bezeichnen. Es wird sich daher empfehlen, an dieser Auffassung auch in Zukunft festzuhalten. Dann aber muß Fries an erster Stelle als Autor des Namens *Gnomoniella tubaeformis* gelten, weil Tode den Erlenpilz gewiß nicht darunter verstanden hat. Petrak.

126. **Microspheara astragali** (D. C.) Trev.

c) Latvia, prov. Kurzeme: in foliis caulibusque *Astragali arenarii* in litore maris pr. Liepaja, m. Sept. leg. K. Starcs.

729. **Ectostroma liriodendri** Fr.

b) Thuringia: in foliis vivis et languescentibus *Liriodendri tulipiferae* in horto „Belvedere“ dicto, Weimar, m. Oct.

leg. J. Bornmüller.

2738. **Septomyxa Tulasnei** (Sacc.) v. Höhn.

b) Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: in fructibus emortuis *Aceris negundinis* in hortis pr. Riga, m. Dec. leg. K. Starcs.

1464. **Septoria lamii** Pass.

b) Carinthia: in foliis vivis et languescentibus *Lamii orvalae* ad Veldes, m. Jul. leg. K. Keissler.

1836. **Heterosporium gracile** Sacc.

b) Graecia: ad folia viva *Iridis pseudacori* in horto botanico Atheniensi, m. Apr. leg. et det. F. von Höhnel.

1490. *Ramularia cylindroides* Sacc.

b) Austria inf.: ad folia viva *Pulmonariae officinalis* in horto botanico Vindobonensi, m. Jul.
leg. R. Wettstein.

Cent. XXXIV.

Unter Mitwirkung der Herren:

J. Bär	F. Greinich	† P. Magnus	H. Schinz
† J. Bäumler	† H. Handel-	G. von Moesz	E. Schmid
J. Baumgartner	Mazzetti	J. A. Nannfeldt	† J. Schuler
† G. von Beck	† F. v. Höhnel	F. Petrak	H. Smith
J. Bornmüller	H. Huber	R. Picbauer	P. Strasser
Bouly de Lesdain	C. Keissler	K. Rechinger sen.	J. Tuzson
† J. Brunnthaler	† A. Kmet	K. H. Rechinger	† P. B. Wagner
A. M. Däniker	† F. Krasser	fil.	† A. Zahlbruckner
J. Dörfler	K. Lohwag	G. Samuelsson	A. Zander
F. Filarszky	† A. Magocsy-Dietz	† G. Schellenberg	† H. Zimmermann

herausgegeben

von der botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien.

Fungi (Decas 132—141).

3301. *Arcyria denudata* (L.) Wettst.

In truncis putridis arborum frondosarum.

Helvetia, Zürich: Wehrenbachtobel, Zürichberg, m. Nov.

leg. A. U. Däniker, E. Schmid, J. Bär.

3302. *Trichia varia* Pers.

In truncis putridis.

Germania, Austria inf.: Sonntagberg, m. Aug.

leg. et det. P. B. Wagner.

3303. *Peronospora aestivalis* Gäum.

In foliis vivis *Medicaginis sativae*.

Tirolia: in pratis ad pagum Sillian, m. Jul.

leg. et det. C. Keissler.

3304. *Peronospora boni henrici* Gäum.

In foliis vivis *Chenopodii boni henrici*.

Italia borealis: Cortina d'Ampezzo, m. Jun.

leg. et det. C. Keissler.

3305. *Peronospora litoralis* Gäum.

In foliis vivis *Atriplicis hastati*.

Hungaria: in pratis Szunyog puszta prope Sachóza, m. Aug.

leg. et det. G. de Moesz.

3306. **Phytophthora infestans** (Mont.) de Bary.

In foliis *Solani tuberosi*.

Germania, Austria inf.: in agris ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Jul. leg. P. Strasser.

3307. **Entyloma arnoseridis** Syd.

In foliis vivis *Arnoseridis minimae*.

Germania, Brandenburg: in agris ad pagum Skaby, m. Jun. leg. P. Magnus.

3308. **Entyloma fuscum** Schröt.

In foliis *Papaveris somniferi*.

Hungaria: Püspök alagi puszta prope oppidum Mezőrs, m. Jul. leg. et det. G. de Moesz.

3309. **Sphaelotheca hydropiperis** (Schum.) de Bary.

In ovariis *Polygoni hydropiperis*.

Helvetia, Tessin: ad Agnuzzo prope Lugano, m. Sept. leg. H. Schinz.

3310. **Tilletia tritici** (Bjerk.) Wint.

In ovariis *Tritici sativi*.

Austria inf.: in agris ad Judenau prope urbem Tulln, m. Jul. leg. G. de Beck.

3311. **Ustilago maydis** (DC.) Tul.

In culmis, ovariis, foliis vivis *Zeae maydis*.

Germania, Austria inf.: in agris ad urbem Korneuburg, m. Aug. leg. G. de Beck.

3312. **Ustilago tragopogonis pratensis** (Pers.) Roussel.

In capitulis vivis *Tragopogonis pratensis*.

Germania, Austria inf.: in pratis loco dicto Forsthof in monte Schöpfel, m. Majo. leg. F. Krasser et A. Zahlbruckner.

3313. **Coleosporum petasitis** Lév.

In foliis vivis *Petasitidis hybri*.

Hungaria bor.: in valle Nefeletej prope baln. Vihuye, com. Bars, m. Aug. leg. A. Magocsy-Dietz.

3314. **Endophyllum sempervivi** (Alb. et Schw.) de Bary.

In foliis vivis *Sempervivi* spec.

Germania, Austria inf.: Bierhäuserberg ad pagum Rodaun prope urbem Vindobonam, m. Apr. leg. et det. F. de Höhnel.

3315. **Gymnosporangium sabinae** (Dicks.) Wint.

In foliis *Piri communis*.

Germania, Austria inf.: in hortis ad pagum Hinterbrühl prope urbem Mödling, m. Sept. leg. et det. F. de Höhnel.

3316. **Puccinia cari-bistortae** Kleb.

In foliis vivis *Polygoni bistortae*.

Germania, Austria inf.: in pratis humidis ad pagum Arbesbach prope urbem Zwettl, m. Aug. leg. A. Zahlbruckner.

3317. **Puccinia circaeae** Pers.

In foliis *Circaeae lutetianae*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Aug. leg. et det. P. Strasser.

3318. **Puccinia cirsii-lanceolati** Schroet.

Ad folia viva *Cirsii lanceolati*.

Germania, Austria inf.: in pratis ad Sonntagberg prope Rosenau, m. Aug. leg. P. Strasser.

3319. **Puccinia de Baryana** Thüm.

In foliis vivis *Anemones silvestris*.

Germania, Thuringia: Rosenberg ad urbem Berka a/Ilm, m. Oct. leg. et det. J. Bornmüller.

3320. **Puccinia oblongata** (Link.) Wint.

In foliis vivis *Luzulae pilosae*.

Germania, Thuringia: in fagetorum locis humidiusculis montis Kleiner Ettersberg prope urbem Weimar, m. Oct. leg. et det. J. Bornmüller.

3321. **Puccinia moliniae** Tul.

In foliis vivis *Moliniae coeruleae*.

Moravia: in pratis inter Čejč et Mutěnice, m. Oct. leg. et det. R. Picbauer.

3322. **Puccinia peucedani-alsatici** Pieb.

In foliis vivis *Peucedani alsatici*.

Germania, Thuringia: in declivitatibus calcareis inter montem arcis Wachsenburg et pagum Haarhausen, m. Sept. leg. J. Bornmüller.

3323. **Puccinia pulsatillae** (Op.) Rostr.

In foliis vivis *Pulsatillae* spec.

Italia bor., Tirolia austr.: in monte Küchelberg prope urbem Meran, m. Majo. leg. J. Bäumler.

3324. **Puccinia punctata** Link.

In foliis et caulibus vivis *Galii ochroleuci* Kit.

Hungaria: Somogy prope Balaton-Földvar, m. Jul. leg. A. Magocsy-Dietz.

3325. **Puccinia sileris** Voss.

In foliis vivis *Sileris trilobi*.

Germania, Austria inf.: in monte Leopoldsberg prope urbem Wien, m. Aug. leg. J. Baumgartner.

3326. **Uredo anthoxanthina** Bub.

In foliis vivis *Anthoxanthi odorati*.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: in horto botanico universitatis Rigensis, m. Nov. leg. et det. K. Starcs.

3327. **Uromyces cacaliae** (DC.) Ung.

In foliis vivis *Adenostyliidis glabrae*.

Germania, Styria super.: in valle Boschberg montis Hochschwab, m. Aug. leg. A. Magocsy-Dietz.

3328. **Uromyces pisi** (Pers.) de Bary.

In foliis caulibusque vivis *Pisi sativi*.

Hungaria bor.: ad Vihnye, com. Bars, m. Aug.

leg. A. Magocsy-Dietz.

3329. **Uromyces polygoni** (Pers.) Fuck.

a) In foliis vivis *Polygoni avicularis*.

Germania, Austria inf.: Pfalzau ad pagum Preßbaum in montibus Wienerwald, m. Jul. leg. F. de Höhnel.

b) In foliis vivis *Polygoni heterophylli*.

Norvegia, Nordland, Ofoten: Haakviken prope Ankenes in litore glareoso, m. Aug. leg. G. Samuelsson et A. Zander.

3330. **Ustilago tragopogi-pratensis** (Pers.) Roussel.

In capitulis vivis *Tragopogonis pratensis*.

Austria inf.: in pratis ad pagum Purkersdorf in montibus Wienerwald, m. Majo. leg. et det. F. de Höhnel.

3331. **Coriolus hirsutus** (Wulf.) Quél.

In truncis putridis.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Sept. leg. P. Strasser.

3332. **Coriolus versicolor** (L.) Quél.

In truncis putridis *Aceris pseudoplatani* et *Fagi silvaticae*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Aug. leg. P. Strasser.

3333. **Exidia pithya** Fr.

In truncis corticatis emortuis *Piceae excelsae*, m. Apr.

Suecia, Uppsala: ad Nantuna, m. Apr.

leg. et det. J. A. Nannfeldt.

3334. **Fomes trivialis** (Fr.) Bres.

In truncis emortuis *Salicis* spec.

Germania, Austria inf.: ad ripas rivuli Edlesbach ad pagum Wiesen-Sigless prope urbem Wiener-Neustadt, m. Oct.

det. J. Bresadola, leg. H. Huber.

3335. **Hymenochaete rubiginosa** Dicks.

In truncis emortuis.

Germania, Austria inf.: loco dicto „Prater“ ad urbem Vindobonam, m. Aug. leg. K. Rechinger sen.

3336. **Phellinus ignarius** (L.) Pat.

In truncis et ramis *Fagi silvatici*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Sept. leg. P. Strasser.

3337. **Thelephora terrestris** (Ehrh.) Fr.

In silvis *Coniferarum* ad terram.

Germania, Carinthia: in monte Neussen prope Kötschach, m. Aug. leg. et det. K. Rechinger sen.

3338. **Ungulina annosa** (Fr.) Pat.

In truncis putridis *Coniferarum*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Sept. leg. et det. P. Strasser.

3339. **Xanthochrous ribis** (Schum.) Pat., f. **evonymi** (Kalchbr.) Bourd. et Galz.

In truncis *Evonymi verrucosae*.

Germania, Austria inf.: in silvis montis Georgenberg ad pagum Purkersdorf prope urbem Vindobonam, m. Apr.

leg. et det. K. Keissler.

3340. **Diaporthe decorticans** (Lib.) Sacc. et Roum.

In ramis emortuis *Pruni padi*.

Germania, Austria inf.: in silvaticis ad flumen Danuvium prope urbem Klosterneuburg, m. Apr. leg. K. H. Rechinger fil.

3341. **Diatrype stigma** (Hoffm.) Fr.

In ramis emortuis.

Helvetia, Zürich: in horto botanico, m. Apr. leg. G. Schellenberg.

3342. **Dichaena faginea** (Pers.) Fr.

In ramis emortuis vel vivis *Fagi silvaticae*.

Germania, Austria inf.: in monte Sonntagberg prope Rosenau, m. Aug. leg. P. Strasser.

3343. **Erysiphe aquilegiae** DC.

In foliis vivis *Actaeae spicatae*.

Germania, Thuringia: in monte Ettersberg prope urbem Weimar, m. Sept. leg. J. Bornmüller.

3344. **Erysiphe convolvuli** DC.

In foliis vivis *Convolvuli arvensis*.

Germania, Austria inf.: Soos ad urbem Baden, m. Sept.

leg. J. Brunnthaler.

3345. **Erysiphe galeopsidis** DC.

In foliis vivis *Stachydis palustris*.

Hungaria: in horto Migazzy ad Aranyosmarot, com. Bars, m. Sept.
leg. F. Filarszky et G. Moesz.

3346. **Erysiphe graminis** DC.

In foliis vivis *Tritici vulgaris*.

Germania, Austria inf.: in agris ad urbem Mödling, m. Jun.
leg. et det. K. Keissler.

3347. **Erysiphe horridula** (Wallr.) Lév.

a) In foliis vivis *Sympyti tuberosi*.

Hungaria: Aranyosmarot, com. Bars, m. Jun.
leg. G. de Moesz.

b) In foliis vivis *Sympyti tuberosi*.

Germania, Salisburgia: in pratis montis Heuberg ad urbem Salzburg, m. Oct.
leg. J. Dörfler.

3348. **Erysiphe lamprocarpa** (Wallr.) Duby.

In foliis vivis *Plantaginis majoris*.

Germania, Austria inf.: ad viarum margines, Sonntagberg pr.
Rosenau, m. Aug. leg. P. Strasser.

3349. **Erysiphe nitida** (Wallr.) Rabh.

In foliis vivis *Paeoniae* spec. cult.

Germania, Tirolia: Gries, in hortis, m. Aug.

leg. J. Bornmüller.

3350. **Hysterographium fraxini** (Pers.) de Not.

In ramis emortuis *Fraxini excelsioris*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad Sonntagberg prope Rosenberg,
m. Apr. leg. P. Strasser.

3351. **Leptentypa Fuckelii** (Nitsch.) Petr.

In ramis emortuis *Tiliae platyphyliae*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Seehof prope Lunz,
m. Jul. leg. F. Petrák.

3352. **Leptosphaeria clivensis** (Berk. et Br.) Sacc.

In caulibus emortuis *Libanotidis montanae*.

Germania, Austria inf.: in monte Pfaffenberg prope Deutsch-Altenburg, m. Jul. leg. J. Baumgartner et K. Lohwag.

3353. **Leptosphaeria erigerontis** Berl.

In caulibus emortuis *Erigerontis canadensis*.

Germania, Austria inf.: in silvis caesis ad Sonntagberg prope
Rosenau, m. Jul. leg. P. Strasser.

3354. **Leptosphaeria purpurea** Rehm.

In caulibus emortuis *Cardui crispi*.

Germania, Austria inf.: in silvaticis ad flumen Danuvium prope urbem Klosterneuburg, m. Apr. leg. K. H. Rechinger fil.

3355. **Massaria inquinans** (Tode) Ces. et de Not.

In ramis emortuis *Aceris pseudoplatani*.

Germania, Austria inf.: ad pagum Seehof prope Lunz, m. Jul. leg. F. Petrak.

3356. **Melanconis Desmazieri** Petr.

In ramis emortuis *Tiliae platyphyliae*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Seehof prope Lunz, m. Jul. leg. F. Petrak.

3357. **Mycosphaerella podagrariae** (Roth) A. Poteb.

In foliis vivis *Aegopodii podagrariae*.

Helvetia, Zürich: in loco publico funeribus destinato Rehalp dicto, m. Oct. leg. H. Schinz.

3358. **Nectria charticola** (Fuck.) Sacc.

In charta putrida.

Gallia, Bretagne: St. Malo, in litore maris, m. Mart.

leg. Bouly de Lesdain.

In Gesellschaft dieser Art wachsen oft verschiedene andere Pilze.

3359. **Ophiobolus tenellus** (Auersw.) Sacc.

In caulibus emortuis *Gnaphalii silvatici*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad Sonntagberg prope Rosenau, m. Jun. leg. P. Strasser.

3360. **Phyllachora graminis** (Pers.) Fuck.

a) In foliis vivis vel emortuis *Brachypodii silvatici*.

Moravia austr.: in silva Oberwald inter pagos Neudeck et Eisgrub, m. Oct. leg. H. Zimmermann.

b) In foliis vivis vel emortuis *Elymi europaei*.

Germania, Thuringia: Adelsberg prope Berka a. Ilm, m. Oct.

leg. J. Bornmüller.

3361. **Pleospora chartarum** Fuck.

In charta putrida.

Gallia, Bretagne: St. Malo in litore maris, m. Oct.

leg. Bouly de Lesdain.

In Gesellschaft dieser Art wachsen oft verschiedene andere Pilze.

3362. **Pseudosphaeria myrtillina** (Fautr. et Sacc.) v. Höhn.

In foliis vivis *Vaccinii myrtilli*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad lacum Obersee dictum prope pagum Lunz, m. Aug. leg. F. Petrak.

3363. **Seynesiella juniperi** (Desm.) Arn.

In foliis vivis *Juniperi communis*.

Slovacia: in silvis ad Trencsin-Tepla, m. Majo.

leg. J. Bäumler.

3364. **Sphaerotheca fuliginea** (Schlecht.) Salm.

In foliis vivis *Veronicae* spec.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Riga: Riga, in hortis, m. Sept.

leg. K. Starcs.

3365. **Sphaerotheca fusca** (Fr.) Blumer.

In foliis vivis *Impatientis noli tangere*.

Hungaria: in silvaticis ad rivulum Csarad prope Aranyosmarot,

m. Aug. leg. G. von Moesz.

3366. **Taphrina alni-incanae** (Kühn) Magn.

In amentis *Alni incanae*.

Hungaria: prope pagum Tatraháza, com. Szepes, m. Jun.

leg. A. Magocsy-Dietz.

3367. **Taphrina epiphylla** (Sad.) Sacc.

In foliis vivis *Alni* spec.

Suecia, Torne Lappmark, Juckasjärvi sn: Abisko, m. Jul.

leg. H. Smith.

3368. **Taphrina pruni** (Fuck.) Tul.

In fructibus *Pruni domesticae*.

Germania, Austria inf.: Sonntagberg prope Rosenau in hortis, m.

Jul. leg. P. Strasser.

3369. **Dasyseypha fuscosanguinea** Rehm.

In ramis emortuis *Pini mughi*.

Germania, Tirolia: Kloster Waldraast in valle Stubai, m. Aug.

leg. Schuler.

Über Synonymie und Nomenklatur dieser Art hat Petrák in Krypt. Forsch. Bayer. Bot. Ges. II. Nr. 2. p. 177 (1931) ausführlich berichtet.

3370. **Fabraea astrantiae** (Ces.) Rehm.

In foliis vivis et languidis *Astrantiae majoris*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Seehof prope Lunz, m. Jul. leg. F. Petrák.

3371. **Hysteropezizella subvelata** (Rehm.) v. Höhr.

In foliis emortuis *Sesleriae coeruleae*.

Germania, Austria inf.: in monte Hundsheimerkogel prope Hainburg, m. Majo. leg. F. Petrák.

3372. **Lophodermium versicolor** (Wg.) Schört.

Suecia, Torne Lappmark, Jukkasjärvi: Abisko, m. Jul.

leg. et det. J. A. Nannfeldt.

3373. **Lamprospora modesta** (Karst.) J. A. Nannf. in Svensk. Bot. Tidsskr. XXII. p. 117 (1928).
Ad terram inter muscos.
Suecia, Torne Lappmark, Jukkasjärvi: Abisko, m. Jul.
leg. et det. J. A. Nannfeldt.
3374. **Ascochyta mercurialis** Bres.
In foliis vivis *Mercurialis perennis*.
Germania, Austria inf.: in silvis ad lacum Untersee prope pagum Lunz, m. Jul.
leg. F. Petrak.
3375. **Ascochyta syringae** Bres.
In foliis vivis *Syringae vulgaris*.
Latvia, prov. Vidzeme, distr. Cesis: in hortis, m. Jul.
leg. et det. K. Starcs.
3376. **Botryodiplodia fraxini** (Lib.) Sacc.
In ramis emortuis *Syringae vulgaris*.
Germania, Austria inf.: in silvaticis ad flumen Danuvium prope urbem Klosterneuburg, m. Apr.
leg. F. Petrak.
3377. **Cytospora chrysosperma** (Pers.) Fr.
In ramis emortuis *Populi nigrae*.
Germania, Austria inf.: in silvaticis loco Prater dicto ad urbem Vindobonam, m. Apr.
leg. K. Rechinger sen.
3378. **Leptothyrium botryoides** Sacc.
In foliis emortuis *Fagi silvaticae*.
Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope pagum Rosenau, m. Jul.
leg. P. Strasser.
Ist die Konidienform von *Coccomyces coronatus* (Schum.) Rehm.
3379. **Marssonina populi** (Lib.) P. Magn.
In foliis emortuis *Populi nigrae*.
Germania, Austria inf.: ad ripam fluminis Danuvii prope pagum Kaiser-Ebersdorf ad urbem Vindobonam, m. Aug.
leg. F. Petrak.
3380. **Marssonina violae** (Pass.) P. Magn.
In foliis vivis et languidis *Violae biflorae*.
Germania, Austria inf.: in silvis ad lacum Obersee prope pagum Lunz, m. Aug.
leg. F. Petrak.
3381. **Passalora depressa** (B. et Br.) v. Höhn.
In foliis vivis et languidis *Imperatoriae ostruthii*.
Germania, Silesia: in alpinis montium Riesengebirge loco Kleiner Teich dicto, m. Aug.
leg. J. Bornmüller.

3382. **Passalora Schnabliana** (Allesch.) Petr.

In foliis vivis *Cardui personatae*.

Helvetia: Arosa, ad margines silvarum, m. Aug.

leg. P. Magnus.

3383. **Phomopsis macilenta** (Rob.) Petr.

In ramulis emortuis *Staphyleae pinnatae*.

Germania, Austria inf.: in monte Braunsberg ad urbem Hainburg, m. Jun.

leg. C. Keissler.

3384. **Pyrenopeziza litigiosum** (Desm.) Died.

In petiolis emortuis *Pteridii aquilini*.

Germania, Austria inf.: Zehnthof ad Scheibbs, m. Majo.

leg. K. H. Rechinger fil.

3385. **Septoria berberidis** Niessl.

In foliis vivis *Berberidis vulgaris*.

Germania, Austria inf.: in silvaticis ad flumen Danuvium prope pagum Klosterneuburg, m. Sept.

leg. F. Petrak.

3386. **Septoria muscari** Brun.

In foliis vivis *Muscari comosum*.

Slovacia: in pratis ad urbem Prenčow, m. Jul.

leg. A. Kmet.

3387. **Septoria petroselini** Desm.

In foliis vivis *Petroselini sativi*.

Germania, Ostsudetenland: Sternberg in hortis, m. Aug.

leg. J. Pisková.

3388. **Septoria ribis** Desm.

In foliis vivis *Ribis nigri*.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: Vestiena, in hortis, m. Aug.

leg. et det. K. Starcs.

3389. **Sirodiplospora strobilina** (Desm.) Naum.

In squamis emortuis conorum *Piceae excelsae*.

Latvia, prov. Vidzeme, distr. Madona: in silva ad Vestiena, m. Apr.

leg. et det. K. Starcs.

3390. **Stagonospora subseriata** (Desm.) Sacc., var. *franconica* Petr.

In foliis emortuis *Sesleriae variae*.

Germania, Austria inf.: Gumpoldskirchen, m. Mart.

leg. C. Keissler.

3391. **Cercospora tuberculans** Ell. et Ev.

Ad folia in arbore mortua *Liquidambaris formosanae*.

China, prov. Hunan: prope urbem Tschangscha, m. Nov.

det. C. Keissler, leg. H. Handel-Mazzetti.

3392. **Cladosporium fuligineum** Bon.

In stromatibus *Epichloes typhinae*.

Germania, Austria inf.: ad pagum Mauerbach prope urbem Vindobonam, m. Jul. leg. et det. C. Keissler.

3393. **Ectostroma iridis** Fr.

In foliis vivis vel languidis *Iridis pseudacori*.

Latvia, prov. Zemgale, distr. Ilukste: Demene ad ripas fluminis, m. Jul. leg. et det. K. Starcs.

3394. **Exosporium tiliae** Link.

In ramis emortuis *Tiliae* spec.

Germania, Austria inf.: Scheibbs, ad pagum Zehnthal, m. Jun. leg. K. H. Rechinger fil.

3395. **Hadronema orbiculare** Syd.

Ad folia viva *Quercus oxyodontis*.

China, prov. Hunan austro-occ.: in monte Yün-schan prope urbem Wukang in silva elata frondosa, m. Jul.

det. C. Keissler, leg. H. Handel-Mazzetti.

3396. **Linodochium hyalinum** (Lib.) v. Höhn.

In foliis emortuis *Pini silvestris*.

Germania, Austria inf.: in silvis ad pagum Sonntagberg prope Rosenau, m. Mart. leg. P. Strasser.

3397. **Ramularia aromatica** (Sacc.) v. Höhn.

In foliis vivis vel languidis *Acori calami*.

Germania, Austria inf.: Steindorf ad lacum Ossiachersee, m. Jun. leg. C. Keissler.

3398. **Ramularia plantaginea** Sacc. et Berl.

In foliis vivis *Plantaginis lanceolatae*.

Hungaria: in pratis ad urbem Aranyosmarot, m. Jul. leg. G. de Moesz.

3399. **Ramularia taraxaci** Karst.

In foliis *Taraxaci officinalis*.

Hungaria: in pratis ad urbem Sükösd, m. Sept. leg. et det. G. de Moesz.

3400. **Sphacelia typhina** (Pers.) Sacc.

In culmis vivis *Calamagrostidis villosae*.

Slovacia: supra lacum Poprad in montibus Tatra, m. Aug. leg. J. Tuzson.

Corrigenda.

519. **Phyllachora cynodontis** (Sacc.) Niessl.

Ad folia et culmos *Cynodontis dactylonis*.

Slovacia: prope Preßburg. leg. J. A. Bäumler.

812. **Puccinia luzulae-sylvaticae** Diet. in Annal. Mycol. XVII. p. 57 (1919).

In foliis vivis *Luzulae maximae*.

Germania, Bohemia: ad lacum dictum „Schwarzer See“ in montibus qui „Böhmerwald“ dicuntur, m. Sept. leg. F. Bubák.

Addenda.

2218. **Melanconis alni** Tul.

b) In ramis emortuis *Alni viridis*.

Germania, Styria orient.: in monte Ringkogel ad Hartberg, m. Oct. leg. J. Baumgartner.

3026. **Allantoporthe tessella** (Pers.) Petr.

b) In ramis emortuis *Salicis* spec.

Germania, Austria inf.: ad ripas rivuli Seebach prope pagum Lunz, m. Jul. leg. F. Petrák.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Petrak Franz

Artikel/Article: [Schedae ad Cryptogamas exsiccatas, editae a Museo historiae naturalis Vindobonensi. 347-373](#)