

## Zwei neue Laubmoose aus Süd-Chile und Feuerland

Von Dr. Josef Froehlich, Wien

Eingegangen 30. Juni 1953

Die Untersuchung einer Anzahl von Laubmoosen, die Herr Prof. Martin Gusinde in den Jahren 1921 und 1922 in Süd-Chile, West-Patagonien und Feuerland sammelte und 1940 dem Naturhistorischen Museum in Wien überließ, ergab zwei für die Wissenschaft neue Arten, deren Beschreibungen folgen. Ihre Typen befinden sich im Herbar des Naturhistorischen Museums in Wien und in meinem Herbar.

### *Pseudodistichium taitaoense* Froehl. nov. spec.

Autoicum; ad 2,5 cm altum, dense caespitosum, subrufo-lutescens; caulis erectus, infra inflorescentiam divisus, ad 2,5 cm longus; folia erecto-patentia, e basi anguste elliptica vel lanceolata ca. 2,7 mm longa et ca. 0,75 mm lata, subvaginante in subulam ca. 1,3 mm longam, canaliculatam, apice pro more denticulatam producta; costa longe excurrens; cellulae inferiores partis subvaginantis lineares, obtusae, parietibus incrassatis, marginales tenerae, membranaceae, indistinctae, superiores breviores, oblongae vel ovatae vel subquadratae vel transverse dilatatae; folia perichaetalia basi vaginante longiore, laxius reticulata, subula minuta; capsula in pedicello ad 2 cm longo erecta, oblonga, basi rotundata, os versus leniter angustata, ca. 1,5 mm longa; flores masculi in ramulo proprio terminales, gemmiformes; folia perigonalia intima 2 obtusa, costa minute excurrente; antheridia numerosa, elongata, paraphysis aequilongis vel subaequilongis; cetera ignota.

Chile australis, peninsula Taitao, San Rafael inter 46° et 47° lat. austr.; leg. Martin Gusinde, 18. I. 1921.

Differt a congeneribus statura multo majora, a *P. austrogeorgico* Card. et *P. Brotherusii* (R. Br. ter.) Dix. capsula oblonga, erecta, a *P. Buchanani* (R. Br. ter.) Dix. cellulis superioribus partis subvaginantis folii irregularibus.

### *Grimmia (Rhabdogrammia) Gussindei* Froehl. nov. spec.

Dioica; gracilescens, pulvinata pulvinulis densis, superne lutescens, intus nigrescens; caulis erectus vel ascendens, ca. 1 cm altus, dense foliosus, fastigiatus ramosus ramis numerosis erectis; folia sicca adpressa, plus minusve distincte spiraliter circa caulem imbricata, humida erecto-patentia, carinata, lanceolata, acuta, 1,5—1,8 mm longa et 0,28—0,35 mm lata, inferiora mutica, superiora pilo hyalino, brevi, parce et minutissime

serrulato terminata, marginibus plus minusve reflexis, superne bistratosis; nervus continuus, 2 ducibus basalibus, paulum notatis; cellulae perincrasatae, valde sinuosae, supremae transversae rectangulæ vel ovalæ, superiores rotundato-quadratae, basin versus sensim longiores, basilares interiores lineares, minus sinuosae, 3—4 series marginales breviter rectangulæ, tenues, hyalinae, plus minusve usque ad medium ascendentes; bracteæ perichaetii paulo longiores et latiores, inferne laxius reticulatae; seta ad 5 mm longa, flexuosa; theca erecta vel nutans, plicis 8 vix conspicuis, siccitate magis prominulis, lutescens, ore sanguineo; peristomii dentes latiusculi, apice bifidi vel pertusi, aurantiaci, lamellis valde prominentibus; operculum obtuse conicum; calyptra mitraeformis.

Fuegia: Canal Beagle, leg. M. G u s i n d e, II. 1922, no. 359.

## Berichtigung zu Bryophyten aus Iran

(Rechingeri iter iranicum secundum — No. 9)

Von Dr. Josef F r ö e h l i c h, Wien

Eingegangen 30. Juni 1953

Der Name *Didymodon planifolius* F r ö e h l., Ann. Mus. Wien, v. 57, 1950, p. 38, muß, da homonym mit *D. planifolius* P. de la V. et Thér., Trav. br. déd. mém. de Husn., fasc. II, 1944, p. 11 (Haiti), geändert werden in *D. planotophaceus* F r ö e h l. nom. nov.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Fröhlich Josef

Artikel/Article: [Zwei neue Laubmose aus Süd-Chile und Feuerland. 117-118](#)