

Ergebnisse der Zoologischen Nubien-Expedition 1962

Teil XXIV

Dictyoptera, Orthoptera, Dermaptera

Von MAX BEIER

Manuskript eingelangt am 5. September 1963

Blattariae

det. K. PRINCIS

Supella longipalpe (F.) (= *supellectilium* auct.)

1 ♂, 1 ♀, Wadi Halfa, Nil-Hotel, 20.—31. 1. 1962. — In allen wärmeren Ländern weit verbreitet.

Blatta orientalis L.

1 Nymphe, Wadi Halfa, Nil-Hotel, 20.—25. 1. 1962.

Blatella germanica (L.)

1 ♀, 1 Nymphe, Assuan, Kitchener-Insel, 17. 1. 1962.

Mantodea

det. M. BEIER

Eremiaphila spec.

1 Junglarve, Wüste östlich Wadi Halfa, 1.—10. 2. 1962.

Heteronotus aegyptiacus LEFV.

1 ♂ Larve, Faras W., Tamariskendünen, 3. 2. 1962.

Sphodromantis viridis (FORSK.)

1 ♀ Larve, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 10. 2. 1962. — Süd-mediterrane Art.

Empusa pennata (THUNB.)

1 ♀ Larve, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 24. 1. 1962. — Mediterrane Art.

Blepharopsis mendica (F.)

1 ♀, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, auf Akazia seyal, 24. 1. 1962. — Süd-mediterrane Art.

Bei den meisten Arten sind Imagines offenbar erst ab März oder April zu erwarten.

Saltatoria

Gryllidae

det. L. CHOPARD

Gryllus bimaculatus DE GEER

5 ♀, Wadi Halfa, Nil-Oase, unter Steinen und Palmstämmen, 20. 1.—
10. 2. 1962; 1 ♂, 3 ♀, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 24. 1. und 10. 2. 1962.

Acheta domesticus L.

1 ♂, 3 ♀, Wadi Halfa, Nil-Oase, unter Steinen und Palmstämmen, 20. 1.—
10. 2. 1962; 1 ♂, 1 ♀, Faras W., Tamariskendünen, 3. 2. 1962; 1 ♀, 2. Nil-
katarakt, Ost-Ufer, unter Steinen, 10. 2. 1962.

Tartarogryllus burdigalensis (LATR.)

1 ♀, Wadi Halfa, 1.—10. 2. 1962; 1 ♀, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 10. 2.
1962. — Beide Individuen sind in ihrer Färbung abnormal dunkel, der
Kopf ist oberseits fast schwarz, die gelben Zeichnungen sind zum Teil
erloschen.

Modicogryllus spec.

1 Larve, Wadi Halfa, 20.—25. 1. 1962.

Pteronemobius hargreavesi CHOP.

1 ♀, Wadi Halfa, 1.—10. 2. 1962. — Diese in den Sammlungen selten
vertretene und möglicherweise nicht häufige Art war bisher nur aus West-
Afrika bekannt. Sie ist, wie die meisten Nemobiinae, wahrscheinlich in
den ihr zusagenden Landstrichen weit verbreitet.

Tettigoniidae

det. M. BEIER

Diogenia fausta (BURM.)

1 ♂ Larve, 2. Nil-Katarakt, Ost-Ufer, auf Akazia seyal, 10. 2. 1962. —
Anscheinend eine recht seltene, suberemische Art.

Acrididae

det. V. M. DIRSCH

Pyrgomorphinae

Chrotogonus homalodemus homalodemus (BLANCH.)

2 ♂, 13 ♀, 11 Nymphen, Wadi Halfa, Oasen-Rand, 20. 1.—10. 2. 1962
und 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 24. 1. und 10. 2. 1962. — In der offenen
Vegetation am Oasenrand und am Nilufer überall häufig.

Pyrgomorpha cognata (KRAUSS)

2 ♀, Wadi Halfa, 1.—10. 2. 1962.

*Euprepocnemidinae**Heteracris annulosus annulosus* (WALK.)

1 ♂, 4 ♀, 1 Nymphe, 2. Nilkatarakt, 24. 1., Khor Musa Pascha, 27. 1.,
Wadi Halfa, 1.—10. 2., Luxor, 19. 2. 1962.

*Cyrtacanthacridinae**Anacridium aegyptium* (L.)

1 ♀, 100 km südlich von Alexandrien, 24. 2. 1962.

Schistocerca gregaria (FORSK.) ph. *solitaria*

4 ♂, 6 ♀, 2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 24. 1. und 10. 2., Khor Musa Pascha,
27. 1. und 10. 2., Wadi Halfa, 1.—15. 2. und Sarra Ost, 11. 2. 1962.

*Acridinae**Aiolopus thalassinus* (F.)

7 ♂, 6 ♀, Wadi Halfa, Rasenfläche beim Nil-Hotel, 1.—15. 2. 1962.

Sphingonotus rubescens (WALK.)

11 ♂, 5 ♀, Wadi Halfa, 20. 1.—10. 2., Khor Musa Pascha, 27. 1., Faras
West, 3. 2. und Sarra Ost 11. 2. 1962. — Stets nur in offener Vegetation.

Acrotylus insubricus inficitus (WALK.)

9 ♂, 7 ♀, Assuan, 17. 1., Wadi Halfa, 20. 1.—10. 2., 2. Nilkatarakt, 24. 1.
1962. — Ebenfalls in offener Vegetation.

Calephorus compressicornis (LATR.)

5 ♂, 16 ♀, Wadi Halfa, Nil-Oase und Rasenflächen beim Nil-Hotel,
17. 1.—15. 2. 1962.

*Truxalinae**Ochrilidia* spec.

1 ♂, 2 Nymphen, Wadi Halfa, 1.—10. 2. 1962.

Tetrigidae

det. V. M. DIRSH

Paratettix meridionalis (RAMB.)

2 ♂, 6 ♀, Assuan, 17. 1., Wadi Halfa, 20.—31. 1. und 2. Nilkatarakt,
Ost-Ufer, 24. 1. 1962.

Tridactylidae

det. L. CHOPARD

Tridactylus variegatus LATR.

1 ♂, 3 ♀, 2. Nilkatarakt, am Nilufer, 24. 1. und 10. 2. 1962.

Tridactylus fasciatus GUÉR.

1 ♀, 2. Nilkatarakt, Nilufer, 10. 2. 1962.

Dermaptera

det. M. BEIER

Labiduridae

Labidura riparia (PALL.)

6 ♂, 15 ♀, 3 Nymphen, Wadi Halfa, 20. 1.—15. 2. 1962, 3 ♂, 3 ♀, 3 Nymphen
2. Nilkatarakt, Ost-Ufer, 24. 1. und 10. 2. 1962, 1 Nymphe, Assuan,
Kitchener-Insel, 17. 1. 1962. — In Ufernähe des Nils überall häufig.

Anisolabis annulipes (LUC.)

2 ♂, 2 ♀, Wadi Halfa, aus Rasen beim Nil-Hotel, 26.—31. 1. 1962.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [67](#)

Autor(en)/Author(s): Beier Max Walter Peter

Artikel/Article: [Ergebnisse der Zoologischen Nubien-Expedition 1962. Teil XXIV Dictyoptera, Orthoptera, Dermaptera. 607-610](#)