

Ergebnisse der von Dr. O. Paget und Dr. E. Kritscher auf Rhodos durchgeführten Exkursionen

Teil XI

Coleoptera, Fam. *Staphylinidae*

(125. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden)

Von OTTO SCHEERPELTZ

Manuskript eingelangt am 18. November 1963

Die nachstehend angeführten Arten stammen lediglich aus den Aufsammlungen des Jahres 1963. Die Staphyliniden der Sammelreise 1959 wurden bereits in den Annalen des Naturhistorischen Museums publiziert. (1960, v. 64, p. 135—138).

Subfam. *Oxytelinae*

Gen. *Oxytelus* Gravenhorst

O. (Subgen. *Anotylus* C. G. Thomson) *tetracarinatus* Block (Verz. Ins. Plauensch. Grund, 1799, p. 116).

Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♀. — Hohlakas (39), 30. 4. 1963, 3 ♀♀.

Die Art ist über die ganze paläarktische Faunenregion und große Teile der nearktischen Faunenregion weit verbreitet.

Gen. *Platystethus* Mannerheim

P. (Subgen. *Platystethus* s. str. C. G. Thomson) *nitens* Sahlberg (Ins. Fenn., I, 1834, p. 413).

Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über fast ganz Europa, das Mittelmeergebiet, die Canarischen Inseln, Kleinasien, den Kaukasus, Transkaukasien, den nördlichen Iran, Afghanistan, bis in den westlichen Himalaya verbreitet.

Gen. *Bledius* Mannerheim

B. (Subgen. *Bledius* s. str. Mulsant-Rey) *spectabilis* Kraatz (Naturg. Ins. Deutschl. Col. II, 1856—58, p. 821, nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 126; *ibid.* XII, 1868, p. 347).

Hohlakak (39), 30. 4. 1963, 10 ♀♀.

Die Art ist über Mittel-Europa, das östliche Süd-Europa, das östliche Mittelmeergebiet, Ägypten, Tunis, Oran, Kleinasien, Mesopotamien, Transkaspien, den Iran, bis nach Turkestan verbreitet.

B. (Subgen. *Bledius* s. str. Mulsant-Rey) *unicornis* Germar (Fauna Ins. Eur., XII, 1825, nr. 3).

Hohlakak (39), 30. 4. 1963, 3 ♀♀.

Die Art ist über Mittel- und Süd-Europa, das Mittelmeergebiet, Nordafrika, Kleinasien, Mesopotamien, den Kaukasus, Transkaukasien, bis in den Iran verbreitet.

Subfam. *Steninae*

Gen. *Stenus* Latreille

S. (Subgen. *Tesnus* Rey) *brunnipes* Stephens (Ill. Brit. Ent., V, 1832, p. 285) subsp. *corcyranus* Bondroit (Ann. Soc. Ent. Belg., LVI, 1912, p. 417).

Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♂.

Die ursprünglich von der jonischen Insel Korfu beschriebene, dann fast von der ganzen südlichen Hälfte der Balkanhalbinsel bekannt gewordene Rasse hat sich später als über das östliche Mittelmeergebiet und das westliche Kleinasien weit verbreitet herausgestellt.

S. (Subgen. *Parastenus* Heyden) *elegans* Rosenhauer (Thiere Andalusiens, 1856, p. 75).

Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 2 ♀♀. — Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 4 ♀♀. — Lindos, Burghang (19), 18. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über Süd-Europa, das Mittelmeergebiet und Nord-Afrika weit verbreitet.

Subfam. *Paederinae*

Gen. *Astenus* Stephens

A. (Subgen. *Astenus* s. str. Reitter-Coiffait) *longelytratus* Palm (Ent. Tidskr., LVII, 1936, p. 78 = *angustatus* auctor., nec Paykull).

Pilona (56), 15. 5. 1963, 1 vollkommen immatures ♀.

Die Art ist über fast ganz Europa, das Mittelmeergebiet, die Azoren und Madeira im Westen, bis nach dem Iran im Osten verbreitet.

Gen. *Medon* Stephens

M. piceus Kraatz (Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 191).

Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 1 ♀. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über Mittel-, West- und Süd-Europa, sowie über das Mittelmeergebiet weit verbreitet.

Gen. *Domene* Fauvel

D. (Subgen. *Domene* s. str.) *stilicina* Erichson (Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932).

Lindos, Alter Hafen (30), 27. 4. 1963, 1 ♂. — Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♀. —

Lindos, Burghang (19), 5. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über die südlichsten Teile der Apenninen- und Balkanhalbinsel, Sizilien, die Ägäischen Inseln, den Dodekanes, das westliche Kleinasien, Syrien und Palästina verbreitet.

Subfam. *Xantholininae*Gen. *Xantholinus* Serville

X. (Subgen. *Leptophallus* Coiffait) *relucens* Gravenhorst (Monogr. Col. Micropt., 1806, p. 101).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 6 ♂♂, 7 ♀♀.

Die Art ist über das südliche Mittel-Europa, Süd-Europa, das östliche Mittelmeergebiet und Kleinasien verbreitet.

X. (Subgen. *Acanthophallus* Coiffait) *graecus* Kraatz (Berl. Ent. Zeitschr., II, 1858, p. 64).

Lindos, Burghang (19), 26. 4. 1963, 1 ♀. — Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♀. —

Katavia, Strand (40), 30. 4. 1963, 1 ♀. — Lindos, Burghang (19), 5. 5. 1963, 1 ♀. — Archangelos, Burg (25), 1 ♂.

Die Art ist über Südost-Europa und das östliche Mittelmeergebiet weit verbreitet.

Subfam. *Staphylininae*Gen. *Philonthus* Curtis

Ph. (Subgen. *Philonthus* s. str.) *ebeninus* Gravenhorst (Col. Micropt. Brunsv. 1802, p. 170).

Lindos, Alter Hafen (30), 27. 4. 1963, 1 ♂, 2 ♀♀. — Hohlakas (39), 30. 4. 1963, 1 ♂.

Die Art ist fast über die ganze paläarktische Faunenregion verbreitet.

Ph. (Subgen. *Philonthus* s. str.) *concinus* Gravenhorst (Col. Micropt. Brunsv., 1802, p. 21).

Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♂. — Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 1 ♂. —

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 2 ♂♂. — Lindos, Grab d. Cleobulus (25), 7. 5. 1963, 1 ♂. — Massari (50), 8. 5. 1963, 1 ♂. — Lindos, Stavri (Dermatas), (32), 8. 5. 1963, 2 ♂♂. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über die ganze paläarktische Faunenregion weit verbreitet.

Ph. (Subgen. *Philonthus* s. str.) *cruentatus* Gmelin (in Linné, Syst. Nat., ed. 13, I, IV, 1790, p. 2035).

Lindos, Alter Hafen (30), 27. 4. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über fast ganz Europa, das östliche Mittelmeergebiet, den Kaukasus, Transkaukasien, bis nach Zentral-Asien verbreitet.

Ph. (Subgen. *Philonthus* s. str.) *fimetarius* Gravenhorst (Col. Micropt. Brunsv., 1802, p. 175).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über ganz Europa, das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Kaukasus, Transkaukasien, den Iran, Afghanistan, bis nach Zentral-Asien und den Himalaya verbreitet.

Ph. (Subgen. *Philonthus* s. str.) *sordidus* Gravenhorst (Col. Micropt. Brunsv., 1802, p. 176).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist Kosmopolit.

Gen. *Staphylinus* Linné

S. (Subgen. *Goërius* Stephens) *Gridellii* J. Müller (Boll. Soc. Ent. Ital., LVI, 1924, p. 19, 24).

Lindos, Burghang (19), 26. 4. 1963, 1 ♀. — Lindos, Hausgarten (26), 30. 4. 1963, 1 ♂. — Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♂. — Philermos, Kloster (11), 4. 5. 1963, 1 ♀. — Lindos, Grabmal Stadtnähe (27), 9. 5. 1963, 1 ♂. — Lindos, Anhöhe Straße (24), 12. 5. 1963, 1 ♀. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 2 ♂♂. — Lindos, Grabmal Stadtnähe (27), 17. 5. 1963, 1 ♂. — Lindos, Burghang (19), 18. 5. 1963, 1 ♂. — Lindos, Anhöhe Straße (24), 22. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über den südöstlichen Teil der Balkanhalbinsel, die Ägäischen Inseln und den Dodekanes, Syrien, Palästina, Kleinasien, bis nach dem westlichen Iran verbreitet.

S. (Subgen. *Pseudocypus* Mulsant-Rey) *mus* Brullé (Fauna Fridr. 1764, p. 23) subsp. *tauricus* J. Müller (Boll. Soc. Ent. Ital., LXIV, 1932, p. 80).

Lindos, Burghang (19), 26. 4. 1963, 1 ♂, 1 ♀. — Lindos, Alter Hafen (30), 27. 4. 1963, 1 ♂, 1 ♀. — Pefki (35), 28. 4. 1963, 1 ♂. — Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 2 ♀♀. — Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 2 ♂♂, 1 ♀. — Vlica-Bucht (52), 10. 5. 1963, 1 ♀. — Lindos, Anhöhe Straße (24), 12. 5. 1963, 1 ♀. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 3 ♀♀. — Vlica-Bucht (52), 13. 5. 1963, 1 ♀.

Diese Rasse der sonst über das südliche Mittel-Europa, Süd-Europa und das mittlere und westliche Mittelmeergebiet verbreiteten Stammform findet sich in Kleinasien, Syrien, Palästina, auf den Inseln des Dodekanes mit Rhodos und auf der Insel Kreta.

S. (Subgen. *Pseudocypus* Mulsant-Rey) *orientalis* Bernhauer-Schubert (Col. Cat. ed. Junk-Schenkling, Pars 67, Staphylinidae IV, p. 389, nom. nov. emend. = *tomentosus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr., XIII, 1869, p. 384, nom. praecoccup.).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♀. — Lindos Anhöhe Straße (24), 6. 5. 1963, 1 ♀. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♂. — Lindos, Burghang (19), 18. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über das östliche Mittelmeergebiet verbreitet, findet sich aber auch in Algier und Marokko.

Gen. *Quedius* Stephens

Qu. (Subgen. *Quedius* s. str. C. G. Thomson-Gridelli) *tristis* Gravenhorst (Col. Micropt. Brunsv., 1802, p. 34).

Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über Mittel- und Süd-Europa, das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Kaukasus und Transkaukasien verbreitet.

Qu. (Subgen. *Raphirus* C. G. Thomson-Gridelli) *nemoralis* Baudi (Studi Entom. I. 1948, p. 131).

Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 1 ♂, 1 ♀. — Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über das südliche Mittel-Europa, Süd-Europa, das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Kaukasus, Transkaukasien, bis nach Turkestan verbreitet.

Subfam. *Tachyporinae*

Gen. *Conosoma* Kraatz

C. immaculatum Stephens (Ill. Brit. Ent., V, 1832, p. 190).

Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 Ex.

Die Art ist über fast ganz Europa, das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Iran, bis nach Ost-Indien verbreitet.

Gen. *Tachyporus* Gravenhorst

T. nitidulus Fabricius (Spec. Ins., I, 1781, p. 337).

Katavia, Strand (30), 30. 4. 1963, 1 ♀. — Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♂. — Archangelos, Burg (25), 1 ♂.

Die Art ist fast über die ganze paläarktische Faunenregion und große Teile der nearktischen Faunenregion verbreitet.

T. hypnorum Fabricius (Syst. Ent. 1775, p. 266).

Lindos, Burghang (19), 5. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über die ganze paläarktische Faunenregion und die an diese angrenzenden nördlichsten Teile der orientalischen Faunenregion verbreitet.

Subfam. *Aleocharinae*

Gen. *Atheta* C. G. Thomson

A. (Subgen. *Dimetrota* Mulsant-Rey) *atramentaria* Gyllenhal (Ins. Suec., I, 2, 1810, p. 408).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über die ganze paläarktische Faunenregion weit verbreitet.

- A. (Subgen. *Coprothassa* C. G. Thomson) *sordida* Marsham (Ent. Brit. Col., 1802, p. 514).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♂.

Die Art ist über fast die ganze paläarktische Faunenregion und große Teile der nearktischen Faunenregion verbreitet, ist aber auch von einzelnen Punkten der neotropischen Faunenregion bekannt, dort aber wahrscheinlich eingeschleppt worden.

- A. (Subgen. *Acrotona* C. G. Thomson) *rhodiensis* Scheerpeltz (Koleopt. Rundschau, XL/XLI, 1962/63, p. 68, 74).

Sieben Quellen (28), 2. 5. 1963, 1 ♀

Die Art ist erst 1962 von Prof. Dr. K. MANDL auf Rhodos (Philerimos, Petaloudos) entdeckt worden, dürfte aber nicht nur auf dieser Insel heimisch, sondern wahrscheinlich auf dem Dodekanes und vielleicht auch auf dem benachbarten, südwestlichen kleinasiatischen Festland weiter verbreitet sein.

Gen. *Aleochara* Gravenhorst

- A. (Subgen. *Isochara* Bernhauer) *tristis* Gravenhorst (Monogr. Col. Micropt., 1802, p. 170).

Monolithos, NNO d. Stadt (13), 3. 5. 1963, 1 ♂, 1 ♀.

Die Art ist fast über die ganze paläarktische Faunenregion und die an diese angrenzenden nördlichsten Teile der orientalischen und aethiopischen Faunenregion verbreitet.

- A. (Subgen. *Coprochara* Mulsant-Rey) *bipustulata* Linné (Fauna Suec., ed. 2, 1761, p. 232).

Mt. Tsambika (54), 13. 5. 1963, 1 ♀.

Die Art ist über die paläarktische, aethiopische und nearktische Faunenregion weit verbreitet, aber auch von einzelnen Punkten der neotropischen und australisch-polynesischen Faunenregion bekannt, wahrscheinlich aber dort eingeschleppt worden.