

Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei

Coleoptera: Tenebrionidae

Von ZOLTAN KASZAB, Budapest

Zoologische Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums

Manuskript eingelangt am 14. März 1968

Durch die gütige Vermittlung von Herrn Direktor Dr. MAX BEIER aus der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien bekam ich vor kurzem das reiche Tenebrioniden-Material, welches im Rahmen der österreichischen Anatolien-Expeditionen 1964 bis 1967 gesammelt wurde. Das Material enthält ungef. 1440 Exemplare, unter welchen ich nicht weniger als 123 Arten, resp. Formen gefunden habe. Außer einigen, für die Fauna Kleinasiens neuen Arten, wie z. B. *Erodius semenovi* BOGATSHEV und *Dichillus iranicus* KASZAB, befinden sich in dem Material auch zahlreiche seltenerne, außerdem noch 2 für die Wissenschaft neue Arten.

Zuerst teile ich die Daten des gesammelten Materials mit, dann folgt die Beschreibung der neuen Formen.

Die Überlassung einiger Belegstücke für die Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums sei auch an dieser Stelle herzlichst gedankt.

Liste der Arten

Erodius semenovi BOG. — Birecik, Euphrat-Ufer, 1. V. 1966 (38 Ex.).

Erodius orientalis oblongus SOL. — Yumurtalik b. Ceyhan (Adana), 7. IV. 1966 (1 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (30 Ex.).

Amnodeis grandis MILL. — zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (2 Ex.); Umgeb. Mardin, 5. V. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (1 Ex.); zw. Midyat und Idil (Mardin), 9., 11. V. 1966 (2 Ex.); Derik, westl. Mardin, 950 m, 8. V. 1966 (1 Ex.).

Amnodeis intermedius REITT. — Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.); 30 km sw. Baykan (Siirt), 15. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.).

Zophosis punctata BRLL. — Ayrancı, sw. von Eregli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); Taspinar (Nigde), 10. IV. 1966 (9 Ex.); Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (2 Ex.); zw. Ürgüp und Görome (Kayseri), 6. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Midyat und Idil (Mardin), 9., 11. V. 1966 (1 Ex.); sw. Elazığ, 9. V. 1967 (2 Ex.); zw. Elazığ und Ergani, 14. V. 1967 (4 Ex.); 20—25 km

sw. Tunceli, 20. VI. 1967 (1 Ex.); Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (2 Ex.); Yozgat, 28.—29. V. 1967 (3 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Hacilar bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Zophosis dilatata DEYR. — Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (10 Ex.).

Dailognatha caraboides SOL. — Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Malatya und Darende, 3. VI. 1966 (2 Ex.); Bahoe bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (1 Ex.); Yüksekovala (Hakkari), 25. V. 1966 (5 Ex.); Bajırı (Hakkari), 25. VI. 1966 (4 Ex.); Ahlat, NO-Ufer d. Vanöglü, 19. V. 1966 (1 Ex.); Kuşunkiran, östl. Van, 2265 m, 29. V. 1966 (1 Ex.); zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (5 Ex.); Baskale, Paßhöhe (Van), 2800 m, 26. V. 1966 (1 Ex.); Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (2 Ex.); Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (1 Ex.); Yozgat, 28.—29. V. 1967 (3 Ex.); Bayburt, 30. VI. 1967 (5 Ex.); Arslantepe (Malatya), 7. VI. 1967 (2 Ex.); Bingöl, 12. VI. 1967 (1 Ex.); Bulgharmaden, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (9 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dailognatha quadricollis carceli SOL. — Ayrancı, sw. von Ereğli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); Misis, östl. von Adana, 17. IV. 1966 (1 Ex.); Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); zw. Siirt und Kurtalan, 16. V. 1966 (1 Ex.); Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (2 Ex.); Derik, westl. von Mardin, 950 m, 8. V. 1966 (1 Ex.); Kusunkiran, östl. Van, 265 m, 29. V. 1966 (4 Ex.); Umgeb. Van, 1750 m, 28. V. 1966 (6 Ex.); Ahlat, NO-Ufer d. Vanöglü, 19. V. 1966 (3 Ex.); Arslantepe (Malatya), 7. VI. 1967 (2 Ex.); Bingöl, 12. VI. 1967 (3 Ex.); Bingöl-Karlova-Yol, 13. VI. 1967 (7 Ex.); Bingöl-Geno, 15. VI. 1967 (3 Ex.); Erzinhan, 26. VI. 1967 (1 Ex.); Tunceli, 22.—24. VI. 1967 (3 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.); Bulgharmaden, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.); Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Nurdagh-Tapesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.); Hacilar bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); 70 km sö. Eskisehir, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Alihoca, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (13 Ex.).

Dailognatha rugipleuris REITT. — Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (10 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (9 Ex.); Kas. leg. PETROVITZ-RESSL (11 Ex.); Dodurga bei Fethiyemle g. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.); Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dailognatha crenata REICHE — Baspinar, westl. Gaziantep, 26. IV. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.); Toprakkale bei Osmaniye, 15. IV. 1966 (1 Ex.); Yumurtalık b. Ceyhan (Adana), 17. IV. 1966 (3 Ex.); Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (3 Ex.); Hatay, Antakiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dailognatha planata MILL. — Bergland östl. von Cirze (Mardin), 10. V. 1966 (1 Ex.); Hatay, Antakiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).

Calyptopsis solieri REICHE — Sakoagözü, nö. Fevzipassa, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.); 40 km südl. von Diyarbakir, 4. V. 1966 (1 Ex.).

Calyptopsis caucasica KR. — zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (1 Ex.).

Calyptopsis capnisiformis REITT. — zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (2 Ex.); Taspinar (Nigde), 14. IV. 1966 (1 Ex.).

Stegastopsis microderoides REITT. — Mardin, 25 km geg. Savur, 6. V. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (1 Ex.).

Tentyria wiedemannii MÉN. — zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Tentyria rotundata mittrei SOL. — zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (1 Ex.); Hacilar bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Talas bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.); zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Tentyria rotundata winkleri C. KOCH — Taspinar (Nigde), 10. IV. 1966 (3 Ex.); zw. Ürgün und Göreme (Kayseri), 6. VI. 1966 (2 Ex.); zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Malatya und Darende, 3. VI. 1966 (1 Ex.).

Tentyria tessulata regipleuris BOGD.-KATJK. — zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (13 Ex.); Kusunkiran östl. Van, 2265 m, 29. V. 1966 (9 Ex.); Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (9 Ex.); Baskale, Paßhöhe(Van), 2800 m, 26. V. 1966 (4 Ex.); Yüksekovali (Hakkari), 25. V. 1966 (13 Ex.); zw. Yüksekovali und Semdinli (Hakkari), 24. V. 1966 (4 Ex.); Bajirgi (Hakkari), 25. V. 1966 (1 Ex.).

Adesmia fischeri fischeri FALD. — zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (6 Ex.); Baskale, Paßhöhe, 2800 m, 26. V. 1966 (2 Ex.); Yüksekovali (Hakkari), 23., 25. V. 1966 (25 Ex.); zw. Yüksekovali und Semdinli (Hakkari), 24. V. 1966 (6 Ex.); Bajirgi (Hakkari), 25. V. 1966 (3 Ex.).

Adesmia procera MILL. — östl. Birecik a. Euphrat, 1. V. 1966 (1 Ex.).

Adesmia gibbula REITT. — sw. Eregli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Midyat und Idil (Mardin), 9., 11. V. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (2 Ex.); Derik, westl. Mardin, 950 m, 8. V. 1966 (1 Ex.).

Adesmia anthracina KLUG — Ayrancı, sw. von Eregli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); Baspinar, westl. v. Gaziantep, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Sakcangözü, nö. Fevzipasa, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (3 Ex.); Yavuzeli, nö. von Gaziantep, 28. IV. 1966 (2 Ex.); Belen, Issuspaaß, Amanus, 18. IV. 1966 (1 Ex.); Nurdag-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (11 Ex.).

Adeslostoma sulcatum DUP. — Taspinar (Nigde), 10. IV. 1966 (1 Ex.); Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.); Arslantepe (Malatya), 7. VI. 1966 (1 Ex.).

Stenosis punctiventris ESCHSCH. — Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

- Stenosis dianae* J. SAHLB. — Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Ürgüp und Göreme (Kayseri), 6. VI. 1966 (1 Ex.).
- Stenosis dilutipes* REITT. — Hatay, Samandag, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Stenosis silvestrii schusteri* C. KOCH — Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Yumurtalik b. Ceyhan (Adana), 17. IV. 1966 (2 Ex.); Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (1 Ex.).
- Stenosis orientalis* BRLL. — Üsküdar bei Istanbul, leg. PETROVITZ-RESSL (27 Ex.).
- Eutagenia smyrnensis* SOL. — Nurdag-Tepesi, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Bornova bei Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Eutagenia minutissima* PIC. — Misis, östl. von Adana, 17. IV. 1966 (2 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).
- Dichillus subsetulosus* REITT. — Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (2 Ex.).
- Dichillus iranicus* KASZ. — Yavuzeli, nö. von Gaziantep, 28. IV. 1966 (1 Ex.).
- Akis opaca* HEYD. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (17 Ex.); Aksehir, 995 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Eskisehir, 792 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Cyphogenia lucifuga* ADAMS — Taspinar (Nigde), 10. IV. 1966 (1 Ex.); Talas bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Cephalostenus orbicollis* MÉN. — Üsküdar bei Istanbul, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.); Selcuk-Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (17 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.); Kumluca bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.); Demire bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Antalya, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.).
- Cephalostenus demaisonii* REITT. — Namrun nö. Tarsus, 1170 m, 11. IV. 1966 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Nurdagh-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Aspendos bei Anatya, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).
- Ocnera setosa* MÉN. — Ahlat, NO-Ufer d. Vanöglü, 19. V. 1966 (1 Ex.); Umgeb. Van, 1750 m, 28. V. 1966 (1 Ex.).
- Pachyscelis villosa* DRAP. — Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (9 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Antalya, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Aspendos bei Antalya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Demre bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).
- Pachyscelis musiva gastridula* FALD. — zw. Elazig und Ergani, 14. V. 1966 (1 Ex.); Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (4 Ex.); Kusunkiran, östl. Van, 2265 m, 29. V. 1966 (1 Ex.); zw. Yüksekova und Semdinli (Hakkari), 24. V. 1966 (4 Ex.).
- Pachyscelis musiva mamillata* FALD. — Bingöl-Kuruca, 16. VI. 1966 (2 Ex.).

- Pachyscelis quadricollis smyrnensis* KR. — Egridir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Pimelia dubia* FALD. — Yüksekovalı (Hakkari), 23. V. 1966 (1 Ex.).
- Pimelia bajula solieri* MULS. — Baspinar, westl. Gaziantep, 26. IV. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (11 Ex.); Buro bei Gaziantep, 29. IV. 1966 (1 Ex.); Belen, Issuspaß, Amanus, 18. IV. 1966 (2 Ex.); Nurdag-Tepesi, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Hasanbeyli Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (2 Ex.); 40 km südl. v. Diyarbakir, 4. V. 1966 (1 Ex.); zw. Midyat und Idil (Mardin), 9., 11. V. 1966 (2 Ex.); Umgeb. Mardin, 5. V. 1966 (1 Ex.); zw. Siirt und Kurtalan, 16. V. 1966 (1 Ex.); Nurdagh-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.); Maras, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).
- Pimelia robusta* KR. — 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (1 Ex.).
- Pimelia timarchoides* MÉN. — Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (1 Ex.); Yozgat, 28.—29. V. 1967 (3 Ex.); Sivas, 5. VI. 1967 (1 Ex.).
- Pimelia akbesiana* FAIRM. — Südöstl. von Ismit, 6. IV. 1966 (1 Ex.); Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); Nurdagh-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.).
- Pimelia anatolica* REITT. — zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); 26 km nördl. Bilecik, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Burdur, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Pimelia polita* SOL. — Selcuk-Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).
- Pimelia verruculifera* SOL. — Ayrancı, sw. von Eregli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Ürgüp und Göreme (Kayseri), 6. VI. 1966 (3 Ex.); Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (20 Ex.); zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (3 Ex.).
- Pimelia verruculifera* SOL. var. *tomentifera* REITT. — Bornova bei Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.).
- Blaps rotundata* SOL. — Topbogazi, Issuspaß, Amanus, 18. IV. 1966 (1 Ex.).
- Blaps rotundata* SOL. var. *laticollis* ALL. — zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.); Yavuzeli, nö. von Gaziantep, 28. IV. 1966 (1 Ex.).
- Blaps connexa* REICHE — Umgeb. von Sirkeli (Adana), 17. IV. 1966 (3 Ex.); Yumurtalık b. Ceyhan (Adana), 17. IV. 1966 (4 Ex.); Elazığ-Baskil, 10. VI. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (1 Ex.); Kilise bei Mardin, 12. V. 1966 (2 Ex.).
- Blaps ecaudata* SDL. — Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (24 Ex.).
- Blaps tibialis* REICHE — Taspinar (Nigde), 10. IV. 1966 (6 Ex.); zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (3 Ex.); Toprakkale bei Osmaniye, 16. IV. 1966 (4 Ex.); Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (2 Ex.); Bingöl-Karlova-Yol, 13. VI. 1967 (1 Ex.); Talas bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); 70 km sö. Eskisehir, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Blaps tibialis* REICHE var. *strigicollis* BDL. — Gölbaşı (Ankara), 25. V. 1967 (5 Ex.); Sivas, 5. VI. 1967 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-

RESSL (1 Ex.); Tarsus bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Hisarcik bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Hisarcik bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Talas bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.); zw. Eskisehir und Kütehya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Blaps pterotapha MÉN. — Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (4 Ex.); Umgeb. Van, 1750 m, 28. V. 1966 (1 Ex.); zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (3 Ex.); Kusunkiran, östl. Van, 29. V. 1966 (2 Ex.); Ahlat, NO-Ufer d. Vanöglü, 19. V. 1966 (6 Ex.); Yüksekova (Hakkari), 25. V. 1966 (1 Ex.); Bayburt, 30. VI. 1967 (5 Ex.).

Blaps lethifera MARSH. — Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Aksehir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Blaps mucronata LATR. — Istanbul, 22. V. 1966 (1 Ex.); Üsküdar bei Istanbul, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.).

Blaps longula REICHE — Baskale-Paßhöhe (Van), 2800 m, 26. V. 1966 (21 Ex.).

Blaps ocreata ALL. — Gölbasi (Ankara), 25. V. 1967 (3 Ex.); Umgeb. Ankara, 27. V. 1967 (1 Ex.); zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Aksehir, 995 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Blaps abbreviata MÉN. — Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (2 Ex.); zw. Siirt und Kürtalan, 16. V. 1966 (1 Ex.).

Blaps lata SDL. — Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.).

Dendarus messenius BRLL. — zw. Yüksekova und Semdinli (Hakkari), 24. IV. 1966 (2 Ex.); Yüksekova (Hakkari), 25. V. 1966 (5 Ex.).

Dendarus crenulatus cibratus WALTL — Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (5 Ex.); Bayburt, 30. VI. 1967 (9 Ex.); nö. Bingöl, 1600—1900 m, 17. VI. 1967 (1 Ex.); Erzincan, 26. VI. 1967 (1 Ex.); Niksar (Tokat), 2. VI. 1967 (1 Ex.); zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Bulgharmaden, Klik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Hacilar bei Kayseri, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dendarus alleonis SDL. — Umgeb. Ankara, 27. V. 1967 (1 Ex.); Yozgat, 28.—29. V. 1966 (1 Ex.).

Dendarus tenellus MULS. — Arslantepe (Malatya), 7. VI. 1967 (1 Ex.); Burdur, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dendarus lugens plicatulus BRLL. — Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); Soksagözü, nö. Fevzipasa, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Elmali, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dendarus impressus MULS. — Yenisehir (Hakkari), 19. IV. 1966 (1 Ex.).

Pedinus bodemeyeri REITT. — Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.); Yozgat, 28.—29. V. 1967 (1 Ex.); Nurdagh-Tapesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Egridir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Bulgharmaden, Klik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Pedinus curvipes MULS. — zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Pedinus strabonis SDL. — Ayrancı, sw. von Eregli, 9. VI. 1966 (1 Ex.); Namrun, nö. Tarsus, 1170 m, 11. IV. 1966 (1 Ex.); Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (6 Ex.); zw. Ürgüp und Göreme (Kayseri), 6. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.); Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (1 Ex.); zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (3 Ex.); Yüksekova (Hakkari), 23. V. 1966 (1 Ex.); Umgeb. Ankara, 27. V. 1967 (1 Ex.); Golbasi (Ankara), 25. V. 1967 (1 Ex.); Bozgat, 28.—29. V. 1967 (1 Ex.); Sivas, 5. VI. 1967 (1 Ex.); Bingöl-Karlova-Yol, 13. VI. 1967 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Aksehir, 995 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.); Alihoca, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Mut, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Colpotus bycantinicus WALTL — Hasanbeyli, Amanusgebirge, 14. IV. 1966 (1 Ex.).

Colpotus schusteri C. KOCH — Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Colpotus voigti C. KOCH? — Damre bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Cabirutus gracilis REITT. — Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (1 Ex.); Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.); Belen, Issuspaaß, Amanus, 18. IV. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (3 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Nurdag-Tapesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Dissonomus substriatus REITT. — Ahlat, NO-Ufer d. Vanöglü, 19. V. 1966 (6 Ex.); zw. Siirt und Kürtalan, 16. V. 1966 (1 Ex.).

Dissonomus picipes FALD. — Umgeb. Mardin, 5. V. 1966 (1 Ex.); Mardin, 25 km geg. Savur, 6. V. 1966 (1 Ex.); Bergland östl. von Cirze (Mardin), 10. V. 1966 (1 Ex.).

Dissonomus politus sp. nov.

Mesomorphus longulus REICHE — Büro bei Gaziantep, 29. IV. 1966 (1 Ex.); Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.); Yenisehir (Hatay), 19. IV. 1966 (1 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (1 Ex.); Yavuzeli, nö. von Gaziantep, 28. IV. 1966 (1 Ex.); 35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (1 Ex.).

Cnemeplatia atropos COSTA — Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Nurdagh-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Anemia sardoa GENÉ — Bergland östl. von Cizre (Mardin), 10. V. 1966 (9 Ex.); Demire bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Gonocephalum pusillum FABR. — Ayrancı, sw. von Eregli, 9. VI. 1966 (2 Ex.); Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (6 Ex.); zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (2 Ex.); zw. Ürgüp und Göreme (Kayseri), 6. VI. 1966 (1 Ex.); Misis, östl. v. Adana, 17. IV. 1966 (1 Ex.); Baskale, Paßhöhe (Van), 2800 m, 26. V. 1966 (8 Ex.); Umgeb. Van, 1750 m,

28. V. 1966 (3 Ex.); Niksar (Tokat), 2. VI. 1967 (1 Ex.); Bingöl-Karlovaya-Yol, 13. VI. 1967 (1 Ex.); Tohum, Tokat, 3. VI. 1967 (1 Ex.); Bingöl-Geno, 15. VI. 1967 (1 Ex.); sw. Elazig, 9. VI. 1967 (2 Ex.); Selcuk-Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Bulgarmaden, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Eskigümüz bei Nigd, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); zw. Afyon und Burdur, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Burdur, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); 16 km südl. Bolvadin, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Gonocephalum rugulosum KÜST. — Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (1 Ex.); Rehuali bei Antalya (Hatay), 19. IV. 1966 (1 Ex.); sw. Elazig, 9. VI. 1966 (2 Ex.); Bergland von Mus, 1520 m, 31. V. 1966 (1 Ex.); Hakkari, 1700 m, 21. V. 1966 (1 Ex.); Bajirgi (Hakkari), 25. V. 1966 (1 Ex.); Zapsuyu-Schlucht (Hakkari), 22. V. 1966 (1 Ex.); Yüksekova (Hakkari), 25. V. 1966 (2 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Gonocephalum costatum BRLL. — Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (7 Ex.); Namrun, nö. Tarsus, 1170 m, 11. IV. 1966 (1 Ex.); Yumirtalik b. Ceyhan (Adana), 17. IV. 1966 (3 Ex.); Umgeb. von Sirkeli (Adana), 17. IV. 1966 (1 Ex.); Misis, östl. von Adana, 17. IV. 1966 (1 Ex.); İslahiye, Amanusgebirge, 19. IV. 1966 (1 Ex.); Bulgarmaden, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Gonocephalum rusticum OL. — Osmaniye (Adana), 20. IV. 1966 (2 Ex.); Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (3 Ex.); Sakoagözü, nö. Fevzi-pasa, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Tunceli, 22.—24. VI. 1966 (1 Ex.); Bingöl-Karlovaya-Yol, 13. VI. 1967 (2 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Demre bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Bornova bei Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Opatrium geminatum asiaticum REITT. — Yozgat, 28.—29. V. 1967 (3 Ex.); Alihoca, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Bulgarmaden, Kilik. Taurus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Opatrium sabulosum L. — zw. Van und Özalp, 27. V. 1966 (7 Ex.); Hakkari, 1700 m, 21. V. 1966 (1 Ex.).

Opattroides punctulatus BRLL. — Belen, Issuspaaß, Amanus, 18. IV. 1966 (6 Ex.); Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (17 Ex.); Baspinar, westl. Gaziantep, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Yavuzeli, nö. von Gaziantep, 28. IV. 1966 (2 Ex.); Buro bei Gaziantep, 29. IV. 1966 (1 Ex.); Yamirtalik bei Ceyhan (Adana), 17. IV. 1966 (2 Ex.); zw. Gaziantep und Kilis, 27. IV. 1966 (4 Ex.); Toprakkale bei Osmaniye, 15. IV. 1966 (17 Ex.); Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (9 Ex.); Osmaniye (Adana), 20. IV. 1966 (4 Ex.); Tunceli, 22.—24. VI. 1966 (6 Ex.); Umgeb. Mardin, 5. V. 1966 (3 Ex.).

35 km n. Mardin, 1000 m, 4. V. 1966 (2 Ex.); Hakkari, 1700 m, 21. V. 1966 (8 Ex.); zw. Yüksekova und Semdinli (Hakkari), 24. V. 1966 (1 Ex.); Zapsuyu-Schlucht (Hakkari), 22. V. 1966 (1 Ex.); zw. Siirt und Kurtalan, 6. V. 1966 (3 Ex.); Arslantepe (Malatya), 7. VI. 1967 (1 Ex.); Bingöl, 12. VI. 1967 (47 Ex.); Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (13 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (9 Ex.); Arslantepe bei Malatya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Nurdagh-Tepesi, 1150 m, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Barnova bei Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Demre bei Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
Diaperis boleti L. var. *fungi* MOTSCH. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (26 Ex.).

Alphitophagus bifasciatus SAY — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).

Palorus ratzeburgi WISSM. — Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Uloma cypraea KR. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (8 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Mut, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Diaclina fagi PANZ. — Dogurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.); Köycegiz, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.).

Cossyphus tauricus STEV. — Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.).

Iphthimus bellardi reitteri GEB. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.).

Iphthimulus truquii MARS. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Menenophilus cylindricus HERBST — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (10 Ex.).

Belopus reitteri ZOUFF. — Taspinar (Nigde), 10. VI. 1966 (1 Ex.).

Amarantha azurea WALTL — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (3 Ex.).

Laena ganglbaueri REITT. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Laena wanensis SCHUST. — Gürpinar (Van), 20. V. 1966 (1 Ex.).

Laena lilliputana sp. nov.

Catomus acutangulus SDL. — Buglan, zw. Mus und Elazig, 1. VI. 1966 (1 Ex.); Baskale, Paßhöhe (Van), 2800 m, 26. V. 1966 (1 Ex.); Bingöl-Karlova-Yol, 13. VI. 1967 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Catomus hesperides REICHE — Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.).

Catomus fulvipes REICHE — Baspinar, westl. Gaziantep, 26. IV. 1966 (2 Ex.); Derik, westl. Mardin, 950 m, 8. V. 1966 (1 Ex.).

- Entomogonus peyronis* REICHE — zw. Siirt und Eru, 17. V. 1966 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Entomogonus egregius* SDL. — 20—25 km sw. Tunceli, 20. VI. 1966 (1 Ex.).
- Entomogonus duchoni* REITT. — Duro bei Gaziantep, 29. IV. 1966 (1 Ex.); Baspinar, westl. Gaziantep, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Sakcagözü, nö. Fevzi-pasa, Amanus, 26. IV. 1966 (1 Ex.); Mardin, 25 km geg. Savur, 6. V. 1966 (1 Ex.).
- Entomogonus saphyrinus* ALL. — zw. Kayseri und Yesilhisar, 7. VI. 1966 (1 Ex.); zw. Van und Ozalp, 27. V. 1966 (2 Ex.).
- Entomogonus barthelemyi* SOL. — Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (6 Ex.); Misis, östl. von Adana, 17. IV. 1966 (1 Ex.); Toprakkale bei Osmaniye, 15. IV. 1966 (1 Ex.).
- Entomogonus angulicollis* MÉN. — Bahce bei Osmaniye, 600 m, 21. IV. 1966 (1 Ex.).
- Raiboscelis coelestinus* WALTL — Arsuz (Hatay), 16. IV. 1966 (1 Ex.); Kas, leg. PETROVITZ-RESSL (16 Ex.); Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.); Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (4 Ex.); Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.); Marmaris, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Helops rossii* GERM. — Üskündar bei Istanbul, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Helops cyanipes* ALL. — Namrun, nö. Tarsus, 1170 m, 11. IV. 1966 (1 Ex.); Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (6 Ex.).
- Probaticus dorsalis* ALL. — zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (7 Ex.).
- Probaticus granipennis* ALL. — Yozgat, 28.—29. V. 1966 (1 Ex.).
- Probaticus corrugatus* SDL. — Tunceli, 22.—24. VI. 1966 (1 Ex.).
- Probaticus tenebriocosus* BRLL. — Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); Bornova bei Izmir, leg. PETROVITZ-RESSL (2 Ex.); zw. Eskisehir und Kütahya, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).
- Probaticus bodemeyeri* REITT. — Namrun bei Tarsus, leg. PETROVITZ-RESSL (5 Ex.).
- Probaticus pentheri* REITT. — Erciasdag-Sattel bei Kayseri, 2300 m, 5. VI. 1966 (3 Ex.).
- Cylindronotus fundator* REITT. — Üzümlü bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (1 Ex.).

Beschreibung der neuen Arten

Dissonomus politus sp. nov.

Körper länglich, ziemlich parallel, kastanienbraun oder dunkelbraun, glänzend. Kopf an den seitenständigen, queren Augen am breitesten, Wangen schmäler und etwas aufgewölbt nach vorn gebogen verengt, Clypeus vorn in der Mitte sehr breit und flach ausgerandet, Ecken vollkommen breit abgerundet. Stirn sehr breit, quer gewölbt, in der Mitte hinten und seitlich sehr fein und spärlich punktiert, nach vorn wird die Punktierung allmählich dichter und auch raspelartig. Clypeus dicht mit feinen raspelartigen Punkten

besetzt, der Grund seitlich mikroskopisch genetzt und etwas matt. Clypealsutur nicht eingedrückt, Clypeus mit der Stirn eine gleiche Ebene bildend. Fühler kräftig, die Basis des Halsschildes nicht erreichend, zur Spitze allmählich verdickt; das 3. Glied länger als breit (wie 6,5:4,8), kaum länger als das 4. (wie 6,5:6), das 4. ebenfalls länger als breit (wie 6:4,8), das 5.—8. untereinander gleichlang und etwas kürzer als das 4. (wie 5:6), das 5. und 6. genau so lang wie breit, das 7. jedoch breiter als lang (wie 5,8:5), die folgenden Glieder allmählich etwas länger (das Verhältnis der Länge der Glieder 8., 9., 10. und 11. wie 5:5,5:6:8) und zur Spitze allmählich breiter (das Verhältnis der Breite der Glieder 8.—11. wie 6,8:7,5:8:8). Das Endglied unregelmäßig oval, so lang wie breit, unter allen Gliedern am größten. Halsschild breit scheibenförmig, etwa 1,7mal so breit wie in der Mitte lang (wie 78:47), in der Mitte am breitesten, Seitenrand breit gerundet, nach vorn und hinten verkürzt, Hinterecken breit abgerundet und ungerandet, Vorderecken breit verrundet, ohne Ecke, fein gerandet, Vorderrand etwas ausgerandet und die Mitte breit ungerandet, Hinterrand gerade und ungerandet. Oberfläche einfach gewölbt, Seiten scharf gerandet, die Scheibe fein punktiert, die Punktierung fein und spärlich, der Grund glänzend. Flügeldecken langoval, an der Basis mit vorstehenden, abgerundet rechtwinkligen Schulterecken, dort sind die Flügeldecken etwas breiter als die Halsschildbasis (wie 74:70), aber schmäler als die größte Breite des Halsschildes (wie 74:78), gegen die Mitte zu allmählich leicht erweitert, etwas hinter der Mitte am breitesten (das Verhältnis zwischen größter Breite der Flügeldecken und Schulterbasis wie 82:74), etwa um ein Fünftel länger als die gemeinsame Breite an der Basis (wie 112:74). Seitenrand breit abgesetzt und von oben gut übersehbar. Oberfläche mit etwas längsrissiger, ziemlich grober und dichter Punktierung, die Punkte wenigstens doppelt so groß wie die des Halsschildes, nur an den Seiten und am Absturz fein, der Grund glatt und glänzend. Unterseite ohne besondere Kennzeichen. Prosternum hinter den Hüften stumpfwinklig vorragend. Beine kräftig, Schenkel gekeult, Vorderschienen stark erweitert, Außenecke breit stumpfwinklig, innen am basalen Drittel stärker ausgerandet, Mittelschienen stark gekrümmmt, Innenseite an der Basis bis über die Mitte ausgerandet, Außenseite abstehend bedornt, Hinterschienen an der Basis innen ebenfalls ausgeschweift, das Endhälfte aber parallel. Mittel- und Hinterschienen am Ende mit einem Dornkorb. Die 3 ersten Glieder der Vorder- und Mitteltarsen unten gelb befilzt, das 1. und 4. Glied der Vordertarsen kaum, das 2. und 3. stärker erweitert, breit kerzförmig. Mitteltarsen schmäler erweitert. Das 1. und 2. Glied der Hintertarsen ebenfalls ein wenig breiter als normal. — Länge: 4,3—5 mm.

1 Exemplar (Holotype ♂) aus Klein-Asien: Gurpinar (Van), 20. V. 1966, in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien und 1 Exemplar (Paratype ♂) aus Iran: Suse, in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest.

Die neue Art ist durch die glänzende Oberfläche, die feine Halsschild-

und die gröbere Flügeldeckenpunktierung, sowie durch die sekundären Geschlechtsmerkmale gekennzeichnet. Systematisch steht sie *D. substriatus* REITT. am nächsten, welche Art aber weniger stark gerundete Halsschildseiten, matte Oberseite und einfache Schienen besitzt. Unter den beschriebenen Arten gibt es keine, bei welcher die Oberseite so stark glänzend wäre wie bei dieser neuen Art.

Laena (s. str.) *lilliputana* sp. nov.

Körper gestreckt, klein, glänzend rötlichbraun, abstehend gelb behaart. Kopf quadratisch, an den kleinen, seitensständigen, rundlichen Augen am breitesten. Wangen parallel, mehr als um ein Drittel länger als die Augen (wie 11:7), vorn buckelig gewölbt, mit den Seiten des Clypeus gerade verengt, Clypeus im Bogen ausgerandet, Clypealsutur leicht quer eingedrückt. Schläfen leicht gerundet verengt, vom Hinterrand der Augen bis zum Hals kürzer als die Wangen. Oberseite grob punktiert, die Abstände der Punkte etwas größer als die Punkte selbst. Der Grund glänzend. Fühler kräftig, die Basis des Halsschildes erreichend, zur Spitze allmählich verdickt; das 2. Glied so lang wie breit, das 3. um ein Drittel länger als das 2. (wie 9:6) und so breit wie das 2., das 4. bis 6. gleichlang, kürzer als das 3. (wie 7:9) und etwas breiter als das 3. (wie 6,5:6), die Glieder 7.—9. länger und breiter, das Verhältnis der Länge der Glieder 7. und 6. wie 8:7, das 7. Glied deutlich breiter als das 6. (wie 7,5:6,5), das 8. und 9. breiter als das 7. (wie 8:7,5), das 9. Glied etwas kürzer als breit (wie 9:10), das Endglied groß, oval, länger als breit (wie 15:11). Halsschild kaum länger als die größte Breite im vorderen Drittel (wie 30:29), nach hinten stark verengt, herzförmig, die größte Breite und die Basis verhalten sich wie 29:22: Vorderecken abgerundet rechtwinklig, der Rand vorn etwas stärker abgeflacht, Hinterecken gerundet stumpfwinklig. Hinterrand etwas gebogen, Vorderrand gerade abgestutzt. Die Scheibe ziemlich flach, Seiten herabgewölbt, mit genau so groben und dicht stehenden Punkten wie die der Stirn, der Grund glänzend. Flügeldecken langoval, fast doppelt so lang wie die gemeinsame Breite in der Mitte (wie 63:33), nach vorn und hinten gleichstark gebogen verengt, auch die Mitte seitlich nicht parallel und ohne Spur einer stumpfen Schulterbeule, an der Basis stark eingeschnürt (Mitte der Flügeldecken, Basis, sowie die Basis des Halsschildes und größte Breite vorn verhalten sich wie 33:16:22:29); einfach quergewölbt, die Scheibe nicht abgeflacht, mit groben Punktreihen, welche am Absturz merklich feiner sind. Der 1. Zwischenraum an der Naht gemeinsam etwas dachförmig, am Ende flach, Zwischenräume schmal und gewölbt, vorn und seitlich fast schmäler als eine Punktreihe; mit je einer feinen Reihe von borstentragenden Raspelpunkten. Die Borste der Zwischenräume aufrecht stehend, die der Reihenpunkte ziemlich anliegend. Die seitlichen Zwischenräume mit einigen sehr langen Haaren, welche an der Basis kleiner Kerbzähnchen sitzen. Der Grund glänzend. Unterseite grob und spärlich punktiert, ohne besondere Kennzeichen. Beine kräftig, Schenkel gekeult, ohne Zähnchen oder Kerbzähnchen.

Vorderschienen des ♂ an der Außenseite gebogen, Innenseite im distalen Drittel flach ausgerandet, dicht behaart. Vorder- und Mitteltarsen des ♂ leicht erweitert, unten gelb befilzt. Länge: 3 mm.

2 Exemplare aus Klein-Asien: Dodurga bei Fethiye, leg. PETROVITZ-RESSL (Holotype ♂ und Paratype) und 2 Exemplare aus Finike, leg. PETROVITZ-RESSL (Paratypen) in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien (Holotype und 2 Paratypen), sowie im Museum Budapest (1 Paratype).

Die neue Art gehört in die Gruppe der *L. clivinoides* BAUDI und *L. ferruginea* KÜST.; die erstere Art ist aber größer, besitzt stark gewölbte Zwischenräume auch neben der Naht der Flügeldecken, welche am Absturz nicht flach, sondern einzeln gewölbt sind, die Augen sind auch größer, die Wangen kürzer, die Reihenpunkte der Decken größer, die Raspelpunkte der Zwischenräume feiner; *L. ferruginea* KÜST. besitzt flachere Flügeldecken, einen weniger stark herzförmigen Halsschild, breitere Schultern, flachere Zwischenräume der Decken und nicht so tief eingedrückte Punkte der Reihen.

Literatur:

- BOGACEV, A. B. (1950): Novye i maloizvestnye vidy triby Erodiini (Coleoptera, Tenebrionidae). — Ent. Obozr., **31**: 231—236 (russisch).
- KASZAB, Z. (1938): Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna Kleinasiens. — Folia Ent. Hung., **5**: 1—7.
- (1939): Vasvári Miklós kisázsiai gyűjtötjainak állattani eredményei. II. Gyászbogarak (Tenebrionidae). Zoologische Ergebnisse der ersten (VI.—X. 1936) und zweiten (V.—VIII. 1937) Forschungsreise N. VASVÁRI's in Kleinasien. Schwarzkäfer (Tenebrionidae). — Math. u. Naturw. Anzeiger d. Ung. Akad. Wiss., **58**: 578—590.
 - (1959): Drei neue *Blaps*- und eine neue *Laena*-Art aus der Türkei und den angrenzenden Gebieten (Coleoptera Tenebrionidae). — Kungl. Fysiogr. Sällskapets i Lund Förh., **29/5**: 51—56.
 - (1960): Wissenschaftliche Ergebnisse der Zoologischen Expedition des National-Museums in Prag nach der Türkei. 24. Coleoptera Tenebrionidae. — Acta Ent. Mus.-Nat. Pragae, **33**: 69—82.
 - (1960): Zwei neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Arabien und Kleinasien. — Ent. Abhandl. Mus. Dresden, **26**: 169—175.
 - (1963): Ergebnisse der österreichischen Iran-Expedition 1949/50. X. Fünf neue Tenebrioniden aus Iran. — Anzeiger d. math.-naturw. Kl. d. Österr. Akad. Wiss., Nr. **5**: 69—77.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [72](#)

Autor(en)/Author(s): Kaszab Zoltán

Artikel/Article: [Ergebnis zoologischer Sammelreisen in der Türkei:
Coleoptera: Tenebrionidae—. 451-463](#)