


- 6* meist deutlicher sichtbar an Holzteilchen wachsend 7
 7 Hutfarbe erst rotbraun, bald gelblichbraun, graufarben
ausblassend;
 Sporengröße 9,0-11,5 X 5,8-6,5 X 7,4-9,5 µm

C. leiocephalus

- 7* nicht mit diesen Merkmalen 8
 8 oft in offenem Gelände, Wiesen etc., wachsend
Hutfarbe erst rotbraun, rostfarben, dann blasser;
 Sporengröße 10,5-14,0 X 6,5-7,5 X 8,1-9,5 µm

C. plicatilis

- 8* nicht mit diesen Merkmalen 9
 9 Hutfarbe erst mit Lilafärbung, schmierig bis fettig
glänzend;
 Sporengröße 10,3-12,4 X 7,2-8,3 X 9,0-11,2 µm

C. spec. (lilatinctus)

- 9° nicht mit diesen Merkmalen 10
 10 Hutfarbe rotbraun bis dattelfarben; Sporen ± rundlich;
 Sporengröße 8,3-11,0 X 7,0-7,3 X 7,3-9,7

C. galericuliformisAufruf zur Mitarbeit

Bei allfälligen Funden einer so intensiv violetten Ramaria fumigata (Peck) Corner, wie sie in B. CETO, Band 3, Nr. 1146, S. 455, abgebildet ist, bitte ich um deren Trocknung und Zusendung (nicht mit der gleichfarbigen Clavaria zollingeri Lév. verwechseln), wenn möglich mit Dia als Farbestätigung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

EDWIN SCHILD
 Borgo Treviso 177
 I-31033 Castelfranco, Italia

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [APN - Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [8_1990](#)

Autor(en)/Author(s): Schild Edwin

Artikel/Article: [Aufruf zur Mi.tai-beit 13](#)