

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 59, Nummer 6

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 59, 6: 1-20

Erschienen am 1. 10. 1985

Beitrag zur Großschmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) des Kreises Bischofswerda

Von TIMM K A R I S C H

Weder das gute, wenn auch teilweise veraltete Verzeichnis der Großschmetterlinge der Oberlausitz von SCHÜTZE (1896), noch andere Werke geben wesentliche Informationen über Schmetterlingsfunde auf dem Gebiet des heutigen Kreises Bischofswerda. In den letzten Jahren und Jahrzehnten war es möglich, ein aktuelles Verzeichnis der Macrolepidopteren dieses Kreises zu erarbeiten. Für die Tagfalter wurden die Ergebnisse bereits veröffentlicht (KARISCH 1984). Die restlichen Großschmetterlingsfamilien sollen in der vorliegenden Arbeit abgehandelt werden.

Ein Überblick über Flora, Geologie und Klima des Kreises Bischofswerda erfolgte bereits (KARISCH 1984). Da eine umfassende Charakteristik aller Fundorte aus Platzgründen an dieser Stelle nicht möglich ist, seien hier nur die wichtigsten zusammen mit der im Text verwandten Abkürzung mit einigen beschreibenden Bemerkungen aufgeführt. Falterfunde in Gemeinden oder Städten bzw. deren unmittelbaren Umgebung laufen unter der Abkürzung des jeweiligen Ortes.

B	Bischofswerda
BBB	Bischofswerda, Butterberg (am Südhang Laubmischwald, sonst unterholzreicher Fichtenforst, einzelne Blockfluren am Osthang)
BBD	Bischofswerda, Belmsdorf
BSW	Bischofswerda, Stadtwald (Mischwald bzw. Fichtenforst)
BU	Burkau
CD	Carlsdorf
CDG	Carlsdorf, Galgenberg (Kiefernforst, in der Krautschicht Brombeere bzw. Heidelbeere in umfangreichen Beständen)
CDR	Carlsdorf, Rückhaltebecken (Erlenbruch bzw. kleiner Fichtenforst am Rand des Stausees, auf der Staumauer Halbtrockenrasen)

DT	Demitz-Thumitz
DTK	Demitz-Thumitz, Klosterberg (am Westhang alte, unterholzarme Buchenbestände, sonst Fichtenforst z. T. in steiler Hanglage, Blockfluren!, zahlreiche Tagebaurestlöcher, gesäumt mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudo-platanus</i> u. a.)
DTP	Demitz-Thumitz, Umgebung Paulabrücke (Ruderalgesellschaft auf ehemaligen Gleisanlagen)
DTS	Demitz-Thumitz, Steinbruchgebiet (große Granodiorittagebaue, unterschiedlich große, z. T. mit <i>Betula pendula</i> bewachsene Gesteinsbänke, xerothermes Gebiet)
DTM	Demitz-Thumitz, Medewitzer Wald (etwa 2 km ² großes Waldgebiet, Laubmischwald: <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudo-platanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Alnus glutinosa</i> u. a., teilweise Fichtenforst bzw. Erlenbruchwald)
DTW	Demitz-Thumitz, Umgebung Wasserwerk (Mischwald)
GA	Großhähnchen
GH	Großharthau
GHM	Großharthau, Masseneirand Richtung Seeligstadt (grasiger, unterholzreicher Fichtenforst auf nassem Standort, am Waldrand <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> usw.)
GR	Großröhrsdorf
MW	Medewitz
MWS	Medewitz, Sandberg (Kiefernforst, große Sandgrube mit Rohrkolbenbeständen und <i>Sarothamnus scoparius</i>)
ND	Naundorf
NDG	Naundorf, Gickelshäuser (Fichtenforst, am Nordhang frische Weidewiesen)
NK	Neukirch
NKA	Neukirch, Valtenberg (Fichtenforst bzw. Buchenwald) in z. T. steiler Hanglage, große Kahlschläge)
NKD	Neukirch, Dahrner Berg (Fichtenforst, alter, wassergefüllter Steinbruch, am Rand <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudo-platanus</i> und <i>Betula pendula</i>)
NKV	Neukirch, Vogelberg (relativ unterholzreicher Fichtenforst, am Fuße des Nordhangs Lichtung mit kniehohen Lärchen)
PO	Pohla
POP	Pohla, Pohlaer Berg (Mischwaldrest in Ackerflur)
PT	Putzkau
PTR	Putzkau, Rüdenberg (in unteren Lagen Mischwald <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> u. a., sonst unterholzreicher Fichtenforst)
R	Rammenau
RN	Rothnaußlitz
SB	Schönbrunn
SC	Schmölln
SCN	Schmölln, Neue Häuser (Mischwald mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Alnus glutinosa</i> usw.)
ST	Steinigtwolmsdorf
STG	Steinigtwolmsdorf, Goldberg (Fichtenforst, teilw. Blockflur, nasse Wiesen mit <i>Cirsium</i>)
TR	Tröbigau
TRH	Tröbigau, Hoher Hahn (Fichtenforst bzw. Laubmischwaldstücken)
U	Uhyst a. T.
UAA	Uhyst a. T., Autobahnauffahrt (Halbtrockenrasen)
UTW	Uhyst a. T., Taucherwald (unterholzreicher Misch- bzw. Laubmischwald)
W	Wölkau

Im systematischen Teil der Arbeit folgt nach der Nennung der Fundorte der Name desjenigen Sammlers, auf den die entsprechende Angabe beruht. Sämtliche mir bekannten Sammlungen mit Material aus dem Kreis Bischofswerda habe ich besichtigt. Schwierige Arten habe ich zur Bestimmung an die Herrn HEINICKE (Noctuidae) und GELBRECHT (Geometridae) gesandt. Aus Platzgründen macht es sich erforderlich, die Namen der Sammler ebenfalls abzukürzen. Die Abkürzungen erscheinen dann jeweils in Klammerangabe.

BE	BECK, Demitz-Thumitz,
BH	BERTHOLDT, Tröbigau,
BR	BÜRGER, Schmölln/Oberl.,
HA	HAUSER, Bautzen,
HE	HEITZ, Bautzen,
J	JÖRNITZ, Bischofswerda,
KA	KARISCH, Demitz-Thumitz,
KL	KLUGE, Demitz-Thumitz,
L	LEPELDT, Schmölln/Oberl.,
M	MARSCHAT, Leipzig,
S	SÜSSMUTH, Radeberg,
V	VOGEL, Görlitz, und
W	WAGNER, Großröhrsdorf.
R	steht für Belege nach Faltern aus der Sammlung von M. RIETZEL, Bischofswerda.

Für die mit + gekennzeichneten Arten bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Fundortangaben bzw. handelt es sich um verschleppte oder verfliegene Individuen.

Zur Charakterisierung der Intensität des Auftretens der einzelnen Arten an ihren Fundorten habe ich allgemeine Häufigkeitsangaben verwandt. Da diese Begriffe sehr subjektiv betrachtet werden, seien sie hier entsprechend ihrer Verwendung in der vorliegenden Arbeit kurz erläutert:

sehr selten	nur wenige Exemplare im Abstand mehrerer Jahre gefunden,
selten	wenige Exemplare und nicht jedes Jahr,
vereinzelt	wenige Exemplare jedes Jahr,
nicht selten	jedes Jahr etwa 10 bis 20 Exemplare,
häufig	jedes Jahr mehr als 20 Exemplare.

Weiterhin erscheinen noch die folgenden Abkürzungen im Text:

a. K.	am Köder gefangen,
a. L.	am Licht gefangen,
e. l.	ex larva,
Expl.	Exemplar(e).

Bei im Kreis Bischofswerda allgemein verbreiteten Arten wird auf die Angabe von Fundorten und Sammlern verzichtet. Genauere Informationen über diese Arten kann der Interessent vom Autor beziehen.

Ich danke hiermit neben den o. g. Entomologen den Herren Dr. DUNGER, Görlitz, FRANKE, Görlitz, Dr. GELBRECHT, Königs Wusterhausen, HEINICKE, Gera, SBIESCHNE, Bautzen, SCHUSCHK, Bautzen, JEREMIES, Köblitz, und Dr. PETERSEN, Eberswalde, für die umfangreiche Unterstützung.

Systematisches Verzeichnis¹

Familie Nolidae

Nola cuculatella L.: DTS selten a. L. (BE), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA).

Familie Lymantriidae

Dasychira pudibunda L.: häufig.

Orgyia recens HBN.: DT sehr selten (BE).

Leucoma salicis L.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), e. l. von Pappel am Volksgut
DT (M, KA), NK (V).

Lymantria dispar L.: DT sehr selten a. L. (BE, KA), B (V).

Lymantria monacha L.: DT vereinzelt, 1982/83 häufig a. L. (BE), CDR e. p. (MA),
SCN selten a. L. (KA), B (R). Etwa 25 % aller Expl. = f. *monacha* L.

Euproctis chrysorrhoea L.: DT vereinzelt a. L. (M, KA), B (R, V).

Porthesia similis FUESSL.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, KA), DTM vereinzelt (KA), B (V).

Familie Arctiidae

Cybosia mesomella L.: DTM, selten (KA), MWS, selten (KA), PTR (V).

Eilema depressa ESP.: B (V), NKV ein Expl. 1982 (BE).

Eilema lutarella L.: B 1 Expl. 23. 08. 1955 (V).

Eilema complana L.: DT nicht selten a. L. (KA), B (R, V), NKV vereinzelt a. L. (BE).

Eilema lurideola ZINCK.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA, M), NKV nicht selten a. L. (BE, KA).

Atolmis rubricollis L.: B (V), 1946 (R), NKV 1 ♂ 25. 06. 1982 (BE).

Coscinia cribraria L.: DTM 1 ♂ 1979 (KA).

Phragmatobia tuliginosa L.: häufig.

Parasemia plantaginis L.: DTM nicht selten (BE, M, KA), MWS vereinzelt (1 ♂ f. *hospita*) (KA), TRH häufig (f. *hospita* vereinzelt) (BH), BSW vereinzelt (KA), PTR (V), SC (L), SB nicht selten (KA, J), POP selten (KA), Ringenhain selten (KA).

Spilarctia lubricipeda L.: häufig.

Spilosoma menthastri ESP.: häufig.

Spilosoma urticae ESP.: DT 1 ♂ a. L. (M).

Cynia mendica CL.: DT selten (KA), DTP selten (M), B (R).

Arctia caja L.: häufig.

Panaxia dominula L.: DTK (M), Ohorn 1953 (L), BBB e. l. 1938 (R).

Panaxia quadripunctaria PODA: PTR 1 Expl. 08. 08. 1954 (V) – Fundortangabe richtig? +

Thyria jacobaea L.: CDR (M nach SCHNEIDER) – Kein Beleg mehr vorhanden! +

¹ Stand vom 31. September 1984

Familie Notodontidae

- Harpyia bicuspis* BRKH.: B 1 Expl. 08. 06. 1954 (V).
- Harpyia turcula* CL.: DT selten a. L. (B), DTS selten a. L. (BE, KA), B (V).
- Harpyia hermelina* (GOEZE): DTS und DT selten bis vereinzelt a. L. (BE, KA, M), NKD selten a. L. (KA), B (V).
- Cerura erminea* ESP.: DTS sehr selten a. L. (BE, KA).
- Cerura vinula* L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, KA, M), BBD e. l. von *Populus tremula* (BH), B (V).
- Stauropus fagi* L.: DT selten (BE), NKV selten am Licht (BE, KA).
- Hibocampa milhauseri* F.: DTS und DT sehr selten a. L. (BE, KA), DTW sehr selten (KA), B (V).
- Gluphisia crenata vertunae* DERENNE: DTS und DT vereinzelt, jahrweise nicht selten a. L. (BE, KA, M), NKD häufig a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (BE, KA).
- Drymonia querna* F.: DTS selten bis sehr selten a. L. (BE), B (V).
- Drymonia trimacula dodonea* HBN.: nicht selten.
- Drymonia ruficornis* HUFN.: DT und DTS nicht selten.
- Peridea anceps* GOEZE: DTS und DT nicht selten a. L. (M, BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (V).
- Phosia tremula* CL.: DT und DTS nicht selten a. L. (M, BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (V).
- Phosia gnoma* F.: DT und DTS nicht selten a. L. (M, BE, KA).
- Notodonta phoebe* SIEB.: DTS vereinzelt a. L. (BE, KA), DT selten a. L. (BE, KA), NKD selten a. L. (KA), B (V).
- Notodonta dromedarius* L.: nicht selten.
- Notodonta ziczac* L.: nicht selten.
- Leucodonta bicoloria* DEN. & SCHIFF.: DTS vereinzelt, DT selten a. L. (BE, KA), DTM (M), SCN nicht selten a. L. (KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA).
- Odontesia carmelita* ESP.: DTS selten a. L. (BE, KA), DT sehr selten a. L. (KA).
- Lophopteryx camelina* L.: häufig.
- Lophopteryx cuculla* ESP.: DTS und DT selten a. L. (M, BE), SC (B), NKV selten a. L. (BE, KA).
- Pterostoma palpina* L.: häufig.
- Ptilophora plumigera* ESP.: DT 2 ♂ 1979, 1 ♀ 1981 a. L. (KA), TR 1 ♂ 1980 (BH).
- Phalera bucephala* L.: DT und DTS nicht selten a. L. (M, BE, KA), SC (L), B (V).
- Clostera curtula* L.: DT und DTS häufig a. L. (M, BE, KA).
- Clostera anastomosis* L.: DT und DTS selten a. L. (BE, KA).
- Clostera pigra* HUFN.: DT und DTS a. L. (M, KA).

Familie Zygaenidae

- Procris statice* L.: DTP selten (BE, M, KA), B (V).
- Mesembrynus purpuralis* BRÜNN.: B (R) – Fundortangabe exakt? +
- Zygaena filipendulae* L.: CDR vereinzelt (HA, M, S, KA), DTP selten (BE, KA).

Huebneriana tritolii ESP.: DTP häufig (HA, KL, M, BE, KA), CDR häufig (M, KA), B (R, V).

Familie Cochliidiidae

Apoda limacodes HUFN.: DTP 1 Expl. (BE).

Familie Sphingidae

Mimas tiliae L.: nicht selten.

Laothoe populi L.: nicht selten.

Smerinthus ocellata L.: DTS und DT vereinzelt a. L. (BE, KA), B (V).

Acherontia atropos L.: DT 1 ♀ e. l. 1970 von *Solanum tuberosum* (M).

Agrius convolvuli L.: DT und DTS jahrweise vereinzelt a. L. (M, BE, KA), SC (L, BR), B jahrweise selten bis vereinzelt a. L. (J, KA).

Sphinx ligustri L.: DT vor 1970 (WEBER), B (V).

Hyloicus pinastri L.: in Kiefern- bzw. Fichtenforsten vereinzelt bis häufig a. L.

Hyles euphorbiae L.: TR e. l. (BH), B (V) – Da keine umfangreicheren Bestände von *Euphorbia cyparissias* im Kreis vorhanden, wahrscheinlich kein ständiger Bestandteil der Fauna!

Hyles galii ROTT.: B (V). +

Deilephila elpenor L.: DT, DTS und DTW nicht selten a. L. (M, BE, HA, KA, KL), B (R, V), NKV (B).

Deilephila porcellus L.: DT und DTS selten a. L. (BE).

Macroglossum stellatarum L.: DT 1982 und 1984 je 1 Expl. (BE); B 1 Expl. 1983 (KA), SC 2 Expl. 1976 (L).

Familie Thyatiridae

Habrosyne pyritoides HUFN.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, M, KA); NKV vereinzelt a. L. (BE, KA); GHM nicht selten a. L. (BE, KA).

Thyatira batis L.: DT selten a. L. (BE, KA); NKV vereinzelt, NKD nicht selten a. L. (S, BE, KA).

Tethea fluctuosa HBN.: DT sehr selten (BE, M, KA); NKV und NKD vereinzelt a. L. (S, BE, M, KA); TR (B); GHM selten a. L. (BE, KA).

Tethea duplaris L.: NKD nicht selten a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (BE, KA).

Tethea or DENIS & SCHIFF.: häufig (in der f. *albigensis* zu ca. 65 %).

Polyploca flavicornis L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (M, BE, KA).

Familie Drepanidae

Drepana falcata L.: häufig.

Drepana lacertinaria L.: DT selten a. L. (BE, KA), DTM vereinzelt (M), B (R).

Drepana binaria HUFN.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, M, KA), SCN selten (KA), BU vereinzelt a. L. (KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA).

Drepana cultraria F.: DT selten a. L. (BE, KA), SCN vereinzelt a. L. (BE, KA), NKA häufig (KA), NKV vereinzelt, NKD häufig a. L. (S, BE, KA).

Familie Syssphingidae

Agria tau L.: NKA (HE), DT 1 ♂ 1982 (KA).

Familie Saturniidae

Eudia pavonia L.: TRH häufig (BH), SC (L), DT 1 ♀ 1981 (KA).

Familie Lasiocampidae

Malacosoma neustria L.: DTM selten (M, KA), B (V).

Trichiura crataegi L.: DT und DTS selten a. L. (BE, KA), DTM 1980 einige Raupen auf *Betula pendula*-Jungwuchs gefunden (M, KA). 1 Expl. mit weißlicher Flügelgrundfarbe 09. 09. 1981 DT (BE).

Poecilocampa populi L.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), DTM vereinzelt (M, KA).

Eriogaster lanestris L.: B 19. 05. 1953 (V).

Lasiocampa quercus L.: B (V). +

Macrothylacia rubi L.: DTS selten a. L. (KA), CDG selten (S, KA), DTM 1 ♂ 1978 (KA), NKD 1 Expl. 1982 (S), B (V).

Philudoria potatoria L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (M, BE, KA), DTM vereinzelt (M, KA, KL), SC (L), MWS selten (KA).

Cosmotriche lunigera lobulina ESP.: DT 1 ♂ 04. 08. 1968 (BE).

Epicnaptera ilicifolia L.: DT 1 Expl. 23. 05. 1977 (BE).

Epicnaptera tremulifolia HBN.: DT und DTS selten bis sehr selten a. L. (M, BE).

Gastropacha quercifolia L.: B (V).

Odonestis pruni L.: B 1957 (V).

Dendrolimus pini L.: CDR sehr selten (M).

Familie Psychidae

Epichnopteryx pulla ESP.: DTS selten (KA), DTM vereinzelt (KA), CDR selten (KA).

Fumea casta PALL.: häufig.

Proutia betulina Z.: CDR selten (BE).

Talaeporia tubulosa TETZ.: häufig.

Familie Aegeriidae

Aegeria apiformis CL.: DT vereinzelt (M, BE, KA).

Synanthedon sphecoformis GERNING: DTM, 1 Expl. an *Alnus glutinosa* (BE).

Synanthedon tipuliformis CL.: DT und DTP, wahrscheinlich vereinzelt (BE, KA).

Familie Hepialidae

Hepialus humuli L.: nicht selten.

Hepialus fusconebulosus DE GEER: DT sehr selten (KA). DTM selten (KA), NKV nicht selten a. L. (BE, M, KA).

Hepialus sylvina L.: häufig.

Familie Cossidae

Cossus cossus L.: DT 1 ♀ (WEBER in coll. M), B 1 Expl. 08. 06. 1957 (V).

Zeuzera pyrina L.: DT selten, DTS vereinzelt a. L. (BE, M, KA).

Familie Noctuidae

- Euxoa aquilina* DEN. & SCHIFF.: DT 1 Expl. 1980 a. L. (KA).
- Euxoa obelisca* DEN. & SCHIFF.: DT einige Expl. 1980 (M).
- Agrotis cinerea* DEN. & SCHIFF.: B 06. 06. und 14. 06. 1055 je ein Ex. (VOGEL 1957).
- Agrotis segetum* DEN. & SCHIFF.: häufig.
- Agrotis exclamationis* L.: häufig.
- Agrotis ipsilon* HUFN.: nicht selten.
- Ochropleura praecox* L.: DTS 1 Expl. 1980 a. L. (BE).
- Ochropleura plecta* L.: häufig.
- Rhyacia simulans* HUFN.: DT 1983 einige Expl. (BE, KA).
- Rhyacia lucipeta* DEN. & SCHIFF.: DTS 1 ♂ 1979 (BE), DTS 1 ♂ 1980 (M).
- Noctua pronuba* L.: häufig.
- Noctua comes* HBN.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), DTP vereinzelt (KA), B (V).
- Noctua fimbriata* SCHREBER: DT vereinzelt a. L. (BE, M, KA), B (V), PTR (R).
- Noctua janthina* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS selten (BE, KA), B 1 Expl. 1980 (KA), DTW selten a. L. (BE, KA).
- Opigena polygona* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS jahrweise vereinzelt bis selten a. L. (BE, KA).
- Graphiphora augur* F.: DT nicht selten a. L. (M, BE), B (V), GHM nicht selten a. L. (BE, KA).
- Eugraphe sigma* DEN. & SCHIFF.: PTR (R), DT 1976 (BE), B (V), NKV selten a. L. (KA).
- Lycophotia molothina* ESP.: DT 1 Expl. (MA).
- Lycophotia porphyrea* DEN. & SCHIFF.: DT 1 Expl. 1973 (BE), PTR 1948 (R), B (V), NKV selten a. L. (KA).
- Diarsia mendica* F.: NKV häufig a. L. (M, BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA).
- Diarsia brunnea* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (M, KA), B (V), NKV selten a. L. (BE, KA), GHM vereinzelt a. L. (KA, BE).
- Diarsia rubi* VIEW.: DT vereinzelt a. L. (BE, M, KA), NKD nicht selten a. L. (S, KA), B (V).
- Xestia c-nigrum* L.: jahrweise häufig.
- Xestia ditrapezium* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS nicht selten (BE, M, KA), NKV häufig a. L. (M, BE, KA), B (V).
- Xestia triangulum* HUFN.: DT selten a. L. (BE, KA), B (V), NKV selten a. L. (BE, KA), GHM selten a. L. (BE, KA).
- Xestia ashworthii candelarum* STGR.: B 1 Expl. 20. 05. 1955 a. L. (VOGEL 1957). +
- Xestia baja* DEN. & SCHIFF.: DT und DTM 1980 nicht selten a. L. und a. K. (M), B (V).
- Xestia sexstrigata* HAWR.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), SCN selten a. L. (KA).

Xestia xanthographa DEN. & SCHIFF.: häufig.
Naenia typica L.: DT und DTP vereinzelt bis selten (BE, KA), SC selten a. L. (BE).
Eurois occulta L.: DT selten bis sehr selten (KL, BE, KA).
Anaplectoides prasina DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (KA), NKV vereinzelt a. L. (M, KA, BE).
Cerastis rubricosa DEN. & SCHIFF.: DT und DTS vereinzelt a. L. (M, BE, KA), B (R, V).
Cerastis leucographa DEN. & SCHIFF.: DT 1 Expl. 16. 04. 1981 (KA).
Discestra trifolii HUFN.: häufig.
Hada proxima HBN.: DT (BE), NKV vereinzelt 1982 a. L. (BE, KA).
Hada nana HUFN.: PTR 1938 (R), DT selten (BE), NK 1 Expl. (BE), B (V).
Polia bombycina HUFN.: DTS vereinzelt a. L. (BE), PTR 1946 (R), B (V), NKV häufig am Licht (BE, M, KA).
Polia hepatica CL.: B (V), NKV vereinzelt a. L. (M, BE, KA), DTS selten a. L. (BE).
Polia nebulosa HUFN.: DT vereinzelt a. L. (BE), PTR 1946 (R), B (V), NKV nicht selten a. L. (BE, KA, M).
Pachetra sagittigera HUFN.: DT sehr selten (BE, KA).
Heliophobus reticulata GOEZE: B 2 Expl. 06. 1936 (R).
Heliophobus texturata ALPH.: DTS 1 ♂ am 11. 06. 1979 a. L. (BECK 1982).
Mamestra brassicae L.: häufig.
Mamestra persicariae L.: häufig.
Mamestra contigua DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (M, BE), PTR 1935 (R), B (V).
Mamestra w-latinum HUFN.: DT vereinzelt a. L. (M, KA), NK 1 Expl. (BE).
Mamestra thalassina HUFN.: häufig.
Mamestra suasa DEN. & SCHIFF.: DT (BE), B (R, V).
Mamestra oleracea L.: DT häufig (BE), B (V).
Mamestra pisi L.: häufig.
Mamestra bicolorata HUFN.: DT selten (BE, M, KA), PTR 1936 (R).
Hadena rivularis F.: DT selten a. L. (BE), B (V).
Hadena compta DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (BE, M, KA), PTR 1936 (R), B (V).
Hadena bicurris HUFN.: DT vereinzelt a. L. (M, BE, KA).
Cerapteryx graminis L.: häufig.
Tholera cespitis DEN. & SCHIFF.: B 1935 (R), (V).
Tholera decimalis PODA: DT vereinzelt a. L. (M, KA), B (R, V).
Panolis flammea DEN. & SCHIFF.: DT sehr selten (BE), DTW 1 Expl. (KA), PTR 1934 (R), B (V).
Egira conspiciellaris L.: DT sehr selten a. L. (M).
Orthosia cruda DEN. & SCHIFF.: häufig.
Orthosia populeti F.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), DTM vereinzelt (M), B (V).

- Orthosia gracilis* DEN. & SCHIFF.: DT selten bis vereinzelt a. L. (BE), SCN selten a. L. (KA), B (V).
- Orthosia stabilis* DEN. & SCHIFF.: häufig.
- Orthosia incerta* HUFN.: häufig.
- Orthosia munda* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), CDR und CDG (KA, S), MWS vereinzelt (KA), GHM nicht selten a. K. (KA, KL), B (V).
- Orthosia gothica* L.: häufig.
- Mythimna conigera* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (M), B (V).
- Mythimna ferrago* F.: häufig.
- Mythimna albipuncta* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (M), B (V).
- Mythimna pudorina* DEN. & SCHIFF.: DT 1 Expl. (BE).
- Mythimna impura* HBN.: nicht selten.
- Mythimna pallens* L.: häufig.
- Mythimna l-album* L.: DT, DTS und DTK nicht selten a. L. und a. K. (BE, KA), B (V).
- Mythimna obsoleta* HBN.: DT selten a. L. (KA), B (V).
- Mythimna comma* L.: nicht selten.
- Cucullia fraudatrix* EV.: DTP 1980 e. l. (BE).
- Cucullia chamomillae* DEN. & SCHIFF.: DTP, DTS vereinzelt (BE, KA).
- Cucullia umbratica* L.: nicht selten.
- Cucullia tanaceti* DEN. & SCHIFF.: DTP 1 Expl. e. l. 1975 (BE) von *Tanacetum vulgare*.
- Calophasia lunula* HUFN.: DT selten a. L. und e. l. von *Linaria vulgaris* (BE, M).
- Brachyolmia viminalis* F.: DT und DTS jahrweise häufig, sonst selten a. L. (BE, M, KA).
- Brachionycha sphinx* HUFN.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), DTM und CDR vereinzelt (M, KA).
- Brachionycha nubeculosa* ESP.: DT und DTS selten bis sehr selten a. L. (BE, KA).
- Lithomoia solidaginis* HBN.: DT 1 ♀ 1979 a. L. (KA), DTS 1 Expl. 1980 a. L. (BE).
- Lithophane ornithopus* HUFN.: DTS 1 Expl. (BE), PTR 1 Expl. 03. 1938 (R).
- Lithophane turcitera* HUFN.: DT 1 Expl. (M).
- Xylena vetusta* HBN.: B (R, V), DTK 1 Expl. 1983 a. K. (BE).
- Xylena exoleta* L.: PTR 1 Expl. 03. 1936 (R), B 1 Expl. 11. 08. 1955 (V).
- Allophyes oxyacanthae* L.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Dryobotodes eremita* F.: B 1 Expl. 09. 1946 a. L. (R). +
- Blepharita satura* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS nicht selten a. L. (KA, M, BE), DTM nicht selten a. K. (M, BE), B (R, V).
- Blepharita adusta* ESP.: B 1 Expl. 09. 1947 (R) und 2 Expl. 1957 (V).
- Polymixis gemmea* TR.: DT 1 Expl. 1980 (BE), B (V), NKV 1 ♂ 25. 07. 1982 a. L. (BE).

Polymixis xanthomista HBN.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, M, KA, SCHUSCHK).

Eupsilia transversa HUFN.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), B (V).

Coinstra vaccinii L.: nicht selten.

Conistra rubiginosa SCOP.: DT und DTS vereinzelt bis selten a. L. (M, KA, BE).

Conistra rubiginea DEN. & SCHIFF.: B 1952 (V).

Agrochola circellaris HUFN.: DT und DTS nicht selten a. L. und a. K. (BE, KA, M), B (V).

Agrochola lota CL.: DT sehr selten a. L. (BE, KA), B (R, V), NK (BE).

Agrochola macilenta HBN.: DTS 1 Expl. a. L. (KL).

Agrochola helvola L.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), PTR (R), B (V).

Agrochola litura L.: nicht selten.

Agrochola lychnidis DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (BE, KA), B (R, V), NK (BE).

Parastichtis suspecta HBN.: DT und DTS 1980 einige Expl. a. L. (M, BE, KA).

Xanthia togata ESP.: DT selten a. L. (KA), DTS vereinzelt a. L. (BE), DTM selten (M), PTR 1936 (R), NK (BE), B (V).

Xanthia icteritia HUFN.: häufig.

Xanthia citrargo L.: DT und DTK selten (BE, KA), B (R, V).

Simyra albovovosa GOEZE: DT und DTS 1983 3 Expl. a. L. (BE, KA).

Acronicta megacephala DEN. & SCHIFF.: nicht selten.

Acronicta aceris L.: DT und DTS vereinzelt (BE), B (V).

Acronicta leporina L.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (V), UTW selten (KA).

Acronicta alni L.: DT, DTS und DTW sehr selten a. L. (BE, KA).

Acronicta psi L.: DT und DTS häufig a. L. (BE, M, KO), NKD vereinzelt a. L. (S, KA), B (V).

Acronicta auricoma DEN. & SCHIFF.: PTR 1935 (R), B (V), DT 1 Expl. (BE), R 1 Expl. 1982 a. L. (KA).

Acronicta rumicis L.: nicht selten.

Craniophora ligustri DEN. & SCHIFF.: DT (M).

Cryphia fraudatricula HBN.: DT 1980 2 Expl. a. L. (KA).

Cryphia algae F.: B 1 Expl. 20. 07. 1955 (V). +

Cryphia domestica HUFN.: DT, DTS und DTW vereinzelt a. L. (M, BE, KA), B (R, V).

Amphipyra pyramidea L.: DT und DTS häufig a. K. und a. L. (M, BE, KA), DTM nicht selten a. K. (M, BE), B (V).

Amphipyra tragogonon CL.: DT nicht selten a. L. (BE, KA, M), B (R, V), NK (BE).

Mormo maura L.: DT 1 ♀ 08. 1984 (BE).

Dipterygia scabriuscula L.: DT (M).

Rusina ferruginea ESP.: vereinzelt.

- Thalpophila matura* HUFN.: DT (BE).
- Trachea atriplicis* L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (M, BE), B (R, V).
- Euplexia lucipara* L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (M, BE, KA), B (R, V), NKV (BE), GHM selten a. L. (BE, KA).
- Phlogophora meticulosa* L.: DT und DTS jahrweise vereinzelt a. L. (BE, M, KA), NK (BE).
- Phlogophora scita* HBN.: NK 1 Expl. (BE), B 1953 (V).
- Ipimorpha retusa* L.: DT vereinzelt a. L. (BE, M).
- Ipimorpha subtusa* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (BE, M), SCN 1 Expl. 1980 a. L. (KA), B (R), DTW 1 Expl. a. L. 1984 (KA).
- Enargia palaeacea* ESP.: DT, DTW, DTK und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), B (V).
- Enargia ypsillon* DEN. & SCHIFF.: DT (M).
- Cosmia affinis* L.: B 1 Expl. 14. 06. 1954 (V). +
- Cosmia trapezina* L.: häufig.
- Cosmia pyralina* DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt (BE), B (V).
- Hyppa rectilinea* ESP.: NKV selten a. L. (KA), NKD selten a. L. (KA), GHM selten a. L. (KA).
- Actinotia polyodon* CL.: DT (M), B 1 Expl. 22. 08. 1955 (VOGEL 1957).
- Apamea monoglypha* HUFN.: häufig.
- Apamea lithoxylea* DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (KA, M), B (V).
- Apamea sublustris* ESP.: B (V).
- Apamea crenata* HUFN.: nicht selten.
- Apamea lateritia* HUFN.: DT selten a. L. (BE).
- Apamea remissa* HBN.: DT selten a. L. (M, BE), NKV vereinzelt a. L. (BE, KA), B (V).
- Apamea unanimitis* HBN.: DT selten a. L. (BE).
- Apamea scolopacina* ESP.: DT, DTS, DTK und DTW selten bis vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Apamea ophiogramma* ESP.: DT selten a. L. (M).
- Oligia strigilis* L.: häufig.
- Oligia latruncula* DEN. & SCHIFF.: vereinzelt.
- Oligia fasciuncula* HAWR.: DT und DTK selten a. L. (BE), NKV selten a. L. (KA).
- Mesoligia furuncula* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (M, BE), DTS vereinzelt a. L. (BE), B (R).
- Mesapamea secalis* L.: DT und DTS nicht selten (BE, KA).
- Mesapamea secalella* REMM.: DT vereinzelt (BE, KA).
- Photedes pygmina* HAWR.: DT sehr selten a. L. (M, KA).
- Luperina testacea* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS häufig a. L. (BE, M, KA), NK (BE).
- Amphipoea oculea* L.: DT selten a. L. (M), B (R, V).
- Amphipoea fucosa* FRR.: DT selten a. L. (KA, M), B (V).

- Hydraecia micacea* ESP.: DT und DTS häufig a. L. (BE, M, KA), B (R), NK (BE).
- Gortyna flavago* DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (M, KA), DTM vereinzelt (M).
- Calamia tridens* HUFN.: DT und DTS je 1 Expl. a. L. (BE).
- Celaena leucostigma* HBN.: DT selten a. L. (M). +
- Nonagria typhae* THNBG.: DT selten bis vereinzelt a. L. (BE, M, KA), DTM und MWS Raupe häufig (BE, M, KA), CD nicht selten (KA), BU nicht selten (KA).
- Archana sparganii* ESP.: MWS vereinzelt (BE, M, KA), BU nicht selten (KA), CDG (BE), NK (BE).
- Rhizedra lutos* HBN.: DT sehr selten a. L. (BE, KA).
- Charanyca trigrammica* HUFN.: DT selten a. L. (M, KA), B (R, V).
- Hoplodrina alsines* BRAHM: häufig.
- Hoplodrina blanda* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (M), B 1 Expl. 26. 07. 1955 (VOGEL 1957).
- Hoplodrina respersa* DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (BE, KA), NKV selten a. L. (BE).
- Caradrina morpheus* HUFN.: DT selten a. L. (M), B 1946 (R).
- Panemeria tenebrata* SCOP.: häufig.
- Pyrrhia umbra* HUFN.: DT selten a. L. (M, BE, KA).
- Axylia putris* L.: nicht selten.
- Lithacodia pygarga* HUFN.: DT selten a. L. (BE), NKD selten a. L. (S, KA), GHM selten a. L. (KA, BE), B (VOGEL 1957).
- Lithacodia deceptor* SCOP.: DTM vereinzelt (KA), DT selten a. L. (BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (VOGEL 1957).
- Deltote bankiana* F.: DT selten a. L. (M).
- Bena prasinana* L.: DT 1 Expl. 1979 a. L. (KA), MWS 1 ♀ 26. 06. 1977 (BE).
- Bena fagana* F.: DT jahrweise vereinzelt a. L. (BE, KA), DTK vereinzelt (KA), NKD vereinzelt a. L. (BE, KA, S).
- Panthea coenobita* ESP.: DT selten a. L. (M, KA, BE), NKV vereinzelt a. L. (M, BE, KA), BBD (V).
- Colocasia coryli* L.: DT nicht selten a. L. (M, BE, KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA), B (V).
- Abrostola trigemina* L.: DT und DTW vereinzelt a. L. (BE, M, KA), B (R).
- Abrostola triplasia* L.: B 1 ♂ 05. 1946 (R). +
- Diachrysia chrysitis* L.: nicht selten.
- Macdunnoughia confusa* STEPH.: DT selten a. L. (BE, M, KA), NK (BE).
- Plusia festucae* L.: DT unregelmäßig und selten a. L. (M).
- Autographa gamma* L.: häufig.
- Autographa pulchrina* HAWR.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA), NKV nicht selten a. L. (BE, KA), B (V).
- Autographa bractea* DEN. & SCHIFF.: DT unregelmäßig und selten a. L. (BE, KA), B 1 ♂ 1966 a. L. (BE), SC (BE).

Catocala traxini L.: DT, DTM, DTK, DTS vereinzelt a. L. und a. K. (BE, M, KA), B (R).

Catocala nupta L.: DT und DTS vereinzelt a. L. und am Köder (M, BE, KA).

Catocala promissa DEN. & SCHIFF.: B 1 Expl. 10. 07. 1950 (V). +

Minucia lunaris DEN. & SCHIFF.: DTS 1 Expl. 1979 (BE).

Callistege mi CL.: häufig.

Euclidia glyphica L.: nicht selten.

Lygephila pastinum TR.: DT selten (BE), B (V).

Scoliopteryx libatrix L.: DT vereinzelt a. L. (BE, M, KA).

Laspeyria flexula DEN. & SCHIFF.: DT selten a. L. (BE), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA).

Colobochyla salicalis DEN. & SCHIFF.: DTM selten (KA), DT und DTS selten a. L. (M, BE).

Parascotia fuliginaria L.: DT selten, 1980 nicht selten a. L. (BE, KA).

Rivula sericealis SCOP.: DT, DTK, DTW und DTS häufig a. L. (M, BE, KA), SC (BE), GHM (BE, KA).

Herminia tarsipennalis TR.: DT selten a. L. (M, KA), B (R, V).

Herminia nemoralis F.: DTM 1 Expl. e. l. (KA).

Hypena crassalis F.: DT, DTM selten (M, BE), BSW selten (KA), NKD selten a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (BE, KA).

Hypena rostralis L.: DT selten a. L. (BE), B 1 Expl. 28. 07. 1957 (V).

Hypena proboscidalis L.: häufig.

Familie Geometridae

Archiearis parthenias L.: DTP, DTM nicht selten (BE, KA), MWS häufig (M, KA), PTR (R), B (V).

Archiearis notha HBN.: DTK, DTM nicht selten (M, BE), MWS vereinzelt (KA), GHM vereinzelt (KL, KA).

Alsophila aescularia DEN. & SCHIFF.: häufig.

Alsophila quadripunctaria ESP.: BSW (M, BE), DT 1979 nicht selten a. L. (KA).

Euchoeca nebulata SCOP.: DTM vereinzelt (KA), DT vereinzelt a. L. (BE), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA).

Asthena albulata HUFN.: DTK 1 Expl. 02. 07. 1976 (BE).

Hydrelia flammeolaria HUFN.: DTK (BE), MWS (BE), GH selten (KA).

Spargania luctuata DEN. & SCHIFF.: B 1 ♀ 17. 07. 1956 (V), PTR 1 Expl. 06. 1948 (R), NKD selten a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (BE, M, KA).

Epirrita dilutata DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (KA), DTM vereinzelt (M, KA).

Epirrita autumnata BKH.: DT nicht selten a. L. (M, KA), DTM vereinzelt (KA).

Operophtera lagata SCHRFB.: häufig.

Operophtera brumata L.: häufig.

Pelurga comitata L.: DT und DTS häufig a. L. (BE, KA), NK (BE), B (V).

- Mesoleuca albicillata* L.: DTS und DT selten a. L. (BE, KA), DTW selten (KA), DTM selten (KA), NKV (BE).
- Cosmorhoe ocellata* L.: DT nicht selten a. L. (BE, KA), NKD selten a. L. (S, KA), SC (B), B (V, R).
- Eulithis prunata* L.: DT vereinzelt a. L. (BE), B (R).
- Eulithis populata* L.: nicht selten.
- Eulithis mellinata* F.: CDG selten (KA), SC (BE), B (V).
- Eulithis pyraliata* DEN. & SCHIFF.: DT selten (BE), B (V).
- Ecliptopera silaceata* WARREN: DT vereinzelt a. L. (M, BE, KA), SCN vereinzelt (KL, KA), B (R, V), NKD nicht selten a. L. (S, KA), NKV vereinzelt a. L. (KA).
- Ecliptopera capitata* H.-S.: CDR 2 Expl. 1982 e. l. von *Impatiens noli-tangere* (KA).
- Chloroclysta siterata* HUFN.: DT 1 Expl. 30. 10. 1978 (BE).
- Chloroclysta citrata* L.: DT (M).
- Chloroclysta truncata* HUFN.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, KA), DTM (KA), DTK (BE).
- Cidaria fulvata* FORST.: DT selten a. L. (KA), SC (BE), B (R).
- Plemyra rubiginata* DEN. & SCHIFF.: B 1 Expl. 05. 07. 1957 a. L. (V.), DTM 1 ♀ 1980 (KA).
- Thera obeliscata* HBN.: CDG selten (KA), DT selten a. L. (BE).
- Thera variata* DEN. & SCHIFF.: in Fichtenforsten häufig.
- Thera juniperata* L.: DT vereinzelt a. L. (M, KA, BE).
- Electrophaes corylata* THNBG.: DT selten (BE), NKD häufig a. L. (S, KA). NKV vereinzelt a. L. (BE, KA), CDR (BE), B (V).
- Hydriomena furcata* THNBG.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, M, KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA).
- Hydriomena impluviata* DEN. & SCHIFF.: NKV 1 Expl. 27. 06. 1982 a. L. (KA).
- Horisme corticata* DEN. & SCHIFF.: B 1 ♀ 19. 07. 1955 (V.). +
- Rheumaptera hastata* L.: DTM vor 1970 (BE), B 1 Expl. 15. 07. 1954 (V), PTR 06. 1946 (R).
- Rheumaptera undulata* L.: B (V), PTR 07. 1947 (R), NKV 1982 (BE).
- Eupithecia tenuiata* HBN.: DT vereinzelt (BE), B (V).
- Eupithecia plumbeolata* HAW.: DT 1982 (BE), CDG nicht selten (BE).
- Eupithecia abietaria* GOEZE: DT 1 Expl. 19. 06. 1978 a. L. (BE).
- Eupithecia bilunulata* ZETT.: MWS 1981 selten (KA), DTK 1982 nicht selten (KA).
- Eupithecia linariata* DEN. & SCHIFF.: DT vereinzelt a. L. (BE), NKV 1982 a. L. (BE).
- Eupithecia venosata* F.: DT und DTS selten a. L. (BE, KA).
- Eupithecia centaurearia* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS nicht selten a. L. (M, BE, KA), B (V, R).
- Eupithecia trisignaria* H.-S.: DTM 1981 (BE).

- Eupithecia intricata arceuthata* FRR.: DT seit 1980 selten a. L. (KA).
- Eupithecia satyrata* HBN.: NKV selten a. L. (BE).
- Eupithecia absinthiata* CL.: DT, DTS und DTP nicht selten (M, BE, KA), TR vereinzelt (KA).
- Eupithecia assimolata* DBLD.: DT 1 Expl. 13. 06. 1979 (BE).
- Eupithecia vulgata* HAW.: häufig.
- Eupithecia tripunctaria* H.-S.: DT nicht selten (BE), B (V).
- Eupithecia denotata* HBN.: DT selten (BE).
- Eupithecia subfuscata* HAW.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, KA), NKV nicht selten a. L. (BE).
- Eupithecia icterata* VILL.: DT und DTS häufig a. L. (BE, M, KA), NKV 1982 (BE).
- Eupithecia succenturiata* L.: häufig.
- Eupithecia subumbrata* DEN. & SCHIFF.: NKV 1982 vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Eupithecia sinousaria* EV.: DT 1 Expl. a. L. (MA).
- Eupithecia pimpinellata* HBN.: NKV selten 1982 a. L. (BE).
- Eupithecia nanata* HBN.: DT selten (BE), DTW vereinzelt a. L. (KA), B (R).
- Eupithecia innotata* HUFN.: DT selten a. L. (BE).
- Eupithecia virgaureata* DBLD.: SC selten 1981 (BE), DT 1978 sehr selten (KA).
- Eupithecia lanceata* HBN.: DT 1978 selten a. L. (BE).
- Eupithecia lariceata* FRR.: DT selten a. L. (BE).
- Eupithecia tantillaria* BSD.: DTM nicht selten (KA), SC nicht selten (KA), BSW nicht selten (KA), DTK häufig (KA).
- Gymnoscelis rufifasciata* HAW.: DT selten a. L. (BE).
- Chloroclystis v-ata* HAW.: DT selten a. L. (BE).
- Calliclystis rectangulata* L.: häufig.
- Calliclystis debiliata* HBN.: DTM nicht selten (M, KA), CDG häufig (BE, KA).
- Anticollis sparsata* TR.: DTM 1 Expl. 1981 (KA).
- Perizoma alchemillata* L.: häufig.
- Perizoma flavofasciata* THNBG.: DT und DTS selten bis vereinzelt a. L. (BE, M, KA), B (V).
- Perizoma didymata* L.: DTK selten (KA), B (V), BSW (BE).
- Euphyia unangulata* HAW.: DT und DTS selten a. L. (BE, KA), NKV und NKD nicht selten a. L. (BE, KA, S), GH (BE).
- Orthonama vittata* BKH.: B 1 Expl. 24. 07. 1955 (V).
- Xanthorhoe birivata* BKH.: CDR selten (M, KA).
- Xanthorhoe designata* HUFN.: DTP nicht selten (KA, M), DT und DTS nicht selten a. L. (M, BE, KA), CDR (M), SCN selten a. L. (KL, KA), NKA vereinzelt (KA), NKD selten a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (S, M, BE, KA).
- Xanthorhoe spadicearia* DEN. & SCHIFF.: häufig.
- Xanthorhoe ferrugata* CL.: nicht selten.
- Xanthorhoe quadritasciata* CL.: DTS selten bis vereinzelt a. L. (BE).

- Xanthorhoe montanata* DEN. & SCHIFF.: häufig.
- Xanthorhoe fluctuata* L.: häufig.
- Scotopteryx chenopodiata* L.: DT und DTS nicht selten (M, BE, KA), B (R, V), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Scotopteryx luridata* HUFN.: DT selten (BE).
- Catarhoe rubidiata* DEN. & SCHIFF.: B ♂ 24. 06. 1955, ♀ 27. 06. 1954 (V). +
- Catarhoe cuculata* HUFN.: DT und DTS sehr selten (BE, M).
- Epirrhoe tristata* L.: CDG selten (KA), DTP vereinzelt (KA, BE), NKD nicht selten a. L. (S, KA), UAA vereinzelt (KA).
- Epirrhoe alternata* MÜLL.: vereinzelt bis häufig.
- Epirrhoe rivata* HBN.: DT selten (BE).
- Camptogramma bilineata* L.: CDR vereinzelt (KA), DTP selten (KA), SC (BE), B (R, V).
- Chesias legatella* DEN. & SCHIFF.: DT jahrweise vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Aplocera praeformata* HBN.: DT selten a. L. (BE, KA), NKV vereinzelt a. L. (KA, BE), SC (BE).
- Aplocera plagiata* L.: nicht selten.
- Aplocera efformata* GN.: DTS selten (BE).
- Lobophora halterata* HUFN.: UTW häufig (S, KA), CDR vereinzelt (KA), DTM vereinzelt (KA), DTP vereinzelt (KA), SCN häufig a. L. (BE, KL, KA), NKD selten a. L. (S, KA), BSW (BE).
- Trichopteryx carpinata* BKH.: DTM selten (KA), DTK selten (KA), DTS selten (BE), DT selten a. L. (KA), DT Volksgut selten (KA).
- Trichopteryx viretata* HBN.: DT selten a. L. (BE), DTM selten (KA), CDR (BE).
- Idaea muricata* HUFN.: DT 1 Expl. 21. 07. 1982 (BE).
- Idaea sylvestraria* HBN.: DT vereinzelt a. L. (BE).
- Idaea biselata* HUFN.: DT vereinzelt a. L. (BE), SC (BE).
- Idaea inquinata* SCOP.: DT nicht selten (BE, KA), B (V).
- Idaea fuscovenosa* GOEZE: DT vereinzelt a. L. (BE).
- Idaea dimidiata* HUFN.: DT nicht selten a. L. (BE).
- Idaea contiguaria* HBN.: DTS selten a. L. (BE), DT 1 Expl. a. L. (BE).
- Idaea emarginata* L.: DT nicht selten a. L. (KA), DTK vereinzelt (KA), MWS (BE).
- Idaea aversata* L.: häufig.
- Cyclophora albipunctata* HUFN.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), MWS selten (KA), PTR (R), NKD nicht selten a. L. (S, BE, KA), B (V).
- Cyclophora punctaria* L.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), DTK (BE), NKD selten a. L. (S, KA).
- Cyclophora linearia* HBN.: NKD selten a. L. (S, BE, KA).
- Timandra griseata* PETERSEN: häufig.
- Scopula nigropunctata* HUFN.: DT selten a. L. (BE), B (V), MWS (BE).
- Scopula marginipunctata* GOEZE: DT und DTS selten bis vereinzelt a. L. (BE, KA).

- Scopula immutata* L.: BSW selten (BE).
- Abraxas sylvata* SCOP.: B 1 ♀ 20. 08. 1955 (V).
- Lomaspilis marginata* L.: nicht selten.
- Ligdia adustata* DEN. & SCHIFF.: DT (BE).
- Semiothisa notata* L.: DTK, DTM, DT nicht selten (M, BE, KA), PTR (R), NKD selten a. L. (S, KA), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Semiothisa alternaria* HBN.: DT vereinzelt bis selten a. L. (BE), NKD nicht selten a. L. (S, KA), NKV (BE), GHM vereinzelt a. L. (BE, KA), B (V).
- Semiothisa signaria* HBN.: PTR 1 Expl. 06. 1946 (R). +
- Semiothisa liturata* CL.: CDG vereinzelt (KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA), NKV (BE), DTS selten (BE), B (V).
- Semiothisa clathrata* L.: nicht selten.
- Semiothisa wauaria* L.: DT und DTK nicht selten (KA, M, BE), B (V).
- Semiothisa fulvaria* VILL.: CDG häufig (BE, KA), DT selten a. L. (KA), B (V, R), NKV vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Cepphis advenaria* HBN.: CDG vereinzelt (BE, KA), W nicht selten (KA), DTM vereinzelt (KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (V).
- Petrophora chlorosata* SCOP.: DTM vereinzelt (KA), B (V), BBB selten (KA), BSW vereinzelt (KA), TRH selten (KA), NKD nicht selten a. L. (S, KA), DT selten bis vereinzelt a. L. (BE, KA).
- Plagodis pulveraria* L.: NKD 1 ♂ 05. 06. 1982 a. L. (KA).
- Plagodis dolabraria* L.: DT selten a. L. (BE, KA), SCN vereinzelt a. L. (KL, KA), NKD vereinzelt a. L. (S, KA).
- Opisthograptis luteolata* L.: DT nicht selten a. L. (BE, KA), B (R, V), NKD nicht selten a. L. (S, KA), NKV selten a. L. (BE, KA, M).
- Epione repandaria* HUFN.: DT selten a. L. (BE, KA), SC (BE).
- Ennomos autumnaria* WRNB.: DT sehr selten (BE, KA), DTM sehr selten (KA).
- Ennomos quercinaria* HUFN.: DTK 1 Expl. 1984 (BE).
- Ennomos alniaria* L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, KA), B (R).
- Ennomos fuscantaria* HAW.: DT selten a. L. (BE, KA), B (R, V).
- Ennomos erosaria* DEN. & SCHIFF.: DT nicht selten a. L. (BE, KA), PTR (R).
- Selenia dentaria* F.: DT nicht selten a. L. (BE, KA), B (KA, V).
- Selenia tetralunaria* HUFN.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), NK (BE).
- Odontopera bidentata* CL.: DT sehr selten a. L. (BE), SCN selten a. L. (BE), NKD häufig a. L. (KA, S, BE).
- Crocallis elinguaris* L.: DT selten bis vereinzelt a. L. (BE), MWS (BE), B (V), PTR (R).
- Ourapteryx sambucaria* L.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, KA), B (V).
- Colotois pennaria* L.: häufig.
- Angerona prunaria* L.: DTM selten (KA), DT selten a. L. (BE, KA), B (V), BBB selten (KA), NKA selten (KA), NKV vereinzelt a. L. (BE, M, KA).
- Apocheima pilosaria* HBN.: DT und DTS häufig a. L. (M, BE, KA), CDR häufig (M, KA), DTM häufig (KA), B (V).

- Apocheima hispidaria* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS seit 1980 3 ♂♂ a. L. (KA, BE).
- Lycia hirtaria* CL.: häufig.
- Biston strataria* HUFN.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), NK (BE), B (V). Die mut. melanaria KOCH: DT 2 ♂♂ a. L. (BE, KA).
- Biston betularia* L.: nicht selten. F. *betularia* selten
- Agriopis leucophaearia* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS vereinzelt a. L. (BE, M, KA), DTM selten (KA).
- Agriopis aurantiaria* HBN.: DT häufig a. L. (BE, KA), DTM häufig (KA).
- Agriopis marginaria* F.: DT nicht selten a. L. (BE, KA), DTM vereinzelt (KA).
- Erannis defoliaria* CL.: häufig.
- Peribatodes rhomboidaria* DEN. & SCHIFF.: DT selten (BE).
- Peribatodes secundaria* ESP.: MWS sehr selten (BE), PTR (R).
- Cleora cinctaria* DEN. & SCHIFF.: DT selten bis vereinzelt a. L. (BE, KA), NK (BE), PTR (R).
- Deileptenia ribeata* CL.: DT selten a. L. (BE), MWS (BE), BSW (BE).
- Alcis repandata* L.: DT und DTS nicht selten a. L. (BE, KA), CDG (KA), B (R, V), PTR (R), NKV (BE).
- Archianna melanaria* L.: DT 1 Expl. a. L. (BECK 1968), B 1 ♀ 22. 07. 1955 (V).
- Boarmia punctinalis* SCOP.: CDG nicht selten (KA), NKD selten a. L. (S, KA), B (V), SC (BE).
- Ectropis bistortata* GOEZE: DTM nicht selten a. L. (KA), DT häufig (KA), B (V).
- Aethalura punctulata* DEN. & SCHIFF.: DTM häufig (KA), NK (BE), B (V), UAA vereinzelt (KA).
- Ematurga atomaria* L.: nicht selten.
- Bupalus piniaria* L.: CDG nicht selten (KA), DT vereinzelt a. L. (BE, KA), BSW (BE), B (V).
- Cabera pusaria* L.: häufig.
- Cabera exanthemata* SCOP.: DT und DTS selten a. L. (BE, KA), MWS vereinzelt (KA).
- Lomographa bimaculata* F.: DTM selten (M, KA), W selten (KA), NKD nicht selten a. L. (S, KA), B (V), DT selten a. L. (BE).
- Lomographa temerata* DEN. & SCHIFF.: DTW selten (KA), NKD häufig a. L. (S, KA), DTK selten (KA), GHM selten a. L. (BE, KA), B (V), DTS selten a. L. (BE).
- Campaea margaritata* L.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), DTM vereinzelt (KA).
- Hylaea fasciaria* L.: ST in f. *prasinaria* selten (SCHLAGER, KA), NKV in f. *fasciaria* und f. *prasinaria* vereinzelt a. L. (BE, M, KA).
- Gnophos obscurata* DEN. & SCHIFF.: DT und DTS selten bis vereinzelt a. L. (KA, BE).
- Geometra papilionaria* L.: DT vereinzelt a. L. (BE, KA), SCN selten a. L. (KL).
- Comibaena pustulata* HUFN.: W sehr selten (BE).
- Hemithea aestivaria* HBN.: DT 1 Expl. 1980 a. L. (KA).
- Jodis putata* L.: DTM nicht selten (KA), CDG nicht selten (KA), NKD häufig a. L. (S, KA), PTR (V), B (V).

Zusammenfassung

Durch die jahre- und jahrzehntelange Arbeit der Entomologen des Kreises Bischofswerda konnten für das Gebiet dieses Kreises insgesamt 465 Arten der sogenannten „Nachtschmetterlinge“ sicher nachgewiesen werden. Von weiteren 15 Arten (mit + gekennzeichnet) existieren Belege in einzelnen Sammlungen, die zweifellos richtig determiniert sind. Trotzdem bestehen bei diesen Arten Zweifel an der Richtigkeit der Fundortangabe bzw. handelt es sich bei den Tieren um verfliegene oder verschleppte Individuen.

Ebenso wie bei den Tagfaltern zeigt sich bei den „Nachtschmetterlingen“ die relative Artenarmut des Kreises Bischofswerda. Hervorzuheben ist der ziemlich hohe Anteil an mehr montan verbreiteten Arten, der für die niedrigeren Höhenlagen, in denen das Kreisgebiet liegt, bemerkenswert ist. Insgesamt erfolgte der Nachweis von 515 Arten Macrolepidopteren.

Literaturverzeichnis

- BECK, K.-R. (1968): Faunistische Notizen. 23. *Arichanna melanaria* L. (Lep., Geom.) in der Oberlausitz. — Ent. Nachr. 12, 11: 131.
- (1982): Faunistische Notizen. 96. *Heliophobus texturata* ALPHERAKY erstmals in der Oberlausitz gefunden (Lep., Noct.). — Ent. Nachr. u. Ber. 26, 3: 138.
- (1984): Beobachtungen. 9. Zum Überwinterungsverhalten von *Phlogophora meticulosa* L. (Lep., Noct.). — Ent. Nachr. u. Ber. 28, 1: 45.
- BERGMANN, A. (1952–1955): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. — Band 1–5. Jena.
- FORSTER, W., u. Th. A. WOHLFAHRT (1960): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band III: Spinner und Schwärmer (Bombyces et Sphinges). — Stuttgart.
- HEINICKE, W., u. C. NAUMANN (1980–82): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Noctuidae. — Beitr. zur Ent.: 30–32.
- KARISCH, T. (1984): Beitrag zur Kenntnis der Rhopalocera-Fauna des Kreises Bischofswerda (Lep.). — Dt. Entom. Z., N. F. 31, 4–5: 325–335.
- KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge. — Leipzig–Radebeul.
- OTTO, H.-W. (1972): Flora des Kreises Bischofswerda. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 47, 8: 2–5, 75.
- u. Schülergruppe „Fakultativer Biologieunterricht“ der EOS Bischofswerda (1980): Landeskultur und Naturschutz im Kreis Bischofswerda. — Manuskript.
- SCHÜTZE, K. T. (1896): Die Großschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. — Isis 8: 271–283.
- VOGEL, J. (1957): Faunistische Notizen. 8. Bemerkenswerte Lichtfänge in Bischofswerda. — Nachrichtenblatt d. Oberl. Insektenfreunde 1, 9: 4.

Anschrift des Verfassers:

Timm Karisch

DDR - 8503 D e m i t z - T h u m i t z

Straße der Jugend 6

Postfach 07-69

Eigenverlag des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz – Forschungsstelle –
Alle Rechte vorbehalten

Printed in the German Democratic Republic – Druckgenehmigung Nr. J 127,85
Graphische Werkstätten Zittau III/28/14 768 800

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Karisch Timm

Artikel/Article: [Beitrag zur Großschmetterlingsfauna \(Macrolepidoptera\) des Kreises Bischofswerda 1-20](#)