

8.

Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns.**Wanzen, Zikaden und Blattflöhe.**

Von O. Karl, Stolp.

Die in dieser Arbeit verzeichneten Wanzen, Zikaden und Blattflöhe habe ich in der Umgebung Stolps und im Ihnagrenzgebiet bei Reetz (Neumark) gefangen. Gelegentlich sammelte ich auch bei Alt-Belz (Kreis Köslin) und bei Kollatz, östlich von Polzin. Aus der Gesamtausbeute habe ich eine Sammlung zusammengestellt, die sich im Besitze des hiesigen Heimatmuseums befindet. Die Bestimmung der Zikaden und Blattflöhe wurde von Herrn Mittelschullehrer Haupt, Halle a. d. S., nachgeprüft. Bei der Bestimmung der Wanzen hat mir Herr Dr. Hedicke, Berlin, wesentliche Dienste geleistet. Es ist mir daher ein Bedürfnis, beiden Herren auch an dieser Stelle meinen besonderen Dank auszusprechen.

Heteroptera.**Polyneuria.***Cydnidae**Thyreocoris* Schr.

scarabaeoides L., 6-7, Ihnagrenzgebiet bei Reetz (Neumark).

Schirus A. S.

luctuosus M. R., 4-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet bei Reetz (Neumark).

bicolor L., 4-9, Stolp: Kl.-Strellin, Veddin; Ihnagrenzgebiet.

Legnotus Schiödde

picipes Fall., 7-8, Stolp: Freichow; Ihnagrenzgebiet.

*Pentatomidae**Eurygaster* Lap.

maura L., 6-9, Stolp: Kl.-Strellin, Brückower Moor, Wusterwitzer Moor, Veddin, Potänewiesen; Ihnagrenzgebiet.

Aelia Fbr.

acuminata L., 5-9, überall häufig.

klugi Hhn., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Ihnagrenzgebiet.

Neottiglossa Kirk.

pusilla Gmel., 5-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Kl.-Strellin; Ihnagrenzgebiet.

Eusarcoris Hhn.

aeneus Scop., 7-8, auf *Ulmaria pentapetala*, Flachmoor in der Feldmark von Altenwedel, in nächster Nähe von Reetz (Neumark).

Carpocoris Klt.

fuscispinus Boh., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

pudicus Poda, 6-8, Stolp: Kl.-Strellin; Ihnagrenzgebiet.

lunulatus Goeze, 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Dolycoris M. R.

baccarum L., 4-10, überall häufig.

Palomena M. R.

prasina L., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, Kl.-Strellin, Veddin, Wusterwitzer Moor.

viridissima Pod., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Freichow, Potäne, Kl.-Strellin, Veddin, Wusterwitzer Moor.

Chlorochroa Stål

juniperina L., 9, Stolp: Brückower Moor.

Piezodorus Fieb.

lituratus Fbr., 8-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Loitz.

Pentatoma Ol.

rufipes L., 7-9, Stolp: Waldkatze, Reitz, Kl.-Strellin, Loitz; Nöenberg; Ihnagrenzgebiet.

Eurydema Lap.

dominulus Scop., 7-9, Stolp: Evermoor, Walkmühle, Kl.-Strellin.

decoratum H. S., 6-7, Ihnagrenzgebiet bei Reetz (Neumark).

oleraceum L., 5-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet; stellenweise gemein.

Acanthosoma Curt.

haemorrhoidale L., 5-6, Stolp: Waldkatze, Arnshagen.

Elasmucha Stål

ferrugata Fbr., 5-10, Stolp: Waldkater, Freichow.

grisea L., 5-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet; die häufigste Art.

pivicolor Westw., 9, Stolp.

Elasmolesthus Fieb.

interstinctus L., 5-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet; häufige Art.

Picromerus A. S.

bidens L., 7-9, Stolp: Freichow, Reitz, Veddin, Wusterwitzer Moor; Alt-Belz bei Köslin.

Troilus Stål

luridus Fbr., 5-9, Stolp: Evermoor, Veddin, Freichow, Brückower Moor.

Arma Hhn.

custos Hhn., 9, Brückower Moor bei Stolp.

Rhacognatus Fieb.

punctatus L., 8-9, Wusterwitzer Moor (Kreis Schlawe).

Zicrona A. S.

coerulea L., 8-9, Stolp: Loitz, Brückower Moor, Wusterwitzer Moor.

Coreidae

Mesocerus Reut.

marginatus L., 7-9, Stolp: Veddin, Wusterwitzer Moor.

Coriscus Schrk.

calcaratus L., 7-9, Stolp: Kl.-Strellin, Schwuchow, Schmaatz.

Corizidae

Corizus Fall.

hyoscyami L., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Freichow, Kl.-Strellin, Loitz; Nörenberg; Ihnagrenzgebiet.

Rhopalus Schill.

parumpunctatus Schill., 4-10, überall verbreitet und häufig.

tigrinus Schill., 7-8, Stolp: Kl.-Strellin, Wusterwitzer Moor; Falkenburg; Ihnagrenzgebiet.

maculatus Fieb., 5-9, Stolp: Menkenbruch, Veddin, Wusterwitzer Moor, Schwuchower Moor.

Stictopleurus Stål

punctatolnervosus Goeze, 6-7, Ihnagrenzgebiet.

crassicornis L., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz; Ihnagrenzgebiet.

Mirmus Hhn.

miriformis Fall., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet; Ihnagrenzgebiet.

Chorosoma Curt.

schillingi Schill., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Phloeobiotica.

Aradidae

Aradus Fbr.

cinnamomeus Pz., 8, Stolp.

depressus Fbr., 7, Stolp: Lindow-Dünen.

versicolor H. S., 6, Kollatz bei Polzin.

Onychiophora.

Myodochidae

Nysius Dall.

jacobaeae Schill., 7-9, Stolp: Quandtheide; auf *Senecio silvaticus*.

lineatus Cost., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

punctipennis H. S., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

thymi Wlff., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Cymus Hhn.

glandicolor Hhn., 7-9, stellenweise gemein, besonders an mehr oder weniger feuchten Stellen, an *Carex*.

Ischnorhynchus Fieb.

resedae Pz., 4-9, Stolp: Waldkatze, Brückower Moor, Arnshagen, Freichow; Ihnagrenzgebiet.

Ischnodemus Fieb.

sabuleti Fall., 5-8, Stolpmünde, Dünen am Auslauf und an der Potäne.

Geocoris Fall.

grylloides L., 7-8, Stolp: Schmaatz, Wintershagen, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

Platyplax Fieb.

salviae Schill., 7, Ihnagrenzgebiet, auf Salbei (Altenwedel).

Ligyrocoris Stål

silvestris L., 6-8, Stolp: Cublitzer Moor an der Schlauer Chaussee; Ihnagrenzgebiet.

Orthaea Dall.

lurida Hhn., 8-9, Stolp: Arnshagen, Wusterwitzer Moor.

fracticollis Schill., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Ulrichsfelde, Potänewiesen, Brückower Moor.

Tropistethus Fieb.

holosericeus Schlitz., 6-7, Stolp: Schwuchow.

Pterotmetus A. S.

staphyliniformis Schill., 8, Stolp: Wintershagen.

Macrodema Fieb.

micropterum Curt., 8-9, Stolp.

Rhyparochromus Curt.

praetextus H. S., 8, Stolp: Wintershagen.

Stygnocoris Dgl. Sc.

rusticus Fall., 8-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Freichow.

fuliginus Geoffr., 8-9, Stolp.

pedestris Fall., 7-10, Stolp: Ulrichsfelde, Kl.-Strellin, Stolpmünde, Loitz, Wusterwitzer Moor.

Peritrechus Fieb.

geniculatus Hhn., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Veddin, Arnshagen, Ulrichsfelde, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

sylvestris Fbr., 8-9, Stolp: Reitz.

Trapezonotus Fieb.

arenarius L., 8, Stolp.

Xanthochilus Stål.

quadratus Fbr., 7, Ihnagrenzgebiet (Altenwedel).

Calyptonotus Dgl. Sc.

pini L., 8-10, Stolp: Freichow, Waldkater, Waldkatze, Loitz.

Emblethis Fieb.

verbasci Fbr., 8-9, Wusterwitzer Moor, Kreis Schlawe.

Gastrodes Westw.

abietum Bergr., 22. 11. 33, Stolp, am Baumstamm.

Drymus Fieb.

sylvaticus Fbr., 8-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Freichow, Potänewiesen.

brunneus Shlbgr., 9, Stolp.

Eremocoris Fieb.

abietis L., 7, Stolpmünde.

Scolopostethus Fieb.

affinis Schill., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Vessin; Ihnagrenzgebiet.

decoratus Hhn., 4-10, Stolp: Ulrichsfelde, Brückower Moor, Stolpmünde, Schwuchower Moor, Wusterwitzer Moor.

pilosus Reut., 8-9, Stolp.

Neididae

Neides Reut.

tipularius L., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet (Altenwedel).

Berytus Fbr.

minor H. S., 8-9, Stolp: Potänewiesen.

Metatropis Fieb.

rufescens H. S., 6-9, Stolp: Horster Teiche.

Piesmatidae

Piesma Le P. S.

maculata Lap., 8-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Ulrichsfelde, Wusterwitzer Moor.

Tingitidae

Dictyonota Curt.

tricornis Schrk., 8, Stolp: Potänewiesen.

Lasiotropis Stål

reticulata H. S., 8-9, Stolp: Kl.-Strellin.

Tingis Fbr.

cardui L., 8, Stolp: Freichow, Brückow, Arnshagen.

angustata H. S., 8-9, Stolp: Kl.-Strellin.

Physcatocheila Fieb.

quadrifaculata Wlff., 4-6, Stolp: Brückower Moor, Wusterwitzer Moor.

Monanthia L. S.

echii Schrk., 7-8, Ihnagrenzgebiet.

humuli Fbr., 4, Stolp: Menkenbruch.

symphyti Fall., 4, Stolp: Menkenbruch.

Serentia Spin.

laeta L. f. *femoralis* Thoms., 8-9, Stolp: Wusterwitzer Moor.

Reduviidae

Ploiariola Reut.

vagabunda L., 10, Stolp: Walkmühle, unter Tannen.

Coramus Curt.

subapterus Deg., 7-8, Walkmühlenkirchhof, Wintershagen, Salesker Strand.

Nabididae

Nabis Latr.

apterus Fbr., 9, Stolp.

Dolichonabis Reut.

lineatus Dahlb., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Reduviolus Stål

flavomarginatus Schltz., 7-8, Stolp; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

ferus L., 4-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

rugosus L., 6-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Anthocoridae

Lyctocoris Fall.

campestris Fbr., 5-6, Stolp.

Anthocoris Fall.

nemorum L., 4-10, überall gemein.

nemoralis Fbr., 5-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

limbatus Fieb., 4, Stolp: Stolpewiesen, Menkenbruch, Ulrichsfelde, auf Weidenblüten.

Acompocoris Reut.

pygmaeus Fall., 9, Stolp: Reitz.

alpinus Reut., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Triphleps Fieb.

minuta L., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen; Ihnagrenzgebiet.

Miridae

Pithanus Fieb.

maerkeli H. Sch., 6-7, Stolp: Schwuchow, Kl.-Strellin, Stolpmünde.

Pantilius Curt.

tunicatus Fbr., 8-10, Stolp: Evermoor, Wiesenrandgelände bei der Walkmühle, auf Erlen.

Phytocoris Fall.

dimidiatus Kbm., 7-8, Stolp: Waldkater, Walkmühle, Loitz.

longipennis Flor., 7-8, Stolp: Stolpmünde.

varipes Boh., 6-8, Stolp: Kl.-Strellin, Wintershagen, Potänewiesen; Ihnagrenzgebiet.

tiliae Fbr., 8, Stolp: Walkmühlengelände.

— *f. marmorata* Dgl.Sc., 8, Stolp: Kl.-Strellin.

Adelphocoris Reut.

lineolatus Goeze, 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

ticinensis Mey.D., 8-9, Stolp: Strandsumpfgebiete bei Lindow und an der Potäne.

Calocoris Fieb.

ochromelas Gmel., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Kl.-Strellin.

biclavatus H.Sch., 7-8, Stolp: Kl.-Strellin, Freichow.

fulvomaculatus Deg., 6, Stolp: Gebiet des Schwarzen Sees b. Ulrichsfelde, Brückower Moor.

affinis H.Sch., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Wintershagen.

roseomaculatus Gmel., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

norvegicus Gmel., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Alloeonotus Fieb.

fulvipes Scop., 7, Ihnagrenzgebiet.

Pycnopterna Fieb.

striata L., 5-6, Stolp: Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen.

Stenotus Jak.

binotatus Fbr., 6-7, Ihnagrenzgebiet: Ziegenhagen, Altenwedel, Ravenstein.

Dichroscytus Fieb.

rufipennis Fall., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Ulrichsfelde.

Lygocoris Reut.

pabulinus L., 7-9, Stolp; Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

Lygus Hhn.

rubricatus Fall., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Schwuchow, Reitz; Ihnagrenzgebiet.

pratensis L., 4-10, überall gemein.

limbatus Fall., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Stolpmünde.

lucorum Mey.D., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Arnshagen, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

spinolae Mey.D., 7-8, Stolpmünde: Potänesumpfbereich.

contaminatus Fall., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Brückower Moor, Lindow, Cublitzer Moor an der Schlauer Chaussee.

viridis Fall., 6-8, Stolp; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

Orthops Fieb.

kalmi L., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Freichow; Ihnagrenzgebiet.

Camptozygum Reut.

pinastri Fall., 7-8, Stolp: Schwuchow.

Poeciloscyltus Fieb.

brevicornis Reut., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

unifasciatus Fbr., 6-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

vulneratus Wlff., 7, Ihnagrenzgebiet.

Polymerus Hhn.

nigritus Fall., 6-9, Ihnagrenzgebiet.

Charagochilus Fieb.

gyllenhali Fall., 6-9, Stolp: Loitz, Freichow; Ihnagrenzgebiet.

Liocoris Fieb.

tripustulatus Fbr., 6-9, Stolp: Kl.-Strellin, Stolpetalgebiet, Reitz; Ihnagrenzgebiet.

Camptobrochis Fieb.

punctulatus Fall., 9, Stolp.

Deraecoris Kbm.

ruber L., 7-8, Stolp, auf Blättern niederer Pflanzen.

trifasciatus L., Stolp: Stolpmünde, Freichow, im Spülicht, von den Wellen ans Land gespült; Ihnagrenzgebiet.

Capsus Fbr.

ater L., 6-7, Stolp: Gr.-Strellin, Schwuchow, Loitz, Freichow; Kollatz bei Polzin; Ihnagrenzgebiet.

Capsodes Dahlb.

gothicus Fall., 7-8, Wusterwitzer Moor (Kr. Schlawe).

Acetropis Fieb.

carinata H. S., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Brachytropis Fieb.

calcarata Fall., 3-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Stenodema Lap.

virens L., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

laevigatum L., 5-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

holsatum Fbr., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Veddin, Kl.-Strellin.

Notostira Fieb.

erratica L., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

tricostata Cost., 7-9, Stolp: Waldkater, Waldkatze, Freichow, Wusterwitzer Moor.

Trigonotylus Fieb.

ruficornis Fall., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

pulchellus Hhn., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Miris Fbr.

dolobratus L., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

ferrugatus Fall., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Monalocoris Dahlb.

filicis L., 6-8, Stolp: Schwuchow, Freichow, Muddelstrand, überall an Farnen, Walkmühlengebiet.

Bryocoris Fall.

pteridis Fall., 6-8, Stolp: Arnshagen, Loitz, Freichow, Muddelstrand.

Macrolophus Fieb.

nubilus H. S., 8, Stolp: Walkmühle, Schwarzmühle bei Kublitz, Kl.-Strellin.

Dicyphus Fieb.

epilobii Fieb., 7, Ihnagrenzgebiet (Ziegenhagen).

globulifer Fall., 8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

pallidus H. Sch., 8-9, Stolp: Quandtheide (bei Dargatzhof).

Systellonotus Fieb.

triguttatus L., 7, Stolp: Heidestelle beim Walkmühlen-Friedhof, zwischen Besenginster.

Pilophorus Hhn.

cinnamopterus Kbm., 7-9, Stolp; Stolpmünde.

clavatus L., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin.

perplexus Dgl. Sc., 8, Stolp: Walkmühle, Potäne.

Cyllocoris Hhn.

flavoquadrимaculatus Deg., 5-6, Stolp: Waldkater, Veddin, Kl.-Strellin, Ulrichsfelde.

histrionicus L., 6-7, Stolp: Waldkater, Arnshagen.

Blepharidopterus Klt.

angulatus Fall., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen.

Mecomma Fieb.

ambulans Fall., 7, Ihnagrenzgebiet.

Orthotylus Fieb.

virescens Dgl. Sc., 7, Stolp.

concolor Kbm., 7, Stolp.

nassatus Fbr., 7-8, Kl.-Strellin, Kreis Stolp.

flavosparsus Sahlb., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

prasinus Fall., 6, Ihnagrenzgebiet.

marginalis Reut., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Heterotoma Latr.

meriopterum Scop., 7-9, Stolp: Walkmühle.

Heterocordylus Fieb.

genistae Scop., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

tibialis Hhn., 6, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Kl.-Strellin.

erythrophthalmus Hhn., 8, Stolp.

Orthocephalus Fieb.

mutabilis Fall., 6-8, Stolp: Stolpmünde; Kollatz bei Polzin; Ihnagrenzgebiet.

saltator Hhn., 7-8, Stolp: Veddin; Ihnagrenzgebiet.

Strongylocoris Blanch.

leucocephalus L., 6-8, Stolp: Schwuchow; Ihnagrenzgebiet.

Halticus Hhn.

pusillus H. S., 7-9, Stolp: Schwuchow, Reitz.

apterus L., 7-9, Ihnagrenzgebiet.

Oncotylus Fieb.

viridiflavus Goeze, 7, Ihnagrenzgebiet (Altenwedel).

punctipes Reut., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Conostethus Fieb.

roseus Fall., 6, Kollatz bei Polzin.

Placochilus Fieb.

seladonicus Fall., 6-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Hoplomachus Fieb.

thunbergi Fall., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Megalocoleus Reut.

exanguis H. S., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

molliculus Fall., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

pilosus Schrk., 7-8, Stolp: Waldkater.

Amblytylus Fieb.

albidus Hhn., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

nasutus Kbm., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Macrotylus Fieb.

herrichi Reut., 6, Ihnagrenzgebiet (Altenwedel).

paykulli Fall., 6, Ihnagrenzgebiet.

Lopus Hhn. (*Onychumenus* Reut.)

decolor Fall., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Phylus Hhn.

melanocephalus L., 6-7, Stolp: Arnshagen.

coryli L., 8, Stolp: Walkmühlengebiet, Kl.-Strellin.

Psallus Fieb.

roseus Fbr., 7-8, Stolp: Ulrichsfelde, Schwuchow.

lepidus Fieb., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

varians H. S., 5-7, Stolp.

variabilis Fall., 5-6, Stolp.

betuleti Fall., 6-7, Stolp: Kl.-Strellin, Stolpmünde, Stolpetalgebiet.

salicellus M. D., 8, Stolp: Walkmühlengebiet.

Atractomus Fieb.

mali Mey. D., 8, Stolp: Schwuchow, Kl.-Strellin.

Criocoris Fieb.

crassicornis Hhn., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Plagionathus Fieb.

albipennis Fall., 6-7, Stolp; Kollatz bei Polzin; Ihnagrenzgebiet.

chrysanthemi Wlff., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

arbustorum Fbr., 6-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Chlamydatus Curt.

pullus Reut., 9, Stolp: Reitz.

Microsynamma Fieb.

bohemani Fall., 6-7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

nigritula Zett., 7-8, Stolp: Veddin, Stolpmünde.

Hydrobiotica.

Gerridae

Gerris Fbr.

- najas* Dg., 7-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet.
rufoscutellatus Latr., 7-10, Stolp.
thoracius Schumm., 8, Stolp: Freichowbachmündung.
lacustris L., 7-10, Stolp.
gibbifer Schumm., 4-10, Stolp.
odontogaster Zett., 7-9, Stolp.
argentatus Schumm., 4-10, Stolp.

Velidae

Velia Latr.

- currens* Fbr., 7-11, Stolp: Waldkaterbach, Kl.-Strellin.

Saldidae

Saldula V. D.

- pallipes* Fbr., 5-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.
arenicola Schlitz., 7-9, Stolp.
saltatoria L., 4-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Chartoscirta Stål.

- cincta* H. S., 5, Stolpmünde, Auslauf.
elegantula Fall., 7-8, Stolp: Fischteiche bei Aesleben.

Naucoridae

Naucoris Fbr.

- cimicoides* L., 7-11, Stolp: Veddin, Kublitzer Teiche neben der Schlauer Chaussee.

Nepidae

Nepa L.

- cinerea* L., 5-10, in allen stehenden Gewässern.

Notonectidae

Notonecta L.

- glaucia* L., 5-10, überall in stehenden Gewässern.

Sandaliorrhyncha.

Corixidae

Sigara Fbr.

- scotti* Dgl. Sc., 7-10, Stolp.
semistriata Fieb., 7-11, Stolp.

nigrolineata Fieb., 7-11, Stolp.

castanea Thoms., 7-11, Stolp, Teich am Plassower Wege.

sahlbergi Fieb., 7-11, Stolp.

linnei Fieb., 7-11, Stolp.

distincta Fieb., 7-11, Stolp.

Corixa Geoffr.

dentipes Thoms., 8-10, Stolp: Großer Teich an der Schlauer Chaussee.

Cymatia Fl.

coleoptrata Fbr., 8-11, Stolp: Tote Flußarme der Stolpe.

Homoptera.

Auchenorrhyncha.

Cercopidae

Lepyronia A.C.

coleoptrata L., 8, Stolp: Lebanehrung vor Dambe; Wusterwitzer Moor, Flachmoorwiesen.

Aphrophora Germ.

salicis Deg., 7, Stolp: Freichow, auf Zitterpappeln am Rande der Außendünen.

spumaria L. (syn. *alni* Fall.), 7-9, überall verbreitet.

Philaenus Stål.

leucophthalmus L. (syn. *spumarius* Fall.).

v. *leucophthalmus* L., 8, Stolp: Veddin, Wusterwitzer Moor.

v. *lateralis* L., 6-8, Stolp: Potänewiesen, Wusterwitzer Moor; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

v. *flavicollis* Schrk., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Potänewiesen, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

v. *marginellus* Fbr., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Potänewiesen; Ihnagrenzgebiet.

v. *leucocephalus* L., 7-8, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

v. *albomaculatus* Schrk., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin; Ihnagrenzgebiet.

v. *quadrinaculatus* Schrk., 8, Stolp: Potänewiesen, Wusterwitzer Moor.

v. *populi* Fbr., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

v. *vittatus* Fbr., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

v. *trilineatus* Schrk., 7, Ihnagrenzgebiet.

lineatus L., 7-10, überall häufig.

exclamationis Thnbg., 7, Ihnagrenzgebiet.

campestris Fall., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Membracidae

Centrotus Fbr.

cornutus L., 5-8, Stolp: Veddin, Kl.-Strellin, Loitz, Arnshagen.

Gargara A. S.

genistae Fbr., 7-9, Stolp, überall an Heidestellen mit Besenginsterbeständen.

Jassidae

Ulopa Fall.

reticulata Fbr. 6-8, Stolp: Wintershagen, Schwarzer See bei Ulrichsfelde, Lindow bei Stolpmünde.

Paropia Germ.

scanica Fall., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Schwuchow, Arnshagen; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

Tettigoniella Jac.

viridis L., 7-10, auf sauren, nassen Wiesen gemein.

Euacanthus L.

interruptus L., 7, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

Idiocerus Lew.

fasciatus Fieb., 7-9, Stolp: Waldkater, Loitz, Brückower Moor, Freichow.

stigmatalis Lew., 7-9, Stolp, überall häufig.

populi L., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet; häufig.

v. *fulgidus* Fbr., 8-10, Stolp.

confusus Fl., 8-10, Stolp.

scurra Germ., 10, Stolp; Evermoor.

Oncopsis Burm.

scutellata Fieb., 8, Stolp: Schwarzer See bei Ulrichsfelde.

lanio L., 7-8, Stolp: Waldkater, Kl.-Strellin, Freichow; auf Eichen.

prasina Fbr., Alt-Belz bei Köslin.

Bythoscopus Germ.

flavicollis L., 5-9, sehr verbreitet und häufig, in der Farbe äußerst veränderlich.

Macropsis Lew.

virescens Fbr., 7-8, Stolp: Brückower Moor, Freichow, Stolpmünde, Potänewiesen.

v. forina Hpt., 7-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

nana H. S., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

Agallia Curt.

venosa Fall., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Veddin, Arnshagen, Potänewiesen.

brachyptera Boh., 8-9, Stolp: Kl.-Strellin, Potänewiesen.

Eupelix Germ.

cuspidata Fbr., 7-8, Stolp; Reetzer Ihnagrenzgebiet; vorzugsweise an sandigen, trockenen Stellen.

Acocephalus Germ.

bifasciatus L., Stolp: Evermoor, Moorgebiet des ehemaligen Schwarzen Sees bei Ulrichsfelde.

albifrons L., 8, Stolp: Muddelstrand, Potänewiesen.

histrionicus Fbr., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

flavostriatus Don., 8-10, Stolp: Loitz, Lindow, Arnshagen; Alt-Belz bei Köslin (Bärenbruch).

nervosus Schrk., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet; die häufigste Art.

Strongylocephalus Fl.

agrestis Fall., 7-8, Stolp: Veddin, Potänewiesen.

Doratura Shlb.g.

stylata Boh., 6-9, Stolp: Schwuchow, Reetz; Ihnagrenzgebiet.

homophyla Fall., Stolp: Schwuchow, Stolpetalgebiet.

Deltocephalus Burm.

socialis Fl., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

multinotatus Boh., 7-10, allgemein verbreitet und häufig.

pulicaris Fl., 7-10, wie vorige.

striatus L., 8-10, häufig.

panzeri Fl., 7-8, Stolp.

abdominalis Fbr., 6-10, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

cephalotes H. S., 7-10, Stolp.

pascuellus Fall., 8, Stolp.

Paralimnus Mats.

phragmitis Boh., 8, Stolp.

Graphocraerus Thms.

ventralis Fall., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Schwuchow, Potäne; Ihnagrenzgebiet.

Platymetopius Burm.

undatus Deg., 7-8, Stolp: Brückower Moor.

Allygus Fieb.

mixtus Fbr., 7-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet; häufig.

commutatus Scott., 6-8, Stolp: Freichow; Ihnagrenzgebiet.

Euscelis Brull.

argentatus Fbr., 6-8, Stolp: Lindow; Ihnagrenzgebiet.

griseus Zett., 7-9, Stolp.

plebejus Fall., 7-10, überall häufig.

quadrum Boh., 7-8, Stolp; Wusterwitzer Moor; Alt-Belz bei Köslin; Ihnagrenzgebiet.

obsoletus Kbm., 7-9, überall häufig.

striatulus Fall., 6-9, Stolp: Schwuchow, Freichow, Wusterwitzer Moor.

v. russeolus Fall., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Freichow, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

transversa Fall., 6-7, Ihnagrenzgebiet.

sordidus Zett., 7-9, Stolp: Potänewiesen, Stolpetalgebiet.

lineolatus Brullé, 7-9, Stolp: Reitz, Arnshagen, Freichow, Veddin; Ihnagrenzgebiet.

brevipennis Kbm., 6, Stolp.

impictifrons Boh., 7, Ihnagrenzgebiet.

Limotettix Shlbgr.

striola Fall., 8, Stolp: Potänewiesen.

Stictocoris Thms.

preyssleri H. S., 8-9, Stolp: Lindow, Loitz.

Thamnotettix Zett.

biguttatus Fall., 6-9, Stolp; Ihnagrenzgebiet.

cruentatus Pz., 7-8, Wusterwitzer Moor.

tornellus Zett., 7-8, Stolp.

andropogonis Lep., 8-10, Stolp: Loitz.

tenuis Germ., 7-10, Stolp: Loitz, Wusterwitzer Moor; Ihnagrenzgebiet.

frontalis H. S., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Potänewiesen.

vittiventris Latr., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet; Ihnagrenzgebiet.
quadrinotata Fbr., 8-10, Stolp.

Grypotes Fieb.

puncticollis H. S., 8-9, Stolp.

Cicadula Fieb.

sexnotata Fall., 8-10, Stolp.

Baclutha Kirb.

punctata Thnbg., 8-9, Stolp.

Alebra Fieb.

albostriella Fall., 8-9, Stolp.

Dicraneura Hard.

citrinella Zett., 8-10, Stolp: Loitz.

flavipennis Zett., 8-10, Stolp.

Chlorita Fieb.

viridula Fall., 8-10, Stolp, häufig.

flavescens Fbr., 7-10, überall gemein.

Empoasca Walsh.

smaragdula Fall., 7-10, überall häufig.

Eupteryx Curt.

germari Zett., 8-9, Wusterwitzer Moor.

vittata L., 9, Stolp: Evermoor, Waldrand hinter Schwaatz.

aurata L., 9-10, Stolp: Reitz, Kl.-Strellin, Wusterwitzer Moor.

atropunctata Goeze, 8-10, Stolp: Kl.-Strellin, Labuhnerbrück.

urticae Fbr., 8-10, überall häufig.

pulchella Fall., 8-9, auf Eichengebüsch.

Typhlocyba Germ.

jucunda H. S., 8-9, Stolp: Goldbrunnen.

nitidula Fbr., 9, Stolp: Horster Teiche.

rosae L., 8-9, Stolp.

gratiosa Boh., 8-9, Stolp: Waldkatze, Walkmühle.

cruenta H. S., 8-9, Stolp: Stolpetalgebiet.

quercus Fbr., 8-9, Stolp: Waldkater.

Erythroneura Fisch.

flammigera Geoffr., 8-9, Stolp: Wiesenrandgebüsch bei der Walkmühle; Wusterwitzer Moor.

Cixiidae

Cixius Latr.

similis Kbm., Stolp: Brückower Moor, Wusterwitzer Moor.

nervosus L., 6-9, die häufigste Art.

pilosus Oliv., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin, Arnshagen; Ihnagrenzgebiet:
Stabenow.

cunicularis L., 6-8, Stolp: Reitz, Arnshagen, Stolpmünde.

Delphacidae

Kelisia Fieb.

pallidula Boh., 8, Stolp: Potänewiesen.

vittipennis Shlb., 8-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Lindow, Potänewiesen.

Delphax Fbr. (*Aracopus* Spin.)

crassicornis Pz., 8, Strandsumpf hinter der Potäne.

Megamelus Fieb.

venosus Germ., 4, Stolp: Menkenbruch.

Conomelus Fieb.

limbatus Fbr., 8-9, Stolp: Menkenbruch, Veddin, Potänewiesen,
Stolpmünde.

Liburnia Stål

pellusida Fbr., 5-8, Stolp; Ihnagrenzgebiet; überall verbreitet und
nicht selten.

obscura Boh., 6, Stolp: Freichow, Horster Teiche.

leptosoma Flor., 5, Evermoor.

lugubrina Boh., 6, Stolp: Horster Teiche, Freichow.

forcipata Boh., 6, Stolp: Horster Teiche.

discolor Boh., 6-8, Stolp: Horster Teiche, Freichow.

albocarinata Stål, 7-8, Stolp: Wusterwitzer Moor.

Stiroma Fieb.

bicarinata H.S., 6-7, Stolp: Schwuchow; Freichow, Muddelstrand.

Issidae

Ommatidiotus Spin.

dissimilis Fall., 7-8, Stolp: Strickershagen, Brückower Moor, Wuster-
witzer Moor.

Sternorhyncha.

Psyllidae

Livia Latr.

juncorum L., Stolp: Potänewiesen, Stolpmünde, Waldkatze, Lebanehrung; im August aus Schopfgallen von *Juncus lamprocarpus* gezogen, auch noch im Dezember von Besenginster gestreift.

Aphalara Foerst.

calthae L., 2-12, Stolp: Waldkatze, von Besenginster und Rottannen gestreift.

exilis Web. u. M., 9-12, Stolp: Waldkatze, von Besenginster gestreift.

Psylla Geoffr.

foersteri Fl., 6-7, Stolp: Lindow, Freichow, Rowe, an Erlen.

melanoneura Foerst., 2-12, Stolp, von Besenginster, Rottannen und Kiefern gestreift.

ledi Fl., 6-7, Wusterwitzer Moor, an *Ledum palustre*.

Arytaena Foerst..

genistae Latr., 2-12, an Besenginster gemein.

Trichohermes Kirk.

walkeri Foerst., 6-8, Stolp: Walkmühle, von *Rhamnus cathartica* gestreift.

Trioza Foerst.

remota Foerst., 2-12, Stolp, von Besenginster und Rottannen gestreift.

urticae L., Stolp, im Dezember von Kiefern gestreift.

nigricornis Foerst., 2-12, Stolp, an Kiefern und Rottannen.

acutipennis Zett., Stolp, im Dezember von Besenginster gestreift.

striola Fl., Stolp, im Dezember von Besenginster und Rottannen gestreift.

abdominalis Fl., Stolp, im Dezember von Besenginster gestreift.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflöhe 122-141](#)