

V.

***Tenthredinoidea*
aus der Umgebung von Stolp.**

Von Konrektor O. Karl, Stolp.

Seit dem Jahre 1917 sammle ich auch *Tenthredinoidea*, und so bin ich in der Lage, folgende Arten aus der Umgebung von Stolp nachzuweisen. Die ganze Sammlung habe ich dem Heimatmuseum in Stolp überwiesen.

A. *Tenthredinidae*.**I. *Tenthredininae*.****1. *Tenthredinini*.**

1. *Sciapteryx consobrina* Kl. 4—5, Reitz, Kl.-Strellin.
2. *Sc. costalis* F. Am 16. 4. 24 ein ♂ bei Stolp.
3. *Tenthredella mesomelas* L. 6, Stolp, Veddin, Arnshagen.
4. *T. mandibularis* F. 7, Stolp.
5. *T. temula* Scop. 6, Stolp, Arnshagen.
6. *T. atra* L. 5—6, Stolp, Arnshagen.
7. *T. fagi* Pz. 6—7, Stolp, Stolpmünde, Arnshagen.
8. *T. lichtwardti* Knw. Am 21. 6. 17 ein ♀ bei Stolp.
9. *T. flavicornis* F. 6, Stolp, Loitz, Arnshagen.
10. *T. livida* L. 6—7, Stolp, Loitz, Arnshagen.
11. *T. ferruginea* Schrnk. 6—7, Stolp, Arnshagen, Stolpmünde, Hebr.-Dammitz.
12. *T. balteata* Kl. 7, Freichow, Stolpmünde.
13. *T. colon* Kl. 6—7, Stolp, Loitz, Alt-Belz.
14. *Tenthredo zonula* Kl. 7, Buchhorst.
15. *T. rossii* Pz. Am 21. 6. 17 ein ♀ bei Arnshagen.
16. *T. scrophulariae* L. 6—7, Stolp, Stolpmünde, Kl.-Strellin, Loitz.
17. *T. arcuata* Forst 7—8, Stolp, Stolpmünde, Kl.-Strellin.
18. *Rhogogaster viridis* L. 6, Stolp, Veddin, Stolpmünde, Loitz.
19. *Rh. punctulata* Kl. Am 22. 6. 17 ein ♂ bei Stolp.
20. *Rh. aucupariae* Kl. 5—6, sehr verbreitet und nirgends selten.
21. *Perineura rubi* Pz. Am 12. 5. 25 ein ♂ bei Arnshagen.
22. *Tenthredopsis inornata* Cam. 6, Stolp, Veddin.
23. *T. campestris* L. 6—7, Stolp, Nipnow, Gr.-Strellin.
24. *T. litterata* Geoffr. 6, Stolp.
25. *T. flavomaculata* Cam. Am 18. 6. 17 ein ♂ bei Stolp.

26. *T. friesei* Knw. 6, Stolp.
27. *T. coqueberti* Kl. Am 26. 5. 19 ein ♂ bei Stolp.
28. *Pachyprotasis rapae* L. 5—7, überall verbreitet.
29. *Macrophya sanguinolenta* Gmel. 5—6, Stolp, Loitz.
30. *M. blanda* F. 6, Stolp, Nipnow.
31. *M. annulata* Geoffr. Am 12. 6. 17 ein ♂ bei Nipnow.
32. *M. duodecim-punctata* L. 5—6, Stolp, Stolpmünde, Arnshagen, Loitz.
33. *M. albicincta* Schrnk. 5—6, Stolp, Reitz, Gr.-Strellin.
34. *M. ribis* Schrnk. 6, Loitz, Gr.-Strellin.

2. *Dolerini*.

35. *Dolerus bimaculatus* Geoffr. 5—6, Arnshagen, Stolp, Loitz, Kl.-Strellin.
36. *D. dubius* Kl. 5, Stolp, Veddin, Loitz, Kl.-Strellin.
37. *D. palustris* Kl. 6, Stolp, Stolpmünde, Loitz.
38. *D. pratensis* L. 5—8, Stolp, Stolpmünde, Loitz.
39. *D. madidus* Kl. 4—5, Stolp.
40. *D. uliginosus* Kl. 4—6, Stolp, Stolpmünde, Veddin.
41. *D. ferrugatus* Lep. 5, Stolp, Arnshagen.
42. *D. gessneri* E. Andr. 5—6, Stolp, Gr.-Strellin.
43. *D. puncticollis* C. G. Thoms. 4—6, Stolp, Veddin, Kl.-Strellin.
44. *D. picipes* Kl. 4—5, Stolp.
45. *D. haematodes* Schrnk. 3—6, Stolp, Arnshagen.
46. *D. nigratus* Müll. 5—6, sehr verbreitet und häufig.
47. *D. niger* L. 4—7, Stolp, Arnshagen, Loitz.
48. *D. oblongus* Cam. 4—6, Stolp, Veddin, Kl.-Strellin.
49. *D. aeneus* Htg. Am 6. 5. 18 ein ♂ bei Veddin.
50. *Loderus pratorum* Fll. 6, Stolp, Arnshagen.
51. *L. vestigialis* Kl. 5—6, Stolp, Veddin.
52. *L. palmatus* Kl. 6, Stolp, Gr.-Strellin.

3. *Selandriini*.

53. *Athalia bicolor* Lep. 5—6, Stolp, Veddin, Loitz.
54. *A. glabricollis* C. G. Thoms. 5—8, Stolpmünde, Loitz.
55. *A. lineolata* Lep. 5—7, Stolp, Reitz, Kl.-Strellin.
56. *Selandria flavens* Kl. 6—7, Stolp, Stolpmünde.
57. *S. serva* F. 5—6, Stolp, Veddin, Loitz, Gr.-Strellin.
58. *S. stramineipes* Kl. 6—7, Veddin, Stolpmünde.
59. *S. cinereipes* Kl. 5—8, Stolp, Loitz, Stolpmünde.
60. *S. annulitarsis* C. G. Thoms. 5, Loitz, Kl.-Strellin.
61. *S. foveifrons* C. G. Thoms. Am 20. 5. 17 ein ♂ bei Reitz.
62. *S. morio* F. 5—6, Stolp, Reitz.
63. *S. fürstenbergensis* Knw. Stolp, Loitz.

64. *Stromboceros delicatalus* Fll. 6—7, Stolp, Stolpmünde.
65. *Strongylogaster lineata* Christ. 6—7, Stolp, Veddin, Alt-Belz.
66. *Str. xanthorea* Steph. 5—6, Stolp, Veddin, Loitz.
67. *Pseudotaxonus filicis* Kl. 5—6, Stolp, Veddin, Loitz.
68. *Eriocampa umbratica* Kl. 5—6, Stolp, Loitz.
69. *E. ovata* L. 6—8, Stolp, Arnshagen.
70. *Leucempria candidata* Fll. Am 25. 4. 18 2 ♀♀ bei Veddin.
71. *Empria pulverata* Retz. 5—6, Stolp, Loitz.
72. *E. abdominalis* F. Am 9. 6. 24 bei Gr.-Strellin.
73. *E. klugi* Steph. 5—6, Stolp, Veddin.
74. *E. liturata* Gmel. 5—6, Stolp, Kl.-Strellin, Veddin.
75. *E. parvula* Knw. Am 19. 5. 25 ein ♂ bei Stolp.
76. *E. longicornis* C. G. Thoms. 5—6, Stolp, Loitz.
77. *E. pumila* Knw. 4—5, Stolp, Kl.-Strellin, Arnshagen.
78. *E. tridens* Knw. 4—6, Stolp, Veddin, Loitz.
79. *Allantus togatus* Pz. 6, Stolp, Arnshagen.
80. *A. tener* Fll. 4—7, Stolp, Loitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde.
81. *A. pallipes* Spin. 5—7, Stolp, Ritzow, Arnshagen, Stolpmünde.
82. *A. calceatus* Kl. 4—7, Stolp, Stolpmünde, Veddin.
83. *A. carpini* Htg. 4—6, Stolp, Veddin.
84. *Taxonus agrorum* Fll. 5—6, Stolp, Loitz, Arnshagen.
85. *Ametastegia equiseti* Fll. 4—7, Stolp, Loitz, Kl.-Strellin.
86. *A. glabrata* Fll. 5—7, Stolp, Veddin, Stolpmünde.

4. *Hoplocampini*.

87. *Caliroa annulipes* Kl. Am 31. 7. 17 ein ♀ bei Stolpmünde.
88. *Phyllotoma ochropoda* Kl. Am 15. 6. 17 ein ♀ bei Veddin.
89. *Ph. vagans* Fll. Am 28. 6. 18 ein ♀ bei Stolp.

5. *Blennocampini*.

90. *Pelmatopus fuscus* Kl. 4—5, Stolp, Veddin.
91. *Tomostethus luteiventris* Kl. 4—6, Stolp, Reitz, Veddin, Stolpmünde.
92. *T. gagathinus* Kl. 5, Loitz, Stolp.
93. *T. fuliginosus* Schrnk. 5—7, Stolp, Loitz, Veddin, Stolpmünde.
94. *T. ephippium* Pz. 4—7, Stolp, Stolpmünde, Veddin, Loitz.
95. *Monophadnus pallescens* Gmel. 4—5, Stolp, Veddin, Loitz.
96. *M. geniculatus* Htg. 4—5, Stolp, Veddin.
97. *Blennocampa geniculata* Steph. 4—8, Stolp, Stolpmünde, Kl.-Strellin, Arnshagen, Loitz.
98. *Bl. alternipes* Kl. 5—7, Stolp, Kl.-Strellin, Stolpmünde.
99. *Bl. tenuicornis* Kl. 5—6, Stolp, Loitz, Kl.-Strellin, Veddin.
100. *Bl. subcana* Zadd. 4—6, Stolp, Veddin.
101. *Scolioneura betulae* Zadd. Am 31. 7. 17 ein ♀ bei Stolpmünde.

6. Nematini.

102. *Hemichroa albi* L. Am 19. 8. 17 ein ♀ bei Stolp.
103. *H. crocea* Geoffr. 6—8, Stolp, Arnshagen.
104. *Dineura virididorsata* Retz. Am 19. 5. 25 ein ♂ bei Stolp.
105. *Platycampus luridiventris* Fll. 6, Stolp, Reitz, Loitz, Arnshagen.
106. *Cladius pectinicornis* Geoffr. Am 15. 7. 17 ein ♂ bei Schwuchow.
107. *Priophorus tener* Zadd. 5—6, Loitz, Reitz, Veddin.
108. *Pr. padi* L. 5—6, Stolp, Loitz, Arnshagen, Hebr.-Damnitz.
109. *Euura saliceti* Fll. Am 28. 4. 18 ein ♀ bei Stolp.
110. *Eu. amerinae* L. Aus Gallen von *Salix fragilis* in großer Anzahl gezogen.
111. *Croesus latipes* Vill. 6—7, Stolp, Stolpmünde, Arnshagen.
112. *Amauronematus histrio* Lep. 4—5, Stolp, Veddin, auf blühenden Weiden, nicht selten.
113. *A. fallax* Lep. 4—5, Stolp, Veddin, Stolpmünde.
114. *A. viduatus* Zett. 4—6, Stolp, Veddin, Kl.-Strellin, Stolpmünde.
115. *A. humeralis* Lep. 4—6, Veddin, Loitz, Stolpmünde.
116. *A. tunicatus* Zadd. 4, Stolp, Veddin.
117. *A. amplus* Knw. 4—5, Stolp, Veddin.
118. *A. distinguendus* Ensl. Am 23. 4. 18 ein ♀ bei Veddin.
119. *A. puniceus* Christ. Am 26. 5. 19 ein ♀ bei Stolp.
120. *Nematinus fuscipennis* Lep. 5—6, Stolp, Stolpmünde, Arnshagen.
121. *N. luteus* Pz. 5—7, Stolp, Ritzow.
122. *N. acuminatus* C. G. Thoms. 7—8, Stolp, Loitz.
123. *Pterenoidea capito* Knw. 5, Stolp, Kl.-Strellin.
124. *Pt. myosotides* F. 6, Stolp, Reitz, Veddin, Loitz.
125. *Pt. pavida* Lep. 6—7, Stolp.
126. *Pt. polyspila* Först. 7, Stolp, Stolpmünde.
127. *Pt. curtispina* C. G. Thoms. Am 12. 5. 24 ein ♂ bei Stolp.
128. *Pt. miliaris* Pz. Am 4. 7. 24 ein ♀ bei Stolpmünde.
129. *Pt. hypoxantha* Först. 6—8, Stolp, Loitz.
130. *Pt. eurysterna* Zadd. 5, Stolp.
131. *Pachynematus albipennis* Hg. 5—8, Stolp, Reitz, Stolpmünde.
132. *P. vagus* F. 5—8, Stolp, Ritzow, Veddin, Loitz, Stolpmünde.
133. *P. declinatus* Först. Am 2. 6. 17 ein ♂ bei Veddin.
134. *P. infirmus* Först. Am 31. 5. 17 wie ♂ bei Veddin.
135. *P. nigriceps* Htg. Am 22. 5. 19 wie ♀ bei Stolp.
136. *P. umbripennis* Evers. Am 24. 6. 17 ein ♂ bei Stolpmünde.
137. *P. clitellatus* Lep. 4—6, Stolp, Veddin, Reitz, Arnshagen.
138. *P. rumicis* Fll. Am 16. 6. 24 ein ♂ bei Stolp.
139. *P. pallescens* Htg. Am 16. 6. 24 ein ♂ bei Stolp.
140. *P. diaphanus* Evers. Am 31. 5. 17 ein ♂ bei Kl.-Strellin.
141. *P. xanthocarpus* Htg. 5, Stolp.

142. *P. scutellatus* Htg. 5, Stolp.
143. *P. alpestris* Knw. Am 25. 4. 19 ein ♂ bei Stolp.
144. *Lygaeonematus compressicornis* F. 7, Kl.-Strellin.
145. *L. mollis* Htg. 4—5, Veddin, Stolpmünde.
146. *L. ambiguus* Fll. Am 23. 5. 19 ein ♀ bei Stolp.
147. *L. leucopodius* Htg. Am 7. 6. 24 ein ♂ bei Hebr.-Damnitz.
148. *L. paedidus* Knw. Am 6. 6. 24 ein ♀ bei Stolp.
149. *L. pallens* Ensl. Am 12. 5. 24 ein ♀ bei Stolp.
150. *Pristophora staudingeri* Ruth. 5—8, Stolp, Veddin, Stolpmünde.
151. *Pr. conjugata* Dahlb. 5—7, Stolp, Veddin, Arnshagen.
152. *Pr. pallidiventris* Fll. 5—6, Stolp, Veddin, Reitz, Arnshagen.
153. *Pr. melanocarpa* Htg. Am 27. 5. 21 ein ♀ bei Kl.-Strellin.
154. *Pr. fulvipes* Fll. 5—6, Loitz.
155. *Pr. amentorum* Först. 6, Veddin.
156. *Pr. pallidula* Knw. 4—5, Stolp.

II. *Lophyrinae*.

157. *Lophyrus polytomus* Htg. 4—8, Stolp.
158. *L. frutetorum* F. 6, Stolp, Krampe, Stolpmünde, Loitz.
159. *L. virens* Kl. Am 5. 6. 17 ein ♀ bei Stolp.

III. *Cimbicinae*.

160. *Cimbex femorata* L. 7, vereinzelt.
161. *C. lutea* L. ♂ sehr vereinzelt, ♀ häufiger.
162. *Trichiosoma latreillei* Leach. Am 6. 5. 23 ein ♀ auf dem Brückower Moor.
163. *Tr. vitellina* L. Von dieser Art besitze ich ein ♀, das Blüthgen am 16. 6. 17 bei Selitz, Kr. Rummelsburg, gefangen hat.
164. *Abia sericea* L. Am 22. 5. 14 ein ♀ bei Reitz.
165. *A. candens* Knw. Am 21. 7. 22 ein ♀ bei Stolpmünde.

IV. *Arginae*.

166. *Arge coerulescens* Geoffr. 6—7, Stolp, Loitz, Arnshagen, Stolpmünde.
167. *A. fuscipes* Fll. 5—6, Loitz, Hebr.-Damnitz.
168. *A. ustulata* L. 6—8, Stolp, Loitz, Veddin, Stolpmünde.
169. *A. coeruleipennis* Retz. Am 10. 7. 17 ein ♂ bei Stolp.
170. *A. atrata* Forst. 6—7, Stolp, Kl.-Strellin.
171. *A. ciliaris* L. 7, Stolp, Stolpmünde.
172. *A. cyanocrocea* Forst. 6, Stolp, Loitz.
173. *A. rosae* L. Am 26. 6. 21 ein ♂ bei Stolp.
174. *A. dimidiata* Fll. Am 17. 6. 17 ein ♂ bei Stolpmünde.
175. *Schizocera geminata* Gmel. 5, Stolp, Arnshagen.

V. *Pamphilinae*.

176. *Pamphilus depressus* Schrank. 5—6, Stolp.
 177. *P. hortorum* Kl. 6, Loitz.
 178. *P. silvaticus* 5—6, Stolp, Gr.-Strellin.
 179. *Cephaleia arvensis* Pz. 5—6, Stolp, Reitz, Stolpmünde.
 180. *Acantholyda pinivora* Ensl. 8, Stolpmünde.

B. *Cephidae*.

181. *Cephus nigritus* C. G. Thoms. Loitz, Nipnow, Veddin, Loitz, Hebr.-Dammitz.
 182. *C. pymaeus* L. 5—6, Veddin.
 183. *C. pallipes* Kl. 5—6, Stolp, Loitz, Veddin.

C. *Siricidae*.

184. *Paururus juvenis* L. Am 27. 7. 17 ein ♂ auf dem Gollenturm bei Köslin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: [Tenthredinoidea aus der Umgebung von Stolp 39-44](#)