

Nachtrag

zu dem Riehl'schen Verzeichnis der bei Kassel in einem Umkreise von ungefähr drei Meilen aufgefundenen Koleopteren.

Von

K. Bartels.

Das von dem verstorbenen F. Riehl in den Jahren 1860—1862 für den Verein für Naturkunde zu Kassel mit grosser Sorgfalt und auf Grund langer Beobachtung zusammengestellte Käferverzeichnis*) hat sich im Laufe der Jahre nicht als ganz vollständig erwiesen. Riehl selbst hatte in einem in seinem Besitz befindlichen Exemplare des Verzeichnisses zahlreiche Nachträge vermerkt. Der Unterzeichnete kann in Folge eigener Wahrnehmung während einer fast 10 jährigen Sammelzeit in der nächsten Umgegend von Kassel noch eine Anzahl neu aufgefundener Käfer hinzufügen, welche dem eifrigen Sammler Riehl entgangen sind. Unter den nachstehend bezeichneten Käfern sind diejenigen, welche Riehl seinem Verzeichnis später hinzugefügt hatte, durch einen * hervorgehoben. Die Fundorte der letzteren sind von Riehl leider nicht angegeben worden.

**Dyschirius angustatus* Ahr.

**Bembidium rufescens* Guér.

* — *Mannerheimii* Sahlb.

**Haliphus confinis* Steph.

* — *fluviatilis* Aubé.

**Leptusa analis* Gyll.

**Aleochara bilineata* Gyll.

**Homalota crassicornis* Gyll.

* — *castanoptera* Mannerh.

* — *nigricornis* Steph.

* — *divisa* Märkel.

**Oligota granaria* Erichson.

**Gyrophaena gentilis* Erichson.

**Tachinus pallipes* Gravenhorst.

des
von

*) cf. XIII. Bericht des Vereins f. Naturk. pag. 63—102. Kassel 1863.

- **Bolitobius pygmaeus* Fabr.
var. *intrusus* Hampe.
 biguttatus Steph.
- **Mycetoporus brunneus* Marsh.
- **Quedius xanthopus* Erichson.
- * — *tristis* Grav.
- **Staphylinus (Tasgius) ater* Grav.
- **Xantholinus (Nudobius) lentus* Erichson.
- **Lathrimaenum fuscum* Er.
- **Trichonyx sulcicollis* Reichb.
- **Clambus pubescens* Redt.
- **Abraeus globulus* Creutz.
- **Monosoma angusticollis* Gyll.
- * — *spenicollis* Aubé.
- * — *quadricollis* Aubé.
- **Cryptophagus umbratus* Er.
- **Atomaria contaminata* Er.
- **Ephistemus exiguus* Er.
- **Annomatus duodecimstriatus* Müll.
Dermestes bicolor Fabr. Kassel. In Häusern, in
Taubenschlägen nicht selten.
- **Aphodius obscurus* Fabr.
- **Trox perlatus* Goeze.
Chysobothris affinis Fabr. Am Stahlberge nicht selten.
- **Aphanisticus pusillus* Oliv.
- **Cardiophorus cinereus* Herbst.
- **Cyphon nitidulus* Thomson.
- **Malthodes Maurus* Lap.
- **Danacaea nigritarsis* Küst.
Hedobia regalis Duftschmid. Rengershausen, auf
blühenden Gebüsch, selten.
- **Hypophloeus linearis* Fabr.
Cteniopus sulphureus Linn. Wilhelmshöhe auf Blüten,
selten.
- **Rhinosimus aeneus* Oliv.
- **Bruchus varius* Oliv.
- * — *debilis* Gyll.
- * — *luteicornis* Ill.
- **Rhynchites aeneovirens* Marsh.
- **Rhynchites* var. *Fragariae* Gyll.
- **Otiorrhynchus fuscipes* Oliv.
- **Ceuthorrhynchus terminatus* Herbst.
- **Cryphalus Fagi* Fabr.
Clytus arvicola Oliv. Rengershausen auf Gebüsch.
Sehr selten.

Saperda scalaris Fabr. Im Habichtswald und Tannenwäldchen. Selten.

**Oberea erythrocephala* Fabr.

— *linearis* Linn. Am Stahlberge, auf Haselnussgebüsch. Selten.

Toxotus Quercus Götz. Am Stahlberge auf Gebüsch, ♂ häufig, ♀ selten.

Leptura scutellata Fabr. Am Stahlberge auf Gebüsch, ziemlich selten.

Cryptocephalus parvulus Müll.

— *flavilabris* Fabr. Wilhelmshöhe, selten.

**Haltica* (*Aphthona*) *violacea* Koch.

**Longitarsus* *ocroleucus* Marsh.

— x —

Nachweis

über

den Stand der Vereinskasse.

Kassenbestand am 1. Januar 1881	213	<i>M.</i>	32	<i>S.</i>
Einnahme vom 1. Jan. 1881 bis 1. April 1882	1225	"	65	"
	Summa	1438	"	97 "
Ausgabe bis 1. April 1882	1058	"	90	"
	Rest	380	"	07 "
Einnahme bis 1. April 1883	768	"	25	"
	Summa	1148	"	32 "
Ausgabe bis 1. April 1883	497	"	90	"
Bleibt Kassenbestand	650	"	42	"

