

Musci hepatici Lebermoose.

Von Dr. C. Laubinger in Cassel.

Im Laufe des Jahres 1900 sind von mir im Regierungsbezirk Cassel folgende Lebermoose nachgewiesen:

1. *Sarcocyphus fuscus* N. ab Es.; auf feuchtem Kalk- und Sandboden des Sommerholzes b. Neue Mühle. 20./6. 1900.
2. *Plagiochila asplenoides* L.; im Schockethal, Steimkethal des Bramwaldes, auf lehmiger Erde, auf Wiesen etc.
3. *Scapania albicans* L.; Schockethal, Schlucht bei Bergshausen-Cassel.
4. „ *obtusifolia* Hook; auf lehmigen Waldwegen, Waldweg zum Wachtküppel bei Gersfeld. 2./9. 1900.
5. „ *umbrosa* N. ab Es.; an Böschungen des Knüllgebirges. 20./5. 1900.
6. „ *undulata* N. ab Es.; Schlucht bei Bergshausen-Cassel. Juni 1900.
7. „ *nemorosa* N. ab Es.; von nassem Gestein des Schockethals bei Cassel. 21./8. 1900.
8. *Jungermannia trichophylla*; Schlucht am Lohberg bei Cassel. 15./10. 1900.
9. „ *barbata* Schreb.; Schlucht bei Bergshausen, Elgershäuser Weg am Brasselsberge. 15./6. 1900.
10. „ *bicuspidata* L.; auf feuchtem Gestein der Wälder. Juli 1900.
11. „ *divaricata* N. ab Es.; an Waldwegen verbreitet, Gersfeld 2./9. 1900.
12. „ *saxicola* Schrad.; vom Gestein des Meissners. Juni 1900.

13. *Jungermannia commutata* Hüb.; an Böschungen des Saurasens bei Cassel. Juni 1900.
14. „ *tersa* N. ab Es.; desgl. Juni 1900.
15. „ *nana* Rabenhorst (sehr selten); von einer thonig-sandigen Böschung bei Seigertshausen im Knüllgebirge. 20./5. 1900.
16. *Lioclaea lanceolata* N. ab Es.; auf feuchten Felsen und Hohlwegen der Gebirge. Juni 1900.
17. *Lophocolea bidentata* L.; von nassen Steinen im Schockethale 21./8. 1900.
18. „ *heterophylla* Schrad.; vom Gestein des Brasselsbergs am Elgershäuser Wege.
19. *Chilocyphus polyanthus* N. ab Es.; Schlucht bei Bergshausen. 20./6. 1900.
20. *Calypogeia Trichomanis* N. ab Es.; auf Waldboden.
21. *Lepidoxia reptans* N. ab Es.; Schlucht am Lohberg, Bergshäuser Schlucht etc. 15./10. 1900.
22. *Trichocolea Tomentella* N. ab Es.; aus dem Ahnathale, Steimkethal des Bramwaldes. 5./9. 1900.
23. *Madotheca platyphyloidea* N. ab Es.; an Steinen des Lindenberg bei Cassel. 20./3. 1900.
24. *Frullania Tamarisci* N. ab Es.; am Scharfenstein bei Gudensberg, am Wachtküppel bei Gersfeld a. d. Rhön. 2./9. 1900.
25. „ *dilatata* N. ab Es.; am Grunde junger Walnusbäume zu Wilhelmshöhe. 14./5. 1900.
26. *Pellia epiphylla* L.; Ahnathal, Steimkethal des Bramwaldes. 26./6. 1900.
27. *Blasia pusilla* Mich.; am Waldwege zwischen Ihringshausen und Spikershausen. 25./10. 1900.
28. *Aneura pinguis* Hüb.; von einer feuchten, schattigen Wiese am Wurmberge bei Cassel. 26./5. 1900.
29. „ *pinnatifida* Hüb.; von nassen Steinen einer Schlucht im Schockethale. 21./8. 1900.

-
30. *Echinomitrium furcatum* Hübn.; vom Basaltgestein des kleinen Bilsteins am Brasselsberge und vom Hirzstein. 16./10. 1900.
 31. *Lunularia vulgaris* Michel; von Blumentöpfen der Gewächshäuser zu Wilhelmshöhe. 16./10. 1900.
 32. *Marchantia polymorpha* L.; vom nassen Gestein zu Wilhelmshöhe.
 33. *Fegatella conica* L.; vom nassen Gestein des Aquaducts in Wilhelmshöhe.
 34. *Ricciella fluitans* A. Braun; schwimmend auf einem Teiche unterhalb Schloss Ludwigseck im Knüllgebirge. 15./6. 1900.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Laubinger Carl August

Artikel/Article: [Musci hepatici Lebermoose 93-95](#)