©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Pflanzen auf den sumpfigen und moorigen Quellwiesen der Lempe,

zwischen Forsthaus, Waldhaus und Mariendorf im Reinhardswalde.

Beobachtet von Apotheker Th. Sander in Hofgeismar u. a. 1903/04.

Herr Apotheker Sander schreibt darüber folgendes:

Auf Anregung des Herrn Dr. C. Laubinger in Cassel u. a. sowie durch eine mir zur Durchsicht übergebene Denkschrift über die Erhaltung der Naturdenkmäler, welche vom Kultusministerium an sämtliche Landratsämter zur Anregung von Maßnahmen für den genannten Zweck versandt wurde, fühle ich mich veranlaßt, da mit der Trockenlegung des Torfmoors im oberen Lempetale leider schon begonnen ist, die auf diesem Gebiete wachsende und dem Untergange geweihte Torfflora in meinem Herbarium zu erhalten. Bei Aufstellung der Liste habe er keine Rücksicht auf *Salices, Equiseten* und *Epilobien* genommen.

Gleichzeitig hat Herr Forstmeister Grebe eine Liste über die hauptsächlichsten, in demselben Gebiete vorkommenden Moose, die nun auch durch Trockenlegung verschwinden werden, hinzugefügt.

Es wäre wünschenswert, wenn ein Teil des sumpfig-moorigen Lempegebiets in seinem ursprünglichen Zustande verbliebe, um die wichtige Torfflora erhalten zu sehen.

Die nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

A. *Phanerogamen.*

Ranunculus Flammula, Stellaria glauca, Veronica scutellata, Galium palustre und *uliginosum, Solanum dulcamara, Montia rivularis, Crepis paludosa, Drosera rotundifolia, Carex pilulifera, Carex vesicaria, Carex remota, Carex pallescens, Carex Oederi, Carex elongata, Carex ampullacea, Carex panicea, Carex flava, Carex leporina, Carex vulgaris, Carex stellulata, Eriophorum angustifolium, Scirpus silvaticus* und *lacustris, Juncus silvaticus* und *effusus, Juncus conglomeratus* und *supinus, Juncus squarrosus, Nardus stricta, Aira flexuosa* und *caespitosa, Festuca ovina* und *rubra, Agrostis alba, Triodia decumbens, Glyceria fluitans, Anthoxanthum odoratum, Phalaris arundinacea, Calamagrostis lanceolata* und *montana, Cynosurus cristatas, Koeleria cristata* u. a.

Ferner nach Dr. C. Laubinger:

Salix rosmarinifolia L., *Salix repens* L., *Salix ambigua* Ehrh. (*aurito repens* Wimm.), *Salix aurita* u. a. Weiden, *Coeloglossum viride, Comarum palustre.*

B. *Cryptogamen.* (Moose) nach Grebe.

Sphagnum medium Limp., *Sphagnum contortum* Schultz, *Sphagnum recurvum* Palis, *Sphagnum rufescens* Br. eur., *Sphagnum cymbifol.* Erh., *Sphagnum squarrosum* Pers., *Sphagnum teres* (Schimp.), *Sphagnum laricinum* (Spruce), *Pleuridium alternifolium* (Dicks), *Dicranella Schreberi* Swartz, *Racomitrium aciculare* L, *Leptobryum pyriforme* L., *Bryum Duvalii* Voit., *Bryum pseudo-triquetrum* Hedw., *Philonotis caespitosa* Wils., *Polytrichum strictum* Banks, *Hypnum vernicosum* Lindb., *Hypnum exannulatum* Gimb., *Hypnum intermedium* Lindb., *Hypnum fluitans* Dill., *Scapania undulata, Scapania irrigua* u. v. a.

Cassel, Mai 1905. Dr. C. Laubinger.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 49

Autor(en)/Author(s): Sander Th.

Artikel/Article: Pflanzen auf den sumpfigen und moorigen Quellwiesen der Lempe 103-104