

# Weitere Nachträge

zur

**Flora Bambergers und des nördlichen fränkischen Jura**

von

**Dr. Kurt Harz,**  
k. Reallehrer in Kulmbach.



- Anemone Pulsatilla L:** trockene Raine bei Streitberg, Würgau, Kasendorf.
- Adonis aestivalis L:** Aecker des Staffelbergs, bei Kasendorf.
- Nigella arvensis L:** Aecker bei Streitberg, Bamberg, auf dem Staffelberg.
- Nuphar luteum Sm:** im Main resp. dessen Altwässern, sehr häufig: Mainrot, Banz, Zapfendorf, Hallstadt, Obertheres; in der Regnitz bei Bug, Gaustadt, Bischberg.
- Corydalis cava Schweig:** Kulmbach am Patersberg.
- Barbarea arcuata Rehb:** Staffelstein.
- Arabis petraea Lam:** sehr häufig an Abhängen zwischen Göfswenstein und Pottenstein.
- Cardamine impatiens L:** Hauptsmoos bei Bamberg, Kirchsulletten.
- Sisymbrium strictissimum L:** Ufergebüsch zwischen Hallstadt und Breitengüfsbach.
- Sisymbrium pannonicum Jacq:** Plassenburg auf Schutt, Bamberg an den Dämmen.
- Erysimum strictum L:** sehr häufig am alten Regnitzbett vom Steg in Bamberg bis Gaustadt.
- Erysimum odoratum Ehrh:** steinige Orte bei Giech, Streitberg, Göfswenstein, Wölkendorf, Hochstall, auf der Friesener Warte.
- Brassica nigra Koch:** am Mainufer bei Breitengüfsbach, Kemmern, Bischberg sehr häufig.
- Alyssum saxatile L:** südwestlicher Felsenvorsprung der Friesener Warte.
- Thlaspi perfoliatum L:** Stammberg.
- Thlaspi montanum L:** Abhänge bei Streitberg, Göfswenstein.
- Isatis tinctoria L:** Staffelberg.
- Drosera rotundifolia L:** In Gräben des Hauptsmoorwaldes.
- Cucubalus baccifer L:** In Gebüsch am Main beim Kemmern, Hallstadt an der Regnitz bei Pettstadt, Strullendorf, Bug.
- Silene Otites L:** häufig am Bahndamm Strullendorf-Bamberg-Hallstadt, Wiesen bei Kunigundenruh, am Heinrichsdamm, am Damm nach Gaustadt.

- Lepigonum rubrum* Whg.: zwischen dem Pflaster am Domplatz in Bamberg.
- Linum perenne* L: Friesener Warte.
- Cytisus nigricans* L: Wald der Plassenburg.
- Medicago minima* L: am Heinrichsdamm bei Bamberg.
- Astragalus Cicer* L: Felder bei Streitberg.
- Hippocrepis comosa* L: Ehrenbürg.
- Vicia pisiformis* L: Gebüsch der Altenburg, des Kreuzberges, bei Breitengüßbach, Zapfendorf, Würgau, Mirschbach.
- Vicia casubica* L: Kreuzberg.
- Lathyrus silvestris* L: Kreuzberg bei Hallstadt.
- Rosa rubiginosa* L: Staffelberg, Friesener Warte.
- Rosa dumetorum* Thuill: Aurach.
- Rosa tomentosa* Sm: Aurach.
- Rosa gallica* L: Aurach.
- Rubus tomentosus* Borkh: Aurach.
- Rubus dumetorum* W. et N: Aurach.
- Portulacca oleracea* L: in Kulturen der Breitenau, von Zapfendorf, in Gärten Bambergs.
- Sedum purpurascens* Koch: Aecker oberhalb Hallstadts.
- Sedum album* L: Felsen bei Würgau, Kasendorf, Burgkundstadt, Wölkendorf.
- Sedum boloniense* Lois: Regnitzauen bei Bamberg.
- Sedum reflexum* L: Strullendorf, Bug, Hallstadt.
- Sempervivum soboliferum* Sims: Altenstein, Staffelstein.
- Oenanthe fistulosa* L: Sumpfwiesen bei Hallstadt.
- Peseli coloratum* Ehrh: Staffelberg.
- Libanotis montana* Crtz: Göfswenstein, Rabeneck.
- Heracleum Sphondylium* L: mit gestrahlten und ungestrahlten Dolden, mit rötlichen, weißen und grünlichen Blüten sehr häufig in der Breitenau.
- Dipsacus pilosus* L: Altenburg, Memmelsdorf.
- Aster Amellos* L: Jurahöhe Vierzehnheiligen auf dem Staffelberg.
- Stenactisannua* Nus: Rasenplätze unmittelbar bei Bamberg.
- Pulicaria vulgaris* Gaerte: Strafsengräben in Hallstadt.
- Cirsium eriophorum* Scop: Strafsiech an der Strafe, Giech, sehr häufig auf der Jurahöhe bei Würgau.
- Cirsium lanceolatum* L: weißblühend am Kanal bei Bug und Gaustadt.

- Cirsium oleraceum* + *acaule* Hampe: auf Rainen und Wiesen der Breitenau bei Bamberg, bei Würgau, Breitengüßbach, Rentweinsdorf, Ebern, Friesen, stets in der Nähe der beiden Eltern.
- Serratula tinctoria* L: weifsblühend auf dem Kreuzberg.
- Centaurea rhenana* Boz: Friesener Warte.
- Centaurea dacea* L: mit fast weissen Blüten auf dem Kreuzberg.
- Crepis paludosa* Mch: Bug.
- Gentiana ciliata* L: Staffelberg.
- Gentiana cruciata* L: Strullendorf, Kulmbach.
- Cynoglossum officinale* L: Streitberg.
- Nonnea rosea* Lk: Rasenplätze und Schuttstellen in und um Kulmbach.
- Myosotis caespitosa* Sch: Sümpfe bei Hallstadt.
- Physalis Aëkekenghi* L: steinige Orte bei Streitberg.
- Hyoscyamus niger* L: Strafe um Pettstadt.
- Datura Stramonium* L: Schutt um Bamberg.
- Digitalis grandiflora* Lam: Gebüsch bei Streitberg, auf der Ehrenbürg.
- Linaria arvensis* Dof: sandige Felder bei Oberhaid, Pettstadt.
- Lathraea squamaria* L: Laubwälder bei Kulmbach.
- Stachys germanica* L: steinige Orte bei Göfswenstein.
- Stachys annua* L.: Aecker bei Streitberg, auf der Friesener Warte.
- Tencrium Scordium* L: Sumpfwiesen bei Hallstadt.
- Utricularia vulgaris* L: Sümpfe bei Bug.
- Anagallis coerulea* Schrb: Juraäcker bei Würgau, Hochstall.
- Elodea canadensis* Rich: Altwässer bei Bug.
- Triglochin palustre* L: Gräben der Breitenau.
- Potamogeton compressus* L: Bäche bei Aurach.
- Lemna gibba* L: Gräben der Breitenau.
- Cypripedium Calceolus* L: Wälder bei Göfswenstein.
- Lilium Martagon* L: Wälder bei Würgau, Kasendorf.
- Anthericum ramosum* L: Raine bei Würgau, Streitberg, Göfswenstein.
- Melica uniflora* Retz: Wälder bei Banz.
- Eragrostis minor* Host: massenhaft im Posthof und dem anstossenden Landeplatz am Kanal in Bamberg.
- Blechnum Spicant* With: Hauptsmoorwald.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Harz Kurt

Artikel/Article: [Weitere Nachträge zur Flora Bamberg's und des nördlichen fränkischen Jura. 141-145](#)