

Holothurien der Aru-Inseln

nach den Sammlungen von Dr. H. Merton.

Von

C. Vaney

Professeur adjoint à l'Université de Lyon.

Cucumaria gluberrima Semper.

Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m.

Cucumaria semperi Bell.

Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m.

Colochirus dotiolum (Pallas).

Dredgezug Nr. 11, Pulu Bambu, 10 m. Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m.
Bei Insel Jin, Ostseite, 25—30 m.

Colochirus quadrangularis Lassel.

Dredgezug Nr. 11, Pulu Bambu, 10 m. Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m.
Pulu Babi, Westseite, 10—12 m. Bei Lola, 4—6 m.

Colochirus quadrangularis var. *mollis* Pearson.

Dredgezug Nr. 1, vor Ngaiguli, 16 m.

Colochirus tuberculatus (Quoy et Gaimard).

Bei Insel Jin, Ostseite, 25—30 m. Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m.
Dredgezug Nr. 1, vor Ngaiguli, 14 m.

Thyone variabilis Ludwig.

Dredgezug Nr. 9, südwestlich von Lola, 8—10 m.

Thyone sacellus (Selenka).

Dredgezug Nr. 2, nordwestlich von Ngaiboer, 16 m. Dredgezug Nr. 1, bei Ngaiguli, 14 m

Thyone mirabilis Ludwig.

Bei Lola, 4—6 m.

Orcula purpuropunctata Sluiter.

Bei Gomo-Gomo, 4—8 m. Strand bei Ngaiboer.

Pseudocucumis intercedens Lampert.

Dredgezug Nr. 11, Pulu Bambu, 10 m.

Holothuria atra Jaeger.

Strand bei Ngaiboer. Vor Udjir, 3—5 m.

Stichopus chloronotus Brandt.

Vor Udjir, 3—5 m.