

I n h a l t.

	Seite
<i>Fr. Hessenberg</i> , mineralogische Notizen. No. 8. (Siebente Fortsetzung.) Mit vier Tafeln . . .	1—46.
<i>Fr. Scharff</i> , über die Bauweise des Feldspaths. II. Der schiefspaltende Feldspath, Albit und Periclin. Mit zwei Tafeln	47—84.
<i>O. Brefeld</i> , Dictyostelium mucuroides. Ein neuer Organismus aus der Verwandtschaft der Myxomyceten. Eine Untersuchung aus dem botanischen Laboratorium in Halle. Mit drei Tafeln	85—108.
✓ <i>A. Kölliker</i> , anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien. Erste Abtheilung: Die Pennatuliden. Erste Hälfte. Mit zehn Tafeln	109—256.
<i>Fr. Hessenberg</i> , mineralogische Notizen. No. 9. (Achte Fortsetzung.) Mit fünf Tafeln . . .	257—324.
<i>M. Woronin</i> , Sphaeria Lemanaeae, Sordaria fimiseda, Sordaria coprophila und Arthrobotrys oligospora. Mit sechs Tafeln	325—360.
<i>A. de Bary</i> , Eurotium, Eurysiphe, Cicinmobolus. Nebst Bemerkungen über die Geschlechtsorgane der Ascomyceten. Mit sechs Tafeln	361—455.
✓ <i>Lucae, J. C. G.</i> , der Schädel des japanischen Maskenschweins und der Einfluss der Muskeln auf dessen Form. Mit drei Tafeln	457—486.
✓ <i>A. Kölliker</i> , anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien. Erste Abtheilung: Die Pennatuliden. Fortsetzung. Mit sieben Tafeln	487—602.
