

# Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes

⟨Adephaga: II. Teil, Polyphaga: Staphylinoidea⟩

---

Von Korv.-Kapt. ⟨Ing.⟩ a. D. Fr. Peetz-Pr. Oldendorf, Westfl.

Die vorliegende Arbeit ist das Sammelergebnis eines Zeitraumes von etwa 30 Jahren (1900—1930). Sie umfaßt das Gesamtgebiet der *Coleoptera*. Infolge ihres Umfanges kann bei dem zur Verfügung stehenden Raume jährlich nur ein Abschnitt gebracht werden. Dieser erste Beitrag enthält den zweiten Teil der *Adephaga*, echte Wasserkäfer (*Dytiscidae*, *Haliplidae*, *Gyrinidae*) und aus der Abteilung der *Polyphaga* die Familienreihe der *Staphylinoidea*. Die Bearbeitung der fehlenden Familien *Cicindelae* und *Carabidae* hat Herr Hauptlehrer K. Barner, Eickum, übernommen, der sich schon seit Jahren auf das Studium dieser beiden Familien spezialisiert hat.

Das Sammelgebiet umfaßt das lippisch-westfälische Weserbergland mit etwa folgenden Begrenzungen: im Norden die Verbindungslinie zwischen Steinhuder Meer und Dümmersee, im Westen die Linie vom Dümmersee bis etwa Gütersloh, im Süden eine Linie von Gütersloh über Horn und Blomberg bis Pymont und von dort im Osten die Linie bis zum Steinhuder Meer. Dieses Gebiet wird durchzogen vom Teutoburger Wald, dem Weser- und Wiehengebirge mit seinen Ausläufern und enthält viele charakteristische Fundorte, wie z. B. das alluviale Werretal, die Herforder Liasmulde, das „Große Moor“ bei Nettelstedt, das Gebiet des Dümmersee mit der Hunte, das Steinhuder Meer, die Senne bei Bielefeld und das Hochmoor bei Hiddesen (Hiddeser Bent). Es wird von der Weser mit ihren Nebenflüssen durchflossen, von denen die Werre mit Else, die Bastau, die Osper und Aue besonders genannt seien.

Die aufgeführten Funde stützen sich in erster Linie auf die reichhaltige, mir zur Verfügung stehende Sammlung des Herrn K. Barner. Diese Sammlung wurde von Herrn Barner und den Herren Musikdirektor Schwier, seiner Zeit Petershagen und Lehrer Büsching, Eldagsen, zusammengebracht. Dem Wohnsitze dieser Herren entsprechend stammen die meisten Funde aus der Gegend von Petershagen, Mennighüffen, Löhne und Eickum bei Herford. Die in den „Beiträgen zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes von K. Barner“, welche im Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld 1922 veröffentlicht wurde, angeführten Fundorte sind auch in vorliegender Arbeit berücksichtigt. Verfasser dieses sammelte in den letzten 10 Jahren hauptsächlich in der Umgebung seines Wohnsitzes Pr. Oldendorf, Kr. Lübbecke.

Die Bestimmung der Tiere habe ich mit der größtmöglichen Genauigkeit vorgenommen bzw. nachgeprüft und nur solche Funde aufgenommen, für welche Belegexemplare in meiner Sammlung vorhanden sind. Zweifelhafte, insbesondere bei der sehr schwierigen Familie der *Aleocharinae*, habe ich zurückgestellt. Die von Herrn Pfarrer Hubental bestimmten Tiere der Sammlung Barner habe ich durch: „(Hub)“ gekennzeichnet. Die Aufführung der Familien folgt der *Fauna Germanica* von Reitter.

Für häufig wiederkehrende Fundorte benutze ich folgende Abkürzungen: Pthg = Petershagen, Mghf = Mennighüffen, Eick = Eickum bei Herford, PrOld = Pr. Oldendorf am Wiehengebirge, Kr. Lübbecke. Die aus der Sammlung Barner (Schwier, Büsching) stammenden Funde sind durch vorgesetztes „Ba:“ gekennzeichnet.

### III. Familie: Haliplidae

#### *Haliphus* Latr.

<i>confinis</i> Steph.	Dümmersee b. Hüde.
<i>fulvus</i> F.	Gevinghausen b. Bünde, i. Fischteich.
<i>flavicollis</i> Strm.	Bünde, i. d. Else.
<i>fulvicollis</i> Er.	Dümmersee b. Hüde; Großes Moor b. Nettelstedt.
<i>ruficollis</i> v. Heydeni	
<i>Wehnke</i>	Bünde, Gevinghauser Fischteich.
<i>fluviatilis</i> Aubé	Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.
— <i>a. striatus</i> Sharp	Dümmersee b. Lembruch.
— <i>v. Wehnkei</i> Gerh.	Bünde, Else b. Hunnebrock.
<i>immaculatus</i> Gerh.	Dümmersee b. Lembruch.
<i>lineatocollis</i> Mrsh.	Ba: Pthg (Schwier).

#### *Cnemidotus* Illig.

<i>caesus</i> Dft.	Bünde, Gevinghauser Fischteich.
--------------------	---------------------------------

### V. Familie: Dytiscidae

#### *Hyphydrus* Illig.

<i>ferrugineus</i> L.	Stift Quernheim, sumpfiger Teich; Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor, Moorteich.
-----------------------	---

#### *Hygrotus* Stephens.

<i>inaequalis</i> F.	Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Nettelstedter Moor, Moorteich.
<i>impressopunctatus</i> Schall.	Ba: Teutob. Wald.

#### *Hydroporus* Clairville.

<i>pictus</i> F.	Bünde, Stift Quernheim, Else b. Hunnebrock.
<i>flavipes</i> Oliv.	Ba: Pthg.
<i>platynotus</i> Grm.	Ba: Brackwede b. Bielefeld.
<i>elegans</i> Panz.	Bünde, Gevinghauser Fischteich, Else b. Hunnebrock.

- duodecimpustulatus* F. Bünde, Stift Quernheim u. i. d. Else, nicht selt.  
Ba: Pthg (Schwier).
- halensis* F. Ba: Pthg (Schwier); Dümmersee b. Hüde.  
überall häufig.
- lineatus* F. Bünde, Stift Quernheim.
- palustris* L. Bünde, Stift Quernheim.
- notatus* Strm. Bünde, Stift Quernheim; Ba: Mghf.
- piceus* Steph. Ba: Pthg (Schwier).
- melanocephalus* Gyll. Ba: Pthg (Schwier).
- tristis* Payk. Bünde, Gevinghauser Fischteich; Großes Moor b. Nettel-  
stedt.
- elongatulus* Strm. Ba: Pthg (Schwier).
- obscurus* Strm. Bünde, i. d. Else; Hiddeser Bent; Großes Moor b.  
Nettelstedt; Ba: Mghf.
- erythrocephalus* L. PrOld; Ba: Brackwede b. Bielefeld.
- juscipennis* Schaum. Ba: Mghf.
- planus* F. Bünde, i. d. Else.
- pubescens* Gyll.
- ferrugineus* Stephens
- Noterus** *Clav.*  
*crassicornis* Müll. Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.
- Laccophilus** *Leach.*  
*obscurus* Panz. Bünde, Gevinghauser Fischteich.  
*hyalinus* Degeer Werffen u. Gevinghausen b. Bünde u. i. d. Else.
- Agabus** *Leach.*  
*bipustulatus* L. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.  
*melanarius* Aubé Ba: Pthg, Weser.  
*Sturmi* Gyll. Stift Quernheim; Hiddeser Bent.  
*guttatus* Payk. Ba: Weserkette, Schneegrund.  
*undulatus* Schrank. Stift Quernheim; Ba: Pthg.  
*affinis* Payk. PrOld.  
*unguicularis* Thoms. Ba: Mghf.  
*paludosus* F. Ba: Pthg (Schwier).  
*congener* Payk. Ba: Pthg (Schwier).
- Platambus** *Thoms.*  
*maculatus* L. Bünde, Spradlower Bach u. Else; Ba: Eick; Mghf.  
--- v. *inaequalis* Ba: Mghf.
- Copelatus** *Erichs.*  
*ruficollis* Schall. Ba: Pthg (Schwier).
- Illybius** *Erichs.*  
*juliginosus* F. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.  
*guttiger* Gyll. Ba: Pthg (Schwier).  
*ater* Degeer überall nicht selten.  
*fenestratus* F. Ba: Pthg (Schwier).  
*subaeneus* Er. Donoper Teich b. Detmold; Bünde, i. d. Else.
- Rhantus** *Lacord.*  
*punctatus* Geoffr. Ba: Pthg (Schwier).  
*bistriatus* Er. Bünde, Else b. Hunnebrock.

*Colymbetes Clairville.*

*fuscus* L.

Bünde, Else u. Gevinghauser Fischteich; PrOld;  
Dümmersee b. Hüde.

*striatus* L.

Bünde, Spradower Bach; Ba: Eick.

*Acilius Leach.*

*sulcatus* L.

überall häufig.

*canaliculatus* Nicol.

Ba: Pthg (Schwier).

*Dytiscus* Lin.

*latissimus* L.

Rietberg i. W., einmal im Jan. 1887 unter dem Eise  
der Torfstiche der Emsniederung sehr zahlreich;  
Ba: in der Düpe b. Pthg, 1898/99 u. 1900 unter dem  
Eise zahlreich, sonst selten.

*punctulatus* F.

Bünde, Stift Quernheim, in Fischteichen; PrOld.

*dimidiatus* Bergst.

PrOld.

*marginalis* L.

überall häufig.

*circumcinctus* F.

Werffen b. Bünde u. i. d. Else; PrOld.

*Cybister* Curtis.

*laterimarginalis* Degeer

Rietberg i. W., im Gebiet im allgem. selten.

## VI. Familie: Gyrinidae

*Aulogyrinus Regimb.*

*concinuus* Klug.

Bünde, i. d. Else sehr häufig.

*Gyrinus* Lin.

*marinus* Gyll.

Bünde, i. d. Else u. überall häufig.

— *v. opacus*

Bünde, i. d. Else.

*natator* L.

Rödinghausen a. Wiehengeb.; Nettelstedter Moor.

*Orectochilus Lacord.*

*villosus* Müll.

Bünde, i. d. Else; Weserufer b. Porta, unter Steinen,  
sehr zahlreich.

## II. Polyphaga

### 1. Familienreihe: Staphylinoidea

#### 1. Familie: Staphylinidae

##### 1. Unterfamilie: Aleocharinae

*Ocalea* Er.

*badia* Er.

PrOld.

*picata* Steph.

PrOld, gesiebt.

*Illyobates* Kr.

*propinquus* Aubé

Ba: Eick.

*Chilopora* Kraatz.

*longitarsis* Er.

PrOld.

*rubicunda* Er.

PrOld.

<i>Phloeopora Er.</i>	
<i>testacea Munnh.</i>	PrOld.
<i>Aleochara Grav.</i>	
<i>curtula Goeze.</i>	Ba: Polle, Weserufer; Eick; Pthg.
<i>brevipennis Grav.</i>	Hiddeser Bent.
<i>languinosa Grav.</i>	Ba: Schnathorst.
<i>spadicea Er.</i>	Hunteburg, Bachufer.
<i>Ocyusa Kraatz.</i>	
<i>incrassata Rey.</i>	Ba: Mghf, gesiebt (Hub.).
<i>Ischnoglossa Kr.</i>	
<i>prolixa Grav.</i>	Ba: Mghf. gesiebt (Hub.).
<i>Euryalia Rey.</i>	
<i>decumana Er.</i>	Doberg b. Bünde.
<i>Oxypoda Mnnh.</i>	
<i>spectabilis Maerkel</i>	PrOld, i. Maulwurfsnest; Ba: Eldagsen.
<i>lividipennis Mnnh.</i>	PrOld, i. Maulwurfsnest u. i. Compost.
<i>opaca Grav.</i>	PrOld; Ba: Mghf, Langenhagen.
<i>elongatula Aubé</i>	PrOld.
<i>sericea Heer</i>	PrOld; Doberg b. Bünde.
<i>exigua Er.</i>	PrOld.
<i>alternans Grav.</i>	PrOld, in alten Pilzen.
<i>lucens Rey.</i>	PrOld, in Pilzen.
<i>jiliformis Redtb.</i>	PrOld, gekätschert.
<i>annularis Mnnh.</i>	PrOld; Wellingholzhausen, gekätschert.
<i>Dasyglossa Kr.</i>	
<i>prospera Er.</i>	Ba: Eick.
<i>Myrmedonia Er.</i>	
<i>limbata Payk.</i>	Ba: Pthg; Umgegend v. Minden, bei Lasiusarten.
<i>Atheta Thoms.</i>	
<i>brunnea F.</i>	Bünde, Elseufer.
<i>analís Grav.</i>	PrOld, Garten.
<i>gregaria Er.</i>	PrOld.
<i>linearis Grav.</i>	Ba: Pthg, Langenhagen; Mghf, Ulenburg, unter Laub (Hub).
<i>angustula Gyll.</i>	PrOld, unter trockener Buchenrinde.
<i>aequalis Er.</i>	PrOld, unter trockener Buchenrinde.
<i>melanocera Thoms.</i>	Ba: Haeverstedt, unter Rinde.
<i>castanoptera Mnnh.</i>	Ba: Mghf, gesiebt, an Gräben.
<i>longicornis Grav.</i>	PrOld, in Pilzen.
<i>sordida Marsh.</i>	Ba: Mghf, aus Laub gesiebt (Hub).
<i>laticollis Steph.</i>	Ba: Pthg, häufig.
<i>fungi Grav.</i>	Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).
<i>Falagria Mnnh.</i>	
<i>sulcata Payk.</i>	PrOld, i. Compost.
<i>sulcatula Grav.</i>	PrOld.

- Cardiola Rey.*  
*obscura Grav.* PrOld; Ba: Eick.
- Astilbus Steph.*  
*canaliculatus F.* Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg;  
Eick, nicht selten.
- Autalia Mnnh.*  
*impresa Ol.* PrOld, in Pilzen.
- Gyrophæna Mnnh.*  
*nana Payk.* Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).  
*bihamata Thoma.* Ba: Mghf, im Winter gesiebt (Hub).
- Gymnusa Grav.*  
*brevicollis Payk.* Ba: Pthg, unterhalb des Hopfenberges auf sumpf.,  
moorig. Boden.
- 4. Unterfamilie: Tachyporinae**
- Hypocyptus Mnnh.*  
*longicornis Payk.* Ba: Eick, im Winter aus Laub gesiebt; Mghf; Weser-  
berge.
- Conosoma Kraatz.*  
*bipunctatum Grav.* PrOld, in Pilzen; Ba: Pthg.  
*litoreum L.* Ba: Eick, unter Moos; Mghf; Wiehengeb. b. Schnathorst.  
*pubescens Grav.* Ba: Pthg, unt. Moos, Anspülicht der Osper.  
*immaculatum Steph.* PrOld.
- Tachyporus Gravenh.*  
*obtusus L.* überall häufig.  
*solutus Er.* überall häufig.  
*chrysomelinus L.* gemein.  
*atriceps Steph.* Ba: Schaumburger Wald; Bergkirchen; Mghf; Bühn  
b. Möllbergen.  
*transversalis Grav.* Wiehengeb. b. Linne, gekätschert.  
*hypnorum F.* gemein.  
*pusillus Grav.* Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Mghf; Eick.  
*nitidulus F.* häufig.
- Tachinus Grav.*  
*flavipes F.* Ba: Pthg, häufig.  
*humeralis Grav.* PrOld, gesiebt aus Laub.  
*proximus Kr.* PrOld, gesiebt.  
*marginatus Gyll.* PrOld, Garten.  
*pallipes Grav.* Ba: Eick.  
*rujipes Degeer* überall häufig.  
*subterraneus L.* Ba: Eick; Süntel, Roter Stein.  
-- v. *bicolor Grav.* PrOld; Ba: Eick.  
*fimetarius Grav.* PrOld; Bünde, Doberg, gekätschert.  
*laticollis Grav.* Ba: Pthg; Mghf. Langenhagen; Süntel, im Totental.  
(Im Dung u. an Aas.)  
*collaris Grav.* Ba: Pthg, Messlingen, Anspülicht der Osper.  
*elongatus Gyll.* Ba: Hohenstein i. Wellengrund.

## *Leucoparyphus Kraatz.*

*silphoides* L. PrOld, Garten, unter welchem Unkraut.

## *Habrocerus Er.*

*capillaricornis* Grav. PrOld, gesiebt; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

## *Mycetoporus Mnnh.*

*splendidulus* Grav. Ba: Eick.

*brunneus* Marsh. PrOld, Garten, im Fangeimer.

*Baudueri* Rey Ba: Eick.

## *Bolitobius Steph.*

*lunulatus* L. Ba: Mghf, Torlak, im Winter gesiebt; Teutob. Wald, Ravensburg; Detmold (in Pilzen).

*pulchellus* Mnnh. Ba: Örlinghausen.

*bicolor* Grav. Ba: Eick.

*trinitatus* Er. PrOld, in Pilzen; Ba: häufig überall.

*pygmaeus* F. überall häufig.

## *Byrocharis Lac.*

*analisis* Payk. Ba: Pthg, Marsch, unter Moos.

*inclinans* Grav. Ba: Eick; Wiehengeb. b. Bergkirchen.

*fiformosa* Grav. Ba: Wiehengeb. b. Wallücke.

## 5. Unterfamilie: Staphylininae

### *Quedius Steph.*

*lateralis* Grav. Ba: Pthg, in fauler Eiche.

*scitus* Grav. PrOld; Ba: Eick.

*xanthopus* Er. Ba: Pthg.

*mesomelinus* Mrsh. überall verbreitet.

*ochripennis* Mén. Ba: Eick.

*cruentus* Oliv. Ba: Eick, mehrfach.

*cinctus* Payk. PrOld, gesiebt; Ba: Pthg, im Winter unt. Baumrinde; Süntel; Eick.

*juliginosus* Grav. Bünde, Doberg; PrOld: Ba: Eick; Mghf.

*tristis* Grav. Bünde, Doberg; Ba: Eick.

*molochinus* Grav. Ba: Hiddeser Bent; Pthg, mehrfach.

*umbrinus* Er. PrOld.

*obliteratus* Er. Ba: Eick, einmal.

*humeralis* Steph. Ba: Süntel, i. Höllental; Mghf.

*picipennis* Heer Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, im Jan.

*julvicollis* Steph. Ba: Pthg, Anspülicht der Osper.

### *Creophilus Mnnh.*

*maxillosus* L. Ba: Pthg; Eick.

### *Ontholestes Ganglb.*

*tesselatus* Geoffr. PrOld; Ba: Pthg; Bückeberg; Weserberge b. Häverstedt; Mghf; Eick;

*murinus* L. PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.

## *Staphylinus L.*

*pubescens* Degeer  
*fossor* Scop.

*fulvipes* Scop.  
*stercorarius* Oliv.  
*caesareus* Cederh.  
*erythropterus* L.

*juscatus* Grav.  
*aenaeocephalus* Degeer  
*brunnipes* F.  
*ophthalmicus* Scop.

*olens* Müll.

*similis* F.  
*golbulifer* Geoffr.

## *Neobisnius Ganglb.*

*procerulus* Grav.

## *Philonthus Curtis.*

*splendens* F.  
*intermedius* Boisd.  
*laminatus* Creutz.  
*chalceus* Steph.  
*aenaeus* Rossi  
*atratus* Grav.

*carbonarius* Gyll.  
*temporalis* Rey  
*rotundicollis* Mén.  
*umbratilis* Grav.  
*cephalotes* Grav.  
*sordidus* Grav.  
*timetarius* Grav.

*marginatus* Ström.

*juscipennis* Munnh.

*Mannerheimi* Fauv.  
*varius* Gyll.

*immundus* Gyll.

*sanguinolentus* Grav.

Ba: Pthg; Süntel.

Ba: Eick; Weserbergland, Ottensteiner Plateau, Velmerstot (selten i. Wäldern).

Ba: im Vogeler b. Rühle.

PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Pthg, einmal; Dörentrup i. L. häufig.

Wiehengeb. b. Bad Essen; PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb. b. Schnathorst; Teutob. Wald b. Örlinghausen; Eick (nicht selten).

Ba: Eick; Teutob. Wald; Pthg.

Bünde, Doberg; Ba: Senne; Eick; Pthg; Mghf.

PrOld.

Bünde, Doberg; Ba: Eick; Pthg; Weserberge b. Rotenuffeln.

Ba: Süntel, Hohenstein; Ottensteiner Plateau; Exter; Lemgoer Mark; Eick, ein Stk. (selten, im O. des Gebietes häufiger).

überall nicht selten.

Bünde, Doberg; Ba: Mghf; Pthg; Eick; Oldentrup i. L.

Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, i. April unt. Eichenrinde.

Nettelstedter Moor; Ba: Pthg (nicht häufig).

Ba: Pthg; Mghf (April u. Mai).

Ba: Eick. Eldagsen b. Pthg.

Hücker Moor b. Bünde; PrOld.

überall häufig.

Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, Weser; Polle, Weser.

überall häufig.

PrOld; Weserufer b. Porta.

PrOld, nicht selten; Ba: Eick (Hub).

PrOld.

PrOld; Ba: Eick.

Ba: Eick (Hub).

PrOld; Elseufer b. Bünde; Dümmersee b. Lehmbruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf; Minden.

Ba: Vierenberg b. Salzuflen; Ötinghausen b. Herford, je einmal.

Ba: Umgeg. v. Herford; Pthg; Mghf; Süntel, Katzenase; Weserkette, Iberg, Schnathorst (i. Steinbruch u. Steinen März 12 sehr häufig). Eick; Enger.

Ba: Klus b. Minden (Hub).

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Weserkette b. Schnathorst, Katzenase.

Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Steinhuder Meer; PrOld; Ba: Pthg, Heisterholz, Anspülicht der Osper.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Pthg; Wiehengeb. b. Häverstedt (aus Laub gesiebt).



- coruscus* Grav. Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Süntel. Katzennase.  
*dimidiatus* Sahlb. Dümmersee b. Lembruch u. Hüde.  
*concinus* Grav. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Donoper Teich  
 b. Detmold; Dümmersee b. Hüde; PrOld.
- a. ochropus* Grav. Dümmersee b. Hüde; PrOld.  
*ebenius* Grav. Ba: Eick; Pthg, Eldagsen.  
*discoideus* Grav. PrOld; Ba: Eldagsen; Löhne; Bischofshagen.  
*ventralis* Grav. Dümmersee; Steinhuder Meer; PrOld; Elseufer b. Bünde.  
*quisquiliarius* Gyll. Nettelstedter Moor; Ba: Blomberg i. L.  
*longicornis* Steph. PrOld; Ba: Pthg (Hub).  
*varians* Payk. Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor; PrOld;  
 Ba: Pthg. Anspüllicht der Osper; Wiehengeb. b.  
 Häverstedt; Eick.
- a. unicolor* Steph. Ba: Weserberge.  
*jumarius* Grav. Ba: Eick.  
*micans* Grav. Weserufer b. Porta; Hücker Moor b. Bünde.  
*juvipipes* F. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Nettelstedter  
 Moor; Ba: Eick. am Mühlenbach (an fließendem  
 Wasser sehr häufig).
- splendidulus* Grav. Ba: Umgegend v. Herford; Stukenberg; Pthg, u. Kiefern-  
 rinde; Eick.  
*nigritulus* Grav. PrOld; Hiddeser Bent: Nettelstedter Moor; Ba: Mghf,  
 Ulenberg, Torlak; Eick, im Winter gesiebt.  
*rubripennis* Kiesw. Bünde, Doberg; PrOld. Garten.
- Othius** *Stephens.*  
*punctulatus* Goeze PrOld; Ba: Pthg; Weserkette, Katzennase, Totental,  
 Hohenstein; Mghf; Eick; Lemgoer Mark.  
*melanocephalus* Grav. PrOld; gesiebt; Ba: Süntel, Totental, Hohenstein; Mghf;  
 Eick.  
*myrmecophilus* Kiesw. Ba: Eick (Hub).
- Baptolinus** *Kraatz.*  
*affinis* Payk. Ba: Pthg; Weserkette, Osterberg, Bergkirchen, Schnat-  
 horst; Mghf; gesiebt; Eick.
- Xantholinus** *Serv.*  
*lentus* Grav. Ba: Schaumburger Wald, einmal unter Rinde (Hub).  
*punctulatus* Payk. PrOld; Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; Ba: Eick  
 (häufig).  
*atratus* Heer PrOld.  
*angustatus* Steph. PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.  
*glabratus* Grav. PrOld; Ba: Wiehengeb. b. Schnathorst; Mghf; Eick,  
 mehrfach.  
*linearis* Ol. Weserufer b. Porta; PrOld; Doberg b. Bünde; Ba:  
 Pthg; Schnathorst; Schaumb. Wald.  
— *v. longiventris* Heer Ba: Pthg; Eick; Süntel.  
*distans* Rey PrOld, gesiebt, selten.  
*tricolor* F. Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Süntel; Weserkette, Jakobs-  
 berg, Wittekindsberg, Oberlütbe; Eick; Blomberg  
 i. L.; Teutob. Wald, Ravensburg, n. selt.

## 6. Unterfamilie: Paederinae

### *Lathrobium* Grav.

*multipunctatum* Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Weser; Ottensteiner Plateau i. Glessetal i. April; Bega i. L., i. Juli (selten).

*quadratum* Pzyk.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper.

*terminatum* Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal i. Mai.

*fulvipenne* Grav.

PrOld; Kalksteinbruch b. Hiddesen; Ba: Pthg; Eick; Vlotho.

— v. *Letzneri* Gerh.

Ba: Mghf; Eick; Pthg; Schnathorst; Süntel.

*laevipenne* Heer

Bünde, Doberg, einmal.

*ripicola* Czwalina

Ba: Velmerstot (Hub).

*elongatum* L.

Ba: Pthg; Mghf; Eick.

*geminum* Kraatz

PrOld; Ba: Pthg; Süntel.

*brunnipes* F.

PrOld; Ba: Pthg; Lemgoer Mark. Lattberg (meist unter Rinde).

*jiliiforme* Grav.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Pthg.

*spadiceum* Er.

Bünde, Doberg, einmal.

### *Domene* Fauvel.

*scabricollis* Er.

Ba: Weserbergland; Pyrmont (je einmal).

### *Medon* Steph.

*brunneus* Er.

PrOld, einmal gesiebt.

*fuscus* Mnh.

PrOld, gesiebt.

*dilutus* Er.

Ba: Süntel, gesiebt.

### *Litocharis* Lac.

*ochracea* Grav.

PrOld, Garten, unter trockenem Unkraut.

### *Scopaeus* Kraatz.

*cognatus* Rey

PrOld, Garten, einmal.

### *Stilicus* Latr.

*subtilis* Er.

Ba: Eick; Eldagsen, Osper; Süntel, Katzennase.

*rufipes* Germ.

Ba: Süntel, Katzennase; Eick.

*similis* Er.

Ba: Pthg.

*geniculatus* Er.

PrOld; Ba: Schnathorst.

*orbiculatus* Payk.

Ba: Eick.

### *Paederus* Fabr.

*litoralis* Grav.

Ba: überall häufig.

*riparius* L.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf.

*limnophilus* Er.

Ba: Mghf; in der Gegend v. Löhne u. im Werretal.

*gemellus* Kraatz

Ba: Pthg, einmal bei Eldagsen nahe der Osper auf Sandboden i. gr. Menge; Wissingen b. Melle, einmal auf sandigem, feuchtem Boden zahlreich.

## 8. Unterfamilie: Steniae

### *Stenus* Latr.

*biguttatus* L.

überall häufig.

*bipunctatus* Er.

ebenfalls häufig.

*guttula* Müll.

Ba: Pthg; an der Osper b. Eldagsen, i. Mai.

<i>bimaculatus</i> Gyll.	überall häufig.
<i>fossulatus</i> Er.	Ba: Süntel, Roter Stein, i. Mai (Hub).
<i>asphaltinus</i> Er.	Ba: Wesergeb., Schaumburg i. Mai (Hub).
<i>Junco</i> Payk.	überall nicht selten.
<i>ater</i> Mnnh.	Ba: Mghf.
<i>clavicornis</i> Scop.	Bünde, Doberg; PrOld; Ba: Pthg; Süntel, Osterberg, Roter Stein; Hoher Nacken, Hohenstein; Wiehengeb. b. Oberlütbe; Eick.
<i>providus</i> Er.	Bad Essen a. Wiehengeb.; Ba: Eick; Pthg, Anspülicht der Osper.
<i>pusillus</i> Steph.	PrOld.
<i>nanus</i> Steph.	Ba: Süntel, Hohenstein; Eick.
<i>carbonarius</i> Gyll.	Ba: Minden-Ravensberg (genauer Fundort unbekannt) 1915 — 3 Stk.
<i>incrassatus</i> Er.	Ba: Pthg, Weserufer (sehr selten) (Hub).
<i>buphthalmus</i> Grav.	überall häufig.
<i>melanarius</i> Steph.	PrOld.
<i>atratus</i> Er.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal im Januar.
<i>morio</i> Grav.	Ba: Süntel, Ramsnacken (Benitz).
<i>fuscipes</i> Grav.	Ba: Pthg, häufig.
<i>argus</i> Grav.	Ba: Pthg, an der Osper.
<i>binotatus</i> Ljungh.	Hidder Bent; Ba: Pthg, an der Weser zwischen Schilf, März, April.
<i>geniculatus</i> Grav.	PrOld.
<i>opticus</i> Grav.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, i. Jan.
<i>crassus</i> Steph.	Bünde, Elseufer.
<i>nigritulus</i> Gyll.	Ba: bei Tengern, einmal unter Stein.
<i>brunnipes</i> Steph.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper (Hub).
<i>latifrons</i> Er.	Ba: Pthg; Anspülicht der Osper (Hub).
<i>tarsalis</i> Ljungh.	PrOld; Wiehengeb. b. Linne; Wellingholzhausen, gekätschert; Ba: Eick.
<i>similis</i> Hrbst.	Wiehengeb. b. Linne, gekätschert; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.
<i>cicindeloides</i> Schall.	Ba: Anspülicht der Osper u. Weser.

## 9. Unterfamilie: Oxyporinae

### *Oxyporus* Fbr.

*rufus* L. überall häufig, hauptsächlich an Pilzen.

## 11. Unterfamilie: Oxytelinae

### *Bledius* Mnnh.

*tricornis* Hrbst. Ba: Pthg, 1898 einmal, sonst Saltzter.  
*bicornis* Germ. PrOld, einmal, sonst Saltzter.  
*opacus* Block. Ba: Eick; Löhne, einmal an der Werre 3 Stk. (Hub).

### *Haploderus* Steph.

*caelatus* Grav. PrOld, gesiebt.

- Platystethus Mnnh.*  
*arenarius Grav.* Pymont, Waldblöße, gekätschert; Wellingholzhausen, gekätschert; Nettelstedter Moor; Ba: Eick.  
*cornutus Grav.* Bünde, Elseufer; Ba: Weserkette, Ramsnacken; Löhne, an der Werre; Hillentrup i. L.  
*alulaceus Thoms.* Ba: Eick.  
*nitens Sahlb.* Ba: Hiddeser Bent.
- Oxytelus Grav.*  
*rugosus F.* überall gemein.  
 -- *a. pulcher Grav.* Bünde, Elseufer; Ba: Pthg.  
*laqueatus Marsh.* Ba: Pthg. Anspülicht der Osper, April 99.  
*sculptus Grav.* PrOld.  
*inustus Grav.* PrOld, i. Maulwurfsnest u. gesiebt; Bünde, Doberg, auf Mergel.  
*sculpturatus Grav.* überall häufig.  
*nitidulus Grav.* PrOld; Bünde, Doberg.  
*complanatus L.* PrOld.  
*clypeonitens Pand.* PrOld.  
*tetracarinatus Block.* PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Eick; Mghf.  
*pumilus Er.* Hücker Moor b. Bünde; PrOld.
- Trogoploeus Mnnh.*  
*rivularis Motsch.* PrOld, gesiebt.
- Coprophilus Latr.*  
*striatulus F.* PrOld; Ba: Eick, Schulgarten; Pthg.
- Deleaster Er.*  
*dichrous Grav.* Nettelstedter Moor; Ba: Gohfeld, an der Werre; Eick.
- 13. Unterfamilie: Omalinae**
- Anthophagus Grav.*  
*bicornis Block.* Ba: Süntel, Schaumburg, im östl. Teil der Weserkette, auf Crataegus, Mai 15 sehr häufig.  
 -- *a. nivalis Rey* Ba: Süntel; Hohenstein.
- Lesteva Latr.*  
*pubescens Mnnh.* PrOld.  
*longelytrata Goeze* PrOld; Bad Essen, Wiehengeb.
- Orochares Kraatz.*  
*angustata Er.* PrOld., Wiehengeb., gekätschert.
- Acidota Mnnh.*  
*crenata F.* Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal.
- Olophrum Er.*  
*piceum Gyll.* Ba: Weserkette, Gr. Süntel.  
*assimile Payk.* Ba: Pthg.
- Arpedium Er.*  
*quadrum Grav.* Ba: Weserberge; Pthg, Anspülicht der Osper.

### *Lathrimaenum* Er.

*melanocephalum* Illig.  
*atrocephalum* Gyll.  
*unicolor* Marsh.

PrOld, in alten Pilzen.  
PrOld, gesiebt; Ba: Eick, gesiebt.  
Ba: Löhne, im Torlak; Eick (selten).

### *Xylodromus* Heer.

*depressus* Grav.

Ba: Schnathorst, i. August.

### *Omalium* Grav.

*rivulare* Payk.  
*septentrionis* Thoms.  
*caesum* Grav.

PrOld, gesiebt u. i. Pilzen, häufig; Ba: Eick; Pthg.  
Ba: Eldasen (Büsching).  
PrOld, gesiebt.

### *Phyllodrepa* Thoms.

*floralis* Payk.  
*melanocephala* F.

PrOld, gesiebt; Bünde, Doberg; Ba: Löhne, i. Früh-  
jahr, mehrfach.  
Ba: Eldagsen (Büsching).

### *Anthobium* Steph.

*abdominale* Grav.

PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Wesergeb. b. Schnat-  
horst i. April.

*signatum* Märkel

Ba: Pthg, Heisterholz (Mai); Wiehengeb. b. Dehme,  
auf Kirschblüte (April) (Hub).

*limbatum* Er.

PrOld.

*minutum* F.

Ba: Pthg.

*torquatum* Marsh.

Ba: Pthg.

*sorbi* Gyll.

PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Weserbergland, Porta.

*rectangulum* Fauv.

Ba: Mghf, b. Ulenburg an Lonicera (Hub).

### *Megarthus* Steph.

*sinuato-collis* Laé.

PrOld, gekätschert.

*denticollis* Beck.

Ba: Wiehengeb. b. Häverstedt.

### *Microplepus* Latr.

*porcatus* F.

PrOld, gekätschert, zweimal.

## 3. Familie: Pselaphidae

### *Euplectus* Leach.

*Fischeri* Aubé  
*signatus* Reichenb.

PrOld, im Compost.  
Ba: Süntel, Hohenstein, an faulem Baumstamm.

### *Amauronyx* Reitt.

*Maerkeli* Aubé

Ba: Westfalen (genaue Fundortangabe fehlt).

### *Byraxis* Leach.

*sanguinea* Leach.

Wellingholzhausen, Teutob. Wald, gekätschert; Ba:  
Pthg. Anspülicht der Osper, Mai 99, sehr häufig;  
in der Marsch auf *Sium*, einmal.

### *Reichenbachia* Leach.

*jossulata* Reichenb.  
*juncorum* Leach

Ba: Pthg, einmal u. großem Stein, am Waldrand.  
Ba: Mghf, im Anspülicht des Mühlbaches; Eick, aus  
Laub gesiebt.

*Bythinus Leach.*  
*puncticollis Denny*  
*securiger Rchbch.*

Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.  
PrOld, im Compost.

*Pselaphus Hrbst.*  
*Heisei Hrbst.*

Ba: Pthg (Büsching).

#### 4. Familie: Scydmaemidae

*Neuraphus Thoms.*  
*elongatulus Müll.*

Ba: Johannisberg b. Biefeld, aus Laub gesiebt.

*Euconnus Thoms.*  
*hirticollis Ill.*

Ba: Eick, einmal.

*Scydmaenus Latr.*  
*larsatus Müll.*

PrOld, im Compost.

#### 6. Familie: Silphidae

*Choleva Latr.*  
*spadicea Strm.*  
*Sturmi Bris.*  
*oblonga Latr.*  
*cisteloides Fröl.*

Ba: Bielefeld, Johannisberg, aus Laub gesiebt.  
Ba: Uchte.  
Ba: Schnathorst.  
PrOld, im Maulwurfsnest; Ba: Mghf; Niedermehnen;  
Süntel am Süntelturm, Totental, Hohenstein; Witte-  
kindsberg; Löhne; Eick.  
Ba: Pthg, im Walde i. April (Hub).

*agilis Ill.*

*Nargus Thoms.*

*Wilkeni Spence.*  
*anisotomoides Spence.*

Ba: Pthg, im Walde, i. April.  
Ba: Süntel, Hohenstein, Totental (April u. Mai).

*Catops Payk.*

*fumatus Spence.*  
*Watsoni Spence.*  
-- *v. amoenus Reill.*  
*picipes Fabr.*  
*fuliginosus Er.*  
*chrysoloides Panz.*  
*tristis Panz.*  
*alpinus Gyll.*

Ba: Eick, Fangbecher i. Walde.  
Ba: Pthg; Eick; Mghf (an kl. Kadavern). häufig.  
Ba: Mghf.  
Ba: Eldagsen (Büsching).  
Ba: Pthg: (Hub).  
Ba: Pthg (Büsching).  
Hiddesen, an Hasenfell; Ba: Eick.  
Ba: Teutob. Wald, nahe der Ravensburg; Eick, Fang-  
becher i. kl. Walde.

*Necrophorus Fabr.*

*germanicus L.*  
*humator Goeze*  
*interruptus Steph.*  
*vespilloides Hrbst.*  
*vespillo L.*  
*vestigator Herschel*

Rödinghausen a. Wiehengeb., einmal; Ba: Pthg, b.  
Lahde, einmal (sehr selten).  
überall u. n. selten.  
Ba: Pthg, einmal.  
Ba: Pthg; Bergkirchen, meist an faulen Pilzen.  
überall häufig.  
Börninghausen a. Wiehengeb.

*Necrodes Leach.*

*litoralis L.*

Ba: Pthg; Wiehengeb.; Eick (an größeren Kadavern  
n. selten).

### *Thanatophilus Samouelle.*

- rugosus* L. Ba: Pthg; Mghf.  
*sinuatus* F. überall häufig, an Aas.  
*dispar* Hrbst. Ba: Mghf, einmal.

### *Oeceoptoma Samouelle.*

- thoracica* L. Ba: Pthg; Mghf; Eick (n. selten).

### *Blitophaga Reitt.*

- opaca* L. überall häufig.  
*undata* Müll. häufig.

### *Xylodrepa Thoms.*

- quadripunctata* L. bei Salzuflen, i. Buchenwäldern häufig.

### *Silpha* L.

- tristis* Illig. PrOld; Ba: Eick.  
*obscura* L. überall n. selten.

### *Phosphuga Leach.*

- atrata* L. überall häufig, gern in der Nähe v. Wasser.  
— *a. brunnea* Hrbst. überall häufig.

### *Anisotoma Ill.*

- humeralis* Fabr. Ba: Weserbergland; Beverungen; Pthg.  
*axillaris* Gyll. Ba: Schloß Holte, u. Kiefernrinde (Hub).

### *Agathidium Ill.*

- nigripenne* F. Ba: Süntel, a. d. Südwehe, u. verpilzter Buchen- u.  
Eichenrinde, zweimal i. Mai  
*seminulum* L. PrOld, aus Laub gesiebt; Ba: Mghf, im Torlak;  
Wiehengeb. b. Nettelstedt.  
*rotundatum* Gyll. Ba: Eick.

## 10. Familie: Ptiliidae

### *Pteryx Matth.*

- suturalis* Heer Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

### *Acrotrichis Motsch.*

- grandicollis* Munn. PrOld, gesiebt.  
*intermedia* Gillm. Ba: häufig, im Winter im Laube.  
*fascicularis* Hrbst. Ba: Bielefeld, Teutob. Wald; Mghf, aus Laub gesiebt,  
im Februar.

## 12. Familie: Scaphidiidae

### *Scaphidium Oliv.*

- quadrimaculatum* Oliv. Ba: Pthg; Wesergeb. b. Steinbergen, unter fauler  
Rinde, nicht häufig.

### *Scaphosoma Leach.*

- agaricinum* L. Ba: Hohenstein; Löhne; Eick; Teutoburger Wald b.  
Örlinghausen (häufig).

## 14. Familie: Histeridae

### *Platysoma* Leach.

*frontale* Payk.

Ba: Pthg. unter Birkenrinde; Teutob. Wald b. Örlinghausen.

*compressum* Hrbst.

Ba: Pthg. unter Eichenrinde; Weserkette, Baumgarten; Süntel, Hohenstein.

*angustatum* Hoffm.

Ba: Schloß Holte, unter Kiefernrinde.

### *Hister* L.

*unicolor* L.

Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg.

*terricola* Germ.

PrOld, i. Maulwurfsnest; Nettelstedter Moor; Ba: Mghf.

*merdarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Mghf.

*cadaverinus* Hoffm.

überall sehr häufig.

*striola* Sahlbg.

Ba: Pthg, Eldagsen, zweimal.

*fimetarius* Hrbst.

Ba: Pthg, nicht selten.

*stercorarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb., Limberg.

*marginatus* Er.

Ba: an faulen Pflanzen, selten (Hub).

*rujicornis* Grimm.

Ba: Pthg, selten (Hub).

*purpurascens* Hrbst.

PrOld; Ba: Sieker, Senne; Pthg; Mghf; Eick.

— *a. niger* Schmidt

Ba: Pthg.

*ventralis* Marsh.

PrOld.

*neglectus* Germ.

PrOld; Ba: Pthg, mehrfach; Schnathorst; Eldagsen, Eick.

*carbonarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Schildesche; Pthg; Schaumburger Wald.

*bimaculatus* L.

Ba: Eick, einmal i. Wassertümpel; Versmold.

### *Paromalus* Leach.

*parallelepipedus* Hrbst.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, März 13 u. Okt. 18 (8 Stk).

### *Dendrophilus* Leach.

*punctatus* Hrbst.

PrOld, im Kompost.

### *Gnathoncus* Duval.

*punctulatus* Thoms.

Ba: Pthg, Eldagsen (Büsching); Gr. Süntel; Eick, am Fenster eines Viehstalles sehr zahlr.

*rotundatus* Kug.

Ba: Kahler Asten.

### *Saprinus* Er.

*semistriatus* Scribâ

Ba: Pthg; Wesergeb.; Eick; Teutob. Wald.

*aeneus* Fabr.

Ba: Wald b. Südfelde, im Juni.

### *Plegaderus* Er.

*vulneratus* Panz.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, mehrfach, März 13 und Okt. 18.

### *Onthophilus* Leach.

*striatus* Förster

überall ziemlich häufig.

*sulcatus* Fabr.

PrOld, im Compost; Ba: Eick (nicht selten).

Fortsetzung folgt.