

Nachtrag

zu dem Verzeichniß der in der Preussischen Oberlausitz vorkommenden
Land- und Wassermollusken*).

I. Gruppe. M. Gasteropoda.

1. Abtheilung. M. Pulmonata inoperculata.

I. Familie. Limacea. Nacktschnecken.

1. Gattung. Arion Fér.

1. A. ater L. (A. empiricorum.)
2. A. rufus L. Im Laubaner Hohlwalde.
3. A. subfuscus Drap. Auf der Landskrone.
4. A. hortensis Fér.

2. Gattung. Limax Müll.

1. L. cinereus List.
2. L. agrestis L.

II. Familie. Helicea. Gehäuseschnecken.

1. Gattung. Vitrina Drap.

1. V. pellucida Müll.
2. V. diaphana Drap.
3. V. elongata Drap. Am Buchberge (Basalt) im Laubaner Hohlwalde.

2. Gattung. Daudebardia Hartm.

1. D. brevipes Drap. Erst einmal von mir, und zwar im Herbst 1862 am Rande des Gehäuses an dem nordöstl. Fuße der Landskrone, gefunden.

3. Gattung. Succinea Drap.

1. S. putris L. (S. amphibia Drap.)

*) Der Vollständigkeit wegen sind die in dem früher veröffentlichten Verzeichnisse (Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft Band IX.) bereits enthaltenen Species nochmals, jedoch ohne Angabe des Fundorts, angeführt.

2. *S. Pfeifferi* Rossm. 1862 zahlreich auf vom Wasser bespülten Steinen, an der sogenannten Weinlache bei Görlik.

3. *S. oblonga* Drap. Auch im Erbsbüschchen an der Weinlache.

4. Gattung. *Zonites* Montf.

1. *Z. cellarius* Müll.

2. *Z. hyalinus* Fér. An der Landskrone, selten.

3. *Z. crystallinus* Müll.

4. *Z. nitidus* Müll.

5. *Z. nitens* Mich. Auf der Landskrone.

6. *Z. nitidulus* Drap.

7. *Z. fulvus* Drap.

5. Gattung. *Helix* (L.).

1. *H. pygmaea* Drap.

2. *H. rotundata* Müll.

3. *H. obvoluta* Müll.

4. *H. personata* Lam.

5. *H. lapicida* L.

6. *H. arbustorum*.

7. *H. pulchella* Müll. Auch in den Kalkbrüchen bei Hemmersdorf.

8. *H. costata* Müll.

9. *H. bidens* Chemn. Auch an den mit Gesträuch bewachsenen Reifeufern bei Görlik.

10. *H. aculeata* Müll.

11. *H. sericea* Drap. In Gesellschaft von *H. hispida* im botanischen Garten zu Görlik, jedoch selten.

12. *H. hispida* Müll.

13. *H. incarnata* Müll.

14. *H. umbrosa* Partsch. Sehr häufig in Gesellschaft von *Succinea putris*, namentlich auf Nesseln auf der Försterwiese im Laubauer Hohlwalde, einer feuchten Waldwiese mit Torfgrund, die auch durch das Vorkommen einer Anzahl seltener, dem Vorgebirge angehöriger Pflanzen, wie *Dentaria enneaphylla* und *bulbifera*, *Polygonatum verticillatum*, *circaea alpina*, *Hookeria lucens* u. a., ausgezeichnet ist.

In diesem Sommer fand ich diese Schnecke, wenn auch nur sparsam, auch auf der Landskrone, desgleichen auf dem Löbauer Berge.

15. *H. fruticum* Müll. Auch an den Obermühlbergen und in den Gärten bei Görlik.

16. *H. nemoralis* L.

17. *H. hortensis* Müll.

18. *H. pomatia* L.

6. Gattung. *Bulimus* Scop.

1. *Bulimus montanus* Drap.

2. *Bulimus obscurus* Müll. Erst in wenigen Exemplaren von mir auf der Landskrone während eines Regens gefunden. Kommt daselbst gewiß häufiger vor, scheint aber bei trockener Witterung sich sehr tief zu verfrachten.

7. Gattung. *Glandina* Schum.

1. *Gl. lubrica* (*Achatina*) Müll.

Die Varietät *exigua* Menke (*Ach. lubricella* Ziegl) an Steinen im botanischen Garten, an feuchten Kalkfelsen im Steinbruch bei Hennersdorf.

8. Gattung. *Pupa* Drap.

1. *P. doliolum* Drap.

2. *P. Antivertigo* Drap.

3. *P. muscorum* L. An feuchten Kalkfelsen im Steinbruche bei Hennersdorf.

9. Gattung. *Balea* Prid.

1. *B. perversa* L. (*B. fragilis* Drap.) An der Nordostseite der Landskrone dicht unter der höchsten Kuppe, jedoch bisher nur in 2 Exemplaren gefunden.

10. Gattung. *Clausilia* Drap.

1. *Cl. filograna* Ziegl. Auf der Landskrone, namentlich nach dem Gipfel zu, unter Moos und an den Wurzeln von *Poa nemoralis*, *Melica nutans* und *uniflora* und andern Gräsern nicht selten; doch da sie nach meinen Beobachtungen diesen Aufenthalt, selbst bei nassem Wetter, nicht verläßt und nie an Steinen und Baumstämmen emporfriecht, so ist sie im dunkeln Waldesschaten nicht leicht zu finden.

2. *Cl. plicatula* Drap.

3. *Cl. dubia* Drap. Auf der Landskrone, namentlich an der Ost- und Nordostseite, nicht häufig.

4. *Cl. nigricans* Pult. Meist kaum 9 Millim., selten über 10 Millim. lang. An der Ost- und Nordseite der Landskrone nicht allzu häufig.

5. *Cl. plicata* Drap. Auf der Landskrone, namentlich an der Ost- und Südseite, nach Regen auf unbeschatteten Basaltgerölle nicht selten.

6. *Cl. bidens* Drap. des früheren Verzeichnisses muß heißen: *Cl. biplicata* Montagu (*Cl. similis* v. Charp.). Es ist diese Species in der Umgebung von Görlitz die häufigste der Gattung und findet sich namentlich auf der Landskrone in zahlloser Menge.

7. *Cl. bidens* Drap. (*laminata* Montagu). Auf der Landskrone, doch nicht allzuhäufig. Manche Exemplare haben eine Länge von nur 13 Millim. bei einer Breite von fast 4 Millim.

8. *Cl. orthostoma* Menke (*taeniata* Ziegl). Auf der Landskrone in der Regel mit *plicata* zusammen. Daselbst kommen mit der Normalform nicht

selten Blindlinge von grünlichweißer Farbe vor. Ich fand unter 85 gesammelten Exemplaren deren 10.

Cl. asphaltina Ziegl des früheren Verzeichnisses muß gestrichen werden.

III. Familie. Auriculacea. Ohrschnecken.

1. Gattung. Auricula.

1. *A. minima* Müll. (*Carychium minimum* Müll.)

IV. Familie. Limnaeacea. Wasserschnecken (ohne Deckel).

1. Gattung. Physa Drap.

1. *Ph. fontinalis* L.

2. *Ph. hypnorum* L. Erst in neuester Zeit in einem Graben bei Leopoldshayn aufgefunden.

2. Gattung. Limnaeus Drap.

1. *L. stagnalis* L.

2. *L. palustris* Drap. In der Weinlache bei Görlich, bei Mops.

3. *L. truncatulus* Müll. (*minutus* Drap.). Auch an Steinen am Rande der Weinlache bei Görlich, in Gesellschaft von *Succinea Pfeifferi*.

4. *L. auricularius* L.

5. *L. pereger* Müll.

6. *L. vulgaris* Rossm. In der Weinlache bei Görlich.

3. Gattung. Planorbis Müll.

1. *Pl. corneus* L.

2. *Pl. contortus* L.

3. *Pl. marginatus* Drap. (*Pl. complanatus* L.)

4. *Pl. leucostoma* Mich.

5. *Pl. spirorbis* Müll. Auch in der Weinlache.

6. *Pl. albus* Müll.

7. *Pl. cristatus* Drap. In der Weinlache bei Görlich, an Blättern der *Nymphaea alba*.

8. *Pl. nitidus* Müll.

9. *Pl. complanatus* Drap. (*fontanus* Montagn.)

2. Abtheilung. M. Pulmonata operculata Fér.

3. Abtheilung. M. Ctenobranchiata.

4. Abtheilung. M. Rhipidoglossata.

Aus diesen 3 Abtheilungen sind bis jetzt noch keine Arten von uns in der Oberlausitz gefunden worden.

5. Abtheilung. M. Monopleurobranchiata.

I. Familie. Ancylea.

1. Gattung. Ancylus Geoffr.

1. A. fluviatilis List.
2. A. lacustris Müll.

II. Gruppe. Acephala.

1. Abtheilung. M. Dimya.

I. Familie. Naiadea.

1. Gattung. Anodonta Lam.

1. A. cygnea L.
2. A. anatina L.
3. A. piscinalis Nilsson. In der Weinlache.
4. A. Cellensis Schroet. Im Queiß bei Lauban.

2. Gattung. Unio Retz.

1. U. tumidus Retz.
2. U. batavus Lam.
3. U. pictorum L.
4. U. margaritifer L. In neuerer Zeit ist sie in der Wittig oberhalb Nieda gefunden worden.

II. Familie. Cardiacea.

1. Gattung. Cyclas Brug.

1. C. cornea.
2. C. rivicola Lam. In der Reife bei Görliß.
3. C. lacustris. In den Tümpeln im städtischen Park zu Görliß.
4. C. calyculata Drap. Mit der vorigen an gleichem Fundort.

2. Gattung. Pisidium Pfeiff.

1. P. fontinale Drap.
2. P. obtusale C. Pfeiff. In Gräben am Erbsbüschchen in der Weinlache.
3. P. amnicum Müll. (P. obliquum Pfeiff.) In der Weinlache bei Görliß.
4. P. rivicola Lam. In der Weinlache bei Görliß.

Die Zahl der von uns gesammelten Species beträgt demnach jetzt 89, während das frühere Verzeichniß nur 64 aufzählt.

R. Peck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Peck Felix Georg Reinhard

Artikel/Article: [Nachtrag zu dem Verzeichniß der in der Preußischen Oberlausitz vorkommenden Land- und Wassermollusken 126-130](#)