

Nachtrag

zu dem

Verzeichniss der in der Preussischen Oberlausitz vorkommenden Land- und Wassermollusken von R. Peck

von

Otto Wohlberedt, Berlin 1892.

Man vergleiche: Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz

Band IX pag. 196 — 202,

„ XII „ 126 — 130 und 206,

„ XIV „ 68.

Ferner: Die Mollusken der Preussischen Oberlausitz von Hermann
Jordan, in den Jahrbüchern der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft,

VI. Jahrgang, 1879, pag. 291 — 384,

woselbst auch die übrige hierher gehörige Literatur angeführt ist.

Im Genist der Neisse, unterhalb Görlitz, welchem bis jetzt wenig Aufmerksamkeit zugewendet worden ist, sammelte ich im Frühjahr dieses Jahres nachstehende 41 Arten, unter denen sich fünf für unsere Fauna neue Arten befinden. Besonders interessant ist das Vorkommen von *Planorbis Rossmassleri*, welcher bis jetzt in Schlesien nur bei Patschkau von Herrn Jetschin gefunden worden ist (laut brieflicher Mittheilung des Herrn E. Merkel):

1. *Vitrina pellucida* Müll. Häufig.
2. „ *diaphana* Drap. Nicht häufig.
3. *Hyalina cellaria* Müll. Mehrere schöne Exemplare.
4. „ *nitidula* Drap. Häufig.
5. „ *cristallina* Müll. Sehr häufig.
6. „ *praticola* Reinh. 4 Exemplare; neu für die Preussische Oberlausitz.
7. *Zonitoides nitida* Müll. Sehr häufig.
8. *Patula rotundata* Müll. Ebenso.
9. *Helix pulchella* Müll. Ebenso.

10. *Helix costata* Müll. 5 Exemplare.
11. „ *bidens* Chemn. Häufig.
12. „ *hispida* L. Nicht gerade häufig.
var. *conciuna* Jeffr. Ebenso.
13. „ *incarnata* Müll. 2 kleine Exemplare.
14. „ *arbustorum* L.
15. „ *nemoralis* L. (Gelb 12345, 00300, bräunlich 00000 u. 00300.)
16. „ *pomatia* L.
17. *Cionella lubrica* Müll. Sehr häufig.
var. *lubricella* Zgl. 7 Exemplare.
18. *Caecilianella acicula* Müll. Selten.
19. *Pupa muscorum* L. Selten.
20. *Vertigo antivertigo* Drap. Selten
21. „ *pygmaea* Drap. Häufig.
22. „ *angustior* Jeffr. 1 Exemplar. Neu für die Preussische
Oberlausitz.
23. *Clausilia biplicata* Mont. Nicht häufig.
24. *Succinea putris* L. Sehr häufig.
25. „ *oblonga* Drap. Nicht selten.
26. *Carychium minimum* Müll. Sehr häufig.
27. *Linnaea palustris* Drap. 4 Exemplare.
28. „ *truncatula* L. Häufig.
29. *Planorbis corneus* L. 2 Exemplare.
30. „ *marginatus* Drap. Häufig.
31. „ *rotundatus* Poiret. Sehr häufig.
32. „ *contortus* L. Ebenso.
33. „ *albus* Müll. Nicht häufig.
34. „ *Rossmassleri* Auerswald. Häufig. Neu für die Preuss.
Oberlausitz.
35. „ *complanatus* L. 3 Exemplare.
36. *Valvata cristata* Müll. Nicht häufig. Neu für die Preussische
Oberlausitz.
37. *Sphaerium corneum* L. Nicht häufig.
38. *Calymene lacustris* Müll. Selten.
39. *Pisidium amnicum* Müll. Selten.
40. „ *henslowianum* Sepp. 1 Exemplar. Neu für die Preuss.
Oberlausitz.
41. *Pisidium fossarinum* Cless. Nicht häufig.

Erwähnen möchte ich hier auch das Vorkommen von:

Vitrina diaphana Drap. in grossen Exemplaren, sehr häufig an einer feuchten mit Brennesseln bewachsenen Stelle in der Nähe der Bade-Anstalt an der „Neuen Brücke.“

Clausilia biplicata Mont., häufig unter Steinen im Park an der „Neuen Brücke“ in Gesellschaft von *Zonitoides nitida* Müll. und *Patula rotundata* Müll.

Das „Erlbüschchen“ an der Weinlache bei Görlitz, von welchem Peck und Jordan verschiedene Species anführen, existirt jetzt nicht mehr, weshalb die betreffenden Fundorte zu streichen sind.

Auf der Landskrone fand ich ausser den bekannten Arten und Varietäten noch:

Arion hortensis Fer. häufig,

Patula rotundata Müll. var. *albina*, 2 Exemplare,

Clausilia pumila Zgl. Typus, neben der Varietät *sejuncta* A. Schm., sodass die Zahl der bis jetzt auf genanntem Berge beobachteten Schnecken 55 (nebst 9 Formen- resp. Farben-Abänderungen) beträgt; dieselben sind in nachfolgendem Verzeichniss mit * bezeichnet.

Interessant ist ferner das jetzt sehr häufige Vorkommen auf der Landskrone von *Clausilia laminata* Mont. und *Clausilia nigricans* Pult., welche beide Arten Jordan als nicht häufig, resp. selten angiebt.

Folgende 114 Arten sind bis jetzt in der Preussischen Oberlausitz beobachtet worden:

*1. *Daudebardia brevipes* Drap., Peck Bd. XII pag. 126, Jordan Jahrb., VI. Jahrg. pag. 378.

*2. *Amalia marginata* Drap., Jordan pag. 366.

*3. *Limax laevis* Müll., Jordan pag. 365.

*4. „ *agrestis* L., Peck Bd. IX. pag. 197, Jordan pag. 365.

*5. „ *maximus* L.

*a) var. *cinereo-niger* Wolf., Peck Bd. IX pag. 197 (L. cinereus), Jordan pag. 363.

*b) var. *cinereus* Lister, Jordan pag. 364.

c) var. *unicolor* Heyn., Jordan pag. 364.

6. „ *tenellus* Nils., Jordan pag. 365. Ferner auf dem Hochstein in dunkelgefärbten Exemplaren.

*7. „ *arborum* Bouch., Jordan pag. 364.

*8. *Vitrina pellucida* Müll., Peck Bd. IX pag. 197, Jordan pag. 374.

*9. „ *diaphana* Drap., Peck Bd. IX pag. 197, Jordan pag. 375.

- *10. *Vitrina elongata* Drap., Peck Bd. XII pag. 126, Jordan pag. 377.
 „ *lusatica* Jord., Jordan pag. 376. Vergl. Clessin, Excurs. Moll. Fauna, II. Auflg., pag. 77.
11. *Hyalina glabra* Stud., Jordan pag. 370.
12. „ *cellaria* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 370.
- *13. „ *nitens* Mich., Jordan pag. 369.
- *14. „ *nitidula* Drap., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 369.
- *15. „ *pura* Alder, Jordan pag. 367.
 * var. *viridula* Menke, Jordan pag. 367.
16. „ *radiatula* Ald., v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68 (H. striatula), Jordan pag. 368.
 var. *petronella* Charp., Jordan pag. 368 (mut. *viridula*).
- *17. „ *contracta* West., Jordan pag. 371.
- *18. „ *diaphana* Stud., Peck Bd. XII pag. 127 (H. hyalina), Jordan pag. 371.
19. „ *cristallina* Müll., Peck Bd. IX pag. 199, von Möllendorf Bd. XIV pag. 68 (H. subterranea Brug.), Jordan pag. 371.
20. „ *fulva* Drap., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 372.
21. „ *praticola* Reinh., Neissegenist.
- *22. *Zonitoides nitida* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 373.
23. *Arion empericorum* Fér.
 a) *ater*, Peck Bd. IX pag. 197, Jordan pag. 360.
 b) *rufus*, Peck Bd. XII pag. 126, Jordan pag. 360.
- *24. „ *subfuscus* Drap., Jordan pag. 361.
25. „ *Bourguignati* Mab., bei Hennersdorf, dürfte wohl in der Oberlausitz weiter verbreitet sein. Neu für die Preussische Oberlausitz.
- *26. „ *hortensis* Fér., Peck Bd. IX pag. 197, Jordan pag. 361.
 Auf der Landskrone, häufig, und auf dem Hochstein (im Walde!).
 Der von Scholtz, Moll. Schles. pag. 3, Jordan pag. 361 angegebene:
 „ *albus* Fér. ist wohl nur *A. empericorum* Fér. von fast rein weisser Färbung, wie ich ihn ähnlich auch im Isergebirge (Polaun) beobachtet habe.
 „ *melanocephalus* Faure-Big., Jordan pag. 362, = *Arion empericorum* Fér. juv.

- *27. *Patula rotundata* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 345.
* var. *albina*, Landskrone.
- *28. „ *pygmaea* Drap., Peck Bd. IX pag. 199, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 345.
- *29. *Helix* (Acanthinula) *aculeata* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 347.
- *30. „ (Vallonia) *pulchella* Müll., Peck Bd. IX pag. 198 Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 348.
- *31. „ „ *costata* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 348.
- *32. „ (Trigonostoma) *obvoluta* Müll., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 346.
33. „ „ *holoserica* Stud., Jordan pag. 347.
- *34. „ (Triodopsis) *personata* Lam., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 347. Neumann giebt diese Art nicht vom Greiffenstein an (Jordan), wo sie auch jedenfalls nicht vorkommt, sondern er schreibt nur: „bei Greiffenberg.“
35. „ (Petasia) *bidens* Chemn., Peck Bd. IX pag. 198, Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 349.
* var. *albina*, Jordan pag. 348, Vergl. Seite 169.
- „ (Fruticicola) *sericea* Drap., Peck Bd. XII pag. 127. Man vergleiche Jordan pag. 352—353.
36. „ „ *rubiginosa* Zgl., Jordan pag. 353.
37. „ „ *hispida* L., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 352.
var. *concinna* Jeffr., Neissegenist. (Besonders häufig auf dem Greiffenstein.)
- *38. „ „ *umbrosa* Partsch., Peck Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 351.
39. „ „ *strigella* Drap., Peck Bd. XII pag. 206, Jordan pag. 350.
- *40. „ „ *fruticum* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 350.
- *41. „ „ *incarnata* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 353.
- *42. „ (Chilotrema) *lapicida* L., Peck Bd. IX pag. 199, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 354.
- *43. „ (Arionta) *arbustorum* L., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 355.
var. *trochoidalis* Roff., Kirchhof von Görlitz.

- *44. *Helix* (Tachea) *hortensis* Müll., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 356.
var. *fusco-labiata* Kregl., Jordan pag. 357.
- *45. „ „ *nemoralis* L., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 357.
* var. *conoidea* Cless., Jordan pag. 358.
(Von dieser Varietät befindet sich ein schönes Exemplar von der Landskrone im „Museum der Naturforschenden Gesellschaft“ zu Görlitz.)
- *46. „ (Helicogena) *pomatia* L., Peck Bd. IX pag. 198, Jordan pag. 358.
- *47. *Buliminus montanus* Drap., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 344.
- *48. „ *obscurus* Müll., Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 344.
49. *Cionella lubrica* Müll., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 343.
a) var. *hyalina*, Jordan pag. 343.
*b) var. *lubricella* Zgl., Peck Bd. XII pag. 128, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 343.
50. *Caecilianella acicula* Müll., Jordan pag. 343.
- *51. *Pupa doliolum* Brug., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 340.
- *52. „ *muscorum* L., Peck Bd. XII pag. 128, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 340.
- *53. „ *minutissima* Hartm., v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 341.
54. „ *edentula* Drap., v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 341.
55. *Vertigo antivertigo* Drap., Peck Bd. IX pag. 199, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 341.
- *56. „ *pygmaea* Drap., Peck Bd. IX pag. 199, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 341.
57. „ *substriata* Jeffr., v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 342.
- *58. „ *pusilla* Müll., Jordan pag. 342.
59. „ *angustior* Jeffr., Neissegenist.
- *60. *Balea fragilis* Drap., Peck Bd. XII pag. 128, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 338.
- *61. *Clausilia* (Clausiliastra) *laminata* Mont., Peck Bd. XII pag. 128 (Cl. *bidens* Drap.), Jordan pag. 333.
- *62. „ „ *orthostoma* Menke, Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 333.
* mnt. *viridula*, Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 333.

- *63. *Clausilia* (Alinda) *biplicata* Mont., Peck Bd. IX pag. 199 (Cl. *bidens* Drap.), Bd. XII pag. 128 (Cl. *similis* Ch.), Jordan pag. 334.
* *mut. viridula*, Jordan pag. 335.
- *64. „ „ *plicata* Drap., Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 334.
var. eplicata Rossm., Jordan pag. 334.*)
- *65. „ (Pyrostoma) *dubia* Drap., Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 337.
- *66. „ „ *nigricans* Pult., Peck Bd. IX pag. 199, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 336.
- *67. „ „ *pumila* Zgl., Landskrone.
* *var. sejuncta* A. Schm., Jordan pag. 337.
- *68. „ „ *parvula* Stud., Jordan pag. 336.
- *69. „ „ *tumida* Zgl., Jordan pag. 335.
- *70. „ „ *plicatula* Drap., Peck Bd. IX pag. 199, Jordan pag. 335.
- *71. „ „ *filograna* Zgl., Peck Bd. XII pag. 128, Jordan pag. 338.
72. *Succinea putris* L., Peck Bd. IX pag. 198 (S. *amphibia* Drap.), Jordan pag. 329.
73. „ *Pfeifferi* Rossm., Peck Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 330.
- *74. „ *oblonga* Drap., Peck Bd. IX pag. 198, Bd. XII pag. 127, Jordan pag. 330.
- *75. *Carychium minimum* Müll., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 328.
76. *Limnaea stagnalis* L., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 316.
a) *var. elegans* Leach., Jordan pag. 317.
b) *var. turgida* Menke, Jordan pag. 317.
77. „ *auricularia* L., Peck Bd. IX pag. 200, von Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 322.
var. lagotis Schrenk, Jordan pag. 323.
78. „ *ovata* Drap., von Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 320.
var. amploides Jord., Jordan pag. 321.
79. „ *peregra* Drap., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 319.

*) Diese Varietät fand ich mit der typ. Art auf dem Oybin sehr häufig.

80. *Limnaea palustris* Müll., Peck Bd. XII pag. 129, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 317.
 a) *var. corvus* Gmelin, Jordan pag. 318.
 b) *var. fusca* C. Pfeiffer, Jordan pag. 318.
 c) *var. turricula* Held, Jordan pag. 319.
81. „ *truncatula* L., Peck Bd. IX pag. 200, Bd. XII pag. 129, Jordan pag. 319.
82. *Amphipeplea glutinosa* Müll., Jordan pag. 323.
83. *Physa fontinalis* L., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 324.
84. *Aplexa hynorum* L., Peck Bd. XII pag. 129, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 324.
85. *Planorbis* (Coretus) *corneus* L., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 327.
86. „ (Tropidiscus) *marginatus* Drap., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 327.
87. „ „ *carinatus* Müll., Jordan pag. 328.
88. „ (Gyrorbis) *vortex* L., Jordan pag. 328.
89. „ „ *rotundatus* Poiret, Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 327.
90. „ „ *spirorbis* L., Peck Bd. IX pag. 200, Bd. XII pag. 129, Jordan pag. 327.
91. „ (Bathyomphalus) *contortus* L., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 326.
92. „ (Gyraulus) *albus* Müll., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 326.
93. „ „ *Rossmassleri* Auerswald, Neissegenist.
94. „ „ *nautilus* L., Peck Bd. XII pag. 129, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68 (Pl. cristatus), Jordan pag. 326.
95. „ (Hippeutis) *fontanus* Lightfoot, Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 326.
96. „ (Segmentina) *nitidus* Müll., Peck Bd. IX pag. 200, Jordan pag. 326.
97. *Ancylus fluviatilis* Müll., Peck Bd. IX pag. 201, Jordan pag. 315.
98. „ *lacustris* L., Jordan pag. 315.
- *99. *Acme fusca* Walker, v. Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 314.
100. *Valvata cristata* Müll., Neissegenist.
101. *Viviparus verus* v. Frauenfeld, Peck Bd. XII pag. 206, Jordan pag. 314.

102. *Anodonta variabilis* Drap., Jordan pag. 298.
 a) *cygnaea* L., Peck Bd. IX pag. 201, von Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 298.
 b) *zellensis* Schr., Peck Bd. XII pag. 130, Jordan pag. 298.
 c) *piscinalis* Nils., Peck Bd. XII pag. 130, Jordan pag. 299.
 d) *anatina* L., Peck Bd. IX pag. 200, von Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 299.
103. *Margaritana margaritifera* L., Peck Bd. XII pag. 130, Jordan pag. 299.
104. *Unio pictorum* L., Peck Bd. IX pag. 201, Jordan pag. 301.
var. limosus Nils., Jordan pag. 303.
(var. pachyodon Jord., Jordan pag. 304.) Vergl. Clessin, Excurs. Moll.-Fauna II. Auflg. pag. 537.
105. „ *tumidus* Retz., Peck Bd. IX pag. 201, Jordan pag. 305.
106. „ *crassus* Retz., von Möllendorf Bd. XIV pag. 68, Jordan pag. 306.
var. batavus Lam., Peck Bd. IX pag. 201, Jordan pag. 307.
107. *Sphaerium rivicola* Leach., Peck Bd. XII pag. 130, Jordan pag. 309.
108. „ *corneum* L., Peck Bd. IX pag. 201, Jordan pag. 309.
109. „ *ovale* Fér., Jordan pag. 310.
110. „ *mamillanum* West., Jordan pag. 310.
111. *Calymene lacustris* Müll., Peck Bd. XII pag. 130.
var. Steinii A. Schm., Jordan pag. 311.
112. *Pisidium amnicum* Müll., Peck Bd. XII pag. 130.
113. „ *henslovianum* Sepp., Neissegenist.
114. „ *obtusale* C. Pfeiffer., Peck Bd. XII pag. 130, Jordan pag. 312.
 „ *fontinale* Drap. (?), Peck Bd. IX pag. 202.
 „ *rivicola* Lam. (?), Peck Bd. XII pag. 130.

Einige von mir in diesem Jahre in die weitere Umgegend von Görlitz unternommene Ausflüge ergaben zum Theil recht interessante Ergebnisse in Bezug auf Mollusken, und theile ich im Nachstehenden meine diesbezüglichen Beobachtungen und Funde mit. Leider habe ich beim Rothstein, Gröditzberg und Jeschkengebirge auf die kleinsten Sachen nicht achten können, und dürften daher spätere Sammler noch verschiedenes Neue finden.

Rothstein, Sächsische Oberlausitz.

Dieser aus Basalt bestehende und zum grossen Theil mit Fichtenwald bewachsene, langgestreckte Berg hat in seiner Fauna viel Aehnlichkeit mit der Landskrone. Ich sammelte auf einer Excursion im Juli d. J. dorthin nachstehende 20 Arten Schnecken:

1. *Limax cinereo-niger* Wolf. Häufig.
2. „ *agrestis* L. Zerstreut.
3. *Vitrina pellucida* Müll. Häufig.
4. *Hyalina pura* Müll. Häufig.
5. „ *nitens* Mich. 1 Exemplar.
6. *Arion subfuscus* Fér. Unter Steinen häufig, besonders im Fichtenwald.
7. „ *empericorum* Fér. Auf nassen Wegen, sehr häufig.
8. *Patula rotundata* Müll. Häufig.
9. *Helix personata* Lam. 3 Exemplare.
10. „ *fruticum* Müll. Häufig.
11. „ *lapicida* L. Zerstreut.
12. „ *arbustorum* L. Kräftige und dunkle Gehäuse.
13. „ *hortensis* Müll. Nicht häufig.
14. „ *pomatia* L. Zerstreut.
15. *Cionella lubrica* Müll.
var. *lubricella* Zgl. 5 Exemplare.
16. *Pupa doliolum* Brug. 4 Exemplare.
17. *Clausilia laminata* Mont. 5 Exemplare.
18. „ *biplicata* Mont. Häufig.
19. „ *nigricans* Pult. Häufig.
20. „ *filograna* Zgl. Häufig.

Ueber den

Gröditzberg

von welchem Neumann (Naturgeschichte Schles. Laus. Land- und Süsswassermollusken, 1833) ein paar Arten anführt, ist seit dieser Zeit nichts in Bezug auf Conchylien veröffentlicht worden. Es war daher zu vermuthen, dass in den weitläufigen Ueberresten der ehemaligen Burg noch verschiedenes Interessante zu finden sei. Ich unternahm deshalb am ersten Pfingstfeiertag d. J. dorthin eine Excursion, auf welcher ich folgende 14 Arten fand:

1. *Amalia marginata* Drap. Unter Steinen und unter herabgefallener Dachpappe an der Rückwand der Hauptruine. Ich sammelte 12 Exemplare.
2. *Limax cinereo-niger* Wolf. Sehr grosse Thiere von grauer Färbung.
3. *Hyalina cellaria* Müll. 7 Exemplare.
4. *Arion subfuscus* Fér. Häufig.
5. *Helix personata* Lam. Im Burggraben unter Steinen 2 Exemplare.
6. „ *strigella* Drap. Häufig.
7. „ *fruticum* Müll. Sehr häufig, in allen Farben-Abänderungen.
8. „ *incarnata* Müll. Dunkle röthliche Gehäuse. Sehr häufig.
9. „ *lapicida* L. Ebenfalls recht dunkle Gehäuse. Sehr häufig.
10. „ *hortensis* Müll. Gelb 12345, schön rothbraun 12345, 00000 und zwei albine Gehäuse (00000 und 12345).
11. „ *pomatia* L. Nicht häufig.
12. *Clausilia biplicata* Mont. Sehr häufig. Auch ein rechtsgewundenes Gehäuse wurde gefunden.
13. „ *plicata* Drap. In grosser Menge.
14. *Limnaea peregra* Müll. 3 sehr grosse Gehäuse in einem Teiche bei der Burg. Höhe 20—22 Millimeter.

Clausilia ventricosa Drap., welche nach Neumann ebenfalls dort vorkommen soll, wurde sowohl von Herrn E. Merkel s. Z. als auch von mir nicht gefunden, und möchte ich das Vorkommen dieser Art daselbst in Frage stellen, um so mehr als verschiedene Fund-Angaben Neumann's sich in neuerer Zeit nicht bestätigt haben.

Drei Ausflüge nach der

Kleinen Schneegrube

in diesem Jahre ergaben ausser den von Dr. Reinhardt (Ueber die Molluskenfauna der Sudeten) angegebenen Arten (nur *Cl. filograna* nicht, welche von Möllendorf von dort angiebt) auch die schon lange nicht mehr dort gefundene

Clausilia cruciata Stud. var. *minima* Ad. Schm.

Auf meinen ersten beiden Ausflügen, sowie auf drei Ausflügen des Herrn E. Merkel wurden in Summa gegen 140 Pupeen (*P. edentula*, *pusilla*, *alpestris*) gefunden, unter welchen sich nur ein ganz unvollständiges Exemplar von *P. arctica* (?) befand. Bei meinem dritten Ausfluge dagegen, auf welchem ich wegen plötzlich eintretenden schlechten

Wetters nur ein paar Minuten sieben konnte, fand ich zwei Exemplare von *P. artica* Wall. Man kann hieraus ungefähr ersehen, auf was für einen kleinen Raum diese seltene Art beschränkt ist.

Auf meiner ersten Excursion, bei welcher es kurz zuvor stark geregnet hatte, fand ich in der kleinen Grube und auf dem Wege nach derselben unter den vielen *Limax arborum* Bouch. ein paar Exemplare



mit sehr starker Streifung, sodass man bei oberflächlicher Betrachtung glauben konnte, *Limax cinereus* vor sich zu haben. Die

anatomische Untersuchung überhob mich jedoch jedem Zweifel. Ich gebe zu dieser schönen Varietät eine Abbildung und bemerke zu derselben, dass die Grundfarbe des Thieres gleichmässig hell gelblich grau, die Streifung dagegen vollständig schwarz, am Rande ein wenig verwaschen ist.

Im Uebrigen stimmen die Thiere, auch bezüglich ihrer anatomischen Beschaffenheit, mit normalen Exemplaren überein.

Durch Herrn Albert Protz, dem ich ein Exemplar für das Museum für Naturkunde in Berlin mittheilte, erfuhr ich, dass Herr Professor v. Martons früher einmal bei Stuttgart eine fast gleiche Farben-Abänderung beobachtet, aber nichts darüber veröffentlicht habe.

Jeschkengebirge.

Auf einer Excursion am 26. Juni d. J. dorthin wurden folgende 16 Arten gefunden:

1. *Amalia marginata* Drap. Ruine Hammerstein, 5 Exemplare unter Steinen.
2. *Limax arborum* Bouch. Jeschkenkoppe.
3. *Vitrina pellucida* Müll. Ruine Hammerstein.
4. *Hyalina nitidula* Drap. Ruine Hammerstein.
5. *Arion empericorum* Fér. Ruine Hammerstein. Auf der Unterseite von Petasitesblättern im Christofsgrund.
6. „ *subfuscus* Fér. Jeschkenkoppe, Christofsgrund.
7. *Patula rotundata* Müll. Ruine Hammerstein.
8. *Helix umbrosa* Partsch. Ruine Hammerstein häufig. Christophsgrund 1 Exemplar. Thiere und Gehäuse von fast weisser Farbe.
9. „ *incarnata* Müll. Ruine Hammerstein.
10. „ *lapicida* L. Ruine Hammerstein.

11. *Helix arbustorum* L. Ruine Hammerstein, grosse Exemplare; ferner in Menge in ebenfalls sehr grossen und sehr dünn-schaaligen Stücken und vielen Farben-Abänderungen (einfarbig graubraun mit und ohne Band, rein hellgelb mit und ohne Band u. s. w.) im Christofsgrund an der Unterseite von Petasitesblättern.
12. „ *hortensis* Müll. 00000 und 12345 gelb, Ruine Hammerstein.
13. „ *pomatia* L. Ruine Hammerstein.
14. *Clausilia plicata* Drap. Ruine Hammerstein.
15. „ *plicatula* Drap. Ruine Hammerstein.
16. *Succinea putris* L. Christofsgrund.

Zu dem Anfang d. J. von mir auf der Landskrone aufgestellten Schaukasten, enthaltend die auf genanntem Berge vorkommenden Conchylien, bemerke ich noch nachträglich, — um etwaigen Irrthümern vorzubeugen, — dass ein paar von diesen Schnecken (wie z. B. *Vitrina diaphana*) nicht auf der Landskrone selbst, sondern in der weiteren Umgebung derselben gesammelt worden sind. Massgebend war s. Z. die Aufstellung, welche Jordan im Jahrbuch der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft VI. Jahrgang 1879 Seite 380—381 giebt.

Zum Schluss spreche ich noch den Herren E. Merkel, Dr. Peck, Dr. Reinhardt und Albert-Protz für freundliche Unterstützung, welche ich beim Studium vorstehend genannter Mollusken bei ihnen fand, meinen verbindlichsten Dank aus.


Leider erst nach erfolgtem Druck des Vorstehenden kam mir durch freundliche Vermittelung des Herrn Director Th. Reibisch-Dresden eine kleine Abhandlung zu Gesicht, in welcher auch von der Landskrone einige bereits erwähnte Arten aufgeführt werden:

Ueber das Vorkommen der Gehäuseschnecken und Muscheln in der südlichen Oberlausitz, von August Weise, Ebersbach;

in

Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden, Jahrgang 1883 pag. 102—104.

In dieser Abhandlung wird von der Landskrone (die Arbeiten von Peck, v. Möllendorf und Jordan sind dem Verfasser anscheinend nicht bekannt gewesen) *Helix rufescens* Penn. var. *montana* aufgeführt, welche jedoch nichts Anderes als *Helix umbrosa* Partsch. ist.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Wohlberedt Otto

Artikel/Article: [Nachtrag zu dem Verzeichniss der in der Preussischen Oberlausitz vorkommenden Land- und Wassermollusken von R. Peck 167-180](#)