Zur Molluskenfauna von Bulgarien.

Von Otto Wohlberedt, Triebes (Thür.).

Das Königreich Bulgarien ist trotz seiner Fortschritte auf anderen Gebieten conchyliologisch so gut wie garnicht durchforscht worden, und was wir bisher von diesem Lande in dieser Beziehung wissen, verdanken wir fast ausschliesslich Herren, die nur — in sehr bescheidenem Umfange — nebenbei auf Conchylien geachtet haben:

In letzter Zeit veröffentlichte Professor Jurinič-Sofia auf Grund eigener Beobachtungen einiges über die Nacktschnecken und die Bivalven Bulgariens; es scheint aber, als wenn er weder über genügend Vergleichsmaterial, noch über die nötige Literatur dabei verfügt hätte. Auch anatomische Untersuchungen bei den Nacktschnecken scheinen (ich bin mir dessen nicht ganz sicher, da die Arbeiten in bulgarischer Sprache erschienen sind) zu fehlen. Es wäre wohl richtiger gewesen, die Aufsammlungen vor deren Veröffentlichung einem Spezialisten zur Begutachtung zu übersenden. Auf Anfrage bei Herrn Professor Jurinič wegen weiteren Materials blieb ich, was mir auch schon von anderer Seite vorausgesagt worden war, ohne Rückäusserung.

Vor einiger Zeit sandte mir Herr E. Margais-Alais einige recht nette Sachen aus der Umgebung von Philippopel. Dies gab mir Veranlassung, mich wegen Beschaffung weiteren Materials mit Herrn Professor Bachmetjew-Sofia in Verbindung zu setzen. Professor Bachmetjew veranlasste wiederum eine Anzahl früherer Schüler, in seinem Lande nach Weichtieren zu fahnden. Der Erfolg war aber schliesslich doch nur ein sehr bescheidener; häufig vorkommende Arten wurden in Massen eingesandt, weniger häufige

fehlten fast gänzlich. Immerhin aber schien es mir in Anbetracht unserer mangelhaften Kenntnis angebracht, das Wenige zu veröffentlichen und dabei gleichzeitig alles das zu bringen, was in der Literatur bisher ziemlich zerstreut angeführt wurde.

Bei der Bestimmung der schwierigeren Arten hat mich Herr Oberstabsarzt Dr. Anton Wagner in Diamlach nicht nur in der bereitwilligsten Weise unterstützt, sondern mir auch die Diagnosen und Abbildungen der neuen Arten in liberalster Weise überlassen. Auch an dieser Stelle sei ihm mein herzlichster Dank ausgesprochen. Ebenso danke ich auch Herrn E. Margais und Herrn Professor Bachmetjew für das mir freundlichst übersandte Material.

Literatur.

1835. Frivaldszky, Imre; Köslesek a' Balkány' videken tett termés zettudományi utazásról. A' Magyar tudós társaság evkonyvei (Nachrichten der ungarischen Gelehrten Gesellschaft). Második kötet. Budán 1835. 4^o p. 235—276. Mit 3 Tafeln.

Enthält die Beschreibung von Koleopteren, Lepidopteren und Mollusken. Von Mollusken werden angeführt und mit kurzen lateinischen Diagnosen beschrieben: *Helix girva* (Taf. VII, Fig. 11), *Clausilia fritillaria* (Taf. VII, Fig. 12) und *Clausilia silacea* (Taf. VII, Fig. 13). Fundort: Berge auf dem Balkan.

1837. Frivaldszky, Dr. Emrich von Friwald. Neue Käfer, Falter und Schnecken aus den balkanischen Gebirgen. Faunus, Zeitschrift für Zoologie und vergleichende Anatomie. Herausg. von Dr. Johannes Gistel. Bd. I, Heft II, p. 84—93. München.

Mit kurzer, lateinischer Diagnose werden die bereits in der vorhergehenden Arbeit erwähnten drei Arten vom Balkan wiedergegeben.

1859. Mousson, Albert. Coquilles terrestres et fluviatiles requéillies dans l'Orient par M. le Dr. Alexandre Schläfli, déterminés par — —. Zürich 1859, p. 283. V. La Bulgarie.

Auf dem 88 Meilen langen Wege vom Prespa-See in Macedonien bis nach Varna wurden in der Umgegend folgender Orte nachstehend genannte Arten (infolge der Unsicherheit des Landes nur ganz flüchtig) gesammelt: 1. Prespa-See, 2. Palanka, etwas westlich von Küstendil, jedoch noch zu Macedonien gehörig, 3. Küstendil, 4. Izvor, 5. Loveč, 6. Sevlievo, 7. Tirnovo, 8. Šumla, 9. Festung Dzumaja:

Zonites hydatinus, *Helix lucorum*, *pomatia*, *fruticum*, *frequens*, *carthusiana*, *striata*, *ericetorum*, *obvia*, *corcyrensis*

var. *girva*, *vindobonensis*; *Bulimus detritus*; *Chondrus tridens* var. *eximius*, *microtragus*, *seductilis*; *Pupa avena*; *Clausilia plicata* var. *transsylvanica*, *cana*, *intricata*, *auriformis*; *Cyclostoma elegans*, *costulatum*; *Limnæus truncatum*, *vulgaris*.

1870. Kreglinger, Karl. Systematisches Verzeichnis der in Deutschland lebenden Binnen-Mollusken. Wiesbaden, 1870.

Führt ausser den bereits von Mousson angegebenen Arten folgende Bivalven aus Bulgarien auf, die vermutlich zuerst von Bourguignat a. a. O. (wo?) aufgezählt wurden:

Unio batavus, *pictorum*; *Anodonta anatina*, *cellensis*, *piscinalis*; *Sphaerium lacustre*; *Dreissena polymorpha*.

1870. Bourguignat, I. R. Aperçu sur la Faune malacologique du Bas Danube. Annales de Malacologie Paris, p. 1—41.

Die Angaben beziehen sich fast ausschliesslich auf Funde aus der Donau bei Braila (Rumänien), doch sollen folgende Arten im gesamten Gebiet der Donau vorkommen:

Vivipara acerosa, *subfasciata*, *danubialis*.

1874. Jickely, C. F. Verzeichnis der auf meiner Reise nach dem Rothen Meere in Europa aufgegriffenen Mollusken. Nachrichtenblatt der Deutsch. Mal. Gesellsch. 1874, p. 9. Frankfurt a. M.

Verfasser sammelte in der Umgebung von Varna *Hyalina spec.* (aff. *alliaria*); *Helix corcyrensis* var. *canalifera*, *carthusiana* var., *austriaca*, *lucorum*, *ericetorum* var. *vulgarissima* (?); *Buliminus detritus*, *tridens*; *Cyclostoma elegans*; *Clausilia socialis*.

1876. Bourguignat, I. R. Species novissimæ Molluscorum in Europæ systemati detectæ, notis diagnosticis succinctis breviter descriptæ. Lutetiae 1876. 80 pp.

Enthält zum ersten Male die Beschreibung von (p. 13) *Buliminus bulgaricus* (Umgebung von Eidos) und (p. 15) *B. tetragonostoma* (Varna).

1880. Bourguignat, I. R. Récensement des Vivipara du système européen. Paris, 1880. Impr. Tremblay.

Behandelt u. a. die Donauformen *Vivipara acerosa*, *subfasciata*, *amblya* und *danubialis*.

1881. Bourguignat, I. R. Matériaux pour servir à l'histoire des mollusques acéphales du système européen. Poissy 1880—1881. Impr. Lezay & Co.
Behandelt u. a. aus Bulgarien: *Pseudanodonta danubialis*, *penchinati*, *mecyna*, *complanata*, *pancici*, *scrupaea*, *rossmaessleri*, *ellipsiformis*; *Colletopterum praeclarum*, *eximium*.
1881. Bourguignat I. R. Catalog des Limnées d'Europe. Histoire malacologique du lac Balaton. Poissy 1881. Impr. Lezay & Co.
Enthält zum ersten Male die Beschreibung von *Limnaea acutespira*, *bulgarica*, *exigua* und *varnensis* aus Bulgarien.
1884. Westerlund, C. A., gibt in seinem Aufsätze „En garde“ im Nachrichtenblatt der Deutsch. Mal. Gesellsch. 1884, p. 91, für *Clausilia stabilis* den Fundort „Bulgarien“ an. Wahrscheinlich ist die „Bukowina“ gemeint.
1884. Bourguignat, I. R. Histoire des Méléniens du système européen. Paris 1884. Impr. Tremblay.
Enthält zum ersten Male die Beschreibung von *Melanella ovoidea* aus Bulgarien.
1884. Drouet, Henri. Unionidae de la Serbie. Supplément. Paris, 1884.
Aus Bulgarien werden angeführt: (p. 5) *Unio crassus* (Isker); (p. 15) *Anodonta wimmeri* (Lomfluss bei Lom-Palanka), *savensis* (Lomfluss).
1893. Vavra, W. Ein Beitrag zur Kenntnis der Süßwasserfauna von Bulgarien. Sitzungsberichte der Böhmisches Gesellsch. der Wissensch. Bd. XLVI. Prag, 1893, 4 pp.
Die kleine Arbeit enthält hauptsächlich Daten über kleine Crustaceen. Auf p. 3 werden angeführt; *Limnaea ovata*; *Planorbis umbilicatus*, *rotundatus* (Flussarm der Marica). Ferner auf p. 4: *Limnaea ovata*; *Planorbis umbilicatus*, *rotundatus*, *marginatus*.
1893. Locard, Arnold. Les Dreissensia du système européen d'après la collection Bourguignat. Revue suisse de Zoologie et Annales du Musée d'Histoire Naturelle de Genève. Genève, 1893, p. 113—185.

Entsprechend den Anschauungen der *École nouvelle* werden folgende „Arten“ aus Bulgarien angeführt: *Dreissensia fluviatilis*, *complanata*, *sulcata*, *eximia*, *letourneuxi*, *occidentalis*, *magnifica*, *lutetiana*.

1895. Drouet, H. *Unionidae nouveaux ou peu connus*. *Journal de Conchyliologie*. Vol. 43, Nr. 4. Paris, 1895.

Unio sardicensis aus dem Isker bei Sophia.

1897. Sturany, Dr. Rudolf. Über die von Dr. H. Rebel in Bulgarien 1896 gesammelten Gehäuseschnecken. *Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums*. Bd. XII, p. 111—118, Wien 1897.

Die Ausbeute stammte von Dr. Hans Rebel, welche derselbe zumeist in der Umgebung von Slivno im Balkan gelegentlich entomologischer Studien zusammengetragen hatte. Es sind dies folgende Arten: *Daudebardia rufa* var. *graeca*; *Patula pygmaea*; *Helix haberhaueri* (n. sp.) („Balkan bei Sophia, gesammelt s. Zt. von I. Haberhauer“), *vindobonensis* var. *balcanica*, *obvia*, *lucorum*; *Buliminus detritus* var. *tumidus*, *tridens*, *microtragus*, *seductilis*, *obscurus*; *Clausilis biplicata* var. *bosnica*, *marginata*, *laminata*, *vetusta* var. *striolata*, *rebeli* (n. sp.); *Cyclostoma elegans*.

Abgebildet sind *Clausilia rebeli*, *Helix haberhaueri* und *lucorum*.

1898. Kobelt, Dr. W. *Studien zur Zoogeographie*. Bd. II. Die Fauna der Meridionalen Sub-Region. Wiesbaden, 1898. C. W. Kreidels Verlag.

•Auf p. 31 gibt Verfasser ein Verzeichnis der aus Bulgarien durch Frivaldszky, Haberhauer, Schlaefli und Naegele bekannt gewordenen Mollusken. Frivaldszky und Schlaefli haben selbst gesammelt und darüber veröffentlicht, dagegen hat Haberhauer nur die nach ihm benannte *Arionta* an Dr. Sturany, und Naegele — mit Hilfe eines Sammlers — an Dr. Kobelt *Pomatia pomatia* und *obtusata* geliefert.

Kobelts Verzeichnis umfasst folgende Arten: *Patula pygmaea*; *Gonostoma girva*; *Carthusiana frequens*, *carthusiana*; *Eulota fruticum*; *Xerophila striata*, *vulgarissima*, *obvia*; *Campylaea trizona*; *Arionta haberhaueri*; *Tachea austriaca*; *Pomatia lucorum* var. *onyxiomiera*, *pomatia*, *obtusata*; *Zebrina detrita*, *varnensis*; *Mastus tetragonostoma*;

Napaeus obscurus; *Chondrula tridens* var. *eximia*, *microtragus*, *seductilis*; *Pupa avena*; *Clausiliastra marginata* var. *auriformis*, *laminata*; *Alinda plicata* var. *transsylvanica*, *biplicata* var. *bosnica*; *Strigillaria cana*, *vetusta* var. *striolata*; *Idyla varnensis*, *socialis*, *intricata*, *pagana* var. *bulgarica*, *rugicollis* var. *osmanica*; *Cyclostoma elegans*, *costulatum*; *Limnaea truncatula*, *berlani*, *vulgaris*; *Planorbis marginatus*; *Paludina spec.*; *Dreissena polymorpha*.

1898. Babor, Dr. I. F. Über die von Herrn Dr. H. Rebel im Jahre 1896 in Ostrumelien gesammelten Nacktschnecken. *Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums*. Bd. XIII, p. 40—44, Wien, 1898. Mit einer Tafel.

Gleichsam im Anschluss an die Arbeit von Dr. Sturany werden aufgeführt, bzw. beschrieben: *Amalia hessei*, *carinata*; *Mesolimax braunii*; *Limax conemenosi*, *flavus*.

1906. Jurinič, Professor S. Bemerkungen zu der Nacktschnecken-Fauna Bulgariens. *Travaux de la société bulgare des sciences naturelles*. Nr. 3, p. 9—13, Sophia, 1906.

Aufgeführt und nach dem Äusseren beschrieben werden: *Amalia marginata*, *gracilis*; *Agriolimax agrestis*; *Limax tenellus*, *maximus* mit var. *cinereo-niger*, var. *unicolor*, var. *cinereus*. Sämtliche Arten von verschiedenen Fundorten.

1906. Yourinitsch, St. Prof. ord. Notes sur les Bivalves d'eau douce de Bulgarie. *Annuaire de l'université de Sophia*, p. 61—67, Sophia, 1905—1906.

Aufgeführt werden: *Anodonta mutabilis* mit var. *cygnea*, var. *cellensis*, *piscinalis*; *Unio pictorum* mit var. *limosus*, *tumidus*, *batavus*; *Dreissena polymorpha*.

Sämtliche Arten von verschiedenen Fundorten. Über die Bestimmung siehe Einleitung und später.

1906. Rossmoesler, E. A. Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der Europäischen noch nicht abgebildeten Arten. Fortgesetzt von Dr. W. Kobelt. Neue Folge. Bd. XII, Wiesbaden, 1906. C. W. Kreidels Verlag.

Neu beschrieben werden zum ersten Male vom Rhodopegebirge, aus der Gegend von Philippopol: (Nr. 2034) *Campylaea thracica*, (Nr. 2035—2036), *trizona rhodopensis*;

(2040) *Helicogena thracica*, (Nr. 2043, 2044), *albescens bulgarica*, (Nr. 2045, 2046) *figulina eumolpia*.

1907. Desgleichen. Bd. XIII.

(Nr. 2113) *Helicogena despotina* (vom gleichen Fundort). Das Material gelangte durch einen Sammler an E. Margais in Alais, von dem es dann weiter an Caziot und mich und schliesslich an Professor Kobelt gesandt wurde.

1911. Nachdem die gegenwärtige Arbeit bereits zum Druck eingereicht worden war, erfuhr ich durch Zufall, dass Herr P. Hesse-Venedig auf Grund von ihm aus Bulgarien zugegangenen Materials ein Verzeichnis für das Nachrichtenblatt der Deutschen Malacozoologischen Gesellschaft zusammengestellt habe. Auf meine Bitte war Herr Hesse so ausserordentlich liebenswürdig, mir eine Abschrift des Manuskriptes zukommen zu lassen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank ausspreche. Die Sendung stammt aus der nächsten Umgebung der Stadt Philippopol und umfasst nach dem Verfasser folgende Arten:

1. *Hyalinia glabra* Stud. var. *striaria* Wstld.; 2. *Zonitoides nitudus* Müll.; 3. *Crystallus opinatus* Clessin; 4. *Eulota fruticum* Müll.; 5. *Helicella variabilis* Drap. (?); 6. *Helicella vulgarissima* (Schläfli) Mss.; 7. *H. striata* Müll. (?); 8. *Theba carthusiana* Müll.; 9. *Th. frequens* Mss.; 10. *Hygromia* (*Trichia*) *rubiginosa* var. *epirotica* Mss.; 11. *H.* (*Euomphalia*) *strigella* Drap. var. *mehadiae* Bgt.; 12. *Helicodonta coreyrensis* Partsch; 13. *Helicigona trizona* var. *rumelica* (Zgl.) Rossm.; 14. *Tachea vindobonensis* Fér.; 15. *Helix* (*Cryptomphalus*) *aspersa* Müll.; 16. *H.* (*Helicogena*) *lucorum* L.; 17. *H.* (*Helicogena*) *speideli* Bttg.; 18. *Buliminus detritus* Müll.; 19. *B. olympicus* Kob. var. *tantalus* Pfr.; 20. *B. obscurus* Müll.; 21. *Chondrula microtagus* (Parr.) Rssm.; 22. *Clausilia* (*Clausiliastra*) *marginata* Rssm. var. *auriformis* Mss.; 23. *Cl.* (*Alinda*) *plicata* Drap. var. *macilenta* Rssm.; 24. *Cl.* (*Alinda*) *biplicata* Mont. var. *bosnica* Kim.; 25. *Cl.* (*Idyla*) *pagana* Rssm. var. *osmanica* (Friv.) Wstld.; 26. *Cl.* (*Strigillaria*) *varnensis* Pfr. mit var. *socialis* (Friv.) Pfr.; 27. *Cl.* (*Strigillaria*) *thessalonica* (Friv.) Rssm. mit var. *spretata* (Friv.) Küster; 28. *Succinea pfeifferi* Rssm.; 29. *Limnaea* (*Lymnus*) *stagnalis* L. var. *ampliata* Cless.; 30. *L.* (*Gulnaria*) *auricularia* L. mit var. *ampla* Hartm.; 31. *L.* (*Limnophysa*) *palustris* Müll.; 32. *L.* (*Fossaria*) *truncatula* Müll.; 33. *Planorbis* (*Spirodiscus*) *corneus* L.;

34. Pl. (*Tropidiscus*) *umbilicatus* Müll.; 35. Pl. (*Diplodiscus*) *vortex* L.; 36. *Ericia costulata* (Zgl.) Rasm.; 37. *E. elegans* Müll.; 38. *Vivipara acerosa* Bgt.; 39. *Valvata piscinalis* Müll.; 40. *Pisidium fontinale* C. Pfr.; 41. *Unio gentilis* n. sp. Haas.; 42. *Anodonta piscinalis* (= *maritzana* Bgt.).

Sämtliche Arten haben wohl dem inzwischen verstorbenen Professor Dr. Oscar Boettger, die letzten beiden Bivalven Herrn L. Haas-Frankfurt vorgelegen.

Die Arbeit soll unter dem Titel: „Zur Kenntnis der Molluskenfauna von Ostrumelien“ erscheinen und ist in der gegenwärtigen Arbeit auch entsprechend vermerkt.

Gesammelt wurde das Material von Herrn Professor Boris in Philippopol.

Verzeichnis der bisher aus Bulgarien bekannt gewordenen Mollusken.

(Unter Zugrundelegung von Kobelts „System der palaearktischen Binnenconchylien“, Iconographie N. F., Bd. XI, p. 129 und ff.).

A. Malacozoa Cephalophora.

Pulmonata.

I. Stylommatophora.

Familia Testacellidae.

Genus Daudebardia Hartm.

D. rufa Drap.

Hist. nat. d. Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 118, Taf. VIII, Fig. 26—29. *Helix rufa*.

Rossm. Iconogr., Fig. 39. *Helicophanta rufa* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 5. *Daud. rufa* Drap.

var. graeca A. J. Wagn.

Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wiss. Math. Naturw. Classe, Wien 1895, Bd. LXII, p. 613, Taf. II, Fig. 15, Taf. III, Fig. 19a—b.

D. rufa var. *graeca*.

Allgemeines Vorkommen*): Südeuböa.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XII, p. 112.

D. rufa var. *graeca* A. J. Wagner.

Von Dr. Rebel bei Kušbunar**) im Gebiete des Gök-Dagh im Balkan gesiebt. (det. Dr. A. J. Wagner).

Nach A. J. Wagner leben im Balkan vermutlich auch Vertreter der Sektionen *Libania Bourgt.* und *Carpathica Wagner* (Ann. k. k. Hofm. p. 112).

*) Zumeist nach Westerlund.

**) Sprich š = sch, č = tsch, ć = tz.

Familia Vitrinidae.**Genus Vitrina Drap.****V. rhodopensis nov. spec.** (Taf. 2, Fig. 1 a, b, c).

Vier Exemplare, leider sämtlich unausgewachsen, von Stanimaka bei Philippopel.

„Die Art ist eine neue Form aus der Reihe der *Vitrina reitteri* Boettg., auch der *Vitrina major* Pfr. und *Vitr. bielzi* Kimak. nahestehend. Sie unterscheidet sich von allen diesen Formen durch das höhere, breit kegelförmige erhobene Gewinde und im Anfang langsamer zunehmende Umgänge; der letzte dürfte rasch zunehmen und das Gehäuse dann wesentlich von Jugendformen verschieden erscheinen“. (Dr. A. J. Wagner.)

$$D = 5,4, d = 4, H = 3,2 \text{ mm.}$$

Familia Zonitidae.**Genus Hyalinia Ag.****H. spec.** (aff. *alliaria* Miller).

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges. Frankfurt, p. 9. H. aff. *alliaria*.

Jickely sammelte diese *Hyalinia* in der Nähe von Varna. Sie ist gegenüber *alliaria* (die auf dem Balkan nicht vorkommt) noch etwas enger genabelt, besitzt eine etwas convexere Basis und ein mehr gewölbteres Gewinde.

H. glabra (Stud.) Fér.

Prodr. général pour tous les mollusq. terr. et fluv. 1822, Nr. 215.
Helix glabra Stud.

var. hungarica Westerl.

Jahrbuch der Deutsch. Mal. Ges. 1883.

Allgemeines Vorkommen: Ungarn.

Zwei hierher gehörige Exemplare vom Abhang des Rhodopegebirges gegen Philippopel, die sich durch ausserordentlichen Glanz auszeichnen.

var. striaria Westerl.

K. Vet. Ak. Förh. 1881.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 51. *H. glabra*
v. *striaria* West.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen, Polen, Galizien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
H. glabra Stud. var. *striaria* Wstld.

In der Umgebung von Philippopel. (Hesse, det. Boettger).

D = 10,5–11, H = 5,5–6 mm.

Genus Zonitoides Lehmann.**Z. nitidus Müll.**

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 32. *Helix nitida*
Rossm. Iconogr., Fig. 25. *Helix lucida* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 39. *Hyalina*
nitida Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Asien, Algier.

Ein Exemplar von Philippopel, mit deutschen Stücken übereinstimmend. (Hesse).

H. camelina Bourg.

Testacea novissima quae Cl. de Saucy in itinere per orientem
1850–1851 coll. 1852, p. 14. *H. camelina*.

var. frondosula Mouss.

Coquilles terr. et fluv. rec. par Schläfli 1863, p. 4. *Zonites*
frondosulus.

Westerlund und Blanc, Aperçu sur la Faune Malac. de la
Grèce 1879, p. 23, Taf. I, Fig. 4. *Hyalinia frondosula* Mousson.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 46. *H. cam.*
var. *frondosula* Mousson.

Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 34. *H. frondosula* Mousson.

Allgemeines Vorkommen: Konstantinopel, Euböa.

Abhang des Rhodopegebirges gegen Philippopel, anscheinend
ziemlich häufig.

D 9, H = 4–4½ mm.

Genus Crystallus Lowe.**C. sturanyi A. J. Wagn.**

Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges. 1907, p. 106. *Cr. sturanyi*.
Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 2200. *Cr. sturanyi* A. Wagner.

Allgemeines Vorkommen: Bosnien, Montenegro.

Ein Exemplar von Philippopel mit $5\frac{1}{4}$ Umgängen, also nicht vollkommen ausgewachsen, da die Art gewöhnlich 6 Umgänge aufweist; entspricht sonst gut den Exemplaren aus Bosnien von den Originalfundorten: Krupaquelle bei Pazarič, Trebovič & Bjelasnica und Njegos in Montenegro. (Dr. Wagner).

D = 3,5, d = 3,1, H = 1,7 mm, Philippopel.

D = 4,3, d = 4, H = 2 mm, Bosnien.

C. hydatinus Rossm.

Iconographie Fig. 529. *Helix hydatina*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 37. *H. hydatina* Rm.

Allgemeines Vorkommen: Balkan, Kleinasien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 285.

Zonites hydatinus Rossm.

Palanka, westl. von Küstendil, in Mazedonien (leg. Schläfli). Wohl auch in Bulgarien vorkommend.

C. opinatus Cless.

Molluskenfauna Österr.-Ungarns und der Schweiz 1887, p. 89, Fig. 29. *Vitrea opinata* Ulicny (man.).

Wagner, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges. 1907, p. 108.

C. opinatus Clessin.

Allgemeines Vorkommen: Mähren, Nieder-Österreich, Steiermark, Galizien, Siebenbürgen, N.-Ungarn. (Nach A. J. Wagner).

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Cr. opinatus Clessin.

In der Umgebung von Philippopel.

D = 5,5 mm bei $4\frac{1}{2}$ Umgängen. (Hesse.)

Familia Limacidae.

Die Angaben über nachstehende Nacktschnecken finden sich zumeist bei Professor S. Jurinič (der sein Material selbst gesammelt hat) in „Bemerkungen zu der Nacktschnecken-Fauna Bulgariens“, *Travaux de la Société Bulgare des Sciences Naturelles* Sofia 1906 à l'occasion de la dixième anniversaire de la Société, p. 9—13. Als Bestimmungswerke dienten die beiden Exkursions-Mollusken-Faunen von Clessin, die Molluskenfauna der Hohen Tatra von Hazay und Al. Granger, *Histoire naturelle de la France*. Anscheinend sind die Tiere nur nach der äusseren Beschaffenheit be-

stimmt. Auf direkte Anfrage bei Professor Jurinič blieb ich ohne Antwort. Ich wandte mich deshalb an Professor Simroth, der die Liebenswürdigkeit hatte, mir folgendes darauf zu erwidern (8. November 1908):

„In der Liste ist mir einiges zweifelhaft, z. B. *Limax tenellus* und *L. maximus* in seinen verschiedenen Formen, unter denen ich den *transsylvanicus* vermisste. Ebenso wenig lässt sich über die *Amalien* bestimmteres aussagen. Doch die gehören, ohne grosses Material und viele anatomische Feinarbeit, zum schwersten Kapitel, das mindestens Zeit erfordert. Vorläufig fehlt mir jeder Anhalt dafür, was die *transsylvanischen Alpen* für eine Grenze bilden und ob sie eine sind. *Amalia gracilis* reicht bis jetzt vom Rhein bis *Siebenbürgen*, *Arion subfuscus* geht eben so weit. Ihre neuen Funde aus dem *NO Montenegros* zeigten mir, was bisher unbekannt, dass mehrere *Arion*-Arten hier noch vordringen, die *Albanien*, *Thessalien* und *Griechenland* zu meiden scheinen. Da ist *Bulgarien* entschieden ein lohnendes Gebiet. Aber wir müssten wohl ziemliches Material haben — — —“.

Genus *Limax* Müll.

L. tenellus Nilsson (?).

Hist. moll. Suec. 1822, p. 10. *Limax tenellus*.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Nord-Europa, wenig nach *Russland* hinein, bis *Siebenbürgen*, *Südalpen*; angeblich bis *Nordafrika* *).

1906, Jurinič, p. 11. *Limax tenellus* Nilsson.

Ein Exemplar beim Dorfe *Kostenez* (Juli 1904) im *Rhodopegebirge*. (Jurinič.)

Das Vorkommen dieser Art ist nicht unwahrscheinlich, da dieselbe auch durch *Montandon* (det. *Sturany*), von *Mangalia* in der *Dobrudja* nachgewiesen wurde.

L. maximus L. (?).

Syst. nat. X, 1758, p. 172. *L. maximus*.

Allgemeines Vorkommen: (siehe die Varietäten).

1906, Jurinič, p. 11—12. *Limax maximus* Linné.

*) Die Angaben über die Verbreitung der Nacktschnecken verdanke ich Herrn Professor Dr. H. Simroth, dem ich für die Ausführlichkeit sehr verbunden bin.

1 Exemplar 7,5 cm lang in Čepino auf der Elenanspitze (Juli 1901), 5 Exemplare 2,3–2,5 cm lang vom selben Fundort, 1 Exemplar 7 cm lang vom Dorfe Kostenez im Rhodopegebirge (Juli 1904), 6 Exemplare 5–8,5 cm vom Rhodopegebirge bei Čepelare (Juli 1901), 2 Exemplare 4 cm lang von Varna (Juni 1902), 1 Exemplar 7 cm lang vom Rhodopegebirge beim Dorfe Gestrimeo, 1 Exemplar 6,5 cm lang am Fusse Osogow beim Dorfe Bogoslaw im Bezirke Küstendil (April 1898), 1 Exemplar 5 cm lang von Gabrowo (August 1898), 1 Exemplar 6 cm lang vom Balkan beim Dorfe Gwože. (Jurinič.)

Ferner werden folgende 3 Varietäten von Jurinič angeführt:

L. maximus var. *cinereo-niger* Wolf (?).

Sturms Fauna 1882, VI. Band, I. Heft, Taf. 3.

Allgemeines Vorkommen: Südalpen bis zum Polarkreis in Norwegen, östlich bis Mittelrussland soweit der Wald geht, westlich bis zu den Pyrenäen.

1906, Jurinič, p. 12. *L. m.* var. *cinereo-niger* Wolf.

2 Exemplare 5 cm lang vom Rhodopegebirge beim Dorfe Čepelare und eins 7,5 cm lang von der Elenanspitze bei Čepino. (Jurinič.)

L. maximus var. *unicolor*. Heynem (?).

Mal. Blätter, Bd. IV, 1862, p. 5, Taf. X. *Limax unicolor*.

Allgemeines Vorkommen: Bekannt zuerst nur aus dem Garten der Senckenbergischen Akademie in Frankfurt, dann vereinzelt auf unseren Mittelgebirgen, ferner besonders in allerlei weiteren Umfärbungen in den Südalpen; dazu z. B. als *L. nubigenus* Bourgt. in den Pyrenäen.

1906, Jurinič, p. 12. *L. m.* var. *unicolor* Heynemann.

Ein Exemplar vom Rhodopegebirge bei Čepelare (8,5 cm) und aus Kostenez (7 cm lang). Ein Exemplar zwischen var. *unicolor* und var. *cinereus* aus dem Rhodopegebirge beim Dorfe Gestrimeo. (Jurinič.)

L. maximus var. *cinereus* Lister (?).

Hist. anim. angl. 1678, Taf. 2, Fig. 16. *Limax cinereus*.

Allgemeines Vorkommen: Ähnlich *cinereo-niger*, aber Wärme bedürftiger; nördlich der Alpen fast lediglich als Keller- oder Speicher-Schnecke, jenseits im Freien unter mancherlei Umfärbungen

bis Sizilien, Kanaren, Azoren; verschleppt nach Nord-Amerika, Süd-Amerika, Neuseeland.

1906, Jurinič, p. 12. L. m. var. cinereus Lister.

Am Fusse des Berges Osogow bei Küstendil, im Balkan beim Dorfe Gwože, in der Nähe von Sofia, in Gabrowo und in Varna. (Jurinič.) Nach Montandon kommt L. maximus mit seinen Varietäten cinereo-niger, transsylvanicus (?), alba, cinereus und unicolor angeblich auch in Rumänien vor. (det. P. Godet).

L. (Eulimax) conemenosi Boettg.

Jahrbuch der Deutsch. Mal. Ges. 1885. Lit. nach Babor: Limax (Heynemannia) Conemenosi Simr. Abh. Senckenb. Ges. 1891. Limax ocellatus M. C. non. Poll. Wiener Hofm. in sched. (Griechenland).

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 41. Limax (Eulimax) conemenosi Boettg.

In einem Exemplar von Dr. Rebel bei Slivno im Balkan gesammelt.

L. (Eulimax) variegatus Drap. (= flavus L.).

Tabl. des Mollusques de la France 1801, p. 103.

Allgemeines Vorkommen: Durch Süd-Europa (jenseits der Alpen) von den Azoren bis Transkaukasien freilebend; im Kaukasus in den schwarzen L. ecarinatus Boettg. übergehend. Bei uns nur als Kellerschnecke; als solche verbreitet über die meisten wärmeren Länder der Erde, bis Neu-Seeland, Tasmanien usw.

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 42 bis 43. Limax (Eulimax) flavus L., Taf. II, Fig. 2—6.

Zahlreich von Dr. Rebel in Kellern von Slivno (hierselbst auch in einem Stück von Haberhauer), sowie in einem Exemplar auf dem Blauen Felsen (Gök Dagh) bei Slivno in einer Höhe von 1300 m gesammelt. Über die beiden letzteren Stücke schreibt Dr. Babor:

„Was nun das erstere anbelangt, so will ich mich darüber kurz fassen. Ursprünglich habe ich dasselbe für eine neue Art von irgend einer Sektion der kleinen Limaces gehalten, erst die nähere Untersuchung hat mich belehrt, dass es sich um ein junges Tier von flavus (= variegatus) handelt; es ist klein (2 cm lang), schlank, hinten zugespitzt, licht aschgrau mit weissen Flanken, etwas gedunkeltem, ziemlich undeutlich marmoriertem Schild und sehr eigentümlicher Ausfärbung des Rückens: man findet nicht die

gewöhnliche mosaikartige Felderung, sondern ein Netz von dunkelbraunen, aus Pigmentkörnern zusammengesetzten Strichen, und zwischen diesen Strichen, also in den Augen des Netzes, befinden sich milchweisse Tüpfel (s. die Taf. II, Fig. 2 und 4), die etwa einigen Runzeln gleichkommen; also im Ganzen eine Retikulation, die einigermassen an die Ackerschnecken erinnert; die Seitenfelder der Sohle sind schwach, aber doch deutlich schwarz pigmentiert (nicht wie mit Zimmt bestreut, also von ihrem gewöhnlichen Aussehen abweichend), (s. die Taf. II, Fig. 3). Das zweite erwachsene Stück (etwas über 8 cm lang) hat die gewöhnliche mosaikartige Anordnung des dunkeln und lichten Pigments (wobei bekanntlich die einzelnen Augen den Steinchen eines Mosaiks entsprechen), auch der Schild bringt eine ähnliche Würfelung; das Merkwürdige aber liegt in dunkelschwarzen, punktartigen oder länglichen schwarzen Flecken, welche zu beiden Seiten in zwei übereinander liegenden Längsreihen geordnet (— — —). Kurzum man hat vollständig den Eindruck, als ob man einen typischen variegatus vor sich hätte, der zu einem üblichen Kolorit noch die bekannte Auflösung der dunklen Binden in Flecken von einem gewöhnlichsten maximus var. cinereo-niger erhalten hätte. — — —“.

Genus *Mesolimax* Poll.

M. braunii Poll.

Bollet. Mus. Zool. Anat. comp. Torino 1887. *Mesolimax Braunii* Pollonera.

Allgemeines Vorkommen: Kleinasien bis Ostrumelien.

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 41.

Mesolimax braunii Poll.

Von Dr. Rebel in einem Exemplar am Blauen Felsen bei Slivno (1300 m) gesammelt.

Genus *Agriolimax* Mörch.

A. agrestis L. (?).

Syst. nat. ed. XI 1858, p. 652.

Allgemeines Vorkommen: Über den grössten Teil der Erde, mit Ausnahme der Tropen; schwer zu unterscheiden, wo er in den *A. laevis* übergeht oder mit anderen verwandten Arten verwechselt wurde, Kümmerform an der Eismeerküste Grönlands und Islands mehr normal. In Nordamerika wohl durch *A. laevis* vertreten, den die Amerikaner als *campestris* abtrennen. Die Schnecke geht

manchmal kümmernd, quer durch Asien durch bis Japan und Hawaii; auch bis zur Gobi. Dazu etwa Neu-Seeland, Tasmanien, Kapland, Kerguelen, Feuerland, Chile; in der Literatur schwer auf richtige Bestimmung zu prüfen.

1906, Jurinič, p. 11. *Agriolimax agrestis* Linné.

Jurinič fand ein paar Stücke in Čepino (Elenanspitze) und bei Čepelare, beides Orte im Rhodopegebirge.

Der Färbung nach sollen sie dem *Limax maximus* var. *cinereus* sehr ähnlich sein.

Nächste bekannte Vorkommen in Serbien und Montenegro (det. Simroth) und Rumänien (det. Sturany).

Genus *Amalia* M.-Td.

A. marginata Drap. (?).

Hist. nat. d. Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 124, Taf. 9, Fig. 7. *Limax marginatus*.

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa bis nahe an die Nordsee heran. Bei uns in Sachsen und Thüringen schon ziemlich vereinzelt. Mittelmeerländer.

1906, Jurinič, p. 10. *A. marginata* Drap.

Drei Exemplare vom Rhodopegebirge bei Čepelare, zwei Exemplare (juv.) am Fusse der Zarewspitze beim Rilakloster (August 1901) und ein Exemplar bei Chaskowo (Mai 1899). (Nach Jurinič.)

A. gracilis Leydig (?).

Hautdecke der Gastropoden 1876, p. 68, Taf. 12, Fig. 22. *Limax gracilis*.

Allgemeines Vorkommen: Süddeutschland (von der Rhön an) bis Siebenbürgen, Ober-Italien.

1906, Jurinič, *A. gracilis* Leydig.

Mehrere Exemplare am Fusse der Zarewspitze am Rilo. (Nach Jurinič.)

A. hessei Boettg.

Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges. 1882, p. 96. *Amalia Hessei*.

Allgemeines Vorkommen: Korfu, Ost-Rumelien, vielleicht identisch mit *A. carinata* (s. d.).

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 40.
A. hessei Boettg.

Von Dr. Rebel bei Slivno in 3 Exemplaren gefunden.

A. carinata Leach.

Abhandl. Senckenberg. Ges. 1891, Bd. XVI. *Amalia carinata*.

Allgemeines Vorkommen: Mittelmeergebiet, westlich durch Frankreich bis England.

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 40.

A. carinata Leach.

Von Dr. Rebel in einem Stück am „Blauen Felsen“ bei Slivno in zirka 1300 m Höhe gesammelt.

A. spec.

1898, Babor, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XIII, p. 41.

A. spec.

Das von Dr. Rebel bei Slivno gefundene Exemplar stellt eine Zwischenform von *marginata* und *carinata* dar und erinnert an eine s. Zt. von Dr. Sturany bei Athen gesammelte *Amalia*. (Simroth Annal. k. k. Naturhist. Hofm. IX, 1894.) Das Exemplar war leider noch nicht geschlechtsreif. (Nach Babor.)

Familia Polyplacognatha.

Genus Punctum Morse.

P. pygmaeum Drap.

Hist. nat. d. Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 114, Taf. VIII, Fig. 8—10. *Helix pygmaea*.

Rossm. Iconogr., p. 532. *H. pygmaea* Drap., N. F., p. 1430. *Patula (Punctum) pygmaea* Draparnaud.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 8. *H. pygmaea* Drap.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kaukasien, Westasien.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., Bd. XII, 1897, p. 112. *Patula pygmaea* Drap.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Patula pygmaea* Drap.

Dr. Rebel siebte einige Stücke bei Kušbunar im Gök Dagh (1300 m).

Familia Eulotidae.

Genus Eulota Hartm.

Eul. fruticum Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 71. Helix fruticum. Rossm. Iconogr., Fig. 8 und 1194. Helix fruticum Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 152. Helix fruticum Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kaukasien, Liburnien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli. Helix fruticum Lim.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. Eulota fruticum Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Eul. fruticum Müll.

Ich erhielt diese Art vom Paganowskikloster unweit Caribrod (serb. Grenze). Nach Kobelt in der Umgebung von Sofia und durch Schläfli vom Küstendil. Bei Philippopol. (Hesse).

Familia Helicidae.

Subfamilia Valloniinae.

Genus Vallonia Risso.

V. pulchella Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 30. Helix pulchella. Rossm. Iconogr., Fig. 440. H. pulchella Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 15. H. pulchella Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Asien, Nordafrika.

Einige Exemplare von Sofia durch Professor Bachmetjew.

Subfamilia Helicodontinae.

Genus Helicodonta (Fér.) Risso.

H. corcyrensis Partsch.

Desh. ap. Férussac, Hist. moll. 1839, Nr. 75, Taf. 16, Fig. 23—24. Helix corcyrensis Partsch.

Allgemeines Vorkommen: Balkan.

var. canalifera Ant.

H. E. Anton, Verz. der Conch., welche sich in der Sammlung von H. E. Anton befinden. Halle 1839.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 20. *Helix corcyrensis* var. *canalifera*.

Allgemeines Vorkommen: Balkan.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges., p. 9. *H. corcyrensis* Partsch var. *canalifera* Ant.

Durch Margais aus der Umgebung von Philippopel. Nach Jickely in der Umgebung von Varna.

var. girva Friv.

A. Magyar tud. tars. evkönyvei 1835, p. 274, Taf. VII, Fig. 11. *H. girva*.

Rossm. Iconogr. Fig. 538. *H. contorta* Ziegl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 20. *H. corcyrensis* var. *girva* Friv. ap. Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Balkan.

1837, Frivaldszky, Faunus, p. 93. *Helix girva*.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 287. *H. corcyrensis* var. *girva* Friv.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Gonostoma girva* Friv.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens *Helicodonta corcyrensis* Partsch mit var. *girva* (Friv.). Rossm.

Nach Frivaldszky in den Bergen des Balkan. Nach Mousson bei Küstendil und Izvor (dem typ sich nähernd), Tirново, Džumaja und Šumla (hier die echte *girva*). In der Umgebung von Philippopel zusammen mit dem typ. (Hesse.)

Subfamilia Fruticicolinae.**Genus Fruticicola Held.****Subgenus Fruticicola s. str. (Trichia Held).**

Fr. rubiginosa (Zgl.) A. S.

Zeitschr. für Naturw. 1853, I, p. 3. *Helix rubiginosa* Zgl.

var. epirotica Mouss.

Coquilles terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 269. *H. sericea* var. *epirotica*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 59. *H. rubiginosa* var. *epirotica* Mss.

Allgemeines Vorkommen: Janina.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Hygromia* (*Trichia*) *rubiginosa* var. *epirotica* Mss.

Hesse erhielt einige Stücke aus der Umgebung von Philippopol. (det. Boettger.)

Genus *Fruticicola* Held.

Subgenus *Euomphalia* West.

Eu. strigella Drap.

Tabl. des Mollusq. de la France 1801, p. 81. *H. strigella*.

Rossm. Iconogr., Fig. 9. *H. strigella* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 92. *H. strigella* Drap.

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa, Bosnien, Serbien, Rumänien.

Ein Stück von Philippopol, das gut der grossen Form aus Siebenbürgen entspricht.

var. mehadiae Bourgt.

Servain, Hist. mal. Balaton 1831. *H. Mehadiae* Bgt.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 94. *H. strigella* var. *mehadiae* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen, Rumänien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Hygromia* (*Euomphalia*) *strigella* Drap. var. *mehadiae* Bgt.

Zu dieser von Hesse aus der Umgebung von Philippopol angeführten Varietät gehört wohl auch das Stück, welches ich unter dem Typ aufführe.

Subfamilia *Campylaeinae*.

Genus *Campylaea* Beck.

Subgenus *Cingulifera* Held.

C. trizona (Ziegl.) Rossm.

Iconogr., Fig. 87. *Helix trizona* Ziegl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 136. *H. trizona* (Zgl.) Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Balkanhalbinsel.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Camp. trizona* Zgl. (Welche Varietät?)

Durch Professor Bachmetjew drei junge Stücke von Caribrod an der serbischen Grenze, deren genauere Bestimmung (welche Varietät?) nicht möglich ist.

var. balcanica Friv.

Rossm. Iconogr., Fig. 999, 1000. *H. trizona* var. *balcanica* Friv.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 137. *H. trizona* var. *balcanica* Friv.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. Binnenmoll. Deutschlands, p. 109. *H. umbilicaris* Brumati.

Nach Kreglinger von Frivaldszky in Bulgarien gesammelt.

var. rhodopensis Kobelt.

Iconogr., N. F., Fig. 2035, 2036. *Camp. trizona rhodopensis*.

Allgemeines Vorkommen: Ostrumelien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Helicogena trizona* var. *rumelica* (Zgl.) Rossm.

In der Umgebung von Philippopel.

var. thracica Kobelt.

Iconogr., N. F., Fig. 2034. *Camp. thracica*.

Ich erhielt mehrere Stücke vom gleichen Fundort wie von der vorigen Varietät und bin der Ansicht, dass *thracica* nur eine, allerdings anscheinend häufig vorkommende, alpine Abänderung von *rhodopensis* ist. Bis auf die Färbung stimmen die Exemplare vollständig überein. *Thracica* erinnert an die siebenbürgische *trizona* var. *frauenfeldi*, nur ist erstere wesentlich kleiner.

Subgenus *Dinarica* Bourg.

D. pouzolzi Desh.

Encycl. méthod. Vers. II 1830, p. 233. *Helix Pouzolzi*.

subspec. serbica. (Mölldff.) Kobelt.

Mal. Blätter, Bd. XIX, p. 132. *Helix serbica*.

Rossm. Iconogr., Fig. 982. *Helix serbica* Möll., N. F., Fig. 1714, 1715. *Campylaea* (*Dinarica*) *serbica* Kob., Fig. 1716. *Camp.* (*Dinarica*) *serbica* Kob. var.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 116. *Helix serbica* (Möll.) Kob.

Allgemeines Vorkommen: Serbien, Montenegro, Novipazar.

Ein verwittertes, ausgebleichenes Exemplar ohne Epidermis von Pančarevo bei Sofia.

Das Exemplar ist etwas niedriger als die typische *serbica* aus Südserbien, besitzt mehr abgerundetes Gewinde, und entsprechend der niederen Form, gedrückte, weniger kugliche Gestalt und einen weiteren Nabel. Der Mangel an Spirallinien mag auf dem Mangel an Epidermis beruhen.

$D = 30, d = 25, H = 18$ mm.

Vergl. meine Arbeit über Montenegro und Albanien (Wiss. Mitteil. aus Bosnien und Herz., Wien, 1903, p. 61–62).

Genus *Arianta* Leach.

A. haberhaueri Sturany.

Annal. k. k. Naturhist. Hofm. 1897, p. 112, Taf. III, Fig. 6–8. *Helix haberhaueri*.

Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 1473. *Helix* (*Arianta*) *haberhaueri* Sturany.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Arianta haberhaueri* Sturany.

Von J. Haberhauer s. Zt. gesammelt und nach einer Etikette im Hofmuseum in Wien im „Balkan bei Sofia“ gefunden. Dr. Sturany möchte diese Art zwischen *olympica* Roth und *serbica* Mölldff. stellen, während sie Kobelt, wie hier geschehen, zu *Arianta* zieht.

Subfamilia *Helicinae*.

Genus *Helix* s. str. = *Helicogena* Fér.

Subgenus *Cryptomphalus* M. T.

H. aspersa Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 59. *Helix aspersa*.

Rossm. Iconogr., Fig. 3, 294. *H. aspersa* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 450. *H. aspersa* Müll.

Allgemeines Vorkommen: An den Meeresküsten Europas.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

H. (Cryptomphalus) aspersa Müll.

In der Umgebung von Varna. Nach Hesse in einem Stück bei Philippopel (Grösse 27 : 25 mm).

H. frivaldszkyi Kobelt.

Martini-Chemnitz, Heliceen, Abt. VI, 1906, p. 146. H. (Helicogena) frivaldszkyi.

Iconogr., N. F., Fig. 1928. H. (Helicogena) frivaldszkyi.

var. bulgarica Kobelt.

Iconogr., N. F., Fig. 2043, 2044. Helix (Helicogena) albescens bulgarica Kobelt.

Allgemeines Vorkommen: Ostrumelien.

Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. P. obtusata.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Helix (Helicogena) speideli Boettg.

An den Abhängen des Rhodopegebirges gegen Philippopel, woher sie sowohl Hesse als auch ich erhielt.

Kobelt rechnet die Varietät zu der russisch-kaukasischen vulgaris-albescens, zu der sie auch wegen des grossen Apex sowohl als auch sonst testaceologisch sehr gut hinzugehören scheint. Durch die anatomische Untersuchung stellte Hesse jedoch fest, dass sie mit der russischen Art nichts zu tun hat, sondern zu der engeren Gruppe der Helix secernenda gehört. Ich kann meinerseits bestätigen, dass die Varietät mit den kleinen Formen von secernenda ganz leidlich übereinstimmt, am besten mit der Helix secernenda var. subobtusata Kobelt aus Montenegro, die ebenfalls sich durch den grossen Apex und durch eine der vulgaris ähnliche rotbraune Bänderung auszeichnet.

Subobtusata gehört aber bestimmt zu secernenda und schliesst sich an die var. montenegrina an.

Unter den mir von P. Hesse zur Ansicht freundlichst übersandten Exemplaren der var. bulgarica, die er aus Philippopel erhielt, befindet sich ein Stück, das mit H. vulgaris Rossm. aus dem West-Kaukasus fast genau übereinstimmt. Nur die anatomische Untersuchung allein ergab die Zugehörigkeit zu secernenda. Oder sollten etwa in Südrussland unter der Bezeichnung vulgaris verschiedene Formen vorkommen? Letzteres erscheint mir nach dem anatomischen Befunde von Hesse nicht unwahrscheinlich.

Zur vorstehenden Art gehört auch H. speideli Boettg. von der Insel Tharos, zu welcher Hesse seine Exemplare aus Philippopel zieht.

Auch die Art selbst — frivaldszkyi — zeichnet sich nach Kobelt durch grossen Apex aus und besitzt eine bräunlich über-

laufene Spindel. Ihr Vorkommen ist nicht ganz sicher, erstreckt sich aber wahrscheinlich über Mazedonien und Rumelien. *H. speideli* würde ich als leidlich gut charakterisierte Varietät hinstellen.

H. figulina (Parr.) Rossm.

Iconogr., Fig. 580. *Helix figulina* Parreyss.

Allgemeines Vorkommen: Griechenland, Türkei, Rhodos, Cypern, Syrien.

var. eumolpia Kobelt.

Iconogr., N. F., Fig. 2045, 2046. *H. (Helicogena) figulina*
var. *eumolpia*.

An den Abhängen des Rhodopegebirges gegen Philippopol.

Den Exemplaren ist zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit jugendlichen *frivaldszkyi* var. *bulgarica* nicht abzusprechen, doch unterscheiden sie sich von dieser durch den viel kleineren Apex.

var. despotina Kobelt.

Iconogr., N. F., Fig. 2113. *Helix (Helicogena) despotina*.

Allgemeines Vorkommen: Ostrumelien.

An den Abhängen des Rhodopegebirges gegen Philippopol.

Die Form fehlt im Augenblick in meiner Sammlung, ich glaube aber, dass sie ebenfalls zu *figulina* gehört, da sicherlich zwei so verwandte Formen nicht als Arten an einem Fundort zusammen vorkommen.

Trotz der Unterschiede halte ich es jedoch nicht für ausgeschlossen, dass die beiden Varietäten, vielleicht nur die letztere, zu *frivaldszkyi* gehören. Nur eine anatomische Untersuchung kann hier Gewissheit verschaffen.

H. lucorum Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II, 1774, p. 46. *Helix lucorum*.

var. castanea Olivier.

Voyag. empire ottoman vol. I, p. 224, Taf. 17, Fig. 1. *Helix castanea*.

Rossm. Iconogr., Fig. 291. *H. lucorum* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 470. *H. lucorum*

var. *castanea* Oliv.

Martini-Chemnitz, Heliceen (*Helicogena*) Nr. 177, Taf. 356, Fig. 3—7. *Helicogena castanea* Olivier mit (p. 219) var. *bulgarica*.

Allgemeines Vorkommen: Türkei, Bulgarien.

1859, Mousson, Coquilles terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 285. *Helix lucorum* Lin.

1874, Jickely, Nachrichtenblatt d. Deutsch. Mal. Ges., p. 10. H. (Pomatia) *lucorum* Müll.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 114. H. (Pomatia) *lucorum* L. (Taf. III, Fig. 9—12).

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Pomatia lucorum* Müll. mit var. *onyxiomicra* Bgt.

1906, Martini-Chemnitz (s. oben), p. 218. H. (*Helicogena*) *castanea* Oliv. mit var. *bulgarica* Kobelt.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. H. (*Helicogena*) *lucorum* L.

In Bulgarien verbreitet: Küstendil (Schläfli). Im Balkan bei Slivno (leg. Dr. Rebel), bei Sofia (Naegele) und am Abhang des Rhodopegebirges gegen Philippopol (durch Margais). An letzterem Fundort auch nach P. Hesse.

Die Form variiert ausserordentlich, teils stimmen die Exemplare in Form und Farbe mit der var. *onyxiomicra* aus dem nördlichen Albanien (s. Wohlberedt, Zur Fauna Montenegros und Nordalbaniens p. 72) überein, teils ähneln sie — bis auf den etwas helleren Spindelrand der asiatischen *martensi* Boettg. (*carduchana* Bgt.) in ihren grösseren aufgeblasenen Exemplaren. Diese letztgenannte Varietät (*martensi*) variiert fast in der gleichen Weise.

Den Namen *bulgarica* hatte Kobelt (Martini-Chemnitz, p. 219). eventuell für weissspindlige *lucorum-castanea* vorgesehen.

Ein besonders extrem entwickeltes Stück ist die von Kobelt als

(var.) *thracica* Kobelt

Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 2040. *Helix* (*Helicogena*) *thracica*, Martini-Chemnitz, *Heliceen* (*Helicogena*) Nr. 211, Taf. 368, Fig. 5, 6

aufgestellte Form, die allerdings für sich betrachtet, kaum mit den übrigen Exemplaren zu identifizieren ist. Es handelt sich aber tatsächlich um ein zu *castanea* Oliv. gehöriges Stück.

H. *pomatia* L.

Syst. nat. X, 1758, I, p. 771. *Helix pomatia*.

Rossm. Iconogr., Fig. 1—2. H. *pomatia* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 462. *Helix pomatia* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 285.

Helix pomatia Lin.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *P. pomatia* L.

Schläfli fand bei Sevlievo und Šumla „la vraie pomatia avec tous les caractères, qu'elle présente dans l'Europe moyenne“.

Durch Naegele aus Sofia. Ein Exemplar, welches sich in meiner Sammlung aus Sofia befindet, ähnelt der var. *elsae* Kobelt aus Bukarest. (Vielleicht Marktware?)

var. rhodopensis Kobelt.

Martini-Chemnitz, Heliceen (*Helicogena*) Nr. 287. *Helix* (*Helicogena*) *pomatia* var. *rhodopensis*.

Mir zahlreich vom Abhang des Rhodopegebirges gegen Philippopol zugegangen, und zwar in gebänderten und ungebänderten Exemplaren. Die var. *rhodopensis* verbindet, entsprechend der geographischen Lage des Rhodopegebirges, die rumänische *christinae* Kobelt und *dobrudschae* Kobelt, die serbische *serbica* Kobelt und die griechische *thessalica* Boettg. Manche Exemplare neigen mehr zu dieser, andere wieder mehr zu jener Varietät.

Genus *Tachea* Leach.

T. nemoralis Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 46. *H. nemoralis*.

Rossm. Iconogr., Fig. 5, 298, 404. *H. nemoralis* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 444. *H. nemoralis* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Westeuropa.

Aus der Umgebung von Varna erhielt ich durch Margais 5 Exemplare (gelblich 00000, bräunlich 00000, 00345, 12345), Durchm. 23 mm. Ob hier von Seiten des Sammlers ein Versehen vorliegt? Letzteres ist nicht wahrscheinlich.

T. vindobonensis Fér.

Prodr. général pour tous les moll. 1822, p. 21. *Helicogena silvatica* var. *vindobonensis*.

Rossm. Iconogr., Fig. 7, 495. *H. austriaca* v. Mühlf.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 444. *H. vindobonensis* Fér.

Allgemeines Vorkommen: Ostdeutschland, Österreich, Russland, Balkan.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par. Schläfli, p. 287.
H. vindobonensis C. Pfr.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. Binnenmoll. Deutschlands, p. 121.
H. austriaca Mühlfeldt.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutschen Mal. Ges., p. 9.
H. austriaca.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Tachea austriaca* Mühlf.

1911, Hesse, Zur Kenntniss der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
Tachea vindobonensis Fér.

Küstendil, Izvor, Loveč, Sevlievo, Tirnovo, Šumla. (leg. Schläfli.)

In der Umgebung von Varna (leg. Jickely); ferner Plevno, Philippopel, Zaribrod an der serb. Grenze, Pančarevo bei Sofia, Dupnitza (südlich von Sofia); anscheinend überall sehr häufig.

Zumeist fehlt den Exemplaren das zweite Band.

var. *balcanica* Stz.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 114.
H. vind. var. *balcanica* Stz.

Häufig in der Umgebung von Sliwno im Balkan.

Die Varietät ist nirgends beschrieben, sondern nur nach Exemplaren im Wiener Hofmuseum aufgestellt.

Genus *Iberus* Montfort.

J. vermiculatus Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 20. *H. vermiculata*.

Rossm. Iconogr., Fig. 301, 499, 500. *H. vermiculata* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 411. *H. vermiculata* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mittelmeerländer.

In der Umgebung von Varna.

D 27—30, H 19—22 mm.

Subgenus *Helicopsis* Fitzinger.

H. neglecta Drap.

Hist. nat. d. Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 108, Taf. 6, Fig. 12—15. *H. neglecta*.

Rossm. Iconogr., Fig. 355. *H. neglecta* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 226. *H. neglecta* Drap.

Allgemeines Vorkommen: Spanien, Südfrankreich, Oberitalien, Griechenland, Algerien.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 98. *H. neglecta* Draparnaud.

„Varna“. (Nach Kreglinger, leg.?)

H. variabilis Drap.

Hist. nat. d. Mollusques terr. et fluv. de la France 1805, p. 84, Taf. 5, Fig. 11—12. *Helix variabilis* Drap.

Rossm. Iconogr., Fig. 356 und 1295—1302. *Helix variabilis* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 166. *H. virgata* var. *variabilis* Drap.

Allgemeines Vorkommen: England, Mittelmeergebiete.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Helicella variabilis* Drap.

Eine Anzahl Exemplare dieser schwierigen Art erhielt Hesse aus der Umgebung von Philippopol. Hesse ist sich der Bestimmung nicht ganz sicher und nur auf die Autorität Boettgers hin bringt er die Exemplare unter obigem Namen.

D = 11—14, H = 7—9 mm bei 5—5½ Umgängen. (Hesse.)

Subfamilia Xerophilinae.

Genus Xerophila Held.

Subgenus Xerophila s. str.

X. obvia (Ziegl.) Hartm.

Gastropoden der Schweiz 1840, p. 148, Taf. 45. *Helix obvia* Ziegl.

var. dobrudschae (Parr.) Kobelt.

Iconogr., Fig. 1441. *Helix Dobrudschae* Parreyss.

Allgemeines Vorkommen: Rumänien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 286.

H. ericetorum Müll. var. *vulgarissima* Schl.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 99. *H. candicans* Ziegler.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutschen Mal. Ges., p. 9 und

10. *H. ericetorum* Müll. und var. *vulgarissima* Schl.?

1877, Rossm. Iconogr., Fig. 1430. *H. obvia* var.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 114.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *H. vulgarissima* Schläfli und *obvia* Hartm.

In Bulgarien weit verbreitet.

Fundorte: Philippopel (teilweise rein einfarbig, teilweise schwach gebändert), Pančarevo bei Sofia (typisch gebändert, selten reinweiss), Philippopel (zumeist gebändert), Rilokloster im Rilogebirge (typisch gebändert); ferner Varna (leg. Jickely), Slivno und Schipka (leg. Rebel), Izvor, Tirnovo, Šumla und Džumaja. (leg. Schläfli).

In der Bestimmung folgte ich Herrn Dr. Wagner und bin mit ihm vollständig der Ansicht, dass ohne Kenntnis des Fundortes die Varietät oft vom Typ kaum zu unterscheiden ist.

X. vulgarissima (Schläfli) Mouss.

Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 270. *H. ericetorum* var. *vulgarissima* Schfl.

Rossm. Iconogr., Fig. 1430. *H. obvia* var.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 340. *H. vulgarissima* (Schläfli) Mss.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Helicella vulgarissima* (Schläfli) Mss.

Auf Grund anatomischer Untersuchung glaubt Hesse vorstehende Art von *H. obvia* trennen zu müssen. Es stand ihm für die Untersuchung allerdings nur ein lebendes Exemplar zur Verfügung. Sollte die Art als berechtigt anerkannt werden, dann würden möglicher Weise die von mir als *obvia* var. *dobrudschae* bezeichneten Stücke zum Teil hierher zu ziehen sein.

Subgenus Candidula Kobelt.

C. striata Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 38. *H. striata*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 251. *H. striata* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Norddeutschland, Böhmen, Galizien, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 286. *Helix striata* Müll.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *C. striata* Drap.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *Helicella striata* Müll (?).

Tirnovo, Izvor, Sevlievo und Džumaja. (leg. Schläfli.) Umgebung von Philippopol. (Hesse.)

Genus *Carthusiana* Kobelt.

C. carthusiana Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 15. *H. carthusiana*.

Rossm. Iconogr., Fig. 366. *H. carthusianella* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 81. *H. carthusiana* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mittel-, West- und Süd-Europa, Kaukasus, Kleinasien, Syrien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. per Schläfli, p. 285. *H. carthusiana* Müll.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges., p. 9. *H. carthusiana*.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Carth. carthusiana* Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Theba carthusiana Müll.

Bei Sevlievo, Küstendil, Loveč Tirnovo, Šumla, Džumaja (leg. Schläfli), Varna (leg. Jickely) und Plevno; Umgebung von Philippopol (Hesse); jedenfalls in ganz Bulgarien weit verbreitet.

C. frequens Mouss.

Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli I 1859, p. 254. *H. frequens*.

Rossm. Iconogr., Fig. 1204. *H. frequens* Mousson.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1889, p. 75, *H. frequens* Mss.

Allgemeines Vorkommen: Balkan, Transkaukasien, Klein-Asien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 285. *H. frequens* Mss.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Carth. frequens* Mousson.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Theba frequens Mss.

Bei Sevlievo, Šumla und Džumaja. (leg. Schläfli.)

Bei Philippopol sehr häufig. (Auch durch Hesse.)

Die Exemplare messen im Durchmesser 13—15 mm; jedoch befinden sich auch zwei grössere darunter ($D = 16\frac{1}{2}$ und 17 mm), von denen namentlich das eine Stück, das besonders flach ist, mit *carthusiana* von Montenegro fast ziemlich übereinstimmt.

Nach Mousson ist die Grösse an obigen Fundorten 12—15 mm, die Farbe teils hell, teils dunkel.

Familia Buliminidae.

Genus Buliminus Ehrenberg.

Subgenus Zebrina Held.

Z. bulgarica Bourg.

Spec. noviss. 1876, p. 13. B. bulgaricus.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 4. B. bulgaricus Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

„Bulgarien bei Eidos“ (nach Bourguignat). Fundort mir unbekannt.

Z. detrita Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 101. Helix detrita.

Rossm. Iconogr., Fig. 42. Bul. radiatus Brug.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 5. B. detritus Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Süd-Europa, Kaukasus, Klein-Asien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 288.

B. detritus Müll.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutschen Mal. Ges., p. 9.

B. detritus.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. Zebr. detrita Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

B. detritus Müll.

Küstendil, Loveč, Sevlievo, Tirnovo, Šumla (leg. Schläfli). Umgebung von Varna (Jickely). Ich erhielt diese auf der ganzen Balkanhalbinsel überall auf Kalk häufig vorkommende Art aus Philippopol, Varna, Sofia (Germankloster und Pančarewo), Dupritza.

An manchen Fundstellen überwiegt die bräunliche Färbung derart, dass die weisse Farbe fast völlig verschwindet.

var. tumida (Parr.)

Rossm. Iconogr., Fig. 1335 d. Bul. detritus M. var.

Westerlund; Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 5. B. detritus f. tumidus Parr.

Allgemeines Vorkommen: Balkan.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 116. *B. detritus* Müll. var. *tumidus* Parr.

In der Umgebung von Slivno häufig. (leg. Rebel).

Z. varnensis (Friv.) Pfr.

Monogr. Helic. viv. II 1848, p. 226. *B. varnensis* Frivaldsky.

Rossm. Iconogr., Fig. 1337—1339. *B. varnensis* Frivaldsky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 8. *B. varnensis* (Friv.) Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Dobrudscha.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 31. *Zebr. varnensis* Friv.

An der Küste des Schwarzen Meeres von Varna bis Mangalia in der Dobrudscha. Wie weit die Art südlich von Varna vorkommt, ist unbekannt.

Subgenus *Brephulus* Beck.

B. olympicus (Parr.) Kobelt.

Jahrb. Mal. Ges. 1877, p. 266, Taf. 5, Fig. 8.

var. *tantalus* (Parr.) Pfr.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 11. *B. zebra* f. *tantalus* Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Rumelien (?).

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

B. olympicus Kob. var. *tantalus* Pfr.

In der Umgebung von Philippopel häufig, von wo sie auch P. Hesse erhielt. Ich hielt die Exemplare zunächst für typische *olympicus*, durch die Angaben Hesses habe ich mich eines besseren belehren lassen. Die Form variiert ziemlich und zwar ähnlich wie *Ena subtilis-reitteri* aus Montenegro.

L 13 = 16 mm.

Subgenus *Ena* Leach.

E. obscura Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 103. *Helix obscura*.

Rossm. Iconogr., Fig. 387. *B. obscurus* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk., p. 31. *B. obscurus* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 116. *B. obscurus* Müll.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Nap. obscurus* Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
Nap. obscurus Müll.

Ein Exemplar bei Kušbunar bei Slivno im Balkan in 1300 m Höhe. (leg. Rebel.) Nach P. Hesse bei Philippopol.

Genus *Chondrula* Beck.

Subgenus *Chondrula* s. str.

Ch. microtragus (Parr.) Rossm.

Iconogr., Fig. 651. Pupa *microtragus* Parr.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 42. *B. microtragus* (Parr.) Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Balkan, Krim, Nordeuboea.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 288.

Ch. microtragus Parr.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 116. *B. microtragus* Parr.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Ch. microtragus* Parr.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Ch. microtragus (Parr.) Rossm.

Vier typische Exemplare bei Kušbunar (Rebel). Sehr häufig bei Philippopol und Euxinograd bei Varna. Von Schläfli bei Loveč, Sevlievo, Tirnovo, Šumla und Džumaja in Gemeinschaft mit *tridens* var. *eximius* gefunden.

Ch. tridens Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 106. *Helix tridens*.

Rossm. Iconogr., Fig. 33. Pupa *tridens* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 38. *B. tridens* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Süd-Europa, Kaukasus, Persien, Armenien, Klein-Asien, Syrien.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges., p. 9.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 116. *B. tridens* Müll.

Umgebung von Varna; ein typisches Exemplar von Kušbunar. (Rebel).

var. *eximia* Rossm.

Iconogr., Fig. 305, 722. Pupa *tridens* var. *eximia*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 38. *B. tridens* var. *eximius* Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen, Balkan.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 288. *Ch. tridens* var. *eximius* Rossm.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Ch. tridens* var. *eximia*, Rossm.

Bei Sevlievo, Šumla, Džumaja und Tirново (leg. Schläfli). Ein paar Exemplare von Šumla nähern sich der typischen Art. Čerepiskakloster. Jedenfalls kommen grosse Exemplare neben kleinen vor. Letztere bezeichnet Kimakovicz als typische *Ch. tridens* Müll.

***Ch. seductilis* (Ziegl.) Rossm.**

Iconogr., Fig. 306, 307. Pupa *seductilis* Ziegl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 50. *B. seductilis* (Z.) Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Dalmatien, Rumänien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 289. *Ch. seductilis* Ziegl.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 116. *B. seductilis* (Ziegl.) Rossm.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Ch. seductilis* Zgl.

Rebel sammelte drei Exemplare bei Kušbunar, Schläfli solche bei Tirново, Šumla und Džumaja.

Subgenus *Mastus* Beck.

***M. tetragonostoma* Bourg.**

Spec. noviss. 1876, p. 15. *B. tetragonostoma*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 18. *B. tetragonostoma* B.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *M. tetragonostoma* Bgt.

Umgebung von Varna. (Bourguignat).

Familia Cochlicopidae.

Genus *Cochlicopa* Risso.

***C. lubrica* Müll.**

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 104. *Helix lubrica*.

Rossm. Iconogr., Fig. 43. *Achatina lubrica* Brug.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 147. *C. lubrica* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Nordafrika, Kaukasien, Armenien.

Häufig bei Sofia.

L = 4—5 mm.

Genus *Caecilianella* Stab.

C. acicula Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 150. *Buccinum acicula* Müll.

Clessin, Deutsche Exkurs. Moll.-Fauna II, p. 1884, p. 133. *Caec. acicula* Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 176. *Caec. acicula* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa, Balkan (Montenegro).

Ein Exemplar aus der Umgebung von Philippopol „in der Form, wie sie auch anderwärts vorkommt“. (Dr. Wagner).

Familia *Pupidae*.

Genus *Modicella* Adams.

M. avenacea Brug.

Enc. meth. VI 2. 1792, p. 335. *Bul. avenaceus*.

Rossm. Iconogr., Fig. 36. *Pupa avena* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1887, p. 97. *P. avenacea* Brug.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kaukasien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 289.

Pupa avena Drap.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Pupa avena* Drp.

Bei Tirnovo (leg. Schläfli). „Die Exemplare fast identisch denen von Frankreich und Deutschland, nur etwas bräunlicher“. (Mousson.)

Genus *Pupilla* Leach.

P. muscorum Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 105. *Helix muscorum*.

var. *transsilvanica* v. Kim.

1890, Verh. und Mitt. Siebenbürg. Verein XL, p. 106. *P. musc. var. Transsilvanica*.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen.

Häufig bei Sofia. Vielfach zahnlos und mit schwacher Wulst an der Mündung.

Familia Clausiliidae.

Genus Clausilia Drap.

Subgenus Clausiliastra Mölldff.

Cl. transiens Mölldff.

Malakozoolog. Blätter 1873, p. 135, Taf. 4, Fig. Cl. transiens. Rossm. Iconogr., Fig. 1695.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 18. Cl. transiens Möllend.

Allgemeines Vorkommen: Serbien.

Diese bisher nur aus Serbien bekannte Art erhielt ich vom Paganowski-Kloster bei Caribrod. Die zweite Palatalfalte fehlt vielfach, jedoch stimmen die Exemplare sonst mit dem Typ aus Serbien gut überein.

Cl. marginata (Ziegl). Rossm.

Iconogr., Fig. 107. Cl. marginata Z.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 19. Cl. marginata (Z.) Rm.

Allgemeines Vorkommen: Ungarn, Rumänien.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 117. Cl. marginata (Ziegl). Rssm.

„Die vorliegenden Exemplare aus Bojana bei Sofia stimmen nicht ganz mit der für Bulgarien als charakteristisch beschriebenen Varietät auriformis Mss., welche nach Mousson in Iwortscha bei Sofia vorkommen soll, überein, gehören aber unstreitig zu Cl. marginata“. (Sturany.)

var. auriformis Mouss.

Coquilles terr. et fluv. rec. par Schläfli 1859, p. 291. Cl. auriformis Mss.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 19. Cl. marg. var. auriformis Mouss.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 291. Cl. auriformis Mss.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. Cl. marg. var. auriformis Mouss.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Cl. (Clausiliastra) marginata Rossm. var. auriformis Mss.

Nach Mousson bei Izvor bei Sofia. Anscheinend häufig bei Stanimaka südlich von Philippopel gegen das Rhodopegebirge. (Durch Margais).

Cl. laminata Mont.

Testacea britannica 1803, p. 359, Taf. 11, Fig. 4. Turbo laminatus.

Rossm. Iconogr., Fig. 29, 461, 462. Cl. bidens Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 19. Cl. laminata Mont.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 117. Cl. laminata Mont.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. Cl. laminata Mtg.

Einige Exemplare bei Kušbunar im Balkan. (leg. Rebel.)

Subgenus Alinda Ad.

A. biplicata Mont.

Testacea britannica 1803, p. 331, Taf. 11, Fig. 5. Turbo biplicatus.

var. bosnica (v. Kim.) Brancsik.

Jahrb. d. naturw. Ver. Trencsiner Com. 1888/89, Jahrg. XI, XII, p. 74, Taf. 2, Fig. 8. A. biplicata Mtg. var. bosnina Kim. Allgemeines Vorkommen: Bosnien.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 117. Cl. bipl. var. bosnica Kmkvz.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. A. bipl. var. bosnica Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Cl. (Alinda) biplicata Mont var. bosnica Kim.

Vier Exemplare bei Kušbunar (leg. Rebel). Nach P. Hesse bei Philippopel (Länge 14—19 mm).

var. maxima A. Schm.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 38. Cl. bipl. F. maxima A. S.

Allgemeines Vorkommen: Bosnien, Serbien, Bulgarien.

1868, Schmidt, System der Europ. Clausilien, p. 146. A. biplicata var. maxima.

1874, Kreglinger, Syst. Verz. Binnenmoll. Deutschlands, p. 190. Cl. biplicata var. maxima.

„Bulgarien“. (Schmidt.)

Ein Exemplar erhielt ich von Stanimaka, südlich Philippopel.
L = 21, D = $4\frac{3}{4}$ mm.

var. michaudiana Pf.

Zeitschr. für Malak. 1848, p. 12.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884. Cl. michaudiana Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Türkei.

Anscheinend häufig bei Stanimaka, südl. von Philippopel.

L = 15, D = $3\frac{3}{4}$ mm.

Al. distincta Sturany.

Annal. k. k. Naturhist. Hofm. 1894, p. 373, Taf. XVII, Fig. 1—4. Cl. distincta.

Allgemeines Vorkommen: Türkei (am Ochrida-See).

Anscheinend häufig bei Stanimaka, südl. von Philippopel.

Al. plicata Drap.

Hist. nat. d. Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 72, Fig. 15, 16. Cl. plicata.

var. macilenta Rossm.

Iconogr., Fig. 704. Cl. macilenta Rossm.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 37. Cl. plicata var. macilenta Rm.

Allgemeines Vorkommen: Türkei.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Cl. (Alinda) plicata var. macilenta Rossm.

Nur in einem einzigen Exemplar aus der Umgebung von Philippopel. (Hesse.)

var. pupilla Westerl.

Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 37. Cl. plicata var. pupilla.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

„Bulgarien“. Anscheinend häufig bei Stanimaka, südlich von Philippopel.

var. transsylvanica (Mouss.) Kim.

Verh. und Mitt. siebenbürg. Verein XXXIII 1883, p. 76.

A. plicata var. *Transsylvanica* Mousson in sched.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 37. *Cl. plic.*
var. *transsylvanica* Mss.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen, Banat, Rumänien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 289.

Cl. plicata Drap var. *transylvanica* Parr.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Cl. plicata* v. *trans-*
sylvanica Schm.

Tirново. (leg. Schläfli.)

f. implicata Bielz.

Verh. und Mitt. siebenbürg. Verein XII 1851, p. 223.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 36. *A. plicata*
f. implicata Bz.

Eine Anzahl Exemplare von Stanimaka, die auffallend der
betreffenden Form aus Siebenbürgen entsprechen. (Dr. A. J. Wagner.)

Subgenus Idyla von Vest.**J. thessalonica (Friv.) Rossm.**

Iconogr., Fig. 633. *Cl. thessalonica* Friv.

Martini-Chemnitz, Clausilia 1847, Nr. 158, Taf. 18, Fig. 8, 9.

Cl. thessalonica Frivaldszky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 40. *Cl. thessa-*
lonica (Friv.) K.

Allgemeines Vorkommen: Thessalien, Mazedonien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Cl. (Strigillaria) thessalonica (Friv.) Rssm.

In typischen, jedoch gestrichelten Exemplaren, aus der Um-
gebung von Philippopol. (Hesse).

var. spreta (Friv.) Küster.

Martini-Chemnitz, Clausilia 1847, Nr. 323, Taf. 35, Fig. 18—20.

Cl. spreta Frivaldszky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 41. *Cl. spreta*
(Friv.) K.

Allgemeines Vorkommen: Konstantinopel, Brussa.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Cl. thessalonica var. *spreti* (Friv.) Küster.

Anscheinend häufig an den Abhängen des Rhodopegebirges gegen Philippopel.

L = 12—14, D 4 = 4 $\frac{1}{2}$ mm.

Diese Varität wird auch von Hesse angegeben.

J. varnensis Pf.

Zeitschr. für Mal. 1848, p. 8. Cl. varnensis.

Küster, Martini-Chemnitz, Clausilia 1847, Nr. 192, Taf. 21, Fig. 24—27. Cl. varnensis Pfeiffer.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 41. Cl. varnensis Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Dobrudscha.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. J. varnensis Friv.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Cl. (Strigillaria) varnensis Pfr.

In der Umgebung von Varna. Nach P. Hesse auch bei Philippopel.

var. fritillaria Friv.

A' Magyar tudos tars. evk. 1835, p. 275, Taf. VII, Fig. 12. Cl. fritillaria.

Rossm. Iconogr., Fig. 623, Cl. varn. var. fritillaria Friv.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 41. Cl. varn. var. fritillaria (Friv.) Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Varna.

1837, Frivaldszky, Faunus, p. 93. Cl. fritillaria.

„Varna“.

var. socialis (Friv.) Pf.

Zeitschr. f. Mal. 1848, Taf. 9. Cl. socialis.

Küster, Martini-Chemnitz, Clausilia 1847, Nr. 198, Taf. 22, Fig. 1—4. Cl. socialis Frivaldszky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 42. Cl. socialis (Friv.) Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Varna.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutschen Mal. Ges., p. 9. Cl. socialis Friv.

1898, Kobelt, Zoogeographie II 1898, p. 32. J. socialis Friv.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. Cl. varnensis var. socialis (Friv.) Pfr.

Varna. (leg. Frivaldszky und Jickely). Nach P. Hesse bei Philippopel.

J. fraudigera (Parr.) Rossm.

Iconogr., Fig. 622. Cl. fraudigera Parr.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 42. Cl. fraudigera (Parr.) Rm.

Allgemeines Vorkommen: Mazedonien.

Stanimaka, südlich von Philippopel.

L = 16—17, D = 4 mm.

J. intricata (Friv.) Mouss.

Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 64. Cl. intricata Frivaldszky.

Küster, (Martini-Chemnitz), Clausilia 1847, Nr. 274, Taf. 30, Fig. 10—15. Cl. intricata Frivaldszky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 42. Cl. intricata (Friv.) Mss.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 290. Cl. intricata Friv.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. Cl. intricata Friv.

Loveč (leg. Schläfli) und Varna (coll. Lischke, nach Küster).

J. pagana (Ziegl.) Rossm.

Iconographie Fig. 701. Cl. pagana Z.

var. bulgarica (Friv.) Küst.

Küster, (Martini-Chemnitz), Clausilia 1847, Nr. 194, Taf. 21, Fig. 32—35. Cl. bulgarica Frivaldszky.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 426. Cl. pag. var. bulgarica Friv.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1878, Boettger, Syst. Verz. Clausilia, p. 52. Cl. pagana var. bulgarica (Friv.) K = latecostata Zel.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. Cl. pag. var. bulgarica Friv.

„Bulgarien“ (coll. Küster). Nach Boettger: Tirново.

var. osmanica (Friv.) Westerl.

Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 43. Cl. rug. v. osmanica Friv.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. J. rug. v. osmanica Friv.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Moll.-Fauna Ostrumeliens. Cl. (Idyla) pagana Rssm. var. osmanica (Friv.) Wstld.

„Bulgarien“ (Westerlund). In der Umgebung von Philippopol.
L = 14—23 mm (Hesse).

J. rebeli Sturany.

Annal. k. k. Naturhist. Hofm. 1897, p. 117, Taf. III, Fig. 1—5. J. rebeli.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

Einige Stücke bei Kuşbunar im Balkan (leg. Rebel).

„Auch ich halte — schrieb Professor Boettger an Dr. Sturany — die Art für neu. Ich möchte sie charakterisieren als eine Art mit dem Mündungstypus und Habitus von Alinda, mit der Nackenbildung der Gruppe der rugicollis und dem Schliessapparat und der Gehäusestrichelung der Gruppe der socialis Pfr. Also einer der merkwürdigsten Mischtypen“.

J. rugicollis (Ziegl.) Rossm.

Iconogr., Fig. 186, 699, 700. Cl. rugicollis Z.

f. maxima A. Schm.

System d. Europ. Clausilien 1868, p. 138. J. rug. v. maxima.

Allgemeines Vorkommen: Banat, Bulgarien, Rumänien.

1878, Boettger, Syst. Verz. Clausilia, p. 52. Cl. rug. f. maxima A. Schm.

„Bulgarien“ (Boettger).

var. rhodopensis n. var. (Taf., Fig. 3a und 3b).

Eine vom Typ abweichende Form erhielt ich aus Stanimaka bei Philippopol. Die betr. Exemplare sind stärker rippenstreifig, nahezu fein gerippt, die Unterlamelle erscheint besonders bei einem Exemplar bis zum Mundsaum verlängert und gabelteilig, das Interlamellar schwach gefältelt. (Dr. Wagner.)

L = 19,5, D = 4,5 mm.

J. (?) silacea Friv.

A Magyar tudós társ evk. 1835, p. 275, Taf. VII, Fig. 13. Cl. silacea Frivaldszky.

Frivaldszky führt vorstehende Art auf, die vermutlich zu Idyla gehört. Die Diagnose lautet: Teste unicolore helvola, gracili filiformi, laevi, substricta, columella bilamellata, apertura ovato-coarctata; peristomate albo, reflexo libero.

Fundort: Balkangebirge.

Subgenus *Pseudalinda* Boettg.

Ps. Wagneri n. sp. (Taf., Fig. 2a und 2b.)

Ein Exemplar von Staninaka am Rhodopegebirge. Der Mundsaum etwas beschädigt, sonst frisch und gut erhalten, die Gaumenfalten jedoch nicht gut sichtbar. Sehr ähnlich der *Cl. fallax*, jedoch grösser, gelbbraun mit grünem Stich, sehr fein und dicht rippenstreifig, auch vor der Mündung und am Nacken nur wenig stärker rippenstreifig. Oberlamelle kurz und niedrig, Spirallamelle von der Mündung aus nicht sichtbar. Unterlamelle sehr gedreht, in der Mündung stärker vorspringend, hinten? Spindelfalte, Clausilium von der Mündung aus nicht sichtbar. Von Gaumenfalten erscheint nur die Principale schwach durch das Gehäuse durchscheinend. Der Nacken mit einem kurzen, schwachen Kiel wie bei *fallax*.

L = 20, D = 5 mm.

(Die Beschreibung mir von Herrn Dr. Wagner gütigst überlassen.)

Ps. stabilis (Ziegl.) Pf.

Wird von Westerlund im Nachrichtenblatt 1884, p. 91, als in Bulgarien vorkommend, angegeben. Gemeint ist wohl die *Bukowina*.

Subgenus *Strigillaria* von Vest.

Str. cana Held.

Isis, 1836, p. 275. *Cl. cana*.

Küster, (Martini-Chemnitz), *Clausilia* 1847, Taf. 21, Fig. 5—8.

Cl. cana Held.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 150. *Cl. cana* Held.

Allgemeines Vorkommen: Mittleres Osteuropa, Rumänien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 290.

Cl. cana Held.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Cl. cana* Held.

Tirnovo und Džumija. (leg. Schläfli.)

var. curta n. var. (Taf., Fig. 4a, 4b.)

Fundort: Belovo im Rhodopegebirge.

Entspricht den kleinen, bauchigen Formen der transsilvanischen Alpen. Gehäuse kürzer, gedrunken und bauchig, gelblich hornfarben; die Rippenstreifen auffallend dichter und feiner, mit büschelförmig

angeordneten weissen Stricheln. Die Mündung ist mehr gerundet, Gaumenfalten und Lamellen weiss oder gelblich. Die Unterlamelle mitunter am unteren Ende gabelteilig, das Interlamellar undeutlich gefältelt. (Dr. Wagner.)

H = 13, B = 4 mm.

Str. vetusta (Ziegl.) Rossm.

Iconogr., Fig. 260. Cl. vetusta Zglr.

var. striolata Bielz.

Verh. und Mitt. Siebenbürg. Verein 1861, p. 227. Cl. striolata.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1884, p. 151. Cl. striolata Bielz.

Allgemeines Vorkommen: Siebenbürgen, Bosnien, Slavonien, Kroatien, Kärnthen, Serbien, Sachsen.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm. 1897, p. 117.

Cl. vetusta var. striolata Parr.

1898, Kobelt, Zoogeographie II 1898, p. 32. Cl. vetusta var. striolata.

Ein Exemplar von Bojana bei Sofia. (leg. Rebel.)

Familia Succineidae.

Genus Succinea Drap.

S. pfeifferi Rossm.

Iconogr., Fig. 46 und 2060—2063. S. Pfeifferi Rossm.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 11. S. pfeifferi Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Asien, Nordafrika.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

S. pfeifferi Rossm.

In der Umgebung von Philippopel (durch Margais). Auch Hesse gibt die Art vom gleichen Fundort an (in „einer kleinen Form“).

II. Basommatophora.

Familia Limnaeidae.

Genus Limnaea Drap.

Subgenus Limnaea s. str.

L. stagnalis L.

Syst. nat. X 1758 I, p. 774. *Helix stagnalis*.

Rossm. Iconogr., Fig. 1237. *L. stagnalis* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 24. *L. stagnalis* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kaukasien, Sibirien, Westasien.

Sümpfe der Marića bei Philippopel.

Ähnlich der Fig. 1237 in Rossm. Iconogr. Gehäuse dünnchalig.

L = 45 mm.

Hesse führt in seiner Arbeit die var. *ampliata* Cless. (Excurs. Mollusken-Fauna 1884, p. 352) von Philippopel auf.

Subgenus Radix Montfort.

R. auricularia L.

Syst. nat. X 1758 I, p. 774. *Helix auricularia*.

Rossm. Iconogr., Fig. 1245. *L. auricularia* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 29. *L. auricularia* L.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 293.

L. vulgaris C. Pfr.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *L. vulgaris* C. Pfr.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

L. (Gulnaria) auricularia L.

Aus der Umgebung von Philippopel erhielt ich sie durch Margais.

Die Form ähnelt der Fig. 1245 in Rossm. Iconogr.

(*L. vulgaris* C. Pfr. ist nach Westerlund *L. auricularia* juv.)

Die Art wird auch von P. Hesse angegeben, ein Stück aff.

var. *ampla* Hartm.

R. ovata Drap.

Hist. nat. des Mollusq. terr. et fluv. de la France 1805, p. 52,

Taf. 2, Fig. 30—31. *Limneus ovatus*.

Rossm. Iconogr., Fig. 1258. *Limnaea ovata* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 36. *L. ovata* Drap.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1893, Vavra, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss. *L. ovata* Drap.

Flussarm der Mariča bei Karšijek. (Vavra).

var. aff. fontinalis Stud.

Charpentier, Catal. Suisse 1837, Taf. 2, Fig. 15.

Rossm. Iconogr., Fig. 1512. *L. ovata* var. *fontinalis* Stud. sec. Clessin.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 37. *L. ovata* var. *fontinalis* Stud.

Allgemeines Vorkommen: Europa. Häufig bei Sofia.

Gehäuse sehr dünnchalig, schlank, insbesondere auch die einzelnen Windungen, Naht sehr tief.

$L = 17, D = 11$ mm.

R. lagotis Schrank.

Fauna boica III 1803, p. 289. *Buccinum lagotis*.

Rossm. Iconogr., Fig. 53 und 1240—1242. *L. vulgaris* Pfr. bezw. *lagotis* Schr.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 33. *L. lagotis* Schr.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Asien.

In einer Quelle des Flusses Panega bei der Stadt Vrača.

Subgenus *Limnophysa* Fitzinger.

***L. palustris* Müll.**

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 131. *Buccinum palustre* Müll.

Rossm. Iconogr., Fig. 51, 52 und 1260—1276. *Limnaeus palustris* Müll. bezw. Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 45. *L. palustris* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Asien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *L. (Limnophysa) palustris* Müll.

Mehrere Stücke, ähnlich Rossm. Iconogr., Fig. 1269, aus der Umgebung von Philippopel.

$L = 26$ mm.

Vom gleichen Fundort auch nach Hesse.

var. vulnerata Küst.

Mongraphie, Taf. 5, Fig. 13—15.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 45. L. palustris

var. vulnerata Küst.

Allgemeines Vorkommen: Dalmatien, Bulgarien, Istrien, Italien.
„Bulgarien“. (Westerlund.)

var. corvus Gmel.

Syst. nat. 1788, p. 3665. Helix corvus.

Rossm. Iconogr., Fig. 1263. L. palustris var. corvus.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 47. L. palustris

var. corvus Gmel.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

Ein grosses Exemplar, ähnlich Fig. 1263, in Rossm. Iconogr.,
jedoch gestreckter, aus der Umgebung von Philippopel.

L = 45 mm.

f. varnensis Gall.

Nach Westerlund (Verzeichnis) zu corvus gehörig.

Subgenus Fossaria Westerlund.**F. truncatula Müll.**

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 130. Buccinum
truncatulum.

Rossm. Iconogr., Fig. 57. Linnaeus minutus Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 49. L.
truncatula Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Nordafrika, Nord- und
Westasien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 293.

L. truncatulus Müll.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. L. truncatula Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

L. (Fossaria) truncatula Müll.

Bei Palanka in Mazedonien, westl. von Küstendil. (leg. Schläfli.)

Ferner häufig bei Philippopel (durch Margais, auch nach
P. Hesse).

Gehäuse ziemlich normal.

L = 8, D = 4 mm.

Bourguignat führt in seinem „Catalog des Limnées d'Europe“
(Histoire malac. du Lac Balaton) Poissy 1881 noch folgende, mir

bisher unbekannt gebliebene „Arten“ aus Bulgarien an, die auch Westerlund nicht mit aufzählt:

- L. bulgarica Bourg
- L. exigua Bourg
- L. varnensis Bourg
- L. berlani Bourg.

Familia Planorbidae.

Genus Planorbis Guéttard.

Subgenus Spirodiscus Stein.

Sp. corneus L.

Syst. nat. X 1758, p. 770. *Helix cornea*.

Rossm. Iconogr., Fig. 113. *Pl. corneus L.*

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 65. *Pl. corneus Lin.*

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kleinasien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

Pl. (Spirodiscus) corneus L.

In einer Anzahl von Stücken aus der Umgebung von Philippopol. (Hesse).

D = 34, H = 13 mm.

var. ammonoceras West.

Coll. typ. moll. 1868.

Rossm. Iconogr., Fig. 1928. *Pl. corneus var. ammonoceras Westerlund.*

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 67. *Pl. elophilus var. ammonoceras W.*

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa, Rumänien.

Umgebung von Philippopol.

D = 22 mm.

var. banaticus Lang.

Küster, Monographie, (Martini-Chemnitz), Taf. 7, Fig. 13—15.

Rossm. Iconogr., Fig. 1930. *Pl. corneus var. banaticus Bgt.*

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 67. *Pl. elophilus var. banaticus Lang.*

Allgemeines Vorkommen: Ungarn, Russland, Tirol.

Umgebung von Philippopol.

D = 15 mm.

Subgenus *Tropidiscus* Stein.

Tr. umbilicatus Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 160. *Pl. umbilicatus*.
Rossm. Iconogr., Fig. 59. *Pl. marginatus* Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 69. *Pl. umbilicatus* Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, westliches Asien.

1893, Vavra, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss., p. (3). *Pl. umbilicatus* Müll und *marginatus* Müll.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. *Pl. marginatus* Drap.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
Pl. (Tropidiscus) umbilicatus Müll. mit *f. ecarinatus* Wstld. und *flocinctus* Wstld.

Flussarm der Mariča bei Karšijak (Vavra); Sofia (im Borisgarten), Philippopel, Warme Quelle (20°) in Kričina, Bezirk Tatar Pazardöik. Beim letzten Fundort ist die stark fadenförmige Naht etwas nach der Mitte zu.

Exemplare aus einem Sumpfe bei Sofia sind auf der letzten Windung gegen die Mündung zu fast ohne Naht (*f. ecarinatus* West.).

(Vavra führt *umbilicatus* Müll. und *marginatus* Müll. als zwei verschiedene Arten auf).

Subgenus *Gyrorbis* Ag.

G. spirorbis L.

Syst. nat. X 1758, p. 770. *Helix spirorbis*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 73. *Pl. spirorbis* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Algerien.

1893, Vavra, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss., p. (3). *Pl. rotundatus* Poir.

Flussarm der Mariča bei Karšijak (Vavra). Ferner im Borisgarten bei Sofia.

G. vortex L.

Syst. nat. X 1758, p. 172. *Helix vortex*.

Rossm. Iconogr., Fig. 61. *Planorbis vortex* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 71. *Pl. vortex* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Sibirien.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
Pl. (*Diplodiscus*) *vortex* L.

In einem Exemplar aus der Umgebung von Philippopel. (Hesse).

D = 7 mm.

Subgenus *Gyraulus* Ag.

G. piscinarum Bourg.

Testacea noviss. 1852, p. 22. Pl. piscinarum.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 78. Pl.
piscinarum Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Syrien, Anatolien, Bulgarien.

„Bulgarien“. (Bourg.)

Familia Ancyliidae.

Genus *Ancylus* Geoffr.

A. fluviatilis Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 207. *A. fluviatilis*.

var. **gibbosus** Bourg.

Journ. de Conch. IV 1853. *A. gibbosus*.

Bourguignat, Moll. Alp. Mar. 1862, Taf. 1, Fig. 13—19.

A. gibbosus.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 89. *A. fluv.*

var. **gibbosus** Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Süd-Europa.

Quelle des Flusses Panega bei der Stadt Vraća.

Pneumonopoma.

Familia Cyclostomatidae.

Genus *Ericia* M. T.

E. costulata (Ziegl.) Rossm.

Rossm. Iconogr., Fig. 395, 1676. *C. costulatum* Ziegl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1885, p. 104. *C.*
costulatum (Z.) Rm.

Allgemeines Vorkommen: Südöstliches Europa.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 292.
Cycl. costulatum Ziegl.

1898, Kobelt, Zoogeographie II, p. 32. C. costulatum Zgl.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

E. costulata (Zgl.) Rssm.

Izvor und Tirnovo (leg. Schläfli), Tscherepischkikloster bei Philippopol.

E. elegans Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 177. Nerita elegans.

Rossm. Iconogr., Fig. 44. Cycl. elegans Drap.

Westerlund, Fauna paläarkt Binnenk. 1885, p. 105. Cycl. elegans Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kleinasien, Syrien.

1859, Mousson, Coq. terr. et fluv. rec. par Schläfli, p. 292.
Cycl. elegans Lam.

1874, Jickely, Nachrichtsbl. der Deutsch. Mal. Ges., p. 9. C. elegans Müll.

1897, Sturany, Annal. k. k. Naturhist. Hofm., p. 118. C. elegans Müll.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
E. elegans Müll.

Šumla und Džumija (leg. Schläfli). Häufig bei Slivno (Sturany);
Varna und Tscherepischkikloster bei Philippopol.

Branchiata.

Ctenobranchia.

Familia Paludinidae.

Genus Vivipara Montf.

Kennen wir kaum die mitteleuropäischen Arten nur einigermaßen, so sind wir über die „Arten“ der Balkanhalbinsel noch vollständig im Unklaren.

Bourguignat hat in seinem Aperçu sur la Faune Malacologique eine Anzahl Formen aus der unteren Donau beschrieben, die nach dem einstimmigen Urteil der heutigen Malakozoologen auf vielleicht zwei bis drei Arten zurückzuführen sind. Auch Dr. A. J. Wagner,

der sich seit längerer Zeit mit den Süßwasserformen des Donaugebietes beschäftigt, schreibt mir, dass er nicht in der Lage sei, über die Paludina-Arten ein Urteil abgeben zu können. Jedenfalls handelt es sich bei den Bourguignatschen Arten zum grössten Teil, wie schon Westerlund andeutet, um Altersunterschiede, teils variieren aber auch die Exemplare an den verschiedenen Fundorten. Solange nicht sehr reiches Material vorliegt, werden wir wohl bei den Balkanformen vollständig im Dunkeln tappen.

Nach Bourguignat kommen in der unteren Donau folgende „Arten“ vor:

V. acerosa Bourg.

Aménités malacolog. 1862. *V. acerosa* Bourg.

Rossm. Iconogr., Fig. 1375 (♀), 1376 (♂). *Paludina aethiops* Parreys.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 6. *P. acerosa* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

1870, Annales de Malacologie. *V. acerosa* Bourg.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

V. acerosa Bgt.

Hierzu rechnet Westerlund folgende Formen Bourguignats, die er nur für Junge hält:

V. danubialis Bourg.

Annales de Malacologie 1. 1870.

V. sphaeridia Bourg. (♀).

Récensement des Vivipara du syst. europ. 1880.

V. thiesseana Bourg. (♀).

Récensement des Vivipara du syst. europ. 1880.

V. strongyla Bourg. (♀).

Récensement des Vivipara du syst. europ. 1880.

V. subfasciata Bourg.

Annal. de malacologie 1870, p. 50. *V. subfasciata* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 8. *P. subfasciata* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

V. amblya Bourg.

Annal. de malacologie 1870, p. 53. *V. amblya* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 11. *P. amblya* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Hierher nach Westerlund noch:

V. microlena Bourg.

Annal. de Malacologie 1870, p. 54. *V. microlena* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 11. *P. microlena* Bgt. bei *P. amblya*.

Durch Herrn Margais erhielt ich einige Exemplare von der Marića bei Philippopel, die vielleicht zur *penchinati* Bourg. gehören. Zwei andere Exemplare mit der Fundortbezeichnung „Philippopel“ stammen vielleicht aus einem anderen Wasserbehälter, sind aber den ersteren ähnlich. Dr. Wagner rechnet beide Funde zu *danubialis* Bourg., erstere zu deren var. *penchinati* Bourg.

(Nach Melchior Neumayr, Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesell., Bd. XXXIX, Berlin 1888, p. 605 und Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Bd. (?), Stuttgart, p. 303, kommt *Paludina diluviana* Kunth in recenten Exemplaren in der unteren Donau (Sulina) vor, was bereits von Brusina, Nachrichtsbl. d. Deutsch. Malak. Ges., Frankfurt 1907, p. 40, bestritten wurde).

Familia Bythinidae.

Genus Bythinia Leach.

B. rumelica n. spec. (Taf., Fig. 5, a und b).

Aus einer warmen Quelle (20⁰) in Kričina, Bezirk Tatar Pazarčik in Süd-Bulgarien.

Gehäuse ähnlich der *B. troscheli* Paasch, jedoch grösser, das Gewinde weniger getürmt, der Nabel verhältnismässig weit und offen.

$$H = 12, B = 8,5 \text{ mm.}$$

Diese Form ist ausgezeichnet durch den für eine *Bythinia* verhältnismässig weiten und offenen Nabel; vielleicht ist sie doch nur eine geographische Varietät von *B. leachii* Shepp. (Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. A. J. Wagner.)

Familia Lithoglyphidae.

Genus Lithoglyphus Mühlf.

Nach Bourguignat (Annal. de Malacologie 1870, p. 62) kommt *L. penchiati* Bourg. in der unteren Donau bei Braila vor.

Familia Melaniidae.**Genus Melania Lam.****M. ovoidea Bourg.**

Hist. des Mélaniens du syst. europ. 1884. *M. ovoidea* Bourg.
 Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 107. *M. crassa*
 Kutsch. var. *ovoidea* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Bulgarien.

Rusčuk (Bourg.).

Genus Microcolpia Bourg.**M. acicularis Fér.**

Mém. soc. hist. nat. Paris 1823, p. 160, Taf. 1. *M. acicularis* Fér.
 Rossm. Iconogr., Fig. 672—675. *M. acicularis* Fér.
 Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 109. *M.*
acicularis Fér.

Allgemeines Vorkommen: Krain, Kroatien, Montenegro.

In der Quelle des Flusses Panega in der Nähe der Stadt Vraća.
 Letzter Umgang wenig kürzer als die Hälfte der Schale.

L = 14, D = 5, L. ap. 6½ mm.

Familia Valvatidae.**Genus Valvata Müll.****V. piscinalis Müll.**

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 172. *Neritina piscinalis*.
 Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 2297. *V. piscinalis* Müll.
 Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 132 *V.*
piscinalis Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Kaukasus, Sibirien, Kaschmir,
 Tibet.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.
V. piscinalis Müll.

Diese Art erhielt ich aus dem Flusse Panega bei Vraća und
 von Philippopel. (Hier auch nach Hesse.)

Aspidobranchia.

Familia Neritinae.

Genus Neritina Lam.

N. danubialis (Mühlf.). C. Pfr.

Deutsche Land- und Wasserschnecken III 1828, p. 48, Taf. 8, Fig. 17–18. *N. danubialis* Mühlf.

var. stragulata (Mühlf.). C. Pf.

Deutsche Land- und Wasserschnecken III 1828, Taf. 8, Fig. 19–21. *N. dan. var. stragulata* Mühlf.

Rossm. Iconogr., N. F., Fig. 1330. *N. dan. var. stragulata*, Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1886, p. 148. *N. dan.*

var. stragulata (Mühlf.). C. Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Gebiet der Save.

Aus dem Flusse Panega bei Vraća.

B. Malacozoa Acephala.

1. Isomya.

Familia Najadea.

Während Bourguignat und Drouét aus Bulgarien, entsprechend den Anschauungen der école nouvelle, eine Anzahl neuer Arten, sowohl von *Unio* als von *Anodonto* (einschliesslich *Pseudanodonto* und *Colletopterum*) beschrieben haben, rubriziert Jurinič sämtliche von ihm gesammelten Exemplare unter unsere deutsche Arten. Schon bei unserer doch gewiss vorzüglich durchforschten deutschen Fauna sind wir nicht im Klaren, was wir bei den Bivalven als Art und was als Lokalform zu betrachten haben, deshalb werden wir wohl auch über die Formen der Balkanhalbinsel nie zu einer Einigkeit gelangen. Ich ziehe es deshalb vor, in dem gegenwärtigen Verzeichnis die erwähnten Bivalven (mit Ausnahme von *Unio*) nach dem Alphabet aufzuzählen.

Inzwischen war Herr Dr. F. Haas vom Senckenbergschen Museum in Frankfurt a. M., welcher sich speziell mit den europäischen Bivalven beschäftigt, und bereits die Bivalven aus Philippopel von Freund Hesse (s. *U. gentilis* Haas und *An. piscinalis*) bestimmt hatte, so liebenswürdig, mein diesbezügliches Material aus Bulgarien ebenfalls zu bearbeiten. Ich bringe seine geschätzten Mitteilungen darüber mit seiner Genehmigung am Schlusse dieser Arbeit als Nachtrag.

Genus *Unio* Retzius.

U. consentaneus (Ziegl.) Rossm.

Iconogr., Fig. 208. *U. consentaneus* Z.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1880, p. 66 *U. ater* Nilss. f. *consentaneus* (Z.) Rssm.

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa, Balkan.

S. Nachtrag.

U. batavus Lam.

Histoire natur. des animaux sans vertèbre VI 1819, p. 78. Nr. 33, *U. batavus* Lam.

Rossm. Iconogr., Fig. 128, 214, 410, 414, 745. *U. batavus* Lam.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 74. *U. batavus* Maton und Rackett.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Nord-Europa.

1870, Kreglinger, System Verzeichnis der Moll. Deutschlands, p. 345. *U. batavus* Nilsson.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 66. *U. batavus* Lam.

In einem See bei Varna (Kregl.; leg.); Donau bei Widdin und Silistria und alter Isker bei Sofia (leg. Yourinitch).

U. crassus Retz.

Nova testaceorum genera 1788, p. 17. *Unio crassus* Retz.

Rossm. Iconogr., Fig. 126, 127, 411. *U. crassus* Retz.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 62. *U. crassus* Retz.

Allgemeines Vorkommen: Nord- und Mittel-Europa.

1884, Drouét, Unionidae de la Serbie, p. 5. *Unio crassus* Retz. „Isker“ (Drouét).

U. sardicensis Drouét.

Journal de Conchyliologie 1895. Vol. 43, Nr. 4.

Allgemeines Vorkommen: ?

Isker bei Sofia (Drouét).

U. cancrorum (Bourg.) Loc.

Prodrome de Malacologie française 1882. *U. cancrorum* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 129. *U. cancrorum* (Bgt.) Loc.

Allgemeines Vorkommen: Frankreich, Bayern, Kroatien, Serbien, Bulgarien.

„Bulgarien“. (Nach Westerlund.)

a

c

b

Fig. 1. *Vitrina rhodopensis* n. sp.
Stanimaka. (Vergr. 1 : 5)

a

b

Fig. 2. *Pseudalinda wagneri* n. sp.
Stanimaka. (Vergr. 1 : 3)

a

b

Fig. 3. *Idyla rugicollis* var. *rhodopensis* n. var.
Stanimaka. (Vergr. 1 : 5)

a

b

a

Fig. 5. *Bythinia rumelica*
n. sp. Kričina. (Vergr. 1 : 3)

b

Fig. 4. *Strigillaria cana* var. *curta*
n. var. Belovo. (Vergr. a 1 : 3)

Wagner del.

U. rostratus Lam.

Histoire natur. des animaux sans vertèbre VI. 1819, p. 77.

U. rostratus Lam.

Rossm. Iconogr., Fig. 71, 196, 409, 587—590, 762, 766. *U. pictorum* (L.) Nilss.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 103. *U. rostratus* Lam.

Allgemeines Vorkommen: Mittel- und Nord-Europa.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 346. *U. pictorum* Linné sp.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 65.

U. pictorum L.

In einem See bei Varna. (Nach Kreglinger.) Donau bei Widdin und Isker beim Dorfe Swoge. (leg. Yourinitch.)

s. Nachtrag.

var. limosus Nilss.

Historia Mollusc. Sueciae terr. et fluv. 1822, p. 110. *U. limosus* Nilss.

Rossm. Iconogr., Fig. 199. *U. limosus* Nilss.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 115. *U. limosus* Nilss.

Allgemeines Vorkommen: Nord- und Mittel-Europa.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 65.

U. pictorum var. limosus Nilson.

Donau bei Widdin und Marića bei Tat. Pazarčik. (leg. Yourinitch.)

„Von der typ. Art dadurch unterschieden, dass ihre Schalen am hinteren Ende breiter und stumpf sind, dass die Kardinalzähne gut differenziert und dick sind und dass die Epidermis der Schale braun ist“. (Yourinitch.)

U. gentilis Haas.

Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens. *U. gentilis* Haas. n. sp.

Aus der Marića bei Philippopel. (Hesse.)

Länge 49, Höhe 25, Tiefe 17 mm.

Siehe Nachtrag von Dr. F. Haas.

U. tumidus Retz.

Nova testaceorum genera 1788, p. 17. *U. tumidus* Retz.

Rossm. Iconogr., Fig. 70, 772—778, N. F. 542. *U. tumidus* Retz.
Allgemeines Vorkommen: Nord- und Mittel-Europa.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 66.

U. tumidus Philipsson.

Donau bei Widdin. (leg. Yourinitch.)

„Die Länge der Schale beträgt 5—6 cm und die Breite 2,5—3 cm. Die Epidermis ist entweder grün oder gelbgrün. An der gewölbtesten Stelle haben die Schalen radiale, gelbe Linien. Die Kardinalzähne sind besser differenziert als bei *U. pictorum*, sind aber nicht so konisch und so hart wie bei der folgenden (*batavus*) Art.“ (Yourinitch.)

s. Nachtrag.

Von der unteren Donau führt Bourguignat noch auf in seiner Arbeit:

Aperçu sur la Faune Malacologique du Bas Danube:

U. ponderosus Spitzzi (Braila)

U. proechistus Bourg.

U. graniger Ziegl.

U. tumidus Retz.

U. crassus Retz.

U. batavus Maton und Rackett.

Genus *Anodonta* Cuvier.

Subgenus *Euanodonta* Westerl.

Eu. *anatina* L.

Syst. nat. X 1758, p. 706. *Mytilus anatina*.

Rossm. Iconogr., Fig. 417. *A. anatina* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 255. *A. anatina* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Mittel-Europa.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 335. *A. anatina* Lin.

In einem See bei Varna. (Nach Kreglinger.)

Eu. *aristides* Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéphales d. syst. europ. 1881. *A. aristides*.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 287. *A. aristides* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Kroatien, Wallachei, Serbien, Bulgarien.

„Bulgarien“. (Nach Westerlund.)

Eu. cellensis Gmel.

Caroli a Linné systema natural. 1788.

Rossm. Iconogr., Fig. 280. *A. cellensis* Schröt.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 212. *A. cellensis* Gmel.

Allgemeines Vorkommen Nord- und Mittel-Europa.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. d. Binnenmoll. Deutschlands, p. 332. *A. cellensis* Gmelin.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 64.

A. mutabilis var. *cellensis* Schroeter.

„Bulgarien“. (Nach Kreglinger.) Isker bei Sofia. (leg. Yourinitch.)

Eu. cygnea L.

Syst. nat. X 1758, p. 700. *Mytilus cygnea*.

Rossm. Iconogr., Fig. 342. *A. cygnea* L.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 199. *A. cygnea* Lin.

Allgemeines Vorkommen: Nord- und Mittel-Europa.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 64.

A. mutabilis var. *cygnea* L.

Donau bei Widdin und Gartensee bei Philippopol. (leg. Yourinitch.)

Eu. piscinalis Nilss.

Histor. Mollusc. Sueciae terr. et fluv. 1822, p. 116, Nr. 3 *A. piscinalis* Nilss.

Rossm. Iconogr., Fig. 281. *A. piscinalis* Nilss.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 284. *A. piscinalis* Nilss.

Allgemeines Vorkommen: Mitteleuropa.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 334. *A. piscinalis* Nilsson.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 64.

A. piscinalis Nilson.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

A. piscinalis Nilsson (= *maritzana* Bgt.).

See bei Varna. (Nach Kreglinger). Donau bei Widdin. (leg. Yourinitch). Umgebung von Philippopol. (Hesse).

s. Nachtrag.

Eu. savensis Drouét.

Journal de Conchyliol. 1881.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 285. *A. savica* (Drouét) Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Serbien.

1884, Drouét, Supplément aux Unionidae, Paris 1884, p. 15. *A. savensis* Drouét.

Lomfluss bei Lom-Palanka. (Drouét.)

Eu. *wimmeri* Drouét.

Journal de Conchyliol. 1881, p. 251. *A. wimmeri* Drouét.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 283. *A. wimmeri* Drt.

Allgemeines Vorkommen: Serbien.

1884, Drouét, Supplément aux Unionidae, Paris 1884, p. 15. *A. wimmeri* Drouét.

Lomfluss bei Lom-Palanka. (Drouét.)

Subgenus *Pseudanodonta* Bourg.

Ps. *complanata* (Ziegl.) Rossm.

Rossm. Iconogr., Fig. 68. *Anodonta complanata* Ziegl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 301. *A. complanata* (Z.) Rossm.

Allgemeines Vorkommen: Deutschland, Russland, Donau.

„Donau“. (Nach Westerlund.)

Ps. *danubialis* Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. *Ps. danubialis* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 300. *A. danubialis* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. *ellipsiformis* Bourg.

Matériaux pour servir a l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. *Ps. ellipsiformis* Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 305. *A. ellipsiformis* Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. letourneuxi Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. letourneuxi Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 300. A. letourneuxi Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. mecyna Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. mecyna Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1870, p. 301. A. mecyna (Let.) Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. pancici Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. pancici Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 304. A. pancici (Let.) Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. penchinati Bourg.

Annales de Malacologie, 1, 1870, p. 36, pl. IV, Fig. 1—4. Alasmodonta penchinati.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. penchinati Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 301. A. penchinati Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Donau, von Serbien abwärts.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Ps. rosmässleri Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. rosmässleri Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 305. Ps. rosmässleri Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Donau, von Wien abwärts.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

s. Nachtrag.

Ps. scrupaea Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881. Ps. scrupaea Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 304. A. scrupaea Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk. (Bourg.)

Subgenus Colletopterum Bourg

(s. Nachtrag von Dr. F. Haas.)

C. eximium Bourg.

(Vergl. die Abbildung von *C. letourneuxi* in: Bourguignat, Lettres malacol. à M. M. Brusina et Kobelt 1882, Taf., Fig. 16—17.)

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph. 1881, p. 80.

C. eximium Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 310. A. eximia Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Untere Donau.

Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk, sowie im Lomfluss bei letzterem Ort.

C. praeclarum Bourg.

Matériaux pour servir à l'Hist. d. Moll. acéph., p. 78. C. praeclarum Bourg.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1881, p. 310. A. praeclara Bgt.

Allgemeines Vorkommen: Lomfluss bei Rusčuk.

Lomfluss. (Bourg.)

Familia Sphaeriidae.**Genus Calyculina** Cless.**C. lacustre** Müll.

Vermium terr. et fluv. hist. II 1774, p. 204. Tellina lacustris.

Rossm. Iconogr., Fig 2116, 2117. Sphaerium lacustre Müll.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 20. Sph. lacustre Müll.

Allgemeines Vorkommen: Europa, Nordasien.

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 354. Sph. lacustre Müller.

„Bulgarien“. (Nach Kreglinger.)

Genus *Pisidiun* C. Pf.

P. fontinale C. Pf.

Naturgesch. deutsch. Moll. I 1821, Taf. 5, Fig. 15 und 16.

P. fontinale.

Clessin, Deutsche Excursions. Moll. Fauna, ed. II, Fig. 401.

P. fossarinum Cl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 25. *P. fontinale* C. Pfr.

Allgemeines Vorkommen: Europa.

1911, Hesse, Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Ostrumeliens.

P. fontinale C. Pf.

In einem Stück aus der Umgebung von Philippopel. (Hesse.)

2. *Heteromya*.

Familia *Dreissensidae*.

Genus *Dreissenia* van. Ben.

D. blanci Westerl.

Westerlund, Fauna paläarkt. Binnenk. 1890, p. 319. *D. bourguignati* Loc. var. *blanci* W.

Wohlberedt, Wiss. Mitt. aus Bosnien u. d. Herzegowina 1909, p. 704. *D. blanci* Westerl., Taf. LV, Fig. 202—203.

Allgemeines Vorkommen: Balkan, Kleinasien (nach Brusina).

1870, Kreglinger, Syst. Verz. der Binnenmoll. Deutschlands, p. 366. *D. polymorpha* Pallas.

1893, Locard Les *Dreissensia* du syst. europ. d'après la coll. Bourguignat. (Revue suisse de Zoologie et Annales du Musée d'Hist. nat. de Genève, Bd. I, p. 113—125.)

1906, Brusina, Journ. d. Conchyl., p. 287. *D. blanci* West.

1906, Yourinitch, Annuaire de l'Université de Sofia, p. 67.

D. polymorpha Pallas.

„Bulgarien“ (Kreglinger, Brusina). See (Devensko-See) bei Varna (Locard, Yourinitch). Donau (Locard). Lomfluss b. Rusčuk (Yourinitch).

Locard unterscheidet nach der école nouvelle folgende Formen („Arten“) aus Bulgarien:

- Dreissensia fluviatilis* Pallas. L. c., p. 133—137, Taf. V, Fig. 1—3.
Donau bei Rusčuk.
- D. complanata* L. c., p. 137—138, Taf. VI, Fig. 4.
Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk.
- D. sulcata* Bourg. L. c., p. 140—141, Taf. V, Fig. 5.
Donau bei Silistria.
- D. eximia* Bourg. L. c., p. 145—146, Taf. VI, Fig. 5.
See von Varna.
- D. letourneuxi* Bourg. L. c., p. 147—149, Taf. V, Fig. 9.
See von Varna.
- D. occidentalis* Bourg. L. c., p. 160—162, Taf. VII, Fig. 4.
Donau bei Rusčuk, See von Varna.
- D. magnifica* Bourg. L. c., p. 166—168, Taf. VII, Fig. 7.
Donau bei Giurgevo, gegenüber Rusčuk.
- D. lutetiana*. Bourg. L. c., p. 173—175, Taf. VI, Fig. 7.
See von Varna.
-

Über die Verbreitung der in Bulgarien vorkommenden Weichtiere, soweit wir die Arten genauer kennen, lässt sich folgendes sagen:

Ein grosser Teil ist in Europa weit verbreitet, es sind dies:

Zonitoides nitidus	Strigillaria cana
Limax variegatus	Strigillaria vetusta v. striolata
Amalia carinata	Succinea pfeifferi
Punctum pygmaeum	Limnaea stagnalis
Eulota fruticum	Radix auricularia
Vallonia pulchella	Radix ovata mit v. fontinalis
Helix aspersa	Radix lagotis
Helix pomatia	Limnophysa palustris mit v. vulnerata & corvus
Tachea nemoralis	Fossaria truncatula
Tachea vindobonensis	Spirodiscus corneus mit v. ammonoceras und banaticus
Iberus vermiculatus	Tropidiscus umbilicatus
Helicopsis neglecta	Gyrorbis spirorbis
Helicopsis variabilis	Gyrorbis vortex
Candidula striata	Ancylus fluviatilis v. gibbosus
Carthusiana carthusiana	Ericia costulata
Zebrina detrita	Ericia elegans
Ena obscura	Valvata piscinalis
Chondrula tridens	Calyculina lacustre
Cionella lubrica	Pisidium fontinale.
Caecilianella acicula	
Modicella avenacea	
Clausiliastra laminata	

Auf die Balkanhalbinsel sind beschränkt:

Crystallus hydatinus	Chondrula microtragus
Helicodonta corcyrensis mit v. canalifera und v. girva	Chondrula seductilis
Cingulifera trizona	Microcolpia acicularis
Carthusiana frequens	Neritina danubialis v. stragulata
Zebrina detrita v. tumida	Dreissenia blanci.

Mit Bosnien, Serbien und Montenegro sind gemeinsam:

Crystallus sturanyi	Alinda biplicata v. bosnica
Dinarica pouzolzi v. serbica	Alinda biplicata v. maxima.
Clausiliastra transiens	

Mit Albanien (Janina) ist gemeinsam:

Fruticicola rubiginosa v. *epirotica*.

Mit Griechenland und der Türkei sind gemeinsam:

<i>Daubebardia rufa</i> v. <i>graeca</i>	<i>Buliminus olympicus</i> v. <i>tantalus</i>
<i>Hyalina camelina</i> v. <i>frondosula</i>	<i>Alinda biplicata</i> v. <i>michaudiana</i>
<i>Limax conemenosi</i>	<i>Alinda distincta</i>
<i>Mesolimax braunii</i>	<i>Alinda plicata</i> v. <i>macilenta</i>
<i>Amalia hessei</i>	<i>Idyla thessalonica</i> mit v. <i>spretta</i>
<i>Cingulifera trizona</i> v. <i>rumelica</i>	<i>Idyla fraudigera</i>
<i>Helix lucorum</i> v. <i>castanea</i>	

Mit Siebenbürgen und zum kleinen Teil mit Rumänien sind gemeinsam:

<i>Hyalina glabra</i> v. <i>hungarica</i> und v. <i>striaria</i>	<i>Chondrula tridens</i> v. <i>eximia</i>
<i>Crystallus opinatus</i>	<i>Pupa muscorum</i> v. <i>transsylvanica</i>
<i>Euomphalia strigella</i> v. <i>mehadiae</i>	<i>Clausiliastra marginata</i>
<i>Xer. obvia</i> v. <i>dobrudschae</i>	<i>Alinda plicata</i> v. <i>transsylvanica</i>
	<i>Idyla rugicollis</i> v. <i>maxima</i> .

Eine nicht unbedeutende Angabe ist in Bulgarien endemisch, es sind dies:

<i>Vitrina rhodopensis</i>	<i>Idyla intricata</i>
<i>Cingulifera trizona</i> v. <i>balcanica</i> , v. <i>rhodopensis</i> und v. <i>thracica</i>	<i>Idyla pagana</i> mit v. <i>bulgarica</i> und v. <i>osmanica</i>
<i>Arianta haberhaueri</i>	<i>Idyla rebeli</i>
<i>Helix frivaldszkyi</i> v. <i>bulgarica</i>	<i>Idyla rugicollis</i> v. <i>rhodopensis</i>
<i>Helix figulina</i> v. <i>eumolpia</i> & v. <i>despotina</i>	<i>Idyla silacea</i> ?
<i>Helix pomatia</i> v. <i>rhodopensis</i>	<i>Pseudalinda wagneri</i>
<i>Xerophila vulgarissima</i>	<i>Strigillaria cana</i> v. <i>curta</i>
<i>Zebrina bulgarica</i>	<i>Linnaea bulgarica</i> ?
<i>Zebrina varnensis</i>	<i>Linnaea exigua</i> ?
<i>Mastus tetragonostoma</i>	<i>Linnaea varnensis</i> ?
<i>Clausiliastra marginata</i> v. <i>auri-</i> <i>formis</i>	<i>Linnaea berlani</i> ?
<i>Alinda plicata</i> v. <i>pupilla</i>	<i>Gyraulis piseinarum</i>
<i>Idyla varnensis</i> mit v. <i>fritillaria</i> und v. <i>socialis</i>	<i>Bythinia rumelica</i>
	<i>Melania ovoidea</i>

Nachtrag.

Bulgarische Najaden.

Von Dr. F. Haas, Frankfurt a. M.

Herr O. Wohlberedt-Triebes hatte die grosse Freundlichkeit, mir sein bulgarisches Najaden-Material zur Durchsicht zu übergeben. Da unsere Kenntnis der Unterdonau-Unioniden bisher allein auf den Arbeiten Bourguignats*) und Drouëts**) beruhte, so war von vornherein ein interessantes Ergebnis bei der Bearbeitung der Wohlberedtschen Muscheln anzunehmen, und diese Vermutung hat sich vollauf bestätigt. Zwar waren nur längst beschriebene Arten vertreten, doch zeigte es sich, dass wir diese „alten Bekannten“ nur recht ungenau kennen, da jede Eigenheiten und Besonderheiten aufweist, die zu gewichtigen Schlussfolgerungen führen.

Im Folgenden gebe ich die Namen der vorhandenen Arten und füge jedem eine Bemerkung über die mir aufgefallenen Eigenschaften bei.

1. *Unio pictorum* L.

Nur durch ein Exemplar, aus der Donau bei Sistowo, vertreten, doch zeigt dieses in der Wirbelskulptur das Bestreben, die der Art charakteristischen isolierten Höcker durch niedrige Leisten zu verbinden und auf diese Weise Verhältnisse zu erzielen, wie sie bei *Unio tumidus* und *requienii* herrschen. Die erwähnten niedrigen Leisten stellen den niedrigen Abfall der vorn steil emporsteigenden Wirbelhöcker auf der hinteren Seite dar und erreichen den nächst gelegenen Höcker gar nicht oder nur ganz abgeflacht. Immerhin bahnen sich hier Verhältnisse an, wie wir sie bei meinem *Unio gentilis* aus der Maritza ganz klar ausgeprägt sehen, den ich als dem gemeinsamen Ursprunge von *Unio pictorum* und *Unio requienii* nahestehend betrachte, da er bei deutlicher *pictorum*-Form des Umrisses die Wirbelskulptur von *U. requienii* aufweist, und der auch gewisse Beziehungen zur *tumidus*-Gruppe verrät. Die eigentümliche Ausbildung der Wirbelskulptur bei unserem *U. pictorum* aus der Donau weist auf eine Stromnetzverbindung von der unteren

*) I. R. Bourguignat, Annales de Malacologie I, 1870, p. 36, Taf. 3-4.

**) H. Drouet, Unionidées de la Serbie, 1882. Supplément 1884.

Donau bis zur Wolga hin, da alle dazwischen liegenden Flüsse, mit Einschluss der Maritza, den *U. gentilis* oder seine Übergangsform zum typischen *U. pictorum* besitzen.

2. *Unio tumidus* Retz.

Zwei Stücke aus der Donau bei Rustschuk, die ebenfalls gewisse Beziehungen zu *U. gentilis* aufweisen. Durch die Ausbildung von untereinander verbundenen Höckern auf den Wirbeln und den Besitz von radialen, hellen Strahlen auf der Epidermis als echte *U. tumidus* gekennzeichnet, zeigen sie eine Umrissgestalt, die durch den gestreckt geraden, dem Oberrande parallelen Unterrand an die von *U. pictorum* erinnert. Auch die eben genannte Wirbel-skulptur ist nicht die des typischen *U. tumidus* mit wellenförmigen, in spitzem Winkel zusammenstossenden Bogenleisten, sondern erscheint durch die geraden, zickzackartig geknickten Leisten, die höher vorspringende Höcker verbinden, als eine extrem stark ausgebildete *gentilis*-Skulptur. Wir müssen also den *U. tumidus* der Unterdonau als eine dem typischen *tumidus* ziemlich nahe stehende Zwischenform zwischen diesem und seiner gemeinsamen, hypothetischen Urform mit *U. pictorum*, resp. *U. requienii* betrachten.

3. *Unio consentaneus* Rossm.

6 Exemplare aus dem Isker, 1 aus der Donau bei Rustschuk und 4 junge aus der Donau bei Sistowo. Die angeführten 11 Stücke haben sämtlich einen von den *consentaneus*-Formen des oberen Donau-Gebietes abweichenden und an den der *Save*-Formen erinnernden Habitus, der sich hauptsächlich durch regelmässigeren, eiförmigen, aufgeblasenen Gestalt mit mehr median gelegenen Wirbeln und feinere Hauptzähne kundgibt. Bei jungen Exemplaren sind die Kardinalzähne ganz schmal lamellenförmig gestaltet und werden erst allmählich, im Laufe des Wachstumes, dreieckig-konisch, bei ganz alten, schwerschalenigen Muscheln wohl auch recht plump, doch nie so sehr wie bei den Oberdonau-Formen. Die *consentaneus*-Stücke aus dem Isker besitzen etwas stärkere Schalen wie die aus der Donau, doch dieser Unterschied wird sich durch stärkere Strömung im Isker wohl erklären lassen.

4. *Anodonta piscinalis letourneuxi* Bgt.

8 Stücke aus der Donau bei Sistowo, sämtlich ausgezeichnet durch einen hohen Flügel, der durch hintere Symphintie der Schalen, d. h. durch Überwachsen des Ligaments mit Schalensubstanz,

hervorgerufen wird. Einige Exemplare weisen eine kleine Flügelbildung auch am Vorderende auf. Auf Donau-Anodonten mit vorderer und, hauptsächlich, hinterer Symphintie hat Bourguignat*) sein Genus *Colletopterum*, das die Arten *letourneuxi*, *tanousi*, *praeclarum* und *eximium* umfasste, gegründet, und ich habe in der Neuen Folge von Rossmässlers *Iconographie****) seine Typen abgebildet und dargetan, dass wir alle *Colletopterum*-Arten als Formen der *Anodonta piscinalis* Nilss. betrachten müssen, die in dem mittleren und unteren Donauebiet die Symphintie erworben haben. Da der Besitz der Symphintie die betreffenden Anodonten als Lokalformen genügend charakterisiert, verdienen sie einen eigenen Namen und werden jetzt, nach der erstbeschriebenen *Colletopterum letourneuxi*, als *Anodonta piscinalis letourneuxi* Bgt. bezeichnet. Die drei anderen, vorhin genannten *Colletopterum*-Arten sind auf verschieden hoch geflügelte Donauanodonten gegründet.

5. *Pseudanodonta rosmässleri* Bgt.

Zwei Exemplare aus der Donau bei Rustschuk und sieben aus der Donau bei Sistowo. Durch Kobelt***) sind wir kürzlich unterrichtet worden, dass der Name *complanata* den Elbe-Pseudanodonten gebührt, und dass die Donauform künftig als *Pseud. rosmässleri* Bgt. zu bezeichnen ist. Die letztgenannte Art bewohnt, ohne stark zu variieren, die Donau in ihrer ganzen Länge und zeigt sich erst durch die obenerwähnten sieben Exemplare aus Sistowo in einer neuen Eigenschaft. Während die beiden Stücke aus Rustschuk klein geblieben sind und durch ihre feste Schale und die braune Epidermis den Aufenthalt in kiesigem Untergrund verraten, zeigen sich die Sistowoer Pseudanodonten dünnchalig und hellfarbig, wie wir es von den Bewohnern schlammiger Buchten gewohnt sind. Für den Aufenthalt in festem Schlamm spricht auch die Ausbildung eines hinteren und, bei zwei Exemplaren, auch eines vorderen Flügels, da sich derartige zarte Bildungen nur im Schutze einer ruhigen Umgebung halten können. Die Flügelbildung oder, um einen allgemein dafür gebrauchten Ausdruck zu verwenden, die Symphintie, ist eine bei Pseudanodonten bisher noch nie beobachtete Erscheinung, deren Auftreten bei den Donauformen umso interessanter ist, als wir sie schon bei *Anodonta*

*) F. Haas in *Iconogr.*, N. F., Bd. 18, p. 46, Taf. 471, 472.

**) *Iconogr.*, N. F., Bd. 18, p. 51.

piscinalis des gleichen Gebietes, der Lokalform *letourneuxi*, konstatiert hatten. Ich erwähnte (1. c.), dass die Symphintie für Bewohner von Binnenseen oder aus solchen abfließenden Gewässern charakteristisch ist und deutete die Flügelbildung bei den Anodonten der mittleren und unteren Donau als Eigenschaft, die ihnen als Bewohner des tertiären pannonischen Beckens, resp. seiner Abflüsse, zukommt. Der bisher einzig dastehende Fall von Symphintie bei Pseudanodonten wird also auf die gleiche Ursache wie bei den Anodonten zurückgeführt werden können. Dass bisher nie symphintote Donaupseudanodonten gefunden wurden, ist wohl so zu erklären, dass alle bis jetzt bekannten Stücke aus starkfließendem Wasser stammten, in dem sich die Pseudanodonten bekanntlich am wohlsten fühlen, in dem sie aber, wie auch die sonst symphintote Anodonta *piscinalis letourneuxi*, ihre Flügel durch Überrollen von Kies und dergl. verlieren. In seltensten Fällen, und ein solcher liegt hier vor, finden sich Pseudanodonten auch einmal in ruhigen Buchten mit Schlammgrund, wo sie, wie die dort normaler Weise lebenden Anodonten, ihre aus der Seezeit ererbte Eigenschaft der Symphintie ungestört ausbilden können.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Wohlberedt Otto

Artikel/Article: [Zur Molluskenfauna von Bulgarien 167-238](#)