

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 38

Leipzig 1963

Nr. 13

Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz II

Von WOLFGANG FISCHER

Institut für Landesforschung und Naturschutz, Zweigstelle Potsdam

(Leiter: Dr. K. H. Großer)

Die vorliegende Arbeit enthält mykologische Beobachtungen aus der Niederlausitz, die vom Verfasser im Rahmen vegetationskundlicher Geländearbeiten im Jahre 1961 gemacht wurden. Sie setzt die Reihe der mykologischen Notizen des 1. Beitrages zur Pilzflora der Niederlausitz (Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz, Band 37, H. 2, S. 223–234) fort. Der größte Teil der bemerkenswerten Fundorte liegt wiederum im Luckauer Becken. Allgemein gehaltene Angaben beziehen sich auf dieses Gebiet. Darüber hinaus liegen Beobachtungen aus den angrenzenden Teilen der Niederlausitz von Golßen, Lübben, Lübbenau, Vetschau und Calau vor.

Von A. ARNDT (A) wurden weitere in seinem Nachlaß gefundene mykologische Aufzeichnungen aufgenommen. Von Herrn Dr. K. H. MAR-SCHALLEK (M) erhielt der Verfasser eine Anzahl wertvoller Fundortsangaben aus der Gegend von Rietzneuendorf (nordöstlich Golßen), Lübben und Lubsko (Sommerfeld), die ebenfalls Berücksichtigung fanden. Für die Bestimmung einiger Arten aus der Ordnung *Poriales* möchte der Verfasser Herrn Dr. H. KREISEL, Greifswald, und Herrn W. DAHNKE, Parchim, an dieser Stelle seinen besonderen Dank aussprechen.

Ascobolaceae

Ascobolus stercorarius Bull. — Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum).

Pezizaceae

Lachnea hemisphaerica Wigg. — Zerstreut auf feuchtem Waldboden.

L. scutellata L. — Vetschau: Mühlenfließ bei Göritz (12. 9. 61).

Flicaria violacea Pers. — Luckau: Brandstelle am Buschteich bei Weissack, mit *Pholiota carbonaria* (27. 7. 61).

Humaria rutilans Fr. — Drehna am Sandteich, zahlreich auf feuchtem Sand in der Nähe des Ufers (17. 6. 61).

Rhizinaceae

Rhizina inflata Schaeff. — Rochauer Heide, zahlreich auf Brandplätzen südlich Neusorgefeld (13. 9. 61); Dornswalde, trockene Heide (M, 26. 6. 49).

Geoglossaceae

Mitrula paludosa Fr. — Luckau: Sandteich bei Drehna im nassen Kiefern-Birken-Bruch, auf Kiefernadeln (27. 6. 61); Bergener Moor in einem Abzugsgraben (Juni 1961).

Helvellaceae

Gyromitra esculenta Pers. — Nördlich Bergen im trockenen Kiefernwald, Jagen 127 (18. 3. 61); Höllenberge bei Langengrassau mehrfach (18. 4. 61).

Morchella hybrida Sow. — Senftenberg: Zwischen Almosen und Lindchen an der Chaussee (KRAUSCH, Mai 1960).

Verpa conica Mill. — Golßen: Zützener Busch, ein Exemplar im feuchten Eichen-Hainbuchenwald am Weg (KRAUSCH u. FISCHER, 18. 4. 61).

Helvella lacunosa Afz. — Am Sandteich bei Drehna, zahlreich und z. T. in Zwergexemplaren (27. 6. 61).

Auriculariaceae

Auricularia mesenterica Dicks. — Sonnewalde: Im Park und im Tiergarten zwischen Forsthaus Brehnitz und Zickerin, zahlreich an Ulmenstümpfen (16. 5. 61).

Tremellaceae

Sebacina incrustans (Pers.) Tul. — Sonnewalde: Im Tiergarten am Forsthaus Brehnitz (16. 5. 61); Luckau: Gehrener Quellen, Rasen von *Fegatella conica* dicht überziehend (Okt. 1961).

Exidia glandulosa Fr. — Luckau: Park von Görlsdorf, an einem Stamm von *Prunus padus* (20. 4. 61).

E. saccharina Fr. — Reichwalde: Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 26. 12. 32).

Tremellodon gelatinosum (Scop.) Fr. — Golßen: Alt-Buchhorst (A, 1925).

Exobasiadeae

Exobasidium vaccinii (Fuck.) Woronin — Häufig im Kiefernwald zwischen Weissack und Bergen an *Vaccinium vitis-idaea* (1961).

Bondarzewiaceae

Hericium ramosum (Bull. ex Merat) Letellier (= *Dryodon coralloides* Scop.) — Golßen: Rietzneuendorf, Staatsforst, an einer morschen Buche in 5 m Höhe, Riesenexemplar von ca. 2,5 kg (M, 5. 9. 1946).

Clavariaceae

Sparassis crispa (Wulf. ex Fr.) Fr. — Ziemlich häufig in Kiefernwäldern, z. B. bei Walddrehna und in der Kurzen Heide bei Kreblitz (1961).

Clavaria argillacea Pers. — Reichwalde: Kurze Heide, gesellig zwischen Heidekraut (A).

Ramaria invalii Cott. et Wakef. — Luckau: Schlagteich bei Bornsdorf, im Kiefern-Birken-Bestand einen Hexenring bildend (26. 7. 61); Calau: Kiefernwald südwestlich Koßwig (14. 9. 61).

R. cristata (Holmsk.) Ricken — Luckau: Nordufer vom Großen Teich bei Wanninchen, zahlreich unter Roteichen (27. 7. 61).

R. pyxidata Fr. — Luckau: Bergener Moor, besonders am Nordrand, mehrfach an Kiefernstümpfen (28. 7. 61); Reichwalde: An einem Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 21. 7. 54).

Coniophoraceae

Peniophora incarnata (Pers.) Cooke — Reichwalde: An der Berste an trockenen Ästen (25. 3. 61).

Fistulinaceae

Fistulina hepatica Schaeff. ex Fr. — Rietzneuendorf: Öfter an Eichenstämmen (M).

Ganodermataceae

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. — Häufig im Gebiet, z. B. bei Reichwalde in Mengen an Pappelstümpfen an der Berste; Weissacker Park an einem Lindenstumpf; Golßen: Wald am Gehege bes. an Eschenstümpfen; Am Schlagteich bei Bornsdorf an einem Eichenstumpf (1961).

G. lucidum (Leyss.) Karst. — Reichwalde: Kaseler Busch (A, 1919); Golßen: Laubwald Jagen 435, am Laubholzstumpf (M, 24. 7. 48); Waldow: An Eiche (M, 22. 6. 49); Luckau: Weissacker Park am Buschteich, ein gestieltes Exemplar an einem morschen Eichenstumpf (19. 4. 61).

Hydnaceae

Sarcodon subsquamosus Batsch — Lubsko (Sommerfeld): Kotsemke, Kiefernheide (M, Sept. 1936).

Calodon suaveolens Scop. — Freiwalde (A, 1. 10. 32).

C. nigrum (Fr.) Quél. — Luckau: Drehna, Roteichenbestand bei der Teichanlage am Weg zum Forsthaus Weinberg (16. 9. 61).

Hydnum fragile Fries — Reichwalde: Alt-Buchhorst, einen Ring bildend (A, 3. 9. 22).

Pleurodon auriscalpium (L.) Fr. — Luckau: Schlagteich bei Bornsdorf vereinzelt (26. 7. 61).

Hymenochaetaceae

Hymenochaete rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Lev. — Golßen: Zützener Busch, Eichenstumpf im feuchten Hainbuchen-Wald (18. 4. 61); Sonnewalde: Eichenstumpf im Tiergarten nahe Forsthaus Brehnitz (16. 5. 61).

Inonotus cuticularis (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Weissacker Park, mehrere Exemplare an einem Buchenstumpf und an einem Buchenstamm 3 m hoch (27. 7. 61).

I. hispidus (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Mehrfach an Apfelbäumen in der Calauer Vorstadt an der Chaussee nach Schlabendorf und bei den Scheunen (28. 7. 61); Calau: An der Straße nach Saßleben, an einem Apfelbaum (13. 9. 61); Vetschau: Apfelbaum an der Straße nach Duben (13. 9. 61).

I. obliquus (Pers.) Pilat — Luckau: Höllenberge bei Langengrassau an einer Birke (16. 5. 61).

I. radiatus (Sow. ex Fr.) P. Karsten — Im Gebiet ziemlich häufig, stets an Erlen, so besonders an der Berste bei Reichwalde, im Kaseler Busch, Gehrener Quellen bei Neu-Mühle (1961); verbreitet im Oberspreewald, so bei Lehde und Lübbenau (1961).

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. — Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum); Langengrassau, Schafteich am Nordfuß der Höllenberge an einem Fichtenstumpf (Sept. 1961).

Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilat — Luckau: Bergener Moor nordwestl. Bergen, im Kiefern-Moorwald (1961); Lübben: Kiefernwald am Briesener See (Juni 1961).

P. pomaceus (Pers.) Maire — Lübben: Duben, zahlreich an abgestorbenen Pflaumenbäumen an der Straße nach Luckau (1961); Luckau: In Gärten an *Prunus domestica* mehrfach (Juli 1961).

- P. ribis* (Schum. ex Fr.) Quél. — Reichwalde, an *Ribes rubrum* (12. 9. 61); Luckau: Park in Görlsdorf, an *Ribes alpinum* (20. 4. 61); Luckau: In Gärten an *Ribes grossularia* und *R. rubrum* mehrfach (Juli 1961).
- P. robustus* (P. Karsten) Bourd. & Galzin — Wiesenburger Park an Eichen (1961); Sandteich bei Drehna an Eichen (1961); Luckau: Wannincher Mühle und am Gr. Teich bei Wanninchen an Eichen (1961); Park in Zinnitz zahlreich an alten Eichen (1961); Park in Weissack mehrere Fruchtkörper an einer Robinie (1961).
- P. trivialis* (Bres.) Kreisel — Ziemlich häufig an Weiden, so besonders an der Studenitz bei Willmersdorf, im Frankendorfer Moor und in Terpt (1961); verbreitet im Oberspreewald zwischen Lübben und Lübbenau und bei Altzauche (1961).

Poriaceae

- Fomes fomentarius* (L. ex Fr.) Kickx. — Luckau: Zahlreich an *Betula verrucosa* und *B. pubescens* im Moorwald am Gr. Teich bei Wanninchen (1961); Golßen: Wald am Gehege viel an *B. pubescens* (1961).
- Gloeophyllum abietinum* (Bull. ex Fr.) P. Karsten — Wiesenburger Park, Fichtenstümpfe (1961).
- G. sepiarium* (Wulf. ex Fr.) P. Karsten — Luckau: Fichtenstümpfe im Park von Weissack (19. 4. 61), im Park von Görlsdorf (20. 4. 61) und im Park von Drehna (20. 4. 61).
- Meripilus giganteus* (Pers. ex Fr.) P. Karsten — Reichwalde: Kaseler Busch an Ulme (A, 1944).
- Hapalopilus nidulans* (Fr.) P. Karsten — Lübbenau: An Birkenstangenholz nahe der Straße zwischen Gr. Lübbenau und Bischdorf, im Eichen-Birken-Wald (14. 9. 61); Luckau: An abgefallenen Ästen der Roteiche am Gr. Teich bei Wanninchen und am Sandteich bei Drehna (Juli 1961).
- Laetiporus sulphureus* Bull. — Im Gebiet nicht selten, so an Eichenstümpfen im Park von Weissack, am Gr. Teich bei Wanninchen und an den Reptener Teichen (1961); Golßen: Eichenstumpf im Laubwald nördlich der Stadt (1961); im Spreewald zwischen Lehde und Lübbenau an *Salix alba* in 6 m Höhe (10. 6. 61).
- Osmoporus odoratus* (Wulfen ex Fr.) Singer — Luckau: Fichtenstümpfe im Park von Weissack zahlreich, ferner am Ziegelteich im Park von Drehna (1961); Sonnewalde: Im Tiergarten nicht selten an Fichtenstümpfen (1961).
- Poria versipora* (Pers.) Baxter — Häufig an trockenen, abgefallenen Ästen verschiedener Laubgehölze.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Fr. — Luckau: Bergen am Weg zum Forsthaus Weinberg zahlreich an Espenholz (19. 5. 61); Lübben: Am Südufer vom Briesen-See, an einem Birkenstumpf (Juni 1961).

Gloeoporus amorphus (Fr.) Clem. et Shear — Ziemlich häufig an Kiefernstümpfen.

Trametes betulina (L. ex Fr.) Pilat — Reichwalde: Kaseler Busch, zahlreich an einem Eichenstumpf (25. 3. 61); Sonnewalde: An Eichenkoppelpfählen an der Straße nach Zickerin (12. 6. 61).

T. hirsuta (Wulfen ex Fr.) Pilat — Lübben: Am Briesener See (11. 6. 61); Luckau: Östlich Gehren an der Chaussee, an Kirschbaumholz (15. 9. 61.).

T. mollis (Sommerf.) Fr. — Nördlich Reichwalde an der Berste, an abgefallenen Ästen (25. 3. 61) (det. KREISEL). In Deutschland sehr seltene, montane Art, die bisher in Brandenburg nicht beobachtet wurde.

T. suaveolens (L. ex Fr.) Fr. — Reichwalde: Nördlich des Dorfes, an Weiden und Schwarzpappeln (15. 3. 61), im Herrenbusch an Weiden (A); Luckau: Bornsdorf am Ufer des Schlagteiches, mehrfach an Weiden (Juli 1962).

T. serialis Fr. — Sonnewalde: Tiergarten am Forsthaus Brehnitz, an Fichtenstümpfen (April 1961).

Tyromyces fissilis (Berk. & Curt.) Donk. — Lübben: An einem Apfelbaum am Wall (14. 9. 61).

Stereaceae

Stereum purpureum (Pers. ex Fr.) Fr. — Luckau: Birkenstümpfe südlich Bornsdorf (19. 4. 61).

S. rugosum (Pers. ex Fr.) Fr. — Luckau: Gahroer Buchheide, an Hainbuchen (19. 4. 61); Park in Drehna am Ziegelteich, an Erlen (27. 7. 61); Park in Zinnitz an Hainbuchen (Juli 1961).

S. sanguinolentum (Alb. & Schw. ex Fr.) Fr. — Park in Zinnitz, an Fichtenstümpfen (Juli 1961).

Polyporaceae

Folyporus squamosus (Huds. ex Fr.) Fr. — Im Gebiet verbreitet, besonders an Weichhölzern. Sonnewalde: Ulmenstümpfe im Tiergarten mehrfach (April 1961); Luckau: Stadtgraben am Turm, an Apfelbaum und Eschenahorn (14. 9. 61); in Walddrehna an Roßkastanie (Sept. 1961).

P. arcularius Batsch ex Fr. — Luckau: Park in Görlsdorf, an einem morschen Eichenstumpf (20. 4. 61).

- P. brumalis* Pers. ex Fr. — Im Gebiet verbreitet an abgefallenen Ästen und an Laubholzstümpfen und -stubben.
- P. confluens* (A. et Schw.) Fr. — Lübben: Staakow, sandige Heide (M., 17. 9. 50); Reichwalde: Hammelstall (A, 1915).
- P. ovinus* (Schaeff.) Fr. — Luckau: Wehnsdorf, häufig truppweise im trockenen Kiefernwald (M, 8. 9. 46); Reichwalde: Kurze Heide (A, ohne Datum).
- P. leucomelas* (Pers.) Fr. — Lübben: Staakow und Dornswalde, trockene Kiefernheide (17. 9. 50).

Boletaceae

- Boletus appendiculatus* Schaeff. — Luckau: Am Forsthaus Weinberg, im Buchenwald 3 Exemplare (15. 9. 61). In Brandenburg sehr selten beobachtet, so in dem Tegeler Forst (Berlin) (STRAUS, 1959).
- B. satanas* Lenz. — Reichwalde (A, 1915). In Brandenburg ist der Satanspilz bisher nur aus der Triglitzter Gegend in der Prignitz (JAAP, 1922) bekannt. Ein weiteres fragwürdiges Vorkommen erwähnt ULBRICH (1937) von Frankfurt/Oder.
- B. luridus* Fr. — Fichtenau (A, 1915); Luckau: Am Gr. Teich bei Wanninchen (Juli 1961); Wehnsdorf, im trockenen Kiefernwald (M, 7. 9. 46).
- Suillus piperatus* (Bull. ex Fr.) Kuntze — Reichwalde: Kurze Heide (1961).
- Xerocomus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél. — Lubsko (Sommerfeld): Kotsemke am Forsthaus, im feuchten Kiefern-Birken-Wald, alljährlich erscheinend Ende Juli/August (M).

Paxillaceae

- Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr. — Häufig, aber meist einzeln, an Kiefernstümpfen, in Wald- und Forstgesellschaften.
- P. panuoides* Fr. — Luckau: Kiefernstümpfe im Bergener Moor (1961).

Gomphidiaceae

- Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. — Lübben: Rietzneuendorf, im Garten unter Spitzpappeln (M).
- G. roseus* (L.) Fr. — Lübben: Rietzneuendorf, Nadelwald (M, 1948).

Hygrophoraceae

- Hygrocybe cantharellus* (Schw.) Lge. — Luckau: Bergener Moor, Torfstich II, im Schwingrasen von *Sphagnum medium* (1961).
- H. miniata* (Scop. ex Fr.) Karsten — Golßen: Freidorf, zwischen Gras und hohen Wiesen (M, 17. 9. 61).

Hygrophorus hypotheius Fr. — Zerstreut in Kiefernwäldern, vor allem im Spätherbst nach Frühfrösten auftretend.

H. eburneus (Bull.) Fr. — Golßen: Freidorf, an der Försterei Semmelei (M, 17. 9. 50).

Tricholomataceae

Lyophyllum aggregatum (Schaeff. ex Fr.) Kühn. — Luckau: Bei den Scheunen auf den Druschabfällen zahlreich (28. 7. 61).

Clitocybe brumalis (Fr.) Quél. — Reichwalde: Kurze Heide, im Kiefernwald (Sept. 1961).

C. metachroa (Fr.) Quél. — Reichwalde: Kurze Heide (A).

Collybia cirrhata (Schum. ex Fr.) Quél. — Luckau: Nördlich Pademack im Kiefernwald (Sept. 1961).

C. confluens (Pers. ex Fr.) Quél. — Luckau: Weissacker Park zahlreich (Juli 1961).

C. maculata (A. et Schw. ex Fr.) Quél. — Ragow, feuchte Kiefernheide (M, 1937); Lübbenauer Heide nördlich Calau mehrfach (Sept. 1961).

Tricholoma albobrunneum (Fr.) Quél. — Alt-Buchhorst (A, 17. 9. 22).

T. colossum (Fr.) Quél. — Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Kiefernheide (M, Sept. 1936 u. 1937).

T. luridum Schaeff. — Golßen: Freiwalde (A, 14. 10. 18).

T. flavobrunneum (Fr.) Quél. — Im Gebiet nicht selten, charakteristisch für Kiefern-Birken-Bestände auf frischen Rohhumusböden, so z. B. Luckau: Bei den Bornsdorfer Teichen; Lübbenauer Heide nördlich Calau; Vetschau: Wald zwischen Boblitz u. Raddusch; Vetschau: Bei Göritz am Mühlenfließ (1961).

T. flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund. — Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Sept. 1961).

Phyllotopsis nidulans (Pers. ex Fr.) Quél. — Reichwalde: An einem Kiefernstock in der Kurzen Heide (A, 26. 10. 52).

Panus conchatus (Bull.) Fr. — Luckau: Groß-Krausnick am Weg nach Wehnsdorf, an einem Birkenstumpf (Sept. 1961).

P. tigrinus (Bull. ex Fr.) Sing. — Luckau: An der Chaussee nach Duben an Apfelbäumen mehrfach (28. 7. 61).

Lentinus lepideus Fr. — Golßen: Rietzneuendorf, an Kiefer (M, 9. 6. 48); Lübben: Altzauche im Umflutkanal, an einem Schleusentor (10. 6. 61); Drehnaer Park, Fichtenstümpfe am Ziegelteich (Juni 1961); Park von Weissack, Kiefernstumpf (26. 7. 61).

Schizophyllum commune Fr. — Im Gebiet ziemlich verbreitet, so bei Reichwalde an der Berste massenhaft an gefällten Erlenstämmen (25. 3. 61); Bergener Moor und Görldorfer Park an Erlenholz (April 1961); Weissacker Park an Buchenholz (27. 7. 61); Lübben: Nördlich Tornow an Eichenholz, im Eichen-Birken-Wald (15. 9. 61); zwischen Calau und Saßleben an Eichenästen (14. 9. 61).

Oudemansiella platyphylla (Pers. ex Fr.) Mos. — Sonnewalde: Tiergarten, an einem Buchenstumpf (1961).

O. radicata (Relh. ex Fr.) Bours. — Weissacker Park (Juli 1961).

Pseudohiatula conigena (Pers. ex Fr.) — Zerstreut in den Kiefernwäldern, Höllenberge bei Langengrassau mehrfach; Bergener Moor; Wald nördlich Bergen; Gr. Teich bei Wanninchen; Pademacker Teich (April 1961).

P. tenacella (Pers. ex Fr.) — Luckau: Kiefernwald nördlich Bergen (März 1961).

Baeospora myosura (Fr.) Sing. — Luckau: Pademack am Weg nach Zinnitz, im Kiefernwald (15. 9. 61).

Marasmius perforans (Hofm. ex Fr.) Sing. — Höllenberge bei Langengrassau, auf Fichtennadeln (Juli 1961).

M. rotula (Scop. ex Fr.) Fr. — Reichwalde, Busch (A, 1916).

M. peronatus (Bolt. ex Fr.) Sing. — Luckau: Im Park von Drehna, unter Fichten (Juli 1961).

Mycena pura (Pers. ex Fr.) Quél. — Luckau: Buchenwald am Drehnaer Sandteich; Weissacker Park (Juli 1961).

M. sanguinolenta (A. et Schw. ex Fr.) Quél. — Luckau: Am Schlagteich bei Bornsdorf (26. 7. 61).

M. olida Bres. — Luckau: Park in Drehna, an einem Laubholzstumpf (27. 7. 61).

Amanitaceae

Volvariella speciosa (Fr.) Sing. — Luckau: An den Scheunen, auf Druschabfällen mit *Agaricus hortensis* und *Lyophyllum aggregatum* (28. 7. 61).

V. bombycina (Pers. ex Fr.) Sing. — Golßen: Rietzneuendorf, feuchter Laubwald, schönes, großes Exemplar im Astloch einer Pappel (M, 1946); Luckau: Pademack am südlichen Dorfausgang, im hohlen Stumpf von *Acer platanoides* (29. 6. 61).

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. — Luckau: Nördlich Groß-Krausnick am Weg nach Wehnsdorf, im Eichen-Birken-Wald (15. 9. 61); Weissacker Park, unter Eichen am Schloß (27. 7. 61).

A. porphyrea (A. et Schw. ex Fr.) Secr. — Staakow, sandige Heide (M, 17. 9. 50); Lübbenauer Heide 2 km nördlich Calau (14. 9. 61).

Agaricaceae

Lepioto naucina Fr. (non auct.) — Golßen: Waldow (M, 22. 6. 49).

L. serena (Fr.) Sacc. — Golßen: Rietzneuendorf, im trockenen Grase (M, 3. 9. 50).

Agaricus silvicolus (Vitt.) Sacc. — Calau: Am Seesenteich in der Lübbenauer Heide (14. 9. 61).

A. cretaceus Fr. — Lübben: Steinkirchen, am Spreedeich südlich des Dorfes massenhaft (M, 31. 8. 37).

A. bisporus (Lge.) Sing. — Luckau: An den Scheunen, auf Druschabfällen massenhaft (28. 7. 61).

Cortinariaceae

Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karsten — Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Sept. 1961); Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Kiefernheide (M, 3. 10. 37).

Galerina hypnorum (Schränk ex Fr.) Kühn. — Ziemlich häufig in frischen Kiefernwäldern, meist im Rasen von *Pleurozium schreberi*.

Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing. — Lübbenauer Heide nördlich Calau (14. 9. 61); Luckau: Nördlich Tornow, an einem Eichenstumpf (15. 9. 61).

G. sphagnorum (Pers. ex Fr.) Kühn. — Luckau: Bergener Moor, im Rasen von *Sphagnum medium* (Juli 1961).

Myrxacium delibutum (Fr.) Ricken — Kotsemke bei Lubsko (Sommerfeld), trockene Heide (M, 1937).

M. vibratile (Fr.) Ricken — Staakow (M, 17. 9. 50).

Phlegmacium orichalceum (Batsch) Fr. — Golßen: Rietze, Staatsforst unter Eichen (M, 8. 10. 50).

Crepidotaceae

Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Quél. — Lübben: Kiefernwald östlich Terpt, an trockenen Ästen (15. 9. 61).

Strophariaceae

Pholiota subsquarrosa Fr. — Golßen: Rietze, Staatsforst an lebender Buche (M, 9. 10. 50).

P. squarrosa Müll. — Golßen: Staatsforst, an Wurzeln einer Esche (M, 1943); Reichwalde: Kaseler Busch (18. 10. 36).

Naematoloma capnoides (Fr.) Karsten — Großkrausnicker Heide, an Kiefernstümpfen (15. 9. 61).

N. sublateralitium (Fr.) Karsten — Lübbenauer Heide nördlich Calau; Großkrausnicker Heide (Sept. 1961).

Bolbitiaceae

Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr. var. *titubans* (Bull. ex Fr.) — Reichwalde, an Kuhfladen (20. 10. 37).

Agrocybe praecox (Pers.) Fay. — Luckau: Südlich Bergen, im Junco-Molinietum (März 1961).

Coprinaceae

Panaeolus campanulatus (L.) Fr. — Ziemlich häufig auf Dungplätzen, in Wäldern und auf Weiden.

Psathyrella Candolleana (Fr.) — Reichwalde, in Gärten; Luckau am Stadtgraben (Sept. 1961); Lübben: Baumstumpf in Lehde (10. 6. 61).

P. velutina (Pers. ex Fr.) Sing. — Luckau: Weissacker Park (27. 7. 61).

Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr. — Ziemlich häufig an Laubholzstümpfen.

Russulaceae

Russula delica Fr. — Luckau: Weissacker Park (27. 7. 61).

R. claroflava Grv. — Briesener See bei Lübben (11. 6. 61); Weissack am Buschteich; Schlagteich bei Bornsdorf (27. 7. 61).

R. cyanoxantha (Schaeff.) Secr. — Park von Zinnitz (27. 7. 61).

R. badia Quél. — Luckau: Am Sandteich bei Drehna (26. 7. 61).

R. xerampelina (Schaeff.) Fr. — Luckau: Am Gr. Teich bei Wanninchen (27. 7. 61).

R. pectinatoides Peck — Golßen: Rietzneuendorf, zwischen trockenem Gras (M, 1948).

R. sardonica Fr. — Zerstreut in den Kiefernwäldern, bei Vetschau; Göritz am Mühlenfließ auch im Eichen-Birken-Wald (14. 9. 61).

R. decolorans Fr. — Luckau: Kiefernwald zwischen Bergen und Weissack; Rochauer Heide bei Neusorgefeld (Juli 1961).

R. virescens (Schaeff.) Fr. — Golßen: Dornswalde (M, 1949).

Lactarius theiogalus Bull. ex Fr. — Sonnewalde: Am Forsthaus Brehnitz im Eichen-Hainbuchen-Wald (Juli 1961).

L. vietus Fr. — Zerstreut in feuchten Birken-Kiefern-Mischbeständen, so an den Borsdorfer Teichen und im Drehnaer Park am Ziegelteich (Sept. 1961).

L. pyrogalus (Bull.) Fr. — Golßen: Rietzneuendorf, im Grase eines Gartens (M, 13. 9. 46).

Lycoperdaceae

Calvatia caelata (Bull.) Morg. — Kotsemke bei Lubsco (Sommerfeld), einzeln (M, 1937); Lübbenauer Heide am Nordufer des Seesenteiches (14. 9. 61).

C. saccata (Vahl.) Morg. — Reichwalde, Erlen-Eschen-Wald an der Berste (März 1961).

Sclerodermataceae

Pisolithus arenarius Alb. & Schw. — Lubsco (Sommerfeld): Kotsemke, trockene Heide zerstreut (M).

Nidulariaceae

Cyathus striatus Huds. — Luckau: Weissacker Park, zahlreich an einem Eichenstumpf und auf dem Hauptweg des Parkes (27. 7. 61).

Literatur

JAAP, O. (1922): Weitere Beiträge zur Pilzflora von Triglitz in der Prignitz. — Verhandl. botan. Ver. Prov. Brandenburg **64**, S. 1-60.

ULBRICH, E. (1938): Das Pilzjahr 1937. — Verhandl. botan. Ver. Prov. Brandenburg **78**, S. 1-27.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Fischer, wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle/S.,
Zweigstelle Potsdam,
Potsdam-Babelsberg, Wichgrafstraße 6

Verlag: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany · Druckgen. Nr. 105/48/63

III/14/8 VEB Graphische Werkstätten Zittau-Görlitz 0,5 1761

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang

Artikel/Article: [Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz II 1-12](#)