

# ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 39

Leipzig 1964

Nr. 15

## Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz III

Von WOLFGANG FISCHER

Institut für Landesforschung und Naturschutz, Zweigstelle Potsdam  
(Leiter: Dr. K. H. Großer)

Der vorliegende Beitrag umfaßt bemerkenswerte mykologische Beobachtungen des Verfassers in der westlichen Niederlausitz aus den Jahren 1962 und 1963. Ein kleinerer Teil des Beobachtungsmaterials stammt wiederum aus dem Luckauer Becken, der größere Teil aus den sich südlich anschließenden Landschaften des Kirchhain-Finsterwalder Beckens und der Bad Liebenwerdaer Heide. Es wurden folgende Waldschutzgebiete (Naturschutzgebiete) mykologisch durchmustert: „Tannenbusch“ südwestlich Groß Mehßow (Abt. 158, 161–162), „Weberteich“ 2 km ostnordöstlich von Oppelhain (Abt. 3, 4, 8, 9), „Suden“ 14 km nordöstlich Elsterwerda im Revier Gorden (Abt. 150–152, 155–156), „Schadewitz“ nördlich der Försterei Schadewitz (Abt. 51), „Grünhaus“ 1 km westlich der Försterei im Revier Zollhaus (Abt. 134), „Hohe Warte“ an der Försterei im Revier Weißhaus (Abt. 118, 133–135), „Friedersdorfer Tiergarten“ 1 km südöstlich von Friedersdorf (Abt. 321 a) und „Buchwald bei Doberlug“ (Abt. 72 und 73). Die fünf ersten Schutzgebiete enthalten überwiegend Nadelwald und liegen im Bereich natürlicher Fichtenvorkommen. Im Friedersdorfer Tiergarten und Buchwald bei Doberlug stocken auf reicheren Böden teilweise anspruchsvollere Laubwälder. Dasselbe gilt auch für das Eichen-Hainbuchen-Waldgebiet zwischen der Försterei Brehnitz und der Straße von Sonnenwalde nach Zeckerin, das als die Fasanerie bezeichnet wird.

Die Nomenklatur der Schlauchpilze (Ascomycetes) folgt MOSER (1963), die der Porlinge im weiteren Sinne (Poriales, Polyporaceae) KREISEL

(1961) und die der Blätter- und Bauchpilze (Agaricales, Gasteromycetes) MOSER (1955). (Abkürzung NSG = Naturschutzgebiet)

#### Humariaceae

*Humaria hemisphaerica* (Wiggers ex Fr.) Fuckel — Friedersdorfer Tiergarten und Fasanerie, häufig auf feuchtem, schattigem Waldboden (26. 9. 1963).

#### Pezizaceae

*Peziza badia* Pers. ex Fr. — Groß Mehßower Tannenbusch und Friedersdorfer Tiergarten, auf feuchtem, nacktem Waldboden (September 1963).

#### Sarcoscyphaceae

*Sarcoscypha coccinea* (Fr.) Lambotte — NSG Schadewitz, Wegböschung (25. 9. 1963).

#### Geoglossaceae

*Mitrula paludosa* Fr. — Luckau: Hochmoor-Schwingrasen zwischen Wannichen und Stiebsdorf, Abt. 262 an der sog. Salzlecke, mehrere Exemplare im submersen Sphagnum-Rasen auf Kiefernadeln (7. 5. 1962).

#### Helotiaceae

*Coryne sarcoides* (Jacq. ex Fr.) Tul. — In Suden auf Eichenstubben (24. 9. 1963); Hohe Warte auf Buchenstubben bei der Försterei (25. 9. 1963).

#### Helvellaceae

*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr. — Luckau: 1 km östlich Trebbinchen am Weg nach Bergen, 3 Exemplare im armen Kiefernwald, mit *Pseudohiatula tenacella* (7. 5. 1962).

#### Tremellaceae

*Tremella mesenterica* Retz. — In der Fasanerie nahe am Sonnewalder Park, an einem trockenen Ast (26. 9. 1963).

*Tremellodon gelatinosum* (Scop.) Fr. [*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop. ex Fr.) Karst.] — Fasanerie, nahe der Försterei Brehnitz am Hauptweg nach Sonnewalde, auf mehreren Fichtenstümpfen (26. 9. 1963).

#### Exobasidiaceae

*Exobasidium vaccinii* (Fuck.) Woronin — NSG Weberteich, auf Blättern von *Vaccinium vitis idaea* zahlreich (24. 9. 1963).

## Clavariaceae

*Sparassis crispa* (Wulf. ex Fr.) Fr. — NSG Suden, auf Kiefernstümpfen (24. 9. 1963).

*Ramaria cristata* (Holmsk.) Ricken — In Laub- und Erlenbruchwäldern auf nacktem, feuchtem Boden, so bei Wannichen (Abt. 262), Weberteich, Suden, Grünhaus und Friedersdorfer Tiergarten (September 1963).

*Ramaria abietina* Fr. (*R. invalii* Cott. et Wakef.) — Im NSG Grünhaus, in der Fichtennadelstreuschicht (25. 9. 1963).

## Fistulinaceae

*Fistulina hepatica* Schff. ex Fr. — Buchwald bei Doberlug, Friedersdorfer Tiergarten und Fasanerie bei Sonnewalde, vereinzelt an Eichenstümpfen (September 1963).

## Hymenochaetaceae

*Inonotus hispidus* (Bull. ex Fr.) Karst. — An Apfelbäumen 1 km südöstlich Drehna am Weg nach Tugam (8. 5. 1962).

*Inonotus obliquus* (Pers.) Pilat — Luckau: Weissacker Moor westlich Weissack, Birke am Torfstich XII (7. 5. 1962).

*Inonotus radiatus* (Sow. ex Fr.) Karst. var. *nodulosus* (Fr.) Pilat — An herabgefallenen, trockenen Buchenzweigen, so im NSG Hohe Warte (25. 9. 1963) und im Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963).

*Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. — Kiefernwald am Wege zwischen Trebbinchen und Bergen, mehrere ungestielte Fruchtkörper auf einem Kiefernstubben (22. 10. 1962).

*Phellinus pini* (Thore ex Fr.) Pilat — Luckau: Großer Teich bei Wannichen, Südufer (7. 5. 1962). Luckau: im Hochmoor an der Wanninchener Mühle (Abt. 262), bei der Salzlecke (8. 5. 1962).

*Phellinus trivialis* (Bres.) Kreisel — Luckau: Wanninchener Mühle am Fließ (Abt. 262), an Kopfweiden (26. 10. 1963).

*Phellinus robustus* (Karst.) Bourd. & Galzin — An Stieleichen im Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963). — Anmerkung: Bei der im ersten Beitrag (S. 225) irrtümlich mit *Fomes roburneus* Fr. bezeichneten Art ist *Phellinus robustus* (Karst.) Bourd. & Galzin gemeint.

*Fomitopsis pinicola* (Swart ex Fr.) Karst. — Hochmoor an der Wanninchener Mühle, etwa 100 m nördlich der Salzlecke in der Abt. 262, 1 Exemplar am Stamm einer Sumpfkiefer (*Pinus silvestris* f. *turfosa*) (7. 5. 1962).

## Poriaceae

*Hapalopilus nidulans* (Fr.) Karst. — Buchwald bei Doberlug, Riesenexemplare an einem abgestorbenen Birkenstamm (24. 9. 1963). Groß Mehßower Tannenbusch, an gefällten Eichen, zahlreich (23. 9. 1963).

*Laetiporus sulphureus* Bull. — Park in Golßen, an einem stark vermoderten Weidenstamm (8. 5. 1962). Buchwald bei Doberlug, an einer Eiche (24. 9. 1963). Friedersdorfer Tiergarten, an Eichenstümpfen (26. 9. 1963).

*Osmoporus odoratus* (Wulfen ex Fr.) Singer — An Fichtenstümpfen, im Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963), Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963) und im NSG Grünhaus, wo die Fichte autochthon wächst (25. 9. 1963).

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Fr. — Luckau: 1 km südöstlich Trebbinchen am Weg Borndorf-Bergen, auf Birkenzweigen am Rande einer Sumpfwiese (22. 10. 1962).

*Trametes gibbosa* (Pers. ex Fr.) Fr. — Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963) und bei der Försterei Hohe Warte (25. 9. 1963), an Buchenstümpfen. Garrenchen an der Straße nach Luckau, große Exemplare an Stubben der Schwarzpappel (8. 5. 1962).

*Trametes hirsuta* (Wulfen ex Fr.) Pilat — Park in Golßen, an Roßkastanienstümpfen (8. 5. 1962). Buchwald bei Doberlug, an trockenen Buchenästen (24. 9. 1963).

*Trametes unicolor* (Bull. ex Fr.) Cooke — Buchwald bei Doberlug, zahlreich an einem gefällten Buchenstamm (24. 9. 1963).

*Trametes suaveolens* (L. ex Fr.) Fr. — Garrenchen, Pappelstümpfe an der Luckauer Chaussee, mehrfach (8. 5. 1962).

*Trametes serialis* Fr. — Buchwald bei Doberlug, Fichtenstümpfe (24. 5. 1963).

*Tyromyces caesioides* (Schröd. ex Fr.) (Murill — NSG Grünhaus, an abgestorbenem Fichtenstangenholz (25. 9. 1963).

*Tyromyces fragilis* (Fr.) Donk. — Im NSG Wacholderheide Sellendorf, an trockenen Kiefernzweigen (27. 9. 1963).

*Tyromyces albidus* (Schff. ex Secr.) Donk — An Fichten- und Kiefernholz, wohl häufig, so im Groß Mehßower Tannenbusch, Grünhaus, Schadowitz, Buchwald bei Doberlug und Fasanerie bei Sonnenwalde. Im NSG Schadowitz wächst an einem Kiefernstumpf eine Form mit ausgebreiteten, flachen und kurz gestielten Hüten (September 1963).

*Meripilus giganteus* (Pers. ex Fr.) Karst. — Friedersdorfer Tiergarten, einige große Exemplare neben Eichenstümpfen (24. 9. 1963).

*Gloeophyllum trabeum* (Pers. ex Fr.) Murill. — Luckau: Laubholzstümpfe am Stadtgraben beim Hotel Moorbad (12. 9. 1961).

*Grifola frondosa* (Dicks. ex Fr.) S. F. Gray — Sonnewalde: Fasanerie bei der Försterei Brehnitz, an einem Eichenstumpf (26. 9. 1963).

*Ceriumyces albus* Corda — NSG Suden bei Gorden, an einem modernden Roteichenstumpf (24. 9. 1963).

#### Ganodermataceae

*Ganoderma lucidus* (Leyss.) Karst. — Sonnewalde: Fasanerie nahe der Straße nach Zeckerin, mehrere kleine, aber langgestielte Fruchtkörper an einem Eichenstumpf (23. 9. 1963). Luckau: Wanninchener Mühle, Eichenstumpf am Fließufer (Abt. 261), mehrere Fruchtkörper (26. 9. 1963).

#### Meruliaceae

*Merulius tremellosus* Schrad. ex Fr. — Buchwald bei Doberlug, an abgebrochenen Buchenästen (24. 9. 1963).

*Phlebia aurantiaca* (Sow. ex Fr.) Karst. — Groß Mehßower Tannenbusch, an einem Kiefernstumpf (23. 9. 1963). NSG Suden, an einem Fichtenstumpf (24. 9. 1963).

#### Polyporaceae

*Polyporus leucomelas* (Pers.) Fr. — Im NSG Wacholderschluchten Hohendorf, Kiefernwald (7. 9. 1963).

*Polyporus ovinus* (Schff.) Fr. — Forst Baruth, 3 km südlich Baruth, im Kiefernwald an der Chaussee nach Golßen (22. 10. 1962).

#### Cantharellaceae

*Cantharellus infundibuliformis* Scop. — Einzelne Exemplare auf stark vermoderten Baumstümpfen, so im Groß Mehßower Tannenbusch und Hohe Warte nahe der Försterei (September 1963).

#### Boletaceae

*Suillus Grevillei* (Klotzsch) Sing. — Unter Lärchen häufig, bisher in den NSG'en Weberteich, Suden und Grünhaus beobachtet (September 1963).

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) S. F. Gray — Buchwald bei Doberlug, hat auffallend rote Stielschuppen und schwärzt an Druckstellen stark (24. 9. 1963).

*Leccinum testacea-scabrum* (Secr.) Sing. — Zahlreich und in großen Exemplaren unter Birken im NSG Wacholderschluchten Hohendorf (27. 9. 1963).

#### Paxillaceae

*Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr. — NSG Schadewitz und NSG Wanninchen (Abt. 262), auf Kiefernstümpfen (September 1963).

*Paxillus panuoides* Fr. — NSG Wacholderschluchten Hohendorf und NSG Wanninchen (Abt. 133), mehrfach an trockenen Kiefernästen (September 1963).

#### Gomphidiaceae

*Gomphidius glutinosus* (Schff.) Fr. — Finsterwalde: NSG Grünhaus, mehrfach im Fichtenwald (25. 9. 1963).

*Gomphidius roseus* (L.) Fr. — NSG Wacholderschluchten Sellendorf, Suden und Grünheide, stets in Gesellschaft mit *Suillus bovinus* (September 1963).

#### Hygrophoraceae

*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. — Buchwald bei Doberlug, vereinzelt unter Buchen (24. 9. 1963).

*Hygrophorus hypothejus* Fr. — Luckau: Kiefernwald zwischen Bergen und Trebbinchen (22. 10. 1962).

*Hygrophorus olivaceoalbus* Fr. — Friedersdorfer Tiergarten, eine Gruppe dickschleimiger Exemplare (26. 9. 1963).

*Camarophyllus virgineus* (Wulf. ex Fr.) Karst. — Baruth: Im Grase der Chausseeränder nach Golßen (22. 10. 1962).

*Camarophyllus pratensis* (Pers. ex Fr.) Karst. — NSG Hohe Warte, Grasplatz am Wegrand (25. 9. 1963).

#### Tricholomataceae

*Clitocybe odora* (Bull. ex Fr.) Quel. — Im NSG Suden unter Eichen (24. 9. 1963).

*Collybia cirrhata* (Schum. ex Fr.) Quel. — NSG Weberteich (24. 9. 1963). NSG Wanninchen, auf Resten von *Lactarius vellereus* (26. 9. 1963).

*Collybia tuberosa* (Bull. ex Fr.) Quel. — Groß Mehßower Tannenbusch, auf feuchtem, grasigem Weg, mit dunkelbraunem, glänzendem Sklerotium (23. 9. 1963).

*Collybia cookei* (Bres.) J. D. Arnold. — Auf stark vermoderten Baumstümpfen, NSG Hohe Warte und Fasanerie bei Sonnewalde, mit kleinerem, hellbraunem Sklerotium (September 1963).

*Collybia fusipes* (Bull. ex Fr.) Quel. — Buchwald bei Doberlug, Eichenstumpf (24. 9. 1963).

*Omphalina umbellifera* (L. ex Fr.) Quel. — Luckau: NSG Wanninchen, feuchte Moorerde im Birkenbruch (26. 9. 1963).

*Omphalina philonotis* (Lasch ex Fr.) Quel. — Hochmoorrassen im NSG Wanninchen zahlreich (7. 5. 1962).

*Tricholoma flavobrunneum* (Fr.) Quel. — In frischen Laub- und Kiefern-mischwäldern unter Birken, meist zahlreich, so Groß Mehßower Tannenbusch, Buchwald bei Doberlug, Wanninchener Mühle (Abt. 263) und NSG Wacholderschluchten Hohendorf (September 1963).

*Tricholoma albobrunneum* (Fr.) Quel. — NSG Suden und NSG Wanninchen, unter Birken an feuchten Stellen (September 1963).

*Tricholoma flavovirens* (Pers. ex Fr.) Lund. — Luckau: Kiefernwald am Wege zwischen Bergen und Bornsdorf mehrfach, Hutoberseite bräunlich gefärbt, vergesellschaftet mit *Tricholoma portentosum* (22. 10. 1962).

*Panus conchatus* (Bull.) Fr. — Luckau: in Schlabendorf, an Roßkastanienstümpfen (22. 10. 1962).

*Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst. — NSG Hohe Warte an Eichenstümpfen zahlreich (25. 9. 1963).

*Lentinellus cochleatus* (Pers. ex Fr.) Karst. — Groß Mehßower Tannenbusch, büschelig an einem Baumstumpf, vermutlich Eiche, ohne den sonst üblichen Anisgeruch (23. 9. 1963).

*Pleurotus dryinus* (Pers. ex Fr.) Quel. — Golßen: Chaussee nach Baruth, an einem Lindenstamm in 1 m Höhe (22. 10. 1962).

*Hohenbuehelia atrocoerulea* (Fr.) Sing. — NSG Hohe Warte, an Eichenstoßholz (25. 9. 1963).

*Oudemansiella radicata* (Schrad. ex Fr.) Bours. — Im Gebiet sehr vereinzelt und nur unter Buchen, so Buchwald bei Doberlug, Grünhaus und Hohe Warte (September 1963).

*Oudemansiella platyphylla* (Pers. ex Fr.) Mos. — Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963).

*Marasmius rotula* (Scop. ex Fr.) Fr. — Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963).

*Marasmius epiphyllus* (Pers. ex Fr.) Fr. — Groß Mehßower Tannenbusch, trockene Pflanzenstengel im Erlbruch (23. 9. 1963).

*Mycena capillaris* (Schum. ex Fr.) Quel. — Auf trockenen Eichenblättern, NSG Buchwald und NSG Suden (September 1963).

*Mycena vitilis* (Fr.) Quel. — Friedersdorfer Tiergarten, auf feuchten Waldböden häufig, aber meist einzeln auftretend (26. 9. 1963).

*Mycena inclinata* (Fr.) Quel. — Friedersdorfer Tiergarten, rasenförmig auf einem Eichenstumpf (26. 9. 1963).

*Mycena maculata* Karst. — Zahlreich und in Scharen im NSG Grünhaus, im Fichtenmischwald (25. 9. 1963).

*Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Quel. — Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963).

*Mycena leptcephala* (Fr.) Gill. — NSG Grünhaus unter Fichten (25. 9. 1963).

*Mycena adonis* (Bull. ex Fr.) Quel. — NSG Wanninchen, Abt. 133, einige Exemplare mit prächtig rot gefärbten Hüten auf einer lückigen Stelle im sauren Molinietum des Weges durch den Bruchwald (26. 9. 1963).

*Mycena alcalina* (Fr.) Quel. — Groß Mehßower Tannenbusch, auf Fichtenstümpfen (23. 9. 1963).

*Baeospora myosura* (Fr.) Sing. — Im NSG Schadewitz, auf einem Kienapfel (25. 9. 1963).

*Clitopilus prunulus* (Scop. ex Fr.) Quel. — Vereinzelt auf grasigen Waldwegen im Groß Mehßower Tannenbusch (23. 9. 1963).

*Schizophyllum commune* Fr. — Buchwald bei Doberlug, an trockenen Buchenästen (24. 9. 1963).

*Xeromphalina campanella* (Batsch ex Fr.) R. Mre. — Rasenförmig auf modernden Kiefernstümpfen, so in den NSGen Schadewitz, Weberteich und Wanninchen (September 1963).

#### Amanitaceae

*Volvariella taylori* (Berk.) Sing. — Friedersdorfer Tiergarten, am Waldrand zwei Exemplare auf einem Ruderalplatz (26. 9. 1963).

*Volvariella speciosa* (Fr.) Sing. — Wacholderheide Sellendorf, am Feldrand, am faulenden Kartoffelkraut (27. 9. 1963).

*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr. — Friedersdorfer Tiergarten (26. 9. 1963).

*Amanita porphyrea* (A. et Schw. ex Fr.) Secr. — Im NSG Hohe Warte, vereinzelt im Traubeneichenwald (25. 9. 1963).

#### Agaricaceae

*Macrolepiota rhacodes* (Vitt.) Sing. — Zerstreut, meist unter Fichten, so im NSG Grünhaus (25. 9. 1963), Fasanerie bei Sonnewalde (26. 9. 1963). Im NSG Wacholderheide Sellendorf unter Wacholder (27. 9. 1963).

*Agaricus silvaticus* Schff. ex Secr. — Friedersdorfer Tiergarten und Fasanerie bei Sonnewalde (26. 9. 1963).

*Cystoderma granulosum* (Batsch ex Fr.) Fay. — Kiefernwald bei der Wacholderheide Sellendorf (27. 9. 1963).

#### Crepidotaceae

*Crepidotus variabilis* (Pers. ex Fr.) Quel. — Friedersdorfer Tiergarten, auf trockenen Zweigen (26. 9. 1963).

## Cortinariaceae

*Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken — NSG Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963). Luckau: an der Wanninchener Mühle, im reichen Eichen-Hainbuchen-Wald am Fließ, stark nach Marzipan riechend (26. 9. 1963).

*Hebeloma mesophaeum* (Pers. ex Fr.) Quel. — NSG Grünhaus (25. 9. 1963); NSG Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963).

*Hebeloma saccariolens* Quel. — Luckau: Wanninchener Mühle im Eichen-Hainbuchen-Wald (26. 9. 1963).

*Gymnopilus spectabilis* (Fr.) Sing. — Luckau: NSG Wanninchen, in der Abt. 133, Bruchwald an einem Birkenstamm (26. 9. 1963).

*Hydrocybe armillata* (Fr.) — Im NSG Wacholderschluchten Hohendorf unter Birken (27. 9. 1963).

*Myxaciium mucosum* (Bull. ex Fr.) Ricken — Nicht selten in moosreichen Kiefernwäldern, so NSG Suden, NSG Wanninchen und beim NSG Wacholderheide Sellendorf (September 1963).

*Phlegmacium alboviolaceum* (Pers) Fr. — Luckau: Laubwald bei der Wanninchener Mühle (26. 9. 1963). Wacholderheide Sellendorf (27. 9. 1963.)

## Bolbitiaceae

*Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr. — NSG Suden bei Gorden, grasiger Waldweg (24. 9. 1963).

## Strophariaceae

*Pholiota subsquarrosa* (Fr.) — NSG Hohe Warte, auf einem sandigen Waldweg nahe der Försterei ein Büschel aus der Erde hervorbrechend (25. 9. 1963).

*Nematoloma sublateralitium* (Fr.) Karst. — Nicht selten auf Baumstümpfen, so Groß Mehßower Tannenbusch, Buchwald bei Doberlug, Suden bei Gorden und Hohe Warte (September 1963).

## Coprinaceae

*Psathyrella velutina* (Pers. ex Fr.) Sing. — Sonnewalde: in der Fasanerie mehrfach auf feuchten Waldwegen (26. 9. 1963).

*Psathyrella appendiculata* (Fr.) non al. — Büschelig an Laubholzstümpfen, Fasanerie bei Sonnewalde (26. 9. 1963). Buchwald bei Doberlug (24. 9. 1963).

## Russulaceae

*Russula adusta* (Pers.) Fr. — Zerstreut in Kiefernwäldern und Kiefern-mischwäldern, so Buchwald bei Doberlug, Weberteich, Hohe Warte und an der Wanninchener Mühle (September 1963).

*Russula nigricans* (Bull.) Fr. — Zerstreut in Laubwäldern, Friedersdorfer Tiergarten und Fasanerie bei Sonnewalde, Buchwald bei Doberlug, Wanninchenener Mühle und NSG Weberteich unter Eichen (September 1963).

*Russula pectinata* (Bull.) Fr. ss. Cke. — Friedersdorfer Tiergarten und Groß Mehßower Tannenbusch, auf grasigen Waldwegen, gruppenweise (September 1963).

*Russula foetens* Fr. — Groß Mehßower Tannenbusch, einzeln unter Birken (23. 9. 1963).

*Russula cyanoxantha* Schff. ex Fr. — Zerstreut in Laubwäldern, meist einzeln, Fasanerie bei Sonnewalde, Buchwald bei Doberlug, Mischwald südlich Groß Mehßow (September 1963).

*Russula claroflava* Grv. — Groß Mehßower Tannenbusch, im feuchten Kiefern-Tannen-Wald zahlreich (23. 9. 1963).

*Russula paludosa* Britz. — NSG Suden bei Gorden, im Nadelwald an feuchten Stellen (24. 9. 1963).

*Russula fragilis* Fr. — Ziemlich häufig in meist feuchten Wäldern, so Buchwald bei Doberlug, Weberteich, Hohe Warte und Bruchwälder zwischen Stiebsdorf und Wanninchen (September 1963).

*Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) Gray — NSG Groß Mehßower Tannenbusch und NSG Weberteich, unter Fichten. NSG Hohe Warte, am Straßenrand (September 1963).

*Lactarius chrysorrheus* Fr. — NSG Hohe Warte, sehr zahlreich im heidelbeerreichen Traubeneichenwald (25. 9. 1963).

*Lactarius hibbardiae* (Burl.) Sacc. — NSG Wacholderschluchten Hohendorf, mehrfach unter Birken (27. 9. 1963).

*Lactarius glycosmus* Fr. — NSG Wanninchen, sehr zahlreich in den Birken-Kiefern-Bruchwäldern (Abt. 262 und 133). Groß Mehßower Tannenbusch, zahlreich an feuchten Stellen. Suden bei Gorden. Schadewitz. Hohe Warte (September 1963).

*Lactarius helvus* Fr. — In frischen Kiefernwäldern und Birkenbrüchen, so im NSG Wanninchen, Suden bei Gorden und NSG Weberteich (September 1963).

*Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. — NSG Hohe Warte, im heidelbeerreichen Traubeneichenwald (25. 9. 1963).

*Lactarius theiogalus* (Bull.) Fr. — NSG Grünhaus, unter Fichten (25. 9. 1963).

*Lactarius blennius* Fr. — Zerstreut in Buchenwäldern, so in der Fasanerie und im Friedersdorfer Tiergarten bei Sonnewalde und im Buchwald bei Doberlug (September 1963).

## Sphaerobolaceae

*Sphaerobolus stellatus* (Tode) Pers. — Friedersdorfer Tiergarten, auf trockenen, herabgefallenen Ästen (26. 9. 1963).

### Literatur

- FISCHER, W. (1962): Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz I. — Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37, 2, S. 223—234.
- KREISEL, H. (1961): Die phytopathogenen Großpilze Deutschlands. — Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961.
- MOSER, M. (1955): Die Röhrlinge, Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetales). — Bd. II b der Kleinen Kryptogamenflora von H. GAMS. 2. Aufl. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1955.
- (1963): Ascomyceten (Schlauchpilze). — Bd. II a der Kleinen Kryptogamenflora von H. GAMS, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1963.

### Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Fischer, wissenschaftlicher Assistent  
am Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle/S.,  
Zweigstelle Potsdam,  
Potsdam-Babelsberg, Wichgrafstraße 6

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang

Artikel/Article: [Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz III 1-11](#)