

Diagnosen zweier Phyllopoden-Arten aus Süd-Brasilien.

Von Wilh. Lilljeborg, Upsala.

1. *Branchinecta iheringii*, n. sp.

Branchinectae coloradensi, Packard*) valde similis, multo vero minor, et praeterea ab ea diversa aculeis quibusdam minoribus et paucis ad latus interius segmenti 1^{mi} antennarum inferiorum („claspers“) apud marem, et eo quod segmentum 2^{dum} (ultimum) harum antennarum apud eundem prope apicem ad marginem posteriorem tuberculum et ad latus exterius tuberositatem, quae ibidem apud Br. coloradensem desunt, habet. Cauda apud feminam corpore reliquo brevior, quum eadem e contra apud Br. coloradensem longior est. — Longitudo maris, sine appendicibus caudalibus, 11 et feminae 8 mill.**)

Diese Art ist von Dr. H. von Ihering im südlichen Brasilien in Süßwassertümpeln bei Rio Grande do Sul gefunden und mir von Herrn S. A. Poppe gefälligst zur Bestimmung übersandt. Es war mir eine Freude, dieselbe ihrem hoch verdienten Entdecker widmen zu können.

2. *Limnadia antillarum*, W. Baird.***)

Quamvis bene evoluta et ovifera tamen individuis junioribus *Limnadiae* lenticularis quodammodo similis. Valvulae, a latere inspectae, apud seniores satis pellucidae, ovaes, postice non multum humiliores, margine dorsali quodammodo arcuato, cum marginibus anteriore et posteriore angulos perspicuos sed obtusos formante. Lineae exstantes concentricae incrementi 6, binae approximatae. Umbones humilissimi. Color dilute rufo-albidus. Ungues caudales longi, postice coarctati. Apud juniores margo superior parum arcuatus angulique anterior et posterior magis perspicui. — Longitudo valvularum $6\frac{1}{2}$ et altitudo $4\frac{1}{2}$ mill. — Ova nodulosa vel angulosa, nodulis vel angulis exstantibus 8—10. — Femina tantum inventa.

Gefunden von Dr. von Ihering im Sumpfwasser bei S. Lourenço.

*) Sixth Annual Report of the Peabody Academy of Science, pag. 57—1874. — The Annual Report of the United States Geological and Geographical Survey of the territories for 1873, pag. 621. pl. IV, Fig. 12. — Seine Monographie der nordamerikanischen Phyllopoden stand mir leider nicht zur Verfügung.

**) Bei *B. coloradensis*, bei Fresno in Californien von Dr. G. Eisen gesammelt, haben wir bei dem Männchen eine Länge von 21 und bei dem Weibchen eine solche von 15 mill. gefunden.

***) Proceed. of the Zoological Society of London 1852, pag. 30, pl. XXIII, Fig. 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1887-1888

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Lilljeborg W.

Artikel/Article: [Diagnosen zweier Phyllopoden-Arten aus Süd-Brasilien. 424](#)