© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zweiter Nachtrag

zu dem

Systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten.

Von C. F. Wiepken.

(Abh. d. naturw. Ver. z. Bremen. Bd. VIII. S. 39—101.)

Herr Dr. med. Köben in Augustfehn, der das Material gesammelt zu dem ersten Nachtrag des obigen Verzeichnisses, welcher in den Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, Bd. IX. S. 339—354 abgedruckt, hat seine Forschungen mit Eifer fortgesetzt und das Resultat derselben hat ergeben 138 für das Herzogtum neue Arten und 16 Varietäten, die in nachfolgendem Verzeichnis aufgeführt. Durch diesen Zuwachs ist die bekannte Artenzahl der Käferfauna des Herzogtums von 1654 auf 1792 gestiegen.

Cicindelidae.

Cicindela Linné.

C. campestris L. var. funebris Sturm. Augustfehn. Im Moor. Selten. August, Sept.

C. campestris L. var. tartarica Mannerh. Osternburg, Bekhausen, Augustfehn. Im Moor. Nicht selten. Mai, Juni, September. Schaum I. p. 15.

C. hybrida L. var. maritima Dej. Wangerooge. In den Dünen. Nicht selten. September.

Carabidae.

Carabus Linné.

C. hortensis L. (gemmatus F.) Wardenburg. Selten. Juli.

C. ulrichi Germ. Wardenburg. Selten. Juli.

Cymindis Latreille.

C. vaporariorum L. Augustfehn. Im Moor am Uhlenmeer. Selten. September.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Demetrias Bonelli.

D. unipunctatus Germ. Wangerooge. Auf Disteln und Helm. Häufig. August.

Dromius Bonelli.

D. linearis Olio. Wangerooge. Auf Disteln und Helm. Selten. August.

D. quadrisignatus Dej. Wangerooge. Auf Disteln und Helm. Selten. August.

Masoreus Dejean.

M. wetterhali Gyll. Wangerooge. Unter faulendem Helm. Selten. August.

Harpalus Latreille.

H. griseus Panz. Augustfehn. Dort häufig.

Omaseus Ziegler.

O. nigrita F. Im ganzen Herzogtum häufig. Mai — Sept.

Bradytus Stephens.

B. consularis Duft. Augustfehn. Unter Steinen nicht selten. Januar — December.

Cyrtonotus Stephens.

C. convexiusculus Marsh. Wangerooge. Im Sande. Selten. August.

Calathus Bonelli.

C. mollis Marsh. Wangerooge. In den Dünen unter Kuhdünger. Selten. September.

Platynus Bonelli.

P. viduus Panz. var. lugubris Dej. Oldenburg. Nicht selten. Mai — Sept.

Trechus Clairville.

T. discus. F. Augustfehn. Im Hause am Fenster. Selten. Juli.

Bembicidium Latreille.

B. quinquestriatum Gyll. (pumilio Duft.) Augustfehn. In Sandgruben. Häufig. Mai.

Cillenus Samouelle.

C. lateralis Sam. Wangerooge. Am Strande unter Seegras. Nicht häufig. August.

Dytiscidae.

Hydroporus Clairville.

H. depressus F. Ocholt. In der Torsholter Bäke. Sehr selten. September.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. memnonius Nicolai. Ocholt, Augustfehn. In Wasserlachen. Selten. September.

Agabus Leach.

A. femoralis Payk. Oldenburg, Augustfehn. In Gräben. Nicht selten. Juni, Juli.

Hydrophilidae.

Spercheus Kugelann.

Sp. emarginatus Schaller. Holtgast. In Teichen am Bahndamm auf zusammengetriebenem Confervenschleim. Selten. Mai.

Helophorus Fabricius.

H. dorsalis Marsh. Wangerooge. Am Strande unter Seetang. Selten. August.

H. nanus Sturm. Apen, Holtgast. An schwimmendem Holze. Selten. Mai, Oktober.

H. pumilio Erichs. Apen. Vom Hochwasser angespült. Selten. Oktober.

Hydrochus Leach.

H. angustatus Germ. Augustfehn. In einer Wasserlache. Selten. Juli.

Ochthebius Leach.

O. bicolor Germ. var. rufomarginatus Steph. Wangerooge. Im Sande. Selten. August.

Hydraena Kugelann.

H. palustris Erichs. Ocholt. An schwimmendem Reisig. Selten. April.

Cercyon Leach.

C. littoralis Gyll. Wangerooge. Am Strande unter Seetang. Häufig. August.

Staphylinidae.

Autalia Mannerheim.

A. rivularis Grav. Augustfehn. Unter Steinen. Sehr selten. Mai.

Phytosus Curtis.

Ph. nigriventris Chev. Wangerooge. Am Strande auf den Buhnen. Häufig. August.

Ph. spinifer Curt. Wangerooge. Am Strande auf den Buhnen. Häufig. August.

Aleochara Gravenhorst.

A. bisignata Erich. Wangerooge. In Häusern am Fenster. Nicht häufig. September.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. moerens Gyll. Hasbruch. Aus Pilzen. Selten. August, September.

A. obscurella Grav. Wangerooge. In Häusern am Fenster und an Aas. Häufig. September.

A. sanguinea L. (brunneipennis Kraatz.) Augustfehn. Unter Laub. Selten. April.

Oxypoda Mannerheim.

O. cuniculina Erichs. Wangerooge. Selten. August.

Homalota Mannerheim.

H. aequata Erichs. Holtgast. Unter abgefallenen Eichenästen an Schimmel, welcher die Unterseite derselben überzogen. Nicht häufig. April, Mai.

H. angustula Gyll. Augustfehn. Unter faulen Kohlblättern. Selten. Oktober.

H. aterrima Grav. Augustfehn. An faulenden Pflanzenresten. Selten. April.

H. celata Erichs. Augustfehn. An schimmlichem Brod im Freien gefunden. Nicht selten. August.

H. flavipes Grav. Augustfehn, Hengstforde. Gemein bei den grossen Waldameisen. März, April.

H. luridipennis Mannerh. Ocholt. In Mergelgruben unter faulenden Blättern. Nicht häufig. August.

H. variata Gemm. u. Hrld. (sordida Kraatz.) Ocholt. An Aas gefunden. Selten. April.

Oligota Mannerheim.

O. apicata Erichs. Augustfehn. In einer verfaulten Wallnuss gefunden. Selten. November.

O. parva Kraatz. Augustfehn. In einer verfaulten Wallnuss gefunden. Selten. November.

Myllaena Erichson.

M. intermedia Erichs. Apen. Unter angetriebenem Schilfe. Häufig. December.

M. minuta Grav. Apen. Unter angetriebenem Schilfe. Häufig. December.

Hypocyptus Mannerheim.

H. pygmaeus Kraatz. Vareler Hafen. Auf Salzpflanzen. Selten. August.

Leucoparyphus Kraatz.

L. silphoides L. Wangerooge. In Häusern am Fenster. Nicht häufig. August.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tachyporus Gravenhorst.

T. transversalis Grav. Apen. Unter angeschwemmtem Schilf. Selten. November.

Mycetoporus Mannerheim.

M. splendidus Grav. Augustfehn. Aus einer morschen Esche. Selten. Juni.

Quedius Stephens.

Q. brevis Erichs. Ocholt. In Ameisennestern. (Formica rufa.) Nicht selten. April.

Q. infuscatus Erichs. Augustfehn. Unter Ameisen. Selten. November.

Ocypus Stephens.

O. pedator Grav. Ocholt. In einer Mergelgrube unter Laub. Selten. Juli.

Philonthus Curtis.

Ph. xantholoma Grav. Wangerooge. Am Strande unter Seetang. Nicht selten. August.

Leptacinus Erichson.

L. formicetorum Märkel. Augustfehn. In Ameisennestern. (Formica rufa.) Nicht selten. August.

L. batychrus Gyll. Augustfehn. Im Dünger. Nicht selten. August.

Lathrobium Gravenhorst.

L. dilutum Erichs. Oldenburg. Auf einem Gartenbeet. Selten. Mai.

Lithocharis Lacordaire.

L. castanea Grav. Augustfehn. Im Garten unter ausgelegtem Torf. Selten. April.

Stenus Latreille.

St. impressus Germ. Wangerooge. In Häusern am Fenster. Selten. August.

St. latifrons Erichs. Augustfehn. Unter angeschwemmtem Schilf. Selten. November.

St. melanarius Steph. (cinerascens Erichs.) Apen. Unter angeschwemmten Pflanzenresten. Selten. October.

Bledius Stephens.

B. arenarius Payk. Wangerooge. An der Flutgrenze im feuchten Sande. Häufig. August.

Oxytelus Gravenhorst.

O. complanatus Erichs. Augustfehn. Im Dünger. Selten. Mai.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trogophloeus Mannerheim.

T. pusillus Grav. Oldenburg. An einer Mauer. Selten. April.

T. tenellus Erichs. Augustfehn. In Mistbeeten. Nicht selten. April.

Homalium Gravenhorst.

H. planum Payk. Augustfehn. Unter Baumrinde. Nicht selten. Mai, Juni.

H. pygmaeum Payk. Friesoythe, Augustfehn. In morschem Holze. Häufig. Juni.

Pselaphidae.

Tychus Leach.

T. niger Payk. Augustfehn. Im Hause am Fenster. Selten. Juli.

Euplectus Leach.

E. karsteni Reichenb. Augustfehn. Im Kehricht. Sehr selten. September.

Silphidae.

Agathidium Illiger.

A. laevigatum Erichs. Augustfehn. In einer Sandgrube und an faulem Holz. Selten. Mai, Oktober.

Trichopterigidae.

Ptenidium Erichs.

Pt. formicetorum Kraatz. Hengstforde. Unter Ameisen. Sehr selten. April.

Pt. pusillum Gyll. Augustfehn. Unter faulenden Blättern. Selten. Mai.

Ptilium Gyllenhal.

Pt. kunzei Heer. Augustfehn. Aus einer morschen Esche. Selten. Juni.

Histeridae.

Dendrophilus Leach.

D. pygmaeus L. Ocholt. In Ameisenhaufen. Selten. April.

Saprinus Erichs.

S. maritimus Steph. Wangerooge. Im Dünensande. Häufig. August.

S. metallescens Erichs. Wangerooge. Im Dünensande. Nicht häufig. August.

Plegaderus Erichson.

P. vulneratus Panz. Ocholt. Unter Kiefernrinde. Selten. Juli.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Phalacridae.

Olibrus Erichs.

O. pygmaeus Sturm. Oldenburg. Selten.

Nitidulidae.

Cryptarcha Schuckard.

C. imperialis F. Bokel. Am ausfliessenden Safte der Eichen. Selten. Mai — Juli.

Rhizophagus Herbst.

Rh. nitidulus F. Augustfehn. Im faulen Weidenholz. Selten. Juni.

Cucujidae.

Laemophloeus Castelnau.

L. pusillus Schönh. Augustfehn. Im Hause am Fenster. Selten. Juli.

Silvanus Latreille.

S. surinamensis L. (frumentarius F.) Augustfehn. In Gerste. Selten. März.

Cryptophagidae.

Cryptophagus Herbst.

C. acutangulus Gyll. Augustfehn. Im Hause am Fenster. Selten. August.

C. umbratus Erichs. Holtgast. Unter Hauspähnen einer gefällten Eiche. Selten. Mai.

Atomaria Stephens.

A. nigripennis Payk. Augustfehn. An Aas. Selten. Mai.

Ephistemus Stephens.

E. gyrinoides Marsh. var. dimidiatus Sturm. Augustfehn. An einer Mauer in der Nähe von Dünger. Selten. Juli.

Latridiidae.

Monotoma Herbst.

M. spinicollis Aubé. An schimmlichem Brod. Häufig. Juli.

Latridius Herbst.

L. planatus Mannerh. Wangerooge. Unter faulem Helm. Häufig. August.

Myrmecoxenus Chevrolat.

M. subterraneus Chevr. Apen, Ocholt. In Ameisenhaufen. Selten. April.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Scarabaeidae.

Rhyssemus Mulsant.

Rh. germanus L. Wangerooge. Im Dünensande. Nicht häufig. August.

Odontaeus Klug.

O. mobilicornis F. Frisoythe. Unter Dünger. Selten. Juni.

Cetonia Fabricius.

C. floricola Herbst. Wardenburg. Auf Blüthen. Selten. Juni, Juli.

C. marmorata F. Ocholt. Auf Spiraea ulmaria. Selten. Juli.

Buprestidae.

Agrilus Stephens.

A. biguttatus F. Ocholt. Aus Eichenrinde, in der die Larven leben, gezogen. Selten. Juni.

Elateridae.

Cardiophorus Eschscholtz.

C. ruficollis L. Augustfehn. In Ameisenhaufen. Häufig. Mai, Juni.

Synaptus Eschscholtz.

S. filiformis F. Friesoyte. Auf Blüten. Selten. Mai.

Dascillidae.

Scirtes Illiger.

Sc. orbicularis Panz. Augustfehn. Im Hause am Fenster. Selten. Juli.

Malacodermidae.

Telephorus Schäffer.

T flavilabris Fallén. Oldenburg. Auf Blüten. Selten. Juni.

Malthinus Latreille.

M. balteatus Suffr. Ocholt. Auf Weidengesträuch. Selten. Juni.

Malthodes Kiesenwetter.

M. flavoguttatus Kiesenw. Auf Nussträuchern. Nicht häufig. Juni.

Troglops Erichson.

T. albicans L. Ocholt. An einer Scheunenthür. Selten. Juli.

Cleridae.

Necrobia Latreille.

N. ruficollis F. Ocholt. Im Bahnhof am Fenster. Sehr selten. September.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

N. violacea L. Oldenburg, Bekhausen. Auf der Geest häufig, vorzüglich in Häusern. März — Mai.

Ptinidae.

Hedobia Latreille.

H. regalis Duft. Oldenburg. Auf einem Gartentisch gefunden. Selten. Mai.

Ptinus Linné.

Pt. ornatus Müller. Augustfehn. In einem alten Weidenstamm. Selten. Juli.

Pt. sexpunctatus Panz. Augustfehn. Aus einem morschen Eschenstamm. Selten. Juni.

Ernobius Thomson.

E. longicornis Sturm. Augustfehn. An Bohnenstangen. Selten. Juli.

Oligomerus Redtenbacher.

O. striatellus Brisout. Augustfehn. Aus Fichtenzweigen gezogen. Selten. Juni

Cioidae.

Ennearthron Mellié.

E. cornutum Gyll. Augustfehn. In Polyporus zonatus (auf Erlen). Nicht selten. Januar bis December.

Octotemnus Mellié.

O. glabriculus Gyll. Augustfehn. In Polyporus versicolor. Selten. Juni.

Tenebrionidae.

Phaleria Latreille.

Ph. cadaverina F. Wangerooge. Am Strande unter Seegras. Häufig. August.

Melandryidae.

Eustrophus Latreille.

E. dermestoides F. Augustfehn. An altem Holze und in Pilzen. Häufig. Juli.

Conopalpus Gyllenhall.

C. testaceus Oliv. Augustfehn. An faulen Eichenstämmen. Selten. Juli.

Anthicidae.

Anthicus Paykull.

A. bimaculatus Illig. Wangerooge. Im Dünensande. Selten. August.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mordellidae.

Mordellistena Costa.

M. lateralis Oliv. var. variegata F. Augustfehn. Aus einem morschen Eschenstamm. Selten. Juni.

Curculionidae.

Sitones Germar.

S. gressorius F. Augustfehn, Littel. Auf Sarothamnus scoparius. Häufig. Mai — Juli.

S. lateralis Gyll. Augustfehn.

Tanysphyrus Schönherr.

T. lemnae F. Apen. Unter angetriebenem Schilf. Sehr selten. December.

Apion Herbst.

A. urticarium Herbst. (vernale Payk.) Vareler Hafen. Auf Nesseln. Selten. August.

Rhychites Herbst.

Rh. pauxillus Germ. Ocholt. Auf Blüten von Sorbus aucuparia. Nicht selten. Mai.

Magdalis Germar.

M. duplicata Germ. Augustfehn. Auf Kiefern. Nicht selten. Mai.

Anthonomus Germar.

A. pyri Bohem. Augustfehn. Aus den Stengeln der Birnblüten gezogen. Selten. Juni.

Cionus Clairville.

C. fraxini De Geer. Ocholt. Auf Eichen. Selten. Mai.

Ceutorrhynchus Germar.

C. andreae Germ. Augustfehn. Auf Disteln. Selten. Juni.

C. litura F. Augustfehn. Auf Nesseln. Selten. Juni.

Phytobius Schönherr.

Ph. notula Germ. (canaliculatus Fahrs.) Wangerooge. Unter Tang im Sande. Nicht selten. September.

Scolytidae.

Trypodendron Stephens.

T. domesticum L. Ocholt. In Buchenstuken. Selten. April.

Xyleborus Eichhoff.

X. dispar F. ♂ Ocholt. In Buchenstuken. Selten. April.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Scolytus Geoffroy.

Sc. geoffroyi Goeze. (destructor Oliv.) Aus Birken gezogen, die von den Larven zerstört werden. Häufig. Mai, Juni.

Cerambycidae.

Tetropium Kirby.

T. luridum L. Augustfehn. In Häusern. Sehr selten. Juli.

Criocephalus Mulsant.

C. epibata Schiödt. Wangerooge. An Holz. Sehr selten. August.

Leptura Linné.

L. scutellata F. Ofener Büsche. Sehr selten. Juli.

Stenopterus Illiger.

St. rufus L. Wardenburg. Auf Chrysanthemum leucanthemum. Selten. Juli.

Saperda Fabricius.

S. scalaris L. Wardenburg, Friesoythe. Auf Hollunder und Apfelbaum. Selten. Mai, Juni.

Chrysomelidae.

Donacia Fabricius.

D. thalassina Germ. Ocholt. Auf Binsen. Häufig. Juli — September.

Longitarsus Latreille.

L. brunneus Duft. Augustfehn. Auf Wiesen. Häufig. Mai — Oktober.

Psylliodes Latreille.

Ps. chrysocephala L. var. anglica F. Wangerooge. Auf Cakile maritima. Nicht selten. August.

Ps. marcida Illig. Wangerooge. Auf Cakile maritima. Häufig. August.

Coccinellidae.

Coccinella Linné.

C. distincta Falderm. (labilis Muls.) Wardenberg. Selten. Juli.

Scymnus Kugelann.

Sc. minimus Rossi. Ocholt. Auf Fichten. Nicht selten. Mai.

Sc. rubromaculatus Goeze. (pygmaeus Fourcr.) Ocholt. Auf Eichen. Nicht selten. Mai, August.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Berichtigung.

Bei Revision der Lokalsammlung sind folgende Unrichtigkeiten gefunden:

Im Hauptverzeichnis ist Seite 78 Corynetes coeruleus Degeer zu streichen und dafür „Necrobia violacea L.“ zu setzen, die beiden Käfer sind irrtümlich verwechselt.

Im ersten Nachtrag ist Seite 340 Stenolophus discophorus Fisch zu streichen. Der Käfer war noch unreif und infolgedessen falsch. bestimmt.

Ferner muss es Seite 348 heissen „Aphodius porcus F.“ statt porcatus F.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen

Jahr/Year: 1893-1894

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Wiepken Carl Friedrich

Artikel/Article: Zweiter Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Räferarten. 59-70