

Dritter Nachtrag

zu dem

Systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten.

Von C. F. Wiepken.

Abhandlungen des Naturw. Ver. zu Bremen, Bd. VIII, S. 39—101.

Infolge meines hohen Alters und meiner zunehmenden Kränklichkeit muss ich leider jetzt meinen Ruhestand faktisch antreten, weshalb dies mein letzter Nachtrag ist. Herr Dr. med. Röben, der die Forschungen im Herzogtum fortsetzen will, wird hoffentlich noch weitere Nachträge folgen lassen. Herr Oberlehrer Rautterberg in Hildesheim, welcher früher in Wilhelmshaven war, hat die Käfer, die er im nördlichen Herzogtum gesammelt, dem grossherzoglichen Museum gütigst überlassen. Die Marsch muss noch gründlich durchforscht werden, und unter den Käfern, namentlich den Wasserkäfern, werden sich noch manche finden, die uns noch unbekannt sind.

Carabidae.

Dromius Bonelli.

D. angustus Brullé. Südholz. Unter Kiefernrinde. Selten.

Bradycellus Erichson.

B. placidus Gyll. Upjever, Apen. An Wasserlachen. Oktober, Mai.

Chlaenius Bonelli.

C. vestitus Payk. Am Ufer des Nordloher Kanals unter Torf.
Selten. Juli.

Amara Bonelli.

A. famelica Zimmerm. Augustfehn. In Sandgruben. Selten. Mai.

Dytiscidae.

Haliplus Latreille.

H. lineatocollis Marsh. Neuende, Mariensiel. In Marschgräben. Häufig.

H. apicalis Thoms. Bant. In Gräben. Selten.

Hydroporus Clairville.

H. paralelogrammus Ahrens. Bant. In Marschgräben. Nicht selten.

Liopterus Aubé.

L. agilis F. Bant. In Gräben. Nicht selten.

Agabus Leach.

A. affinis Payk. Bant. In Gräben. Nicht häufig. September.

Hydrophilidae.

Laccobius Erichson.

L. scutellaris Motsch. Bei Wilhelmshaven. In Marschgräben.

var. *atratus* Rottenb. Bant. In Gräben.

Staphylinidae.

Thiasophila Erichson.

Th. angulata Erichs. Südholz. In Haufen von *Formica rufa*. Nicht selten. April.

Oxycypoda Mannerheim.

O. curiculina Erichs. Wangerooge. Selten. August.

O. formiceticola Maerkel. Südholz. In Haufen von *Formica rufa*. Nicht selten. April.

Homalota Mannerheim.

H. anceps Erichs. Südholz. In Haufen von *Formica rufa*. Selten. April.

H. erilis Erichs. Südholz. Unter *Formica rufa*. Selten. April.

Xantholinus Serville.

X. atratus Heer. Südholz. Unter *Formica rufa*. Selten. April.

Stenus Latreille.

St. pilum Erichs. Südholz. In Waldgräben geketschert. Selten. April.

Pselaphidae.

Bryaxis Leach.

B. haemtica Reichemb. Bei Wilhelmshaven. Am Deich geketschert.

Silphidae.

Choleva Latreille.

Ch. longula Hellw. Bei Wilhelmshaven. Am Deich.

Liodes Latreille.

L. parvula Sahlb. Bei Wilhelmshaven. Am Deich geketschert.

Nitidulidae.

Brachypterus Kugelann.

B. glaber Newm. (*pubescens* Er). Jeverland.

Epuraea Erichson.

E. variegata Hrbst. Jeverland.

Meligethes Stephens.

M. aeneus F. var. *coeruleus* Steph. Jeverland. Auf Blüten. Juli.

M. denticulatus Heer. Südholz. Auf blühender *Spiraea ulmaria*.
Nicht selten. August.

Oryptophagidae.

Atomaria Stephens.

A. fuscipes Gyll. Jeverland.

A. mesomelas Herbst. Geketschert.

Ephistemus Stephens.

E. globulus Waltl. Jeverland.

Latrididae.

Latridius Herbst.

L. lardarius De Deer. Bei Wilhelmshaven. Geketschert.

Buprestidae.

Melanophila Eschscholtz.

M. appendiculata F. (*acuminata* de Geer). Bant. Geketschert.

Anthaxia Eschscholtz.

A. quadripunctata L. Bant. Geketschert.

Elateridae.

Agriotes Eschscholtz.

A. sputator L. Marsch bei Wilhelmshaven. Geketschert.

Malacodermidae.

Telephorus Schaeffer.

T. fuscicornis Oliv. Varel. Auf Sträuchern. Juni.

T. haemorrhoidalis F. Bant. Geketschert. Juni.

T. testaceus L. var. *pallipes* Steph. Varel. Auf Sträuchern. Juni.

Charopus Erichson.

Ch. flavipes Payk. Bei Wilhelmshaven. Geketschert.

Phloeophilus Stephens.

Ph. Edwardsi Steph. Südholz. An Fichten, auch im Wurmmehl hohler Eichen. Selten. April, Juni.

Ptinidae.

Ptinus Linné.

Pt. dubius Sturm. Südholz. An Kiefern. Selten. April.

Melandryidae.

Anisoxya Mulsant.

A. fuscata Illig. Augustfehn. In Pilzen. Selten. Juni.

Mordellidae.

Mordellistena Costa.

M. abdominalis F. Elmendorf. Auf Doldenblüten. Selten. Juni.

Anaspis Geoffroy.

A. Amelanopa Forst. (*maculata* Fourer). Aus einer alten Eiche gezogen. Augustfehn. Selten. Oktober.

A. rufilabris Gyll. Augustfehn. Auf Spiräenblüten. Häufig. Juni.

A. trifasciata Chev. Neuenburger Holz. Auf Weissdornblüten. Häufig. Juni.

Curculionidae.

Phyllobius Germar.

Ph. pomaceus Gyll. Augustfehn. Auf Gesträuch. Selten. Juni.

Hypera Germar.

H. postica Gyll. Apen. Unter Anspuhlicht. Selten. Oktober.

H. variabilis Herbst. Vareler Mühlenteich. Nicht selten.

Dorytomus Stephens.

D. pectoralis Pz. var. *melanophthalmus* Payk. Upjever.

D. Schönherri Faust. Upjever.

Bagous Schoenherr.

B. lümpressus Fährs. Bei Wilhelmshaven. Auf feuchten Marschwiesen geketschert.

Apion Herbst.

A. atomarium Kirby. Eversten. Geketschert.

A. penetrans Germ. Wangerooge. In den Dünen geketschert. Nicht selten. August.

Magdalis Germar.

M. barbicornis Latr. Augustfehn. Aus dünnen Obstbaumzweigen gezogen. Selten. Mai.

Anthonomus Germar.

A. sorbi Germ. Upjever, Dreibergen. Auf Weissdorn und Eberesche.
Häufig. Mai, Juli.

Orchestes Illiger.

O. avellanae Donovan. Upjever. Auf Sträuchern. Nicht häufig.

Gymnetron Schoenherr.

G. villosulum Gyll. Neuende. An einem Graben geketschert

Miarus Stephens.

M. campanulae L. Südholz. Geketschert. Nicht selten. Juni.

Ceutorrhynchus Germar.

C. signatus Gyll. Südholz. Geketschert. Selten. Mai.

Phytobius Schoenherr.

Ph. quadrituberculatus F. Jever. Geketschert.

Scolytidae.

Dendroctonus Erichson.

D. micans Kugel. Hengstforde. In einer Sandgrube. Selten. Juni.

Xyleborus Eichhoff.

X. monographus F. ♀ Torsholt. Aus Eichenrinde gezogen. Selten. Mai.

Chrysomelidae.

-Donacia Fabricius.

D. crassipes F. Dreibergen. Auf *Nymphaea alba* L. Selten.

D. vulgaris Zschach (*typhae* Ahrens). Augustfehn. Auf *Typha latifolia* L. Selten. Juni.

Haemonia Latreille.

H. zosteriae F. var. *Curtisi* Lac. Bei Wilhelmshaven. An Wasserpflanzen. Selten. Juni.

Cryptocephalus Geoffroy.

Cr. pusillus F. Ocholt. Auf Weiden. Selten. Juni.

Melasoma Stephens.

M. cuprea F. Zwischenahn. Auf Bruchweiden. Selten. Juni.

Chrysomela Linné.

Chr. brunsvicensis Grav. (*duplicata* Zenk.) Barneführer Holz. Nicht häufig. Juni.

Chr. purpurascens Germ. Apen. Im angetriebenen Schilf. Selten. Oktober.

Crioceris Geoffroy.

Cr. lilii Scop. (*merdigera* F.) Auf Lilien. Häufig. Mai.

Longitarsus Latreille.

L. luridus Scop. Augustfehn. Auf Wiesen. Häufig. Mai, Oktober.

Aphthona Chevrolat.

A. lutescens Gyll. Augustfehn. Unter angetriebenen Pflanzen. Häufig.
Juni, September, Oktober.

Phyllotreta Foudras.

Ph. aenea Allard. Augustfehn. Geketschert. Selten. August.

Erotylidae.

Dacne Latreille.

D. rufifrons F. Augustfehn. An Baumpilzen. Selten. Mai.

Berichtigung.

Im ersten Nachtrag, Seite 353, ist *Longitarsus abdominalis* Duft. zu streichen.

Im zweiten Nachtrag, Seite 59, lies statt Dr. med. Köben —
Dr. med. Rößen.

Seite 69 ist *Longitarsus brunneus* Duft. zu streichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1896-1897

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Wiepken Carl Friedrich

Artikel/Article: [Dritter Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. 235-240](#)