

Fünfter Nachtrag

zum

systematischen Verzeichnis der bis jetzt im
Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten.

Von

C. F. Wiepken,

Direktor des Grossherzoglichen naturhistorischen Museums zu Oldenburg,
zusammengestellt und herausgegeben von

Medizinalrat Dr. med. Röben zu Augustfehn.

Vergl. Abhandl. d. Naturw. Vereins zu Bremen Bd. VIII S. 39—101, Bd. IX
S. 339—354, Bd. XIII S. 59—70, Bd. XIV S. 235—240, Bd. XVII S. 203—215.

Es liegt mir zunächst die angenehme Pflicht ob, dem Herrn
Oberlehrer Künnemann zu Oldenburg für seine freundliche Bereit-
willigkeit die Herausgabe dieses fünften Nachtrages durch Mitteilung
der überaus reichen und interessanten Sammel-Ausbeute, zu fördern,
meinen besonderen Dank auszusprechen. Ebenso bin ich den Herren
Hauptlehrer Becker-Varel, Landgerichtsrat Fischer-Vegesack, Archi-
tekt Klingenberg-Zwischenahn für die Ueberlassung der von ihnen
gesammelten für Oldenburg neuen Käfer, zu grossem Danke ver-
pflichtet.

Die vielen zum Teil neuen Arten liessen eine weitere Be-
folgung der bisherigen Ordnung nach dem Catalogus Coleopterorum
Harold und Gemminger als unzweckmässig und manchmal irreführend
erscheinen. Ich bin deshalb für den fünften Nachtrag dazu über-
gegangen, die in der neuesten Ausgabe des Catalogus Coleopterorum
Europae, Caucasi et Armeniae rossicae von L. von Heyden, E. Reitter
und J. Weise gegebene Anordnung zur Richtschnur zu nehmen.

Im Folgenden bedeuten die Abkürzungen:

a = aberratio. var. = Varietät. det. = determinavit. B. = Becker, Haupt-
lehrer, Varel. F. = Fischer, Landgerichtsrat, Vegesack. Kl. = Klingenberg,
Architekt, Zwischenahn. K. = Künnemann, Oberlehrer, Oldenburg.
R. = Röben, Dr. med., Augustfehn.

Adephaga.

Carabidae.

Dyschirius Bonelli.

D. impunctipennis, Daws. Wangerooge, August. Unter Seetang, am
Wattstrand. Selten, R.

D. laeviusculus Putz. Amelhausen, Juli. Ein Stück am Hunte-
ufer, K.

Bembidion Latreille.

- B. normannum* Dej. Dangast. Unter dem Anspühlicht zusammen mit *B. minimum* Fabr., K. Auch in Ellenserdam, Juni, R.

Bradycellus Erichson.

- B. harpalinus* Serv. Huntlosen. Im Herbst, K. Apen. Im Oktober unter dem Anspühlicht nicht ganz selten, R.

Amara Bonelli.

- A. infima* Duft. Huntlosen. April, Mai, Dezember. Selten, K.

Sphodrus Clairville.

- S. leucophthalmus* L. Einmal, ein Stück im Stühe gefunden, K.

Dytiscidae.

Haliplus Latreille.

- H. confinis* Steph. — *lineatus* Aubé. Moorhausen, Juni. Wechloy, Huntlosen, im September. Selten, K.

Hydroporus Clairville.

- H. granularis* L. Huntlosen. Wechloy, September. In Moortümpeln. Selten, K.

- H. piceus* Steph. Huntlosen, Frühling und Herbst. Sehr selten, K.

- H. obscurus* Strm. Huntlosen, Wechloy, Frühling und Herbst. Nicht selten, K.

Rhantus Lacordaire.

- Rh. Grapi* Gyll. Varel. Selten, B.

Polyphaga.

Staphylinidae.

Proteinus Latreille.

- P. atomarius* Er. Ocholt. Neuenburg. Aus *Fistulina hepatica* gezogen. Oktober. Selten, R. Auch in Varel, K.

Aerolocha Thomson.

- A. amabilis* Heer. — *Hampei* Redt. Augustfehn. Im Herbst in Baumschwämmen und Boletusarten. Selten, R.

Omalium Gravenhorst.

- O. oxyacanthae* Grav. Ofen, Dangast, Huntlosen, Mai. Unter Baumrinde. Selten, K.

- O. exiguum* Gyll. Huntlosen. Ein Stück gesiebt, K.

Xylodromus Heer.

- X. concinnus* Marsh. Huntlosen. Häufig, K. Auch in Augustfehn. In Holzställen am Fenster häufig, Mai, Juni, R.

Acidota Mannerheim.

- A. cruentata* Mann. Huntlosen. 26. Oktober 1907 ein Stück gekäschert. November 10 einige Stücke in Sandgruben gefunden, K.

Trogophloeus Mannerheim.

Tr. arcuatus Steph. Huntlosen, April. Am Hunteufer, K.

Tr. despectus Baudi — *exiguus* Gangl. Huntlosen, April. Am Hunteufer, K.

Platystethus Mannerheim.

P. cornutus Grav. var.: *alutaceus* Thoms. Huntlosen. Oktober ein Stück, K.

Bledius Stephens.

B. pallipes Grav. Beverbeekenberg bei Oldenburg, Mai. Häufig, K.

Stenus Latreille.

St. incrassatus Er. Huntlosen, 30. September und 22. Mai 1904 je ein Stück, K.

St. bifoveolatus Gyll. Huntsmühlen, Mai, ein Stück, K.

St. nitidiusculus Steph. — *tempestivus* Er. 27. März 1907. Zu Huntlosen aus dem Anspühlicht gesiebt, K.

St. pallipes Grav. Amelhausen. Am Hunteufer 1. Mai 1904, ein Stück, K.

Euaesthetus Gravenhorst.

Eu. laeviusculus Mann. Huntlosen, Juni. Am Hunteufer, K. Augustfehn, Oktober unter Anspühlicht. Selten, R.

Paederus Fabricius.

P. gemellus Kraatz. Huntlosen, K. Ocholt, Apen. Mai, Juni an sonnigen Tagen am Ufer bewachsener Tümpel nicht selten, R.

Stilicus Serville.

St. geniculatus Er. Huntlosen, April ein Stück, K.

Lathrobium Gravenhorst.

L. terminatum Grav. Augustfehn, April. Unter Steinen selten, R. Huntlosen, am Hunteufer, K.

L. boreale Thoms. — *geminum* Kraatz. Huntlosen, Dangast, April bis Juni. Nicht selten, K.

L. ripicola Czwalina. Wildenloh, Huntlosen, Mai, Oktober. Selten, K.

L. pallidum Nordm. Huntlosen, in einer Sandgrube ein Stück, K.

Philonthus Stephens.

Ph. immundus Gyll. Huntlosen. Nicht selten am faulenden Unkraut, K.

Ph. varius Gyll. Huntlosen, Juni, ein Stück, K.

Ph. longicornis Steph. Huntlosen, April, ein Stück, K.

Ph. varians Payk. var.: *agilis* Grav. Huntlosen, Juni, ein Stück, K.

Ph. quisquiliarius Gyll. Huntlosen, ein Stück, Juni, K.

Ph. ventralis Grav. Huntlosen, Juni, ein Stück, K.

Ph. fumarius Grav. Donnerschwee. Am Hunteufer, ein Stück, K.

Staphylinus Linné.

St. compressus Marsh. Ocholt, Juli. In einer Mergelgrube unter Laub, R.

Quedius Stephens.

Qu. ochripennis Ménétr. var.: *nigrocoeruleus* Fauv. Huntlosen. Nicht selten, K.

Qu. cruentus Ol. var.: *virens*. Rottenb. Huntlosen, Juni. Ein Stück am fließenden Eichensaft, K.

Qu. fumatus Steph. — *peltatus* Er. Huntlosen, November, auch im April gesiebt, K.

Qu. lucidulus Er. Huntlosen, April gesiebt, K.

Heterothops Stephens.

H. quadripunctula Grav. Huntlosen, März. Ein Stück aus dem Anspühlicht gesiebt. Ebendort Juni zwei Stücke gekäschert, K.

Euryporus Erichson.

Eu. picipes Payk. Huntlosen, 4. April 1907. Ein Stück aus Laub gesiebt, K.

Mycetoporus Mannerheim.

M. Baudueri Rey. — *nanus* Er. Huntlosen, Mai. Ein Stück von trockenen Kiefernzweigen geklopft, K.

M. longulus Mann. Huntlosen. 30. März 1907. Ein Stück im Fluge gefangen, K.

M. forticornis Fauv. Huntlosen, September. In einer Sandgrube, K.

M. clavicornis Steph. Huntlosen. Ein Stück aus Laub gesiebt, K.

Hypocyptus Mannerheim.

H. longicornis Payk. Huntlosen. Nicht selten, K.

Habrocerus Erichson.

H. capillaricornis Grav. Huntlosen, Oktober, November. Aus Laub gesiebt, K.

Myllaena Erichson.

M. gracilicornis Fairm. Dangast, Juni. Ein Stück unter dem Anspühlicht, K.

M. brevicornis Matthews. Huntlosen, ein Stück, K.

Encephalus Westwood.

E. complicans Westw. Huntlosen. Ein Stück in den Rieselwiesen gekäschert. Mehrere Stücke in Sandgruben gefunden, K.

Gyrophæna Mannerheim.

G. pulchella Heer. Ocholt, September, Oktober. In Pilzen nicht selten, R. Auch in Huntlosen, K.

G. fasciata Marsh. — *congrua* Er. Ocholt, Oktober. In faulen Kapuzinerpilzen. Selten, R.

G. strictula Er. Huntlosen, an Baumschwämmen, März. Nicht selten, K.

Tachyusa Erichson.

T. leucopus Marsh. — *flavitarsis* Sahlb. Huntlosen. Am Hunteufer, K.

T. scitula Er. Huntlosen, Mai. Am Hunteufer. Selten, K.

Atheta Thomson.

A. languida Er. var.: *longicollis* Rey. Huntlosen. Mai am Hunteufer, K.

A. incana Er. Huntlosen, Juni, im Moor, K.

A. occulta Er. Augustfehn. Unter Laub, Oktober, selten, R.

A. talpa Heer. Huntlosen, April. Bei *Formica rufa* nicht selten, K.

Chilopora Kraatz.

Ch. longitarsis Er. Huntlosen, April, aus Laub gesiebt, ein Stück, K.

Oxypoda Mannerheim.

O. annularis Mann. Huntlosen, Oktober. Ein Stück aus Laub gesiebt, K.

Microglossa Kraatz.

M. nidicola Fairm. Beverbeeken-Berg bei Oldenburg. In den Nesthöhlen von *Hirundo riparia*, Juni, K.

Aleochara Gravenhorst.

A. intricata Mann. — *bipunctata* Ol. Huntlosen. An Aas und im Dünger häufig. K.

Pselaphidae.

Bythinus Leach.

B. puncticollis Denny. Huntlosen, Mai. Aus Laub gesiebt, K.

Scydmaenidae.

Neuraphes Thomson.

N. elongatulus Müll. Huntlosen, April, Oktober. Aus feuchtem Laub gesiebt, K.

Euconnus Thomson.

Eu. fimetarius Chaud. Huntlosen, Juni. Aus feuchtem Laub gesiebt, K.

Silphidae.

Catops Paykul.

C. grandicollis Er. Huntlosen, August, September. Am Aas, K. Auch in Augustfehn, selten, R.

Colon Herbst

C. appendiculatum Sahlb. Huntlosen, Juli. Ein Männchen am Abend gekäschert, K.

Liodidae.

Amphicyllis Erichson.

A. globus Fabr. Huntlosen. Die Stammform, Mai aus feuchtem Laub gesiebt, K.

Cyrtoplastus Reitter.

C. seriepunctatus Bris. det. Reitter. Huntlosen, Juni. Einige Stücke in einer Sandgrube gefunden, K.

Agathidium Illiger.

A. marginatum Strm. Huntlosen, Mai. Unter einem Brett mehrere Stücke, K.

A. varians Beck. Huntlosen, April. Gesiebt aus Laub und verpilztem Holze.

Corylophidae.

Orthoperus Stephens.

O. atomus Gyll. — *pictus* Reitt. Huntlosen, an altem Holz, K.

Trichopterygidae.

Trichopteryx Kirby.

T. thoracica Gillm. Augustfehn, Juni. Ein Stück unter einem Ziegelsteine auf Gartenboden gefunden, R.

T. intermedia Gillm. Huntlosen. Aus feuchtem Laub gesiebt. Häufig vom Frühling bis zum Herbst, K. Auch in Wangerooge August, R.

T. brevipennis Er. — *clavipes* Gillm. Huntlosen, November, selten, K.

Histeridae.

Hister Linné.

H. striola Sahlb. — *succicola* Thoms. Huntlosen, Mai am ausfließenden Birkensaft, K.

Carcinops Marseul.

C. pumilio Er. — *quatuordecimstriata* Steph. Deichhausen. Im Herbst zahlreich in einem Storehnest, F.

Gnathoncus Duval.

Gn. punctulatus Thoms. Huntlosen. In Aborten, Stallungen nicht selten, K.

Saprinus Erichson.

S. rugifrons Payk. Dangast, selten, K. Auch in Wangerooge August, R.

S. metallicus, Herbst. Wangerooge, August. Im Dünensande nicht selten, R.

Palpicornia.

Hydrophilidae.

Helophorus Fabricius.

H. brevipalpis Bed. — *griseus* Rey. Dangast, K.

H. crenatus Rey. Donnerschwee, Hunteniederung. In Gräben, Mai ein Stück, April 1907 in Anzahl wiedergefangen, K.

H. strigifrons Thoms. Moorhausen, Bornhorst, Mai, Juni. In den Gräben niedriger, sumpfiger Wiesen; auch bei Ofen nicht selten, K.

Hydrochus Leach.

H. brevis Hrbst. Ohmstede, Juni, nicht häufig, K.

Hydraena, Kugelann.

H. testacea Curtis. Huntlosen, April ein Stück, K.

Anacaena Thomson.

A. limbata Fabr. Huntlosen, Frühling bis Herbst sehr häufig in Gräben, K.

Phlydrus Solier.

P. minutus Fabr. — *affinis* Thunb. In moorigen Gewässern in Huntlosen nicht selten, K.

P. frontalis Er. Huntlosen. Mit dem vorhergehenden nicht selten, K.

Laccobius Erichson.

L. biguttatus Gerh. — *bipunctatus* Bedel. Dangast, Juni, nicht selten, K.

L. nigriceps Thoms. Wangerooze, Juni, K.

L. nigriceps Thoms. var.: *maculiceps* Rottenb. Huntlosen, April, K.

Cantharoidea.

Cantharidae.

Malthinus Latreille.

M. frontalis Marsh. Ocholt, Juni. Von Sträuchern geklopft, selten, R.

Trichoceble Thomson.

Tr. memnonia Kiesw. Huntlosen. Ein Stück auf einer gefällten Kiefer, K.

Nitidulidae.

Epuraea Erichson.

E. neglecta Heer. Huntlosen. Unter Buchenrinde, sehr selten, K.

Omosiphora Reitter.

O. limbata Ol. Huntlosen, April. Ein Stück aus Laub gesiebt, K.

Omosita Erichson.

O. depressa L. Huntlosen. Ein Stück am Aas, K.

Nitidula Fabricius.

N. rufipes L. — *obscura* Ol. Huntlosen. Am Aas, K.

N. carnaria Schall. — *quadripustulata* Fabr. Huntlosen. Am Aas, K.

Meligethes Stephens.

M. coeruleovirens Foerst. Oldenburg. Mai häufig auf *Caltha palustris*, K.

- M. serripes* Gyll. Huntlosen, häufig, K.
M. lugubris Strm. det. Reitter. Huntlosen, K.
M. coracinus Strm. var.: *pumilus* Er. det. Reitter. Huntlosen, K.
M. Letzneri Reitt. det. Reitter. Huntlosen, K.

Rhizophagus Herbst.

- Rh. parallellocollis* Gyll. Huntlosen, Ofen, Mai abends schwärmend, K.
Rh. aeneus Richter. — *coeruleipennis* Sahlb. Ofen, April unter Buchenrinde, selten, K.

Cryptophagidae.

Micrambe Thomson.

- M. abietis* Payk. Ofen, April. Ein Stück von einer Fichte geklopft, K.

Atomaria Stephens.

- A. linearis* Steph. Wangerooge, Juni, K.

Phalacridae.

Olibrus Erichson.

- O. millefolii* Payk. Huntlosen. Auf *Achillaea millefolium*, nicht selten, K.
O. corticalis Panz. Huntlosen, Juni, K.

Lathrididae.

Eniemus Thomson.

- E. fungicola* Thoms. Huntlosen, 17. Juni 1907 aus verpilztem Holze gesiebt, K.

Corticaria Marsham.

- C. longicollis* Zetterst. Huntlosen, K. Angustfehn, bei Formicarufla nicht selten. April, R.

Coccinellidae.

Scymnus Kugelann.

- S. abietis* Payk. Huntlosen, August. Ein Stück gekäschert, K.

Nephus Mulsant.

- N. bipunctatus* Kug. Huntlosen, 2. Mai 1907. Ein Pärchen gekäschert, K.

Heteroceridae.

Heterocerus Fabricius.

- H. obsoletus* Curt. Varel. Ein Stück unter Anspühlicht am Wattstrand, B.

Elateridae.

Agriotes Eschscholtz.

- A. pallidulus* Ill. Huntlosen, Juni. Ein Stück in den Rieselwiesen gekäschert, K.

Hypnoideus Stephens.

- H. pulchellus* L. var.: *exiguus* Rand. = ♀ *sabulicola* Boh. Dangast.
Unter dem Anspühlicht am Strande ein Stück, K.

Buprestidae.

Agrilus Curtis.

- A. elongatus* Herbst. — *tenuis* Ratzeb. Huntlosen, Juni. Ein Stück
von Eichenzweigen geklopft, K.

Anobiidae.

Ernobius Thomson.

- E. abietinus* Gyll. Huntlosen, 19. Mai 1907 ein Stück von einer
Fichte geklopft, K.

Anthicidae.

Anthicus Paykul.

- A. floralis* L. var.: *quisquilius* Thoms. Huntlosen, Oktober. Ein
Stück aus gegätetem Unkraut gesiebt, K.

Mordellidae.

Tomoxia Costa.

- T. biguttata* Gyll. Zwischenahn, Kl.

Alleculidae.

Gonodera Mulsant.

- G. murina* L. — a. *evonymi* Fabr. Huntlosen, Mai. Mehrfach am
Hunteufer gekäschert, K.

Phytophaga.

Cbrysomelidae.

Donacia Fabricius.

- D. obscura* Gyll. det. Reitter. Huntlosen, 22. Mai 1907 ein Stück
gekäschert, K.

Cryptocephalus Geoffroy.

- C. ocellatus* Diap. — *geminus* Gyll. Varel, B. Huntlosen, K.

Chrysomela Linné.

- Chr. quadrigemina* Suffr. Huntlosen, April, K.

Phyllodecta Kirby.

- Ph. laticollis* Suffr. Huntlosen. Ein Stück gekäschert, Oktober, K.

Hydrothassa Thomson.

- H. hannoverana* Fabr. a.: *germanica* Wse. Zwischenahn, Kl.

Melasoma Stephens.

- M. saliceti* Wse. Huntlosen. Im Jahre 1902 sehr häufig am Hunte-
ufer. In anderen Jahren weniger häufig, K.

Psylliodes Berthold.

Ps. dulcamarae Koch. Varel, B. Huntlosen, K.

Longitarsus Latreille.

L. brunneus Duft. Dangast, Ohmstede, K. Augustfehn, R. Auf feuchten Wiesen Juni bis Oktober häufig.

Apteropeda Chevrolat.

A. orbiculata Marsh. Huntlosen, April, Mai, Oktober, K.

Rhynchophora.

Curculionidae.

Strophosomus Stephens.

St. curvipes Thoms. det. Reitter. Huntlosen, Mai und Juni 1906 und 1907 in Sandgruben und auf *Calluna vulgaris*, K.

Sitona Germar.

S. humeralis Steph. det. Reitter. Huntlosen, 22. Mai 1907 ein Stück gekäschert, K.

Trachyploeus Germar.

Tr. bifoveolatus Beck. Huntlosen in einer Sandgrube, K. Auch in Augustfehn auf dem Bahndamm, R. Mai, selten.

Tr. aristatus Gyll. Huntlosen, in Sandgruben, Mai, K.

Phytonomus Schoenherr.

Ph. arundinis Payk. Klein Bornhorst, Mai. Am Grabenufer gekäschert, K.

Dorytomus Stephens.

D. validirostris Gyll. Huntlosen. Unter Pappelrinde überwinternd, März, K.

Smicronyx Schoenherr.

S. jungermanniae Reich. — *variegatus* Gyll. Huntlosen, Ofen. Mai auf Kiefern, K.

Bagous Schoenherr.

B. glabrirostris Hrbst. Zwischenahn, Mai 1891 in Anzahl gesammelt, K.

B. glabrirostris Hrbst. — *luteolus* Gyll. — *colliguensis* Hrbst. var.: *nigritarsis* Thoms. Zwischenahn, K.

B. subcarinatus Gyll. — *longitarsis* Thoms. Wangerooge, 8. Juni 1900 ein Stück, K.

Rhyncolus Germar.

R. culinaris Germ. Augustfehn, Oktober. Im Hause am Fenster, R.

Acalles Schoenherr.

A. ptinoides Marsh. det. Reitter. Huntlosen. Ein Stück im September gesiebt, R.

Ceutorrhynchus Germar.

- C. viduatus* Gyll. Huntlosen, Juni, K.
C. Sahlbergi Boh. Huntlosen, 12. Mai 1907 ein Stück gekäschert.
C. suturalis Fabr. Huntlosen, 31. Oktober 1907 ein Stück in einer Sandgrube, K.
C. arquatus Hrbst. det. Schultze. Huntlosen. Ein aberrantes Stück aus dem Anspühlicht gesiebt, wahrscheinlich var. *occultus* Gyll., K.
C. millefolii Schultze det. Schultze. Huntlosen. Von Mai ab auf *Tanacetum vulgare*, selten, K.
C. triangulum Boh. det. Schultze. Huntlosen, Mai, Juni mehrfach gefunden. Vielleicht auf *Achillaea millefolium*.
C. rugulosus Hrbst. det. Schultze. Huntlosen, Juni, auf *Tanacetum vulgare*, K.
C. punctiger Gyll. Huntlosen, Wechloy. Ziemlich selten, K.
C. cochleariae Gyll. Huntlosen, Juni. Auf feuchten Wiesen gekäschert, K.
C. scapularis Gyll. Huntlosen, Mai, Juni am Hunteufer, K.

Baris Germar.

- B. chlorizans* Germ. Huntlosen, Mai, Juni, K.

Limnobaris Bedel.

- L. pusio* Boh. Huntlosen. Mitte Mai 1907 mehrere Stücke an Gräben gekäschert.

Tychius Germar.

- T. meliloti* Steph. Augustfehn, Mai ein Stück gekäschert, R.

Gymnetron Schoenherr.

- G. antirrhini* Payk. — *noctis. auct.* Huntlosen. Auf blühender *Linaria* nicht selten, K.

Nanophyes Schoenherr.

- N. globulus* Germ. Huntlosen, April gekäschert, K.

Magdalis Germar.

- M. linearis* Gyll. Huntlosen, Juni. Auf Kiefern sehr selten, K.
M. frontalis Gyll. Huntlosen, Juni. Auf Kiefern selten, K.

Apion Herbst.

- A. compactum* Desbr. Huntlosen, Mai. Auf *Genista anglica*, K.
A. pallipes Kirby. Hasbruch, April. Auf *Mercurialis perennis*. K.
A. sanguineum Deg. Huntlosen, Mai. Ein Stück in einer Sandgrube, K.
A. ervi Kirby. Hasbruch, Mai ein Stück, K.

Rhynchites Schueider.

- Rh. tomentosus* Gyll. — *planirostris* Desbr. Huntlosen. Auf Birken häufig, K.

Ipidae.**Eccoptyogaster** Herbst.

- E. mali* Bechst. *pruni* Ratz., var.: *piri* Ratz. Oldenburg. Oktober ein totes Stück unter Apfelbaumrinde. Zahlreiche Gänge auch mit Larven, K.

Pityophthorus Eichhoff.

- P. Lichtensteini* Ratzeb. Huntlosen. An Kiefernzweigen, Oktober ein Stück, K.
- P. ramulorum* Perr. det. Reitter. Huntlosen, Amelhausen, April und Mai an Kiefernzweigen, K.
- P. glabratus* Eichh. det. Reitter. Huntlosen, Ofen, Mai, an Kiefernzweigen, sehr selten, K.

Pityogenes Bedel.

- P. quadridens* Hartig. Huntlosen. Aus Fichten geschnitten, April, K.

Xyleborus Eichhoff.

- X. Saxeseni* Ratz. Huntlosen. Ofen. März, an Eichen, K.

Lamellicornia.**Scarabaeidae.****Aphodius** Illiger.

- A. pictus* Sturm. Huntlosen, März bis Oktober, nicht selten, K.
- A. sticticus* Panz. Huntlosen, Wechloy. Juni, September, selten, K.
- A. punctatosulcatus* Strm. Huntlosen, Ofen, K. Augustfehn im Frühling und Herbst beim Dünger, nicht selten, R.

Bei der, gelegentlich der Zusammenstellung dieses fünften Nachtrages zum Verzeichnis der Käfer Oldenburgs, vorgenommenen Durchsicht der Lokalsammlung, hat sich herausgestellt, dass folgende Arten irrtümlich in die bisher erschienenen Verzeichnisse aufgenommen sind und deshalb gestrichen werden müssen:

Bd. VIII der Abhandlungen der naturw. Ges. zu Bremen.

Seite 59: *Ocypus falcifer* Nordm.

„ 63: *Ocypus pedator* Grav.

„ 64: *Saprinus metallescens* Er.

Bd. XIII.

Seite 205: *Cercyon marinus* Thoms.

Bd. XVII.

Seite 212: *Anthicus salinus* Crotch.

„ 212: *Anaspis subtestacea*.

„ 212: *Trachyplocus laticollis* Boh.

„ 212: *Stephanocleonus excoriatus* Gyll.

„ 213: *Apion genistae* Kirby.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1907-1908

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Wiepken Carl Friedrich

Artikel/Article: [Fünfter Nachtrag zum systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. 301-312](#)