

Beitrag zur Flora von Bad Rehbürg und Umgegend.

Von

H. Kaufmann.

Nachfolgende Aufzeichnungen sollen nur ein weiterer Beitrag zur Flora der im Halbkreis gelagerten, schön bewaldeten Hügelkette sein, auf deren etwa halber Höhe das ehemals stark besuchte, jetzt aber verödete Bad Rehbürg, gleichsam in den Wald hineingebaut, liegt. Hierzu kommt noch der Pflanzenbestand der Umgebung, besonders des Steinhuder Meeres und seiner Ufer. Ueber die Flora von Rehbürg sind schon mehrfach von Buchenau u. A. Beiträge geliefert worden und bei dieser Gelegenheit auch über den ganzen Bezirk ausführlicher berichtet. Ich kann mich daher auf wenige Worte beschränken.

Das Gebiet ist nicht pflanzenreich, erheischt aber als Grenzgebiet unserer nordwestdeutschen Flora einiges Interesse. Auch ist das Umherstreifen in dieser landschaftlich anmutigen Gegend sehr lohnend, und nebenbei sei Jedem, der einmal kurze Zeit richtig ausruhen will, die absolute Waldesstille des Badeortes empfohlen.

Im botanischen Sinne besitzt die grösste Anziehungskraft das Hagenburger Moor, das sich zwischen Winzlar und Hagenburg, am südlichen Ufer des Steinhuder Meeres, erstreckt. Bekannter geworden ist es vornehmlich durch das Vorkommen von *Vaccinium macrocarpum*, das so eingebürgert ist, dass es streckenweise zahlreicher als *Vaccinium Oxycoccus* den Boden bedeckt. Die weitere Durchforschung des Moores und Sumpfes, eines noch ganz ursprünglichen Bodens, auf dessen Gräben noch nicht einmal *Helodea Canadensis* ihren Einzug gehalten hat, wird hoffentlich noch Vielen Anregung und Freude bereiten. Vordringen kann man bis unmittelbar ans Seeufer, auf den Bruchwiesen am besten barfuss, nur sei vor Stehenbleiben auf den „Fledderwiesen“, diesem schwimmenden Vegetationsteppich hart am Ufer, gewarnt, da immer die Gefahr eines Durchbruchs vorliegt. Wer zufällig auf ein Exemplar von *Ledum latifolium* stossen sollte, dem sei verraten, dass ich im Herbst 1908 zwei junge Pflanzen dem Moore einverleibt habe, mit dem freundlichen Wunsche: Seid fruchtbar und mehret euch. Im Frühjahr 1909 sah ich sie blühend, und steht zu hoffen, dass sie sich einbürgern.

Zu einem ausgedehnten Besuche des Rehburger Moores bin ich nicht mehr gekommen, ich hätte sonst gern nach dem Vorkommen von *Vaccinium macrocarpum* Umschau gehalten. Die Möglichkeit liegt ja nahe, dass eine Weiterverbreitung aus dem Hagenburger Moore dorthin stattgefunden hätte. Ob die Lebensbedingungen vorhanden wären, bliebe freilich noch abzuwarten. Der Besuch des Rehburger Moores sei übrigens empfohlen, ist es doch botanisch so ziemlich terra incognita.

Bei der Bestimmung meiner Funde bin ich von den Herren Med.-R. Dr. W. O. Focke und Dr. Bitter, Direktor des Botanischen Gartens in Bremen, in weitgehender Weise unterstützt worden, so dass es mir eine sehr angenehme Pflicht ist, den Dank hierfür auch an dieser Stelle zu registrieren.

Polypodiaceae.

Polypodium vulgare L. Verbreitet.

Pteridium aquilinum Kuhn. Am Waldwege zur „Matte“. Waldrand am „alten Felde“.

Blechnum Spicant Roth. Bad Rehburg: Mastbruch; im Gehölz gegenüber dem Bahnhof u. a.

Asplenium Trichomanes L. Bad Rehburg: Mauer am Sanatorium Michaelis. Bergkirchen: Kirhhofsmauer.

— *Ruta muraria* L. Bad Rehburg: Mauer am Sanator. Michaelis. Winzlar: Chausseebrücke bei der Landwehr. Bergkirchen: Spärlich an der Kirhhofsmauer, häufiger an der Mauer des Pfarrgartens und zahlreich an der Kirche. Loccum: Aussenmauer des Klosters.

Athyrium filix femina Roth. Verbreitet.

Phegopteris Dryopteris Fée. Bad Rehburg: U. a. an feuchter Stelle rechts am Walde kurz vor Beginn der ersten Steinbrüche auf dem Wege nach Berghol. Wölpinghausen: In einem Ziehbrunnen.

Polystichum Thelypteris Roth. Hagenburger Moor.

— *cristatum* Roth. Hagenburger Moor.

— *filix mas* Swartz. Bad Rehburg, Winzlar, Wiedenbrügge u. a.

— *spinulosum* DC. Bad Rehburg, Düdinghausen, Nordufer des Steinhuder Meeres.

Marsiliaceae.

Pilularia globulifera L. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Bad Rehburg u. a.

— *silvaticum* L. Bad Rehburg: Bei der Wolfsschlucht, Mastbruch u. a.

— *palustre* L. Verbreitet.

— *limosum* L. Hagenburger Moor. In den Seitengräben des Hagenburger Kanals. Im „neuen Teich“ bei Hagenburg.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago L. Hagenburger Moor.

— *complanatum* L. var. *Chamaecyparissus* Alex. Braun. Mardorf.
Loccum. Stadt Rehburg.

Coniferae.

Pinus silvestris L.

— *Strobus* L.

Larix decidua Miller

Juniperus communis L. Viele ältere Ex. in einem Kiefernbestande bei Mardorf.

Typhaceae.

Typha latifolia L. Winzlar, Hagenburger Moor, Münchehagen.

Typha angustifolia L. Südostseite des Steinhuder Meeres im Schilf.

Sparganium ramosum Hudson. Hagenburger Moor.

— *simplex* Hudson Winzlar, Hagenburger Moor.

— *minimum* Fries. In einem Seitengraben des Hagenburger Kanals.

Potamogetonaceae.

Zannichellia palustris L. Steinhuder Meer.

Potamogeton pectinata L. Steinhuder Meer.

— *densa* L. Steinhuder Meer.

— *compressa* L. Stadt Rehburg: In einem der Meerbacharme innerhalb der Stadt.

— *perfoliata* L. Steinhuder Meer.

— *natans* L. Steinhuder Meer: Nordufer. Wiedenbrügge. Seitengräben des Hagenburger Kanals.

— *lucens* L. Steinhuder Meer. Seitengräben des Hagenburger Kanals.

Juncaginaceae.

Triglochin palustris L. Bad Rehburg: Graben am Mastbruch.

Alismaceae.

Sagittaria sagittifolia L. Winzlar. Steinhuder Meer: Nordufer.

Alisma Plantago L. Steinhuder Meer: Nordufer. Seitengräben des Hagenburger Kanals. Bad Rehburg: Mastbruch. Wiedenbrügge. Hagenburg: Im Trenter Teich.

Hydrocharitaceae.

Hydrocharis morsus ranae L. Winzlar. Hagenburg.

Stratiotes aloides L. Winzlar. Hagenburg.

Gramineae.

Panicum lineare Krocker. Loccum. Stadt Rehburg.

— *Crus galli* L. In Gärten.

Setaria viridis Palisot de Beauvois Winzlar.

— *glauca* Palisot de Beauvois. Bad Rehburg: Im Felde bei den 6 Buchen.

- Phalaris arundinacea* L. Winzlar. Steinhuder Meer. Hagenburger Moor.
- Anthoxanthum odoratum* L. Verbreitet.
- Alopecurus pratensis* L. Bad Rehburg: Wiesen im Mastbruch u. a.
- *geniculatus* L. Wölpinghausen u. a.
- *fulvus* Smith. Winzlar.
- Phleum pratense* L. Bad Rehburg.
- Agrostis spica venti* L. Bad und Stadt Rehburg. Hagenburg. Steinhude.
- *vulgaris* Withering. Verbreitet.
- *alba* L. Verbreitet. Mit *Holcus lanatus* zusammen Hauptbestandteil der Wiesen am Hagenburger Kanal.
- Calamagrostis lanceolata* Roth. Winzlar. Hagenburg. Stadt Rehburg.
- *Epigeos* Roth. Am Bannsee.
- Milium effusum* L. Rehburger Stadtforst.
- Phragmites communis* Trinius. Winzlar. Steinhuder Meer. Wiesen am Hagenburger Moor.
- Aera caespitosa* L. Münchehagen. Hagenburg: Am Trenter Teich.
- *flexuosa* L. Bad Rehburg.
- Weingärtneria *canescens* Bernhardi. Stadt Rehburg. Mardorf.
- Holcus lanatus* L. Vielfach. Vorherrschend auf den Wiesen am Hagenburger Kanal.
- *mollis* L. Münchehagen. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburg: Am Trenter Teich.
- Avena caryophyllea* Weber. Stadt Rehburg. Hagenburg. Steinhude.
- *praecox* Palisot de Beauvois. Stadt Rehburg. Locom.
- Sieglingia decumbens* Bernhardi. Rehburger Stadtforst. Hagenburger Moor.
- Melica uniflora* Retzius. Bad Rehburg: Unter den Buchen am oberen Waldwege zur „Matte“. Rehburger Stadtforst.
- Briza media* L. Vereinzelt hier und da. Auf der „Matte“ in Wölpinghausen. Hagenburger Moor.
- Poa annua* L. Häufig.
- *nemoralis* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Münchehagen: An der Kirche. Hagenburg: Am Trenter Teich und im Moore.
- *compressa* L. Bergkirchen: An der Kirche und der Kirchhofsmauer.
- *pratensis* L. Verbreitet. Bad Rehburg: Mastbruch. Winzlar. Wölpinghausen. Hagenburg: Wiesen am Steinhuder Meer.
- Glyceria aquatica* Wahlberg. Winzlar. Steinhude: Am Steinhuder Meer.
- *fluitans* Rob. Brown. Bad Rehburg: Im Chausseeegraben beim Gastw. Wilkening. Hagenburg: Im Trenter Teich und im Moor.

- Catabrosa aquatica Palisot de Beauvois. Seitengraben des Hagenburger Kanals am Park.
Molinia coerulea Mönch. Bad Rehbürg: Mastbruch. Rehbürger Moor.
Dactylis glomerata L. Verbreitet.
Cynosurus cristatus L. Verbreitet.
Festuca ovina L. Bad Rehbürg. Bergkirchen u. a.
— elatior L. Bad Rehbürg.
— arundinacea Schreber. Bad Rehbürg. Winzlar.
— gigantea Villars. Bad Rehbürg: Mastbruch. Rehbürger Stadtforst. Hagenbürg: Am Trenter Teich.
— sciuroides Roth. Stadt Rehbürg.
Bromus mollis L. Bergkirchen. Düdinghausen.
Brachypodium silvaticum Römer et Schultes. Rehbürger Stadtforst. Waldrand bei Düdinghausen.
Lolium perenne L. Häufig.
Nardus stricta L. Rehbürger Moor. Wiesen unterhalb Berghol. Hagenbürg Wald.

Cyperaceae.

- Rhynchospora alba Vahl. Hagenbürg Moor.
— fusca Römer et Schultes. Hagenbürg Moor. Nordufer des Steinhuder Meeres.
Eriophorum vaginatum L. Hagenbürg Moor. Rehbürger Moor. Bad Rehbürg: Junge Kiefernplantation im Verlauf der Georgshöhe.
— angustifolium Roth. Hagenbürg Moor. Neustädter Moor.
Scirpus paluster L. Winzlar. Hagenbürg.
— acicularis L. Nordufer des Steinhuder Meeres.
— fluitans L. Hagenbürg Moor.
— setaceus L. Bad Rehbürg: Mastbruch.
— lacustris L. Bei Steinhude im Steinhuder Meer.
— silvaticus L. Feuchte Stelle am Walde zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.
— compressus Persoon. Graben am Mastbruch.
Carex dioeca L. Hagenbürg Moor.
— pulicaris L. Rehbürger Stadtforst.
— chordorrhiza Ehrhart. Hagenbürg Moor.
— arenaria L. Nordufer des Steinhuder Meeres: In den „schwarzen Bergen“.
— vulpina L. Hagenbürg: Am Moore und im Trenter Teich.
— teretiuscula Goodenough. Hagenbürg Moor.
— panniculata L. Hagenbürg Moor und Wiesen am Moor.
— paradoxa Willdenow. Hagenbürg Moor.

- Carex remota* L. Bad Rehburg: Mastbruch u. a. Hagenburg: Am Trenter Teich.
- *leporina* L. var. *argyroglochis* Hornemann. Bad Rehburg: In junger Pflanzung unweit des Adolfsplatzes.
- *echinata* Murray. Wölpinghausen u. a. Hagenburger Moor.
- *canescens* L. Hagenburger Moor.
- *stricta* Goodenough. Hagenburger Moor.
- *Goodenoughii* Gay. Hagenburger Moor.
- *acuta* L. Winzlar. Hagenburger Moor.
- *pilulifera* L. Rehburger Stadtforst.
- *panicea* L. Rehburger Moor. Steinhuder Meer: Nordufer. Hagenburger Moor.
- *pallescens* L. Bad Rehburg: In einer Schonung unweit des Adolfsplatzes.
- *silvatica* Hudson. Bad Rehburg: U. a. Gegend des Friedrichsplatzes, Mastbruch. Rehburger Stadtforst.
- *flava* L. var. *vulgaris* Döll. U. a. Rehburger Stadtforst.
- *flava* L. var. *Oederi* Ehrhart. Nordufer des Steinhuder Meeres.
- *flava* L. var. *lepidocarpa* Tausch. Hagenburger Moor.
- *pseudocyperus* L. Hagenburg: Trenter Teich.
- *rostrata* Withering. Hagenburger Moor.
- *vesicaria* L. Hagenburg: Moor und Trenter Teich.
- *acutiformis* Ehrhart. Hagenburger Moor.
- *filiformis* L. Hagenburger Moor.
- *hirta* L. Hagenburger Wald.

Araceae.

- Arum maculatum* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Zahlreich am Standort von *Corydalis cava*. Zwischen Münchehagen und Berghol. Wölpinghausen.
- Calla palustris* L. Hagenburger Moor. Nordufer des Steinhuder Meeres.
- Acorus Calamus* L. Nordufer des Steinhuder Meeres: Am „schwarzen Berge“. In den Seitengraben des Hagenburger Kanals.

Lemnaceae.

- Lemna trisulca* L. Häufig.
- *minor* L. Häufig.
- *polyrrhiza* L. Hagenburger Moor.

Juncaceae.

- Juncus effusus* L. Häufig.
- *glaucus* Ehrhart. Am Wege zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

- Juncus filiformis* L. Nordufer der Steinhuder Meeres. Hagenburger Moor. Bannsee.
— *compressus* Jacquin. Zwischen Winzlar und Wiedenbrügge.
— *squarrosus* L. Stadt Rehburg.
— *bufonius* L. Bad Rehburg: Mastbruch u. a.
— *Tenageja* Ehrhart. Bei Mardorf am Steinhuder Meer.
— *supinus* Mönch. Hagenburger Moor u. a.
— *supinus* Mönch f. *uliginosus* Roth. Nordufer des Steinhuder Meeres.
— *lampocarpus* Ehrhart. Bad Rehburg: Mastbruch. Wiesen bei Berghol-Wölpinghausen.
— *acutiflorus* Ehrhart. Bad Rehburg: Mastbruch.
Luzula pilosa Willdenow. Bad Rehburg. Rehburger Stadtforst u. a.
— *campestris* DC. var. *multiflora* Celakovsky. Häufig.
— *campestris* DC. var. *pallescens* Wahlenberg. Hier und da.

Liliaceae.

- Gagea lutea* Schultes. Am Wege zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch mehrfach.
Allium ursinum L. Bad Rehburg: Am oberen Waldwege zur „Matte“ unter den Buchen.
Majanthemum bifolium Schmidt. Bad Rehburg: Mastbruch u. a. Hagenburger Wald.
Polygonatum multiflorum Allioni. Bad Rehburg: Mastbruch u. a. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch im Walde vielfach. Hagenburger Wald.

Amaryllidaceae.

- Leucojum vernum* L. Düdinghäuser Wald.

Iridaceae.

- Iris Pseudacorus* L. Verbreitet.

Orchidaceae.

- Orchis Morio* L. Wiesen am Hagenburger Walde. Wiesen unterhalb Berghols.
— *mascula* L. Wiesen unterhalb Berghols.
— *latifolia* L. Wiesen am Hagenburger Walde und am Steinhuder Meer.
— *incarnata* L. Hagenburg: Wiesen am Steinhuder Meer.
— *maculata* L. Wiesen am Hagenburger Kanal und weiterhin am Steinhuder Meer. Wiesen unterhalb Berghols u. a.
Platanthera bifolia Reichenbach. Hagenburger Moor (zahlreich).
Epipactis palustris Crantz. Auf feuchten Wiesen bei Winzlar.
Epipactis latifolia L. Bad Rehburg: Mastbruch. Gehölzrand in der Nähe der Gärtnerei Facius & Co.

Liparis Loeselii Richard. Hagenburg: Vereinzelt am Rande des Moores. Zahlreich weiterhin auf den Wiesen am Steinhuder Meere.

Myricaceae.

Myrica Gale L. Rehburger Moor.

Salicaceae.

Salix alba L. var. *vitellina* L. Hagenburg: Im Walde am „neuen Teich“.

— *cinerea* L. In den Steinbrüchen Berghol. Bei den Hütten vor Berghol. Am Hagenburger Walde.

— *aurita* L. Bei den Hütten vor Berghol. Rehburger Stadtforst.

— *repens* L. Hagenburger Moor. Wiesen unterhalb Berghols.

Populus tremula L. Im Steinbruch Berghol.

Betulaceae.

Carpinus Betulus L. Häufig.

Corylus Avellana L. Zerstreut.

Alnus glutinosa Gärtner. Hagenburger Moor.

Betula verrucosa Erhart. Verbreitet.

— *pubescens* Ehrhart. Verbreitet.

Fagaceae.

Fagus silvatica L. Waldungen.

Quercus pedunculata Ehrhart. Vielfach, auch in grösseren Beständen.

Cannabaceae.

Humulus Lupulus L. Winzlar. Wölpinghausen. Am Hagenburger Walde.

Urticaceae.

Urtica urens L. Verbreitet.

— *dioeca* L. Verbreitet.

Polygonaceae.

Rumex Acetosa. Verbreitet.

— *Acetosella* L. Verbreitet.

— *Hydrolapathum* Hudson. Seitengraben des Hagenburger Kanals.

— *crispus* L. Bad Rehburg u. a.

— *obtusifolius* L. Bad Rehburg: Mastbruch u. a.

Polygonum amphibium L. Stadt Rehburg. Hagenburger Moor. Steinhuder Meer: Beim Strandhôtel in Steinhude u. am Nordufer.

— *lapathifolium* L. Verbreitet.

— *Persicaria* L. Verbreitet.

— *Hydropiper* L. Verbreitet.

— *minus* Hudson. Zerstreut. Aussergewöhnlich gross im Mastbruch.

— *aviculare* L. In allen Varietäten verbreitet.

- Polygonum convolvulus* L. Winzlar u. a.
— *dumetorum* L. Stadt Rehbürg.

Chenopodiaceae.

- Atriplex patulum* L. Bad Rehbürg u. a. an Wegen und auf Schuttstellen.
— *hastatum* L. Bad Rehbürg u. a.
Chenopodium polyspermum L. Bad Rehbürg: Mastbruch u. a. m.
— *murale* L. Münchehagen. Loccum. Steinhude.
— *album* L. Verbreitet. Anf Wegen im Hagenburger Moor.
— *rubrum* L. Bad Rehbürg.
— *bonus Henricus* L. Loccum: Am Wege bei der Klostermauer. Wölpinghausen.

Portulacaceae.

- Montia minor* Gmelin. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Paronychiaceae.

- Illecebrum verticillatum* L. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Scleranthaceae.

- Scleranthus annuus* L. Verbreitet.
— *perennis* L. Nordufer des Steinhuder Meeres: In den „schwarzen Bergen“.

Alsiniaceae.

- Spergula arvensis* L. Bad Rehbürg. Winzlar. Stadt Rehbürg.
— *vernalis* Willdenow. Mardorf.
Spergularia rubra Presl. Wölpinghausen. Bergkirchen. Bad Rehbürg. Mardorf. Schneeren.
Sagina procumbens L. Häufig.
— *nodosa* Fenzl. Nordufer des Steinhuder Meeres.
Cerastium arvense L. Verbreitet.
— *glomeratum* Thuillier. Bad Rehbürg: Mastbruch. Hagenburger Moor.
— *triviale* Link. Münchehagen: An der Kirche.
Arenaria serpyllifolia L. Loccum. Stad Rehbürg.
Stellaria nemorum L. Bad Rehbürg. Hagenbürg.
— *media* L. Häufig.
— *Holostea* L. Bad Rehbürg. Hagenburger Wald u. a.
— *glauca* Withering. Hagenburger Moor.
— *graminea* L. Verbreitet. Gräben am Hagenburger Moor.
— *uliginosa* Murray. Bad Rehbürg: Mastbruch. Nordufer des Steinhuder Meeres u. a.
— *crassifolia* Ehrhart. Wiesen am Hagenburger Kanal.

Silenaceae.

- Dianthus Armeria* L. Am Weggraben zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.
— *deltoides* L. Zwischen Hagenburg und Winzlar auf der Höhe.
Melandryum album Garcke. Winzlar. Bad Rehburg u. a.
— *rubrum* Garcke. Bad Rehburg. An der Landstrasse Bergkirchen-Sachsenhagen u. a.
Coronaria flos cuculi Alex. Braun. Besonders zahlreich auf den Wiesen am Hagenburger Kanal.
Agrostemma Githago L. Hier und da. Eine Zwergform von wenigen Centim. Höhe bei den Hütten vor Berghol.

Nymphaeaceae.

- Castalia alba* Woodville et Wood. Bannsee. Steinhuder Meer: Neustädter Seite. Stadt Rehburg: Südbach. Loccum: Im grossen Klosterteich.
Nymphaea lutea L. Steinhuder Meer: Nordufer. Seitengräben des Hagenburger Kanals.

Ceratophyllaceae.

- Ceratophyllum demersum* L. Steinhuder Meer. Hagenburger Moor.

Ranunculaceae.

- Thalictrum flavum* L. Hagenburg: Am Trenter Teich.
Hepatica nobilis Schreber. Bad Rehburg: Mastbruch. Münchehagen: Im Walde bei Hofbes. Heinr. Wesemann. Im Gehölz an den Wiesen unterhalb Berghols. Unterhalb des Wilhelmsturmes im Walde am Standorte von *Corydalis cava*.
Anemone nemorosa L. Verbreitet.
— *ranunculoides* L. In gerader Richtung unterhalb des Wilhelmsturmes am Abhang (Steinhuder Meer-Seite). Ferner weiter unten im Walde mit *Corydalis cava*.
Ranunculus flammula L. Häufig.
— *reptans* L. Steinhuder Meer: Nordufer.
— *Lingua* L. Winzlar. Hagenburger Moor. Gräben im und am Schlosspark in Hagenburg.
— *auricomus* L. Auf den Wiesen unterhalb Berghols am Waldrande.
— *acer* L. Häufig.
— *lanuginosus* L. Am Hagenburger Walde. Bad Rehburg: Mastbruch. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch im Walde.
— *repens* L. Häufig.
— *sardous* Crantz. Zwischen Berghol und Münchehagen.
— *sceleratus* L. Hagenburg: Am Trenter Teich.
— *Ficaria* L. Häufig.

Batrachium hederaceum E. Meyer. Winzlar.

— *aquatile* Ernst Meyer. Steinhuder Meer: Südostseite im Schilf. Hagenburger Moor.

Caltha palustris L. Zerstreut. In Menge auf den Wiesen am Hagenburger Kanal.

Papaveraceae.

Papaver Argemone L. Winzlar.

— *dubium* L. Zwischen Bad Rehburg und Winzlar.

— *Rhoeas* L. Bad Rehburg.

Chelidonium majus L. Häufig. Sehr viel an Hecken in Berghol.

Fumariaceae.

Corydalis cava Schweigger et Körte. Bisher nur ein Standort: Vom Wilhelmsturm geht man den Abhang unter den Buchen hinunter und verfolgt unten den Weg noch eine kleine Strecke nach rechts. Dann links im Walde. Rot und weiss blühend.

— *lutea* DC. An einer Stütze der Aussenmauer des Klosters Loccum.

Fumaria officinalis L. Zerstreut.

Cruciferae.

Teesdalea nudicaulis R. Brown. Häufig.

Thlaspi arvense L. Zerstreut.

Alliaria officinalis DC. Bad Rehburg: Am Wege beim Sanatorium Michaelis; am Ausfluss des Kanalwassers ins Holz bei der Ziegenwiese u. a.

Sisymbrium officinale Scopoli. Verbreitet.

Sinapis arvensis L. Zerstreut.

Brassica Rapa L. Hagenburg: Vielfach an einem Wege ins Moor.

Raphanus Raphanistrum L. Häufig.

Nasturtium officinale R. Brown. Bad Rehburg: Graben im Mastbruch.

— — *var. microphyllum* Boenninghausen. Wiese unweit der Landwehr in Winzlar.

— *amphibium* Rob. Brown. Winzlar. Hagenburg: Ufer des Kanals und des Seitengrabens am Schlosspark.

— *silvestre* Rob. Brown. Häufig.

— *palustre* DC. Am Hagenburger Kanal u. a.

Cardamine pratensis L. Häufig.

Capsella Bursa pastoris Mönch. Häufig.

Draba verna L. Zerstreut.

Stenophragma Thalianum Celakovsky. Zerstreut.

Erysimum cheiranthoides L. Bad Rehburg: Auf Menkes Kamp.

Droseraceae.

- Drosera rotundifolia* L. Hagenburger Moor. Rehburger Moor. Nordufer des Steinhuder Meeres.
— *intermedia* Hayne. Mit der vor. zusammen.

Crassulaceae.

- Sedum maximum* L. Bad Rehbürg. Winzlar.
— *boloniense* Loiseleur. An der Kirchhofsmauer in Bergkirchen.

Saxifragaceae.

- Chrysosplenium alternifolium* L. Bad Rehbürg: Mastbruch. Berg-
hol u. a.
— *oppositifolium* L. Bad Rehbürg: Im feuchten Grunde der sogen.
Wolfsschlucht. Ferner unweit davon an 2 feuchten Stellen im
Rehburger Stadtforst.

Parnassiaceae.

- Parnassia palustris* L. Wiesen am Hagenburger Kanal und im
Hagenburger Moor.

Pomaceae.

- Crataegus Oxyacantha* L. Bad Rehbürg: Mastbruch. Häufig im
Hagenburger Walde.
Sorbus aucuparia L. Verbreitet.

Rosaceae.

- Spiraea Ulmaria* L. Verbreitet. Auch im Hagenburger Moor.
Potentilla palustris Scopoli. Winzlar. Hagenburger Moor u. a.
— *Tormentilla* Necker. Sehr häufig. Auch im Hagenburger Moor.
— *anserina* L. Zerstreut.
Fragaria vesca L. Häufig.
Geum urbanum L. Bad Rehbürg. Hagenburg: Am Trenter Teich.
Agrimonia odorata Miller. Bad Rehbürg: Menkes Kamp u. a.
Münchehagen. Hagenburger Wald.
Rosa canina L. Verbreitet.
— *dumetorum* Thuillier. Winzlar: Bei der Chausseebrücke.
— *pomifera* Herrmann. Bad Rehbürg: Im Walde bei Menkes Kamp.
Rubus Idaeus L. Verbreitet.
— *suberectus* G. Anderson. Verbreitet.
— *plicatus* Weihe et Nees. Münchehagen: Am Walde bei Hofbes.
Heinr. Wesemann. Rehbürg: Oberer Waldweg zur „Matte“.
— *sulcatus* Vest. Waldweg zur „Matte“.
— *carpinifolius* Weihe et Nees. Zwischen Wölpinghausen und dem
Mastbruch.
— *vulgaris* Weihe et Nees. Bad Rehbürg: Oberer Waldweg zur
„Matte“.
— *rhombifolius* Weihe. Bad Rehbürg.

Rubus macrophyllus Weihe et Nees. Bad Rehbürg.

- *Sprengelii* Weihe. Bad Rehbürg. U. a. unweit des Friederikenplatzes. Berghol. Zwischen Wölpinghausen u. d. Mastbr.
- *Radula* Weihe. Bad Rehbürg. Berghol. MÜNCHEHAGEN: Waldrand bei Hofbes. Heinr. Wesemann. Zwischen Wölpinghausen u. d. Mastbruch.
- *rudis* Weihe et Nees. Bad Rehbürg. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.
- *pallidus* Weihe et Nees. Bad Rehbürg.
- *foliosus* Weihe et Nees. Bad Rehbürg: Oberer Waldweg zur „Matte“.
- *Bellardii* Weihe et Nees. Bad Rehbürg: Oberer Waldweg zur „Matte“.
- *dumetorum* Weihe et Nees. Verbreitet in zahlreichen Formen. (Die Form *Rubus divergens* Neumann im Mastbruch.)
- *caesius* L. Winzlar. Wölpinghausen. Bad Rehbürg: Mastbruch u. a.
- *caesius* × *macrophyllus*. Bad Rehbürg: Mastbruch.

Amygdalaceae.

Prunus avium L. Im Steinbruch Berghol.

- *cerasus* L. Im Steinbruch Berghol.
- *Padus* L. Stadt Rehbürg.
- *spinosa* L. Bad Rehbürg: Waldrand an Menkes Kamp und am „alten Felde“. Am Hagenburger Walde. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

Papilionaceae.

Sarothamnus scoparius Koch. MÜNCHEHAGEN. Mardorf u. a.

Genista pilosa L. Zerstreut.

- *tinctoria* L. Zwischen Berghol und MÜNCHEHAGEN. Bergkirchen. DÜDINGHAUSEN. Hagenburg: Im Walde und im Moore. Auf der Matte in Wölpinghausen. Wiesen unterhalb Berghols.
- *Anglica* L. Stadt Rehbürg. Steinhude. Berghol. Hagenburger Moor.

Ononis spinosa L. Winzlar: Bei der Landwehr auf den Wiesen. Zwischen Winzlar und Wiedenbrügge.

Medicago lupulina L. Zerstreut.

- *sativa* L. Steinhude: Am Bahnhof.

Lotus corniculatus L. Häufig.

- *uliginosus* Schkuhr. Bad Rehbürg: Mastbruch. Winzlar. Hagenburg: Im Walde und Moore.

Robinia Pseud-Acacia L. Steinbruch Berghol u. a.

Trifolium pratense L. Häufig.

- *medium* L. In Gebüschchen zwischen Winzlar und Wiedenbrügge.

Trifolium arvense L. Häufig.

— *fragiferum* L. An der Eisenbahn zwischen Winzlar und Wiedenbrügge.

— *hybridum* L. Wiedenbrügge.

Vicia tetrasperma Mönch. Bad Rehb. Hagenburg: Wiesen zwischen Schlosspark und Moor.

— *Cracca* L. Wiesen am Hagenburger Kanal. Hagenburger Moor u. a.

— *sepium* L. Bad Rehb. Bergkirchen: Kirchhof.

Lathyrus pratensis L. Zwischen Berghol und Münch. Hagenburg: In Gebüsch am Wege ins Moor.

Geraniaceae.

Geranium pusillum L. Hagenburg: Bei der Synagoge.

— *molle* L. Grasplätze im Hagenburger Schlosspark.

— *Robertianum* L. Verbreitet.

Erodium cicutarium L'Héritier. Stadt Rehb. Am Wege von Steinhude nach Hagenburg.

Oxalidaceae.

Oxalis acetosella L. Verbreitet.

— *stricta* L. In Gärten.

Linaceae.

Linum catharticum L. Wiesen bei Berghol und zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

Polygalaceae.

Polygala vulgaris L. Verbreitet. Sehr viel auf den Wiesen unterhalb Berghols. Weissblühend im Steinbruch vor Berghol.

— *serpyllacea* Weihe. Bad Rehb. Chaussee nach Berghol, bald hinter Wilkenings Gasthof, links am Wege.

Euphorbiaceae.

Euphorbia helioscopia L. Bergkirchen: Kirchhof.

— *Peplus* L. Bad Rehb. In Gärten.

— *exigua* L. Bei den Hütten im Steinbruch vor Berghol.

Mercurialis perennis L. Im Walde etwa unterhalb des Wilhelms- turmes zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch. Zwischen Berghol und Münch. Hagenburg an den Wiesen in den Hecken (mit *Pulmonaria obscura*.)

Callitrichaceae.

Callitriche stagnalis Scopoli. Häufig.

— *verna* L. Verbreitet.

— *hamulata* Kützing. Graben im Hagenburger Schlosspark.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L. Hagenburger Moor.

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium L. Verbreitet.

Aceraceae.

Acer Pseudoplatanus L. Hagenburg: Schlosspark.

— *platanoides* L. Bad Rehbürg: An der Chaussee bei Tierarzt Kramer.

Balsaminaceae.

Impatiens Nolitangere L. Bad Rehbürg: Sehr verbreitet, z. B. Mastbruch, Gegend des Friedrichplatzes u. a. Hagenburg: Schlosspark.

Rhamnaceae.

Frangula Alnus Miller. Nordufer des Steinhuder Meeres: Am „weissen Berge“. Hagenburger Moor.

Malvaceae.

Malva silvestris L. Winzlar. Wölpinghausen.

— *neglecta* Wallroth. Winzlar. Bergkirchen: Kirchhof.

Hypericaceae.

Hypericum perforatum L. Häufig.

— *quadrangulum* L. Bad Rehbürg: Am Wege von der Allee nach dem Kirchhofschen Hause. Wölpinghausen.

— *tetrapterum* Fries. Bad Rehbürg: Mastbruch. Hagenburg: Zwischen Park und Moor an Gräben u. a.

— *humifusum* L. Bad Rehbürg: Mastbruch. Zwischen Berghol und Münchehagen.

— *pulchrum* L. Zerstreut.

Elatinaceae.

Elatine Hydropiper L. Nordufer des Steinhuder Meeres.

— *hexandra* DC. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Violaceae.

Viola palustris L. Nordufer des Steinhuder Meeres. Hagenburger Moor.

— *canina* L. Nordufer des Steinhuder Meeres: In den „schwarzen Bergen“.

— *silvatica* Fries. Häufig.

— *Riviniana* Reichenbach. Häufig. Am Wege nach Berghol, rechts auf den Hügeln mit weissgesprenkelten Blütenblättern.

— *tricolor* L. Häufig.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L. Häufig. Seitengräben des Hagenburger Kanals. Hagenburger Moor und Trenter Teich.

Peplis Portula L. Bad Rehbürg: Mastbruch.

Onagraceae.

- Epilobium angustifolium* L. Verbreitet und häufig. Auch im Hagenburger Moor.
— *hirsutum* L. Zwischen Winzlar und Wiedenbrügge unweit des Bahndammes links.
— *parviflorum* Retzius. Wölpinghausen.
— *montanum* L. Verbreitet.
— *roseum* Retzius. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburg: Am Trenter Teich.
— *adnatum* Grisebach. Bad Rehburg: Wolfsschlucht. Mastbruch: Graben am Wege aus den Tannen zum Bahnhof.
— *palustre* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburger Moor. Am Trenter Teich.
— *Oenothera biennis* L. Altenhagen: Am Kirchhof.
Circaea lutetiana L. Bad Rehburg: Gegend des Friedrichplatzes; Mastbruch u. a. Hagenburg: Am Trenter Teich.

Halorrhagidaceae.

- Myriophyllum spicatum* L. Steinhuder Meer. Goldfischteich im Hagenburger Schlosspark.

Araliaceae.

- Hedera Helix* L. Verbreitet.

Umbelliferae.

- Hydrocotyle vulgaris* L. Hagenburger Moor.
Cicuta virosa L. Winzlar. Hagenburger Moor.
Helosciadium inundatum Koch. Hagenburger Moor.
Sium latifolium L. Seitengräben des Hagenburger Kanals.
Berula angustifolia Koch. Wölpinghausen. Bad Rehburg: Mastbruch.
Aegopodium Podagraria L. Verbreitet.
Pimpinella magna L. Wiesen bei der Försterei Berghol.
— *saxifraga* L. Bad Rehburg u. a.
Oenanthe fistulosa L. Wölpinghausen. Winzlar. Hagenburger Moor. Trenter Teich.
Selinum Carvifolia L. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburger Moor.
Angelica silvestris L. Waldrand zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.
Thysselinum palustre Hoffmann. Hagenburger Moor.
Heracleum Sphondylium L. Bei Düdinghausen. Loccum: Klosterpark.
Daucus Carota L. Bad Rehburg: Grasweg auf Menkes Kamp. Hagenburg. Steinhude u. a.
Torilis authriscus Gmelin. Bad Rehburg. Winzlar. Mönchehagen.
Scandix pecten Veneris L. Spissingshol.
Anthriscus silvestris Hoffmann. Verbreitet.
Chaerophyllum temulum L. Loccum.

Cornaceae.

Cornus sanguinea L. Winzlar: Bei der Landwehr. Waldrand zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

Hypopityaceae.

Monotropa hirsuta Roth. Unter den Buchen an Menkes Kamp.

Ericaceae.

Calluna vulgaris Salisbury. Verbreitet.

Erica Tétralix L. Häufig. Weissblühend im Hagenburger Moor (selten).

Andromeda polifolia L. Hagenburger Moor.

Vacciniaceae.

Arctostaphylos officinalis Wimmer et Grabowsky. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Vaccinium Oxycoccus L. Hagenburger Moor. Rehburger Moor.

— *macrocarpum* Aiton. Hagenburger Moor. Stellenweise häufiger als die vorige Art.

— *Vitis Idaea* L. Bad Rehburg (vereinzelt). Schneeren. Nordufer des Steinhuder Meeres. Hagenburger Moor.

— *Myrtillus* L. Häufig.

— *uliginosum* L. Hagenburger Moor.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L. Häufig.

Trientalis Europaea L. Bad Rehburg: Grenzwall im Verlauf der Georgshöhe. Am Rande der Kiefern rechts am Wege nach Berghol.

Lysimachia vulgaris L. Verbreitet. Auch im Hagenburger Moor.

— *Nummularia* L. Häufig. Bad Rehburg: Am Strassengraben bei Gastw. Wilkening; Mastbruch. Ufer der Seitengraben des Hagenburger Kanals. An und in Chausseegräben b. Hagenburg.

— *nemorum* L. Bad Rehburg: Mastbruch u. a.

Primula elatior Jacquin. Häufig. Bad Rehburg: Mastbruch. Im Gehölz zwischen Berghol und Münchehagen. Im Walde zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

Hottonia palustris L. Winzlar. Hagenburger Moor. Seitengraben des Hagenburger Kanals.

Gentianaceae.

Menyanthes trifoliata L. Hagenburger Moor.

Cicendia filiformis Delarbre. Zwischen Loccum und Stadt Rehburg.

Gentiana Pneumonanthe L. Hagenburger Moor.

Erythraea Centaurium Persoon Bad Rehburg: Grasweg auf Menkes Kamp. Zwischen Wölpinghausen und Wiedenbrügge. Schmalenbruch.

Apocynaceae.

Vinca minor L. Zwischen dem preussisch-bückerburgischen Grenzposten und dem Wilhelmsturm am Abhange unter den Buchen.

Convolvulaceae.

Convolvulus sepium L. Winzlar. Bad Rehburg: Mastbruch.

— *arvensis* L. Bad Rehburg: Am Bahnhof.

Cuscuta Epithymum Murray. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch.

Borraginaceae.

Borrago officinalis L. Loccum: Im Klosterhof (rotblühend).

Symphytum officinale L. Hagenburg. Steinhude (rot- und weissblühend).

Pulmonaria obscura Du Mortier. Zwischen Berghol und Münchehagen sehr viel im Walde und an Hecken (Nähe Hofbes. Heinr. Wesemann, Münchehagen). Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch im Walde etwa unterhalb des Wilhelmsturmes. Waldrand unterhalb Berghols. Am Hagenburger Walde.

Lithospermum arvense L. Auf Äckern oberhalb Steinhudes.

Myosotis palustris Roth. Verbreitet.

— *caespitosa* Schultz. Steinhuder Meer: Nordufer.

— *hispida* Schlechtendal. Bergkirchen-Düdinghausen.

— *silvatica* Hoffmann. Bad Rehburg: Unweit des Tannenpavillons in den Schaerschen Tannen.

— *arenaria* Schrader. Auf Äckern bei Hagenburg und Steinhude.

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. Münchehagen: Am Wege bei der Mauer des alten Kirchhofs. Loccum: Bei Buschmanns Hotel.

Labiatae.

Lycopus Europaeus L. Schmalenbruch. Wölpinghausen. Hagenburg: Am Kanal und am Trenter Teich. Nordufer des Steinhuder Meeres: Am „schwarzen Berge“ (zwerghaft).

Mentha aquatica L. Schmalenbruch. Hagenburg: Seitengraben des Kanals; im Moor und am Trenter Teich.

— *arvensis* L. Nordufer des Steinhuder Meeres u. a.

Thymus Serpyllum L. Verbreitet.

Calamintha Clinopodium Spenner. Bad Rehburg. Bergkirchen.

Nepeta Cataria L. Loccum: Am Wege bei der Klostermauer.

Glechoma hederacea L. Häufig.

Galeopsis Tetrahit L. Hagenburg: Am Trenter Teich. Bad Rehburg u. a.

— *speciosa* Miller. Bad Rehburg: Im „alten Felde“. Hagenburg: Wiesen zwischen Schlosspark und Moor.

Stachys arvensis L. Zerstreut.

— *silvatica* L. Häufig. Eine in allen Teilen hellere Form am Walde bei Tierarzt Kramer.

— *palustris* L. Zerstreut. Münchehagen: Am Steinbruch.

Betonica officinalis L. Bad Rehbürg. Wiedenbrügge. Hagenburg. Wölpinghausen. Bergkirchen. Sachsenhagen. Spissingshol. Pollhagen. (Auf Waldschlägen, an Waldrändern und Gräben verbreitet).

Galeobdolon luteum Hudson. Häufig.

Lamium album L. Häufig.

— *maculatum* L. Winzlar. Wölpinghausen u. a.

— *purpureum* L. Bad Rehbürg u. a.

— *amplexicaule* L. Bad Rehbürg: Mastbruch.

Scutellaria galericulata L. Häufig. Auch im Hagenburger Moor.

Brunella vulgaris L. Bad Rehbürg. Hagenburg: Am Graben, der den Schlosspark begrenzt u. a.

Ajuga reptans L. Rotblühend am Walde bei Menkes Kamp.

Teucrium Scorodonia L. Bad Rehbürg: Bei den 6 Buchen. Berghol. Wölpinghausen. Bergkirchen. Düdinghausen. Sachsenhagen.

Solanaceae.

Solanum nigrum L. Hagenburg u. a.

— *Dulcamara* L. Bad Rehbürg: Mastbruch. In Gräben am Hagenburger Moor.

Scrophulariaceae.

Verbascum Thapsus L. Bergkirchen: An der Kirche.

— *nigrum* L. Winzlar. Wölpinghausen.

Antirrhinum Orontium L. Münchehagen: Roggenfeld bei Hofbes. Heinr. Wesemann.

Linaria Cymbalaria Miller. Loccum: An einem Pfeiler der Aussenmauer des Klosters (mit *Corydalis lutea*).

— *Elatine* L. Zwischen Berghol und Münchehagen.

— *vulgaris* Miller. Verbreitet. Nordufer des Steinhuder Meeres: Am „weissen Berge“. Zwerghaft bei den Hütten vor Berghol.

Scrophularia nodosa L. Verbreitet.

Veronica Beccabunga L. Verbreitet.

— *Chamaedrys* L. Häufig.

— *Chamaedrys* L. var. *lamiifolia* Hayne. Beim Bergrutsch hinter dem Friedrichsplatz und weiterhin.

— *officinalis* L. Häufig.

— *scutellata* L. Hagenburg. Nordufer des Steinhuder Meeres (zwerbig).

— *serpyllifolia* L. Verbreitet.

— *opaca* Fries. Bad Rehbürg: In Gärten.

Veronica hederifolia L. Winzlar.

Alectorolophus major Reichenbach. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburg: Wiesen am Kanal.

Alectorolophus minor Wimmer et Grabowsky. Auf Wiesen zwischen Winzlar und Wiedenbrügge, unterhalb Berghols und am Hagenburger Kanal.

Melampyrum pratense L. Häufig.

Pedicularis silvatica L. Bad Rehburg. Hagenburg: An Wegen im Moor u. a.

— *palustris* L. Winzlar: Sumpfige Wiesen. Wiesen am Hagenburger Kanal.

Euphrasia officinalis L. Häufig.

— *Odontites* L. Wiedenbrügge. Hagenburg: Wiesen zwischen Schlosspark und Moor.

Lentibulariaceae.

Utricularia minor L. Hagenburger Moor.

Plantaginaceae.

Littorella juncea Bergius. Nordufer des Steinhuder Meeres.

Plantago major L. Häufig.

— *lanceolata* L. Häufig.

Rubiaceae.

Galium Aparine L. Verbreitet.

— *palustre* L. Häufig.

Galium uliginosum L. Bad Rehburg: Mastbruch.

— *Mollugo* L. Häufig.

— *saxatile* L. Häufig.

Asperula odorata L. Häufig. Auch im Hagenburger Moor.

Caprifoliaceae.

Sambucus nigra L. Zerstreut. Waldrand zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch. Hagenburg: Am Trenter Teich.

— *racemosa* L. Im Walde verbreitet. Im Steinbruch Berghol u. a.

Viburnum Opulus L. Waldränder hier und da.

Lonicera Periclymenum L. In Wäldern und Gebüsch häufig.

Adoxaceae.

Adoxa Moschatellina L. Bad Rehburg: Mastbruch. Münchehagen: Im Holze bei Hofbes. Heinr. Wesemann.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L. Winzlar. Hagenburg: An Gräben im Park. U. a.

— *dioeca* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburg: Im Moor und auf den Wiesen am Kanal u. a. m.

Dipsaceae.

Succisa pratensis Mönch. Verbreitet.

Campanulaceae.

Jasione montana L. Zerstreut.

Campanula rotundifolia L. Häufig.

— *rapunculoides* L. Bergkirchen: Kirchhof. Auf dem Wilhelmstein.

— *Trachelium* L. Bad Rehburg: Lichtungen im Mastbruch. Im Walde zwischen Berghol und Münchehagen. Am Bahndamm zwischen Winzlar und Wiedenbrügge. An der Landstrasse Bergkirchen-Sachsenhagen.

Compositae.

Eupatorium Cannabinum L. An der Bahn zwischen Bad und Stadt Rehburg. Wölpinghausen. Bad Rehburg: Mastbruch.

Tussilago Farfara L. Bad Rehburg. Bei den Hütten vor Berghol.

Aster salicifolius Scholler Loccum: Im Klosterhof.

Solidago Virga-aurea L. Nordufer des Steinhuder Meeres: In den „schwarzen Bergen“.

Bellis perennis L. Häufig.

Pulicaria dysenterica Gärtner. Wölpinghausen: Waldrand rechts unterhalb der Chaussee Berghol-Wölpinghausen, kurz vor Wölpinghausen.

Pulicaria vulgaris Gärtner. Im Graben zwischen Wölpinghausen und Wiedenbrügge. Loccum: Bei Buschmanns Hotel.

Artemisia Absinthium L. Bad Rehburg: Am Walde bei der Försterei.

— *vulgaris* L. Schneeren. Bergkirchen: Kirchhof.

Tanacetum vulgare L. Verbreitet.

Achillea Millefolium L. Häufig.

— *Ptarmica* L. Häufig. Auch im Hagenburger Moor.

Anthemis arvensis L. Verbreitet.

— *Cotula* L. Münchehagen.

Chrysanthemum segetum L. Vielfach.

— *Leucanthemum* L. Häufig.

Matricaria Chamomilla L. Häufig. Auch im Hagenburger Moor.

Bidens tripartita L. Loccum: An einem kleinen Teich im Klosterpark. Schmalenbruch. Hagenburg: Am Kanal und im Moore. Nordufer des Steinhuder Meeres (zwerbig).

Arnica montana L. Bad Rehburg: Vereinzelt. Hagenburger Moor.

Senecio paluster DC. Hagenburger Moor.

— *Jacobaea* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Wölpinghausen. Hagenburger Wald.

— *aquaticus* Hudson Wölpinghausen.

- Senecio vulgaris* L. Häufig.
 — *silvaticus* L. Häufig.
Helichrysum arenarium DC. Chaussee von Stadt Rehburg nach Mardorf.
Gnaphalium silvaticum L. Bad Rehburg: Mastbruch u. a.
 — *uliginosum* L. Bad Rehburg: Mastbruch. Nordufer des Steinhuder Meeres.
Antennaria dioeca Gärtner. Stadt Rehburg.
Filago minima Fries. Nordufer des Steinhuder Meeres: In den „weissen Bergen“.
Lappa minor DC. Bergkirchen: Kirchhof. Loccum: Klosterhof.
 — *nemorosa* Körnicke. Wölpinghausen: Im Gebüsch am Wege etwa unterhalb des Wilhelmsturmes.
 — *tomentosa* Lamarek. Bergkirchen: Kirchhof.
Carduus nutans L. Stadt Rehburg. Wölpinghausen: Auf der „Matte“.
 — *crispus* L. Loccum: Klosterhof.
Carlina vulgaris L. Schneeren: Unweit der Mühle.
Cirsium lanceolatum Scopoli. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch. Winzlar. Hagenburg: Wiesen und im Schlosspark.
 — *acaule* Allioni. Loccum-Wiedensahl.
 — *palustre* Scopoli. Häufig.
 — *arvense* Scopoli. Häufig.
Serratula tinctoria L. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburger Wald: An der Bahn.
Centaurea Jacea L. Verbreitet. Winzlar. Wiedenbrügge. Schmalenbruch. Hagenburg: Wald und Moor. Münchehagen. Berghol. Wölpinghausen. Bergkirchen. Sachsenhagen.
 — *Cyanus* L. Zwergig im Hagenburger Moor.
Lampsana communis L. Bad Rehburg. Zwischen Wölpinghausen und dem Mastbruch u. a. m.
Arnoseris minima Link. Stadt Rehburg. Mardorf. Steinhude.
Hypochaeris radicata L. Schneeren. Bergkirchen. Hagenburger Wald.
Taraxacum officinale Weber. Häufig.
Lactuca muralis Lessing. Bad Rehburg. Loccum.
Sonchus oleraceus L. Bad Rehburg u. a.
 — *arvensis* L. Bad Rehburg: Im „alten Felde“.
Crepis paludosa Mönch. Bad Rehburg: Mastbruch. Hagenburg: Schlosspark und Wiesen am Kanal.
 — *biennis* L. Bergkirchen: Am Wege.
 — *virens* Villars. Bad Rehburg.
Hieracium pilosella L. Häufig.
 — *auricula* L. Hagenburger Moor.

Hieracium murorum L. Bad Rehbürg. Münchehagen. Berghol: Am Steinbruch.


— **vulgatum** Fries. Rehbürger Stadforst.

— **boreale** Fries. Berghol: Am Steinbruch.

— **laevigatum** Willdenow. Loccum: Klosterpark.

— **umbellatum** L. Verbreitet.

— — **var. abbreviatum** Hartmann. Münchehagen. Hagenburger Moor.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1910-1911

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Kaufmann H.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Bad Rehburg und Umgegend. 316-338](#)