

Eine neue deutsche Ichneumonide.

Phygadeuon insulanus n. sp.

Von K. Hedwig, Breslau.

Zu dem mikropteren *Phygadeuon differens* H d w., welchen Herr Struve, Borkum, 1937 auffand, gesellt sich eine andere, nahezu aptere Art, deren Feststellung demselben Herrn zu verdanken ist. Das Tier ist seinem ganzen Habitus nach ein echter *Phygadeuon*, weshalb ich es trotz seiner Flügellosigkeit zu dieser Gattung stelle. Sein Kopf erinnert an *cylindraceus* Rth., sein kurzer Bohrer an *parvicauda* Ths.

Körper glatt und glänzend, nur Partie vor dem Schildchen, Metathorax und Unterseite fein punktiert und mit schwächerem Glanze. Kopf kubisch, nach hinten nur schwach verschmälert. Fühler kräftig, nach dem Ende zu verdickt, Glied 2—4 doppelt so lang wie breit. Augen behaart. Parapsidenfurchen fein, aber deutlich. Metathorax gerundet mit vollständiger Felderung, Area superomedia etwas länger als breit, hinten geschlossen, Seitendörnchen fehlen, der abschüssige Teil kürzer als der wagerechte. Flügel stummelförmig, nicht über das Hinterschildchen hinausgehend, mit drei feinen Längsadern und abschließender Basalader, das Ende etwas zugespitzt. Beine nicht besonders kräftig, aber lang (Laufbeine). Hinterleib ohne = 1. Segment-Kopf und Vorderleib, 1. Segment = ein Viertel des gesamten Hinterleibes, schlank, nach hinten wenig erweitert, mit kleinen Knötchen, fein punktiert, oben mit flacher Längsvertiefung, 2. Segment so lang wie das 1., hinten stark erweitert, das 3. fast ebenso lang, nach hinten verschmälert, der ganze Hinterleib stark gewölbt, kahnförmig, mit starkem Glanze, sehr fein und zerstreut behaart. Bohrer kaum vorstehend, punktförmig. Färbung tiefschwarz; rot sind die Mundteile, die Basis des zweiten Segmentes, woselbst die helle Färbung sich nach hinten unbestimmt in Schwarz verliert, ferner die Beine ohne die Hüften; Mittel- und Hinterschenkel in der Mitte verdunkelt, desgleichen die Basis der Hinterschienen; ihre Spitze und ihre Tarsen schwach gebräunt. Tegulae weiß.

Länge $3\frac{1}{2}$ mm. Beschrieben nach 6 ♀, welche Herr Struve auf Borkum am 30. 4. und 10./11. Mai 1938 sammelte. Typus in meiner Sammlung, Paratypen in Sammlung Struve.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Hedwig Karl

Artikel/Article: [Eine neue deutsche Ichneumonide. 678](#)