

Zur Flora von Spiekerooge.

Von Franz Buchenau.

Nachdem der vorstehende kleine Aufsatz der Druckerei übergeben war und ich auch bereits die erste Correctur desselben gelesen hatte, erhielt ich von dem geehrten auswärtigen Mitgliede unseres Vereins, Herrn Dr. J. W. Behrens zu Elberfeld, die Erlaubniss, einige von ihm am 20. Mai 1875 auf Spiekerooge angestellte floristische Beobachtungen hier mittheilen zu dürfen. Herr Dr. Behrens theilte mir ein Verzeichniss der sämtlichen von ihm auf Spiekerooge gefundenen Pflanzen mit, aus welchem ich (unter Weglassung der bereits von Spiekerooge bekannten und in diesen Abhandlungen bereits erwähnten Pflanzen) die beachtenswertheren nachstehend aufführe.

Ranunculus acer L. In der Nähe von Culturen.

Draba verna L., nicht häufig.

Stenophragma Thalianum Celak., in der Nähe von Culturen.

Cochlearia danica L., weit verbreitet.

Cerastium tetrandum Curt., gleichfalls weit verbreitet (die Pflanze war bis jetzt erst im ganz dünnen Sommer-Zustande auf Spiekerooge gefunden worden (vergl. Abh. IV, p. 221),

Aegopodium Podagraria L., im Dorfe.

Bellis perennis L. Im Dorfe und der nächsten Umgebung.

Lycium barbarum L., von Nöldeke in seiner Inselflora noch nicht für Spiekerooge angegeben, ist auch hier nicht selten. (Ebenso verhält es sich für Langeooge, wo die Pflanze gerne unter den Mauern der Häuser durchgezogen wird und dann in den Zimmern Lauben oder Guirlanden bildet.)

Myosotis caespitosa Schultz. An feuchten Stellen und auf Erdwällen.

Myosotis hispida Schlecht. In den Dünen nicht selten.

Rumex Acetosa L. In den Vertiefungen der Dünen.

Folgende Laubmoose fand Herr Dr. Behrens auf Spiekerooge:
Dicranum scoparium (L.) Hedw.; steril, östliche Vordünen.

Ceratodon purpureus (L.) Brid., fructific.; Dünen.

Barbula subulata (L) Brid., fructific.; Erdwälle.

B. ruralis Hedw.; wie vorige.

Orthotrichum fallax (Br.) Schimper; steril; ein Rasen an einer Planke.

Bryum argenteum L.; steril; an Hausmauern und Deichen.

Polytrichum strictum Banks; fructif.; Vordünen.

Camptothecium lutescens (Hds.) Br. et Schpr.; steril; Vordünen.

Brachythecium albicans (Neck.) Br. et Schpr.; steril und spärlich.

Br. rutabulum (L) Br. et Schpr.; steril und spärlich in den Dünen.

Hypnum cupressiforme L., robuste und zarte Formen, sowie die var. γ *ericetorum* Br. Eur.; steril, Vordünen, Wiesen, an Deichen.

Hylocomnium squarrosus (L) Br. et Schpr., steril; überall auf dem Grünlande.

An Flechten sammelte Herr Dr. Behrens:


Xanthonia (*Parmelia*) *parietina* (A). Th. Fr. An Baumstämmen im Dorfe spärlich.

Peltigera polydactyla Hoffm., fructif.; Dünen und Vordünen; stellenweise häufig.

P. canina (L) Schaer; steril. Vordünen, spärlich.

Cladonia pyxidata L.; steril; in Dünen, ziemlich häufig.

Cl. furcata (Huds.) Hoffm.; steril; Dünen, ziemlich selten.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Buchenau Franz Georg Philipp

Artikel/Article: [Zur Flora von Spiekerooge. 523-524](#)