


Sminthurus Poppei n. sp.

Descriptit O. M. Reuter.



Violaceo-niger, sat breviter pallido-pilosus, ventre interdumque guttulis paucis parvis laterum cervino-flavis; capite praecipue vertice circa oculos in maculis nigris positos cervino-flavescenti-variegato; antennis articulis tribus primis pallidis, apice violaceis, quarto toto violaceo, articulis simul sumtis capite solum paullo longioribus, secundo tertio $\frac{2}{5}$ brevioribus, quarto fere $\frac{2}{5}$ basalibus haud annulato et praecipue superne reliqua parte paullo crassiore, dein annulis quatuor instructo, quarum tribus primis transversis aequae longis et ultimo conico praecedentibus conjunctis paullulum brevioribus, parte basali annulisque tribus sequentibus articulo tertio vix longioribus; tibiis pilis nullis clavatis, unguiculo superiore vaginato margine superiore valde arcuato, unguiculo inferiore in apicem piliformem subrectum

longe producto; dentibus furculae apicem versus leviter acuminatis, mucronibus dentibus circiter $\frac{3}{5}$ brevioribus, apicem versus levissime acuminatis. Long. fere 1 mm.

Patria: Bremen; plura specimina sub foliis deciduis ad Blumenthal, Löhnhorst et St. Magnus legit Clar. D. A. Poppe.

Explicatio figurae: a: antenna; d: dentes furculae cum mucronibus; u: unguiculi pedis postici.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen](#)

Jahr/Year: 1884-1885

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Reuter Odo Morannal

Artikel/Article: [Sminthurus Poppei n. sp. 214](#)