

**Habitus- und Zeichnungsabbildungen
der mitteleuropäischen *Ceutorhynchini*
(*Curculionidae*)
von Robert Frieser.**

ABSTRACT

Central european *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*) are shown in pictures to support with the aid of characteristic patterns their identification.


In dieser Arbeit werden die mitteleuropäischen *Ceutorhynchini* im Bild dargestellt. Dies soll dem Sammler, welcher bisher diesen umfangreichen Tribus relativ kleiner Rüssler wegen ihrer Ähnlichkeit gemieden hat, ein Hilfsmittel zur Hand geben die Tiere an ihrer charakteristischen Zeichnung besser identifizieren zu können. Aufgenommen wurden die Käfer von Ingo Wolf mit Hilfe eines Laser-Scanners, welcher sich durch eine hohe Tiefenschärfe auszeichnet, die gerätebedingte monochrome Abbildung schadet bei der erfaßten Gruppe nicht, da sich die Tiere weniger durch Farbe als durch ihre Zeichnung unterscheiden.

Die Präparate stammen zum größten Teil aus meiner Sammlung, einige seltene Exemplare wurden dankenswerterweise von Herrn Lutz Behne vom Deutschen Entomologischen Institut in Eberswalde zur Verfügung gestellt. Sie umfassen, bis auf die nicht erreichbaren Arten:

Coeliodes siculus Schltz. 1901,
Ceutorhynchus angulicollis Schltz. 1896,
Ceutorhynchus faeculentus Gyll. 1837
Ceutorhynchus pilosellus Gyll. 1837,
Ceutorhynchus levantinus Schltz. 1898,
Ceutorhynchus hutchinsiae Temp. 1975,
Ceutorhynchus radula Germ. 1824,
Ceutorhynchus strejceki Dieckm. 1981, (Ch. Bris. 1869),
Ceutorhynchus suturalba Schltz. 1903
Orobitis nigrinus Rtt. 1885
Oreorrhynchaeus alpicola Otto 1894,
Hemiphytobius sphaerion (Boh. 1845)

alle im FHL aufgeführten Species, zusätzlich einige neu beschriebenen oder an das mitteleuropäische Faunengebiet angrenzende Arten (Nr 9, 22, 50, 51, 54, 55, 64A, 78, 79, 80, 82, 103, 167, 199, 200).


Robert Frieser



Abbildungen:

- | | |
|--|---|
| 1) <i>Coeliodes cinctus</i> (Fourcr. 1785), | 2) <i>Coeliodes rubicundus</i> (Hbst. 1795) |
| 3) <i>Coeliodes nigrirarsis</i> Hartm. 1895, | 4) <i>Coeliodes zonatus</i> Germ. 1845 |
| 5) <i>Coeliodes dryados</i> (Gm. 1790), | 6) <i>Coeliodes ilicis</i> Bedel 1885 |
| 7) <i>Coeliodes ruber</i> (Marsh. 1802), | 8) <i>Coeliodes trifasciatus</i> Bach 1854 |
| 9) <i>Coeliodes rubricus</i> Gyll. 1837, | 10) <i>Coeliodes proximus</i> Schltz. 1895 |
| 11) <i>Thamiocolus paravillis</i> Dieckm. 1975 | |


die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)



Abbildungen:

- | | |
|--|--|
| 12) <i>Thamiocolus viduatus</i> (Gyll. 1813) | 13) <i>Thamiocolus uniformis</i> (Gyll. 1837) |
| 14) <i>Thamiocolus imperialis</i> Schltz. 1895 | 15) <i>Thamiocolus sahlbergi</i> (Sahlb. 1845) |
| 16) <i>Thamiocolus kraatzii</i> (Bris. 1869) | 17) <i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyll. 1837) |
| 18) <i>Thamiocolus pubicollis</i> var. | 19) <i>Thamiocolus virgatus</i> (Gyll. 1837) |
| 20) <i>Thamiocolus signatus</i> (Gyll. 1837) | 21) <i>Micrelus ericae</i> (Gyll. 1813) |
| 22) <i>Micrelus ferrugatus</i> Perr. 1847 | 25) <i>Auleutes epilobii</i> (Payk. 1800) |

Robert Frieser



Abbildungen:

- 23) *Zacladus affinis* (Payk. 1792)
 26) *Phrydiuchus topiarius* (Germ. 1824)
 28) *Neosirocalus hampei* (Bris. 1869)
 30) *Neosirocalus pumilio* (Gyll. 1827)
 32) *Neosirocalus cakilis* (Hansen 1917)
 34) *Neosirocalus sisymbrii* Dieckm. 1966

- 24) *Zacladus exiguus* (Ol. 1807)
 27) *Phrydiuchus speiseri* (Schltz. 1897)
 29) *Neosirocalus posthumus* (Germ. 1824)
 31) *Neosirocalus floralis* (Payk. 1792)
 33) *Neosirocalus pulvinatus* (Gyll. 1837)
 35) *Neosirocalus moraviensis* Dieckm. 1966

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (Curculionidae)



36 ♀




37



37A



38



39




40



41



42



43



44



45




46

Abbildungen:

- 36) *Neosirocalus rhenanus* (Schltz.1895)
- 37A) *Neosirocalus niyazii* (Hoffm.1957)
- 39) *Sirocalodes quercicola* (Payk.1792)
- 41) *Calosirus terminatus* (Hbst.1795)
- 43) *Ceutorhynchidius horridus* (Panz.1801)
- 45) *Ceutorhynchidius rufulus* (Duf.1851)


- 37) *Neosirocalus pyrrhorhynchus* (Marsh.1802)
- 38) *Sirocalodes depressicollis* (Gyll.1813)
- 40) *Sirocalodes mixtus* (Muls.Rey 1858)
- 42) *Calosirus apicalis* (Gyll.1827)
- 44) *Ceutorhynchidius hassicus* Schltz.1903
- 46) *Ceutorhynchidius barnevillei* (Gren.1866)



Abbildungen:

- | | |
|--|--|
| 47) <i>Ceutorhynchidius baldensis</i> Schltz. 1896 | 48) <i>Ceutorhynchidius troglodytes</i> (F. 1787) |
| 49) <i>Ceutorhynchidius thalhammeri</i> Schltz. 1906 | 50) <i>Ceutorhynchidius hysterix</i> Perr. 1852 |
| 51) <i>Ceutorhynchidius urens</i> Gyll. 1837 | 52) <i>Mononychus punctum-album</i> (Hbst. 1784) |
| 52A) <i>Mononychus v. salviae</i> Germ. | 53) <i>Ceutorhynchus geographicus</i> (Goeze 1777) |
| 54) <i>Ceutorhynchus korbi</i> Schlz. 1901 | 55) <i>Ceutorhynchus beckeri</i> Schlz. 1900 |
| 56) <i>Ceutorhynchus austriacus</i> Bris. 1869 | |

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)



Abbildungen:

57) *Ceutorhynchus trisignatus* Gyll. 1837

58) *Ceutorhynchus curvistriatus* Schltz. 1897 und *Ceutorhynchus curvistriatus* var. Schltz. 1897

59) *Ceutorhynchus hungaricus* Bris. 1869

60) *Ceutorhynchus pallidicornis* Bris. 1860

61) *Ceutorhynchus amplipennis* Schltz. 1896


62) *Ceutorhynchus albosignatus* Gyll. 1837

63) *Ceutorhynchus euphorbiae* Bris. 1866

64) *Ceutorhynchus borraginis* (F. 1792)

64A) *Ceutorhynchus fairmairei* Bris. 1860

64B) *Ceutorhynchus fairmairei* Bris. 1860




Abbildungen:

- 65) *Ceutorhynchus abbreviatulus* (F.1792)
 67) *Ceutorhynchus asperifoliarium* (Gyll.1813)
 69) *Ceutorhynchus larvatus* Schlitz.1896
 71) *Ceutorhynchus cruciger* (Hbst.1784)
 73) *Ceutorhynchus t-album* Gyll.1837
 76) *Ceutorhynchus trimaculatus* (F.1775)

- 66) *Ceutorhynchus symphyti* Bedel 1885
 68) *Ceutorhynchus ornatus* Gyll.1837
 70) *Ceutorhynchus javeti* Bris.1869
 72) *Ceutorhynchus dimidiatus* Friv.1865
 74) *Ceutorhynchus venedicus* Weise 1879
 76A) *Ceutorhynchus trimaculatus* var.


die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (Curculionidae)



Abbildungen:

- 77) *Ceutorhynchus litura* (F.1775)
 79) *Ceutorhynchus gratiosus* Bris.1869
 82) *Ceutorhynchus aubei* Boh.1845
 84) *Ceutorhynchus millefolii* Schlz.1897
 86) *Ceutorhynchus edentulus* Schlz.1896
 88) *Ceutorhynchus figuratus* Gyll.1837


- 78) *Ceutorhynchus cingulatus* Schlz.1896
 80) *Ceutorhynchus gibbicollis* Schlz.1896
 83) *Ceutorhynchus molitor* Gyll.1837
 85) *Ceutorhynchus triangulum* Boh.1845
 87) *Ceutorhynchus campestris* Gyll.1837



Abbildungen:


- | | |
|--|--|
| 89) <i>Ceutorhynchus rugulosus</i> (Hbst. 1795) | 90) <i>Ceutorhynchus magnini</i> Hoffm. 1939 |
| 91) <i>Ceutorhynchus paszlavskyi</i> Kuthy 1890 | 92) <i>Ceutorhynchus frivaldszkyi</i> Schltz. 1896 |
| 93) <i>Ceutorhynchus urticae</i> Boh. 1845 | 93A) <i>Ceutorhynchus urticae</i> var. Boh. 1845 |
| 94) <i>Ceutorhynchus arquatus</i> (Hbst. 1795) | 95) <i>Ceutorhynchus melanostictus</i> (Marsh. 1802) |
| 96) <i>Ceutorhynchus angulosus</i> Boh. 1845 | 97) <i>Ceutorhynchus ragusai</i> Bris. 1889 |
| 98) <i>Ceutorhynchus marginatus</i> (Payk. 1792) | 99) <i>Ceutorhynchus incisus</i> Schltz. 1899 |

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)



Abbildungen:

- | | |
|---|---|
| 100) <i>Ceutorhynchus fennicus</i> Faust 1894 | 101) <i>Ceutorhynchus moelleri</i> Thoms. 1868 |
| 102) <i>Ceutorhynchus punctiger</i> Gyll. 1837 | 103) <i>Ceutorhynchus letourneuxi</i> Desbr. 1896 |
| 104) <i>Ceutorhynchus albovittatus</i> Germ. 1824 | 105) <i>Ceutorhynchus maculaalba</i> (Hbst. 1795) |
| 106) <i>Ceutorhynchus granulicollis</i> Thoms. 1856 | 107) <i>Ceutorhynchus coarctatus</i> Gyll. 1837 |
| 108) <i>Ceutorhynchus napi</i> Gyll. 1837 | 109) <i>Ceutorhynchus plumbeus</i> Bris. 1869 |
| 110) <i>Ceutorhynchus constrictus</i> (Marsh. 1802) | 111) <i>Ceutorhynchus syrites</i> Germ. 1824 |




Abbildungen:

- 112) *Ceutorhynchus subpilosus* Bris. 1869
 114) *Ceutorhynchus inaeffectatus* Gyll. 1837
 116) *Ceutorhynchus atomus* Boh. 1845
 118) *Ceutorhynchus resedae* (Marsh. 1802)
 120) *Ceutorhynchus rusticus* Gyll. 1837
 122) *Ceutorhynchus turbatus* Schltz. 1903
 124) *Ceutorhynchus assimilis* (Payk. 1792)


- 113) *Ceutorhynchus arator* Gyll. 1837
 115) *Ceutorhynchus interjectus* Schltz. 1903
 117) *Ceutorhynchus querceti* (Gyll. 1813)
 119) *Ceutorhynchus obsoletus* (Germ. 1824)
 121) *Ceutorhynchus cochleariae* (Gyll. 1813)
 123) *Ceutorhynchus parvulus* Bris. 1869

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)



Abbildungen:


- | | |
|---|---|
| 125) <i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> Sol.194) | 126) <i>Ceutorhynchus thlaspi</i> Bris.1869 |
| 127) <i>Ceutorhynchus similis</i> Bris.1869 | 128) <i>Ceutorhynchus unguicularis</i> Thoms.1871 |
| 129) <i>Ceutorhynchus nigrifolius</i> Schltz.1896 | 130) <i>Ceutorhynchus lukesi</i> Tyl 1914 |
| 131) <i>Ceutorhynchus nanus</i> Gyll.1837 | 132) <i>Ceutorhynchus angustus</i> Dieckm.Smrecz.1972 |
| 133) <i>Ceutorhynchus sophiae</i> (Stev.1829) | 134) <i>Ceutorhynchus rapae</i> Gyll.1837 |
| 135) <i>Ceutorhynchus griseus</i> Bris.1869 | 136) <i>Ceutorhynchus scrobicollis</i> Ner.Wagn.1924 |



Abbildungen:

- | | |
|---|--|
| 137) <i>Ceutorhynchus puncticollis</i> Boh. 1845 | 138) <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (Marsh. 1802) |
| 139) <i>Ceutorhynchus dubius</i> Bris. 1883 | 140) <i>Ceutorhynchus wagneri</i> Smrecz. 1937 |
| 141) <i>Ceutorhynchus roberti</i> Gyll. 1837 | 142) <i>Ceutorhynchus alliariae</i> Bris. 1860 |
| 143) <i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> Germ. 1824 | 144) <i>Ceutorhynchus scapularis</i> Gyll. 1837 |
| 145) <i>Ceutorhynchus erysimi</i> (F. 1787) | 146) <i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marsh. 1802) |
| 147) <i>Ceutorhynchus quadridens</i> (Panz. 1795) | 148) <i>Ceutorhynchus picitarsis</i> Gyll. 1837 |
| 149) <i>Ceutorhynchus pandellei</i> Bris. 1869 | |

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)




Abbildungen:

- 150) *Ceutorhynchus pervicax* Weise 1883
- 152) *Ceutorhynchus ignitus* Germ. 1824
- 154) *Ceutorhynchus carinatus* Gyll. 1837
- 156) *Ceutorhynchus hirtulus* Germ. 1824
- 158) *Ceutorhynchus pectoralis* Weise 1895
- 160) *Ceutorhynchus leprieuri* Bris. 1881

- 151) *Ceutorhynchus barbareae* Suffr. 1847
- 153) *Ceutorhynchus sulcatus* Bris. 1869
- 155) *Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget 1857
- 157) *Ceutorhynchus canaliculatus* Bris. 1869
- 159) *Ceutorhynchus coerulescens* Gyll. 1837
- 161) *Ceutorhynchus franzi* Dieckm. 1971


Robert Frieser



Abbildungen:


- | | |
|--|---|
| 162) <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (Payk. 1800) | 163) <i>Ceutorhynchus chalybdaeus</i> Germ. 1824 |
| 164) <i>Ceutorhynchus thomsoni</i> Kolbe 1900 | 165) <i>Ceutorhynchus wellschmiedi</i> Dieckm. 1979 |
| 167) <i>Ceutorhynchus litoralis</i> Schlz. 1898 | 168) <i>Ceutorhynchus kunzei</i> Smrecz. 1957 |
| 169) <i>Ceutorhynchus lycoctoni</i> Hust. 1917 | 171) <i>Ceutorhynchus pseudinclemens</i> Dieckm. 1969 |
| 172) <i>Ceutorhynchus consputus</i> Germ. 1824 | 173) <i>Ceutorhynchus suturalis</i> (F. 1775) |

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (*Curculionidae*)



Abbildungen:

- | | |
|---|--|
| 174) <i>Ceutorhynchus denticulatus</i> (Schrk.1781) | 175) <i>Ceutorhynchus pollinarius</i> (Forst.1771) |
| 176) <i>Ceutorhynchus viridanus</i> Gyll.1837 | 177) <i>Eubrychius velutus</i> (Beck 1817) |
| 178) <i>Litodactylus leucogaster</i> (Marsh.1802) | 179) <i>Phytobius comari</i> (Hbst.1795) |
| 180) <i>Phytobius quadricornis</i> (Gyll.1813) | 181) <i>Phytobius waltoni</i> Boh.1843 |
| 182) <i>Phytobius canaliculatus</i> Fahrs.1843 | 183) <i>Phytobius hygrophilus</i> Hust.1923 |
| 184) <i>Phytobius velaris</i> (Gyll.1827) | 185) <i>Phytobius zumpti</i> Wagn.1939 |



Abbildungen:

- | | |
|---|--|
| 186) <i>Phytobius quadrituberculatus</i> (F.1787) | 187) <i>Phytobius olssoni</i> Israels.1972 |
| 188) <i>Phytobius quadrinodosus</i> (Gyll.1813) | 189) <i>Phytobius muricatus</i> (Ch.Bris.1867) |
| 190) <i>Phytobius granatus</i> (Gyll.1836) | 191) <i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich 1797) |
| 192) <i>Rhinoncus pericarpus</i> (L.1758) | 193) <i>Rhinoncus gramineus</i> (F.1792) |
| 194) <i>Rhinoncus henningsi</i> Wagn.1936 | 195) <i>Rhinoncus bruchoides</i> (Hbst.1784) |
| 196) <i>Rhinoncus bosnicus</i> Schlitz.1900 | 197) <i>Rhinoncus castor</i> (F.1792) |

die mitteleuropäische *Ceutorhynchini* (Curculionidae)




Abbildung:

197A) *Rhinoncus albicinctus* Gyll.1837
 199) *Hypurus bertarini* Perr.1852
 201) *Brachiodontus alpinus* (Hampe 1866)
 203) *Rutidosoma globulus* (Hbst.1795)
 205) *Homorosoma validirostris* (Gyll.1837)
 207) *Scleropterus offensus* Boh.1837

198) *Marmaropus besseri* Gyll.1837
 200) *Paroxyonyx sicardi* Hmt.1931
 202) *Brachiodontus schultzei* Ganglb.1902
 204) *Rutidosoma fallax* (Otto 1897)
 206) *Scleropterus serratus* (Germ.1824)
 208) *Amalus scortillum* (Hbst.1795)




Abbildung:

- | | |
|--|--|
| 209) <i>Amalorrhynchus melanarius</i> (Steph.1831) | 210) <i>Drupenatus nasturtii</i> (Germ.1824) |
| 211) <i>Poophagus sisymbrii</i> (F.1777) | 212) <i>Poophagus hopfgarteni</i> Tourn.1874 |
| 213) <i>Tapinotus sellatus</i> (F.1794) | 214) <i>Stenocarus cardui</i> (Hbst.1784) |
| 215) <i>Stenocarus uliginosus</i> Gyll.1837 | 216) <i>Cidnorhinus quadrimaculatus</i> (L.1758) |
| 217) <i>Coeliastes lamii</i> (F.1792) | 218) <i>Orobitis cyaneus</i> (L.1758) |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Coleopterologica](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [14_2](#)

Autor(en)/Author(s): Frieser Robert

Artikel/Article: [Habitus-und Zeichnungsabbildungen der mitteleuropäischen Ceutorhynchini \(Curculionidae\) 17-36](#)