

**Studi sul genere *Parmena* LATREILLE, 1829. III -
P. slamai n. sp. di Creta (Coleoptera, Cerambycidae)**

Gianfranco SAMA

Abstract.

Studies on the genus *Parmena* LATREILLE, 1829. III – *P. slamai* n. sp. from Crete. (Coleoptera-Cerambycidae).

Parmena slamai n. sp. is described from Crete; the n. sp., related to the *P. pubescens* group, is easily recognizable by its erect elytral setae and shape of internal sac armature (fig. 3).

In un recente studio sul genere *Parmena* LATREILLE, 1829 (S A M A, 1984; S A M A, 1985 in stampa) avevo rilevato come gli individui raccolti nell'isola di Creta, differissero da quelli balcanici attribuiti alla ssp. *pilosa* BRULLE, 1832. Mi ero astenuto dall'attribuire un nome a quella popolazione, in quanto ero a conoscenza che costituiva l'argomento di uno studio da parte di colleghi cecoslovacchi.

Dopo la pubblicazione della prima parte del mio lavoro, gli esemplari suddetti mi sono stati inviati in studio dall'i n g. M i l a n S l a m a di Praga. L'esame di questo materiale e di altro, piu abbondante, raccolto dal D r. P e t e r S c h u r m a n n di Klagenfurt (che ringrazio sentitamente), mi ha convinto che le *Parmena* di Creta sono attribuibili ad una specie inedita, la cui descrizione costituisce l'argomento di questa nota.

Parmena slamai n. sp..

Colorazione bruno nerastra, talora il capo ed il pronoto piu chiari; zampe e antenne bruno rossicce.

Tutto il corpo ricoperto da una densa pubescenza aderente di colore marrone e dorata, piu addensata sul disco del pronoto. Sulle elitre è inoltre presente una piu densa e relativamente piu lunga peluria chiara, concentrata particolarmente nella regione scutellare e lungo due strette bande trasversali ondulate, una premediана ed una postmediана. Più raramente tale pubescenza invade anche la regione omerale. Il disegno che ne deriva rende l'insetto notevolmente simile a *P. bicincta* KÜSTER, 1849.

Su tutto il corpo sono anche presenti le setole erette tipiche, nel genere, del gruppo *pubescens* DALMAN, 1817, ma nella n. sp. (ed è questa una delle sue principali caratteristiche) tali setole sono in gran parte ripiegate all'indietro e spesso semiaderenti; questo risulta particolarmente evidente sul pronoto e sulle elitre.

G. Sama: *Parmena slamai* n. sp.

Punteggiatura del pronoto e delle elitre non significativamente diverse da *pubescens*.

Lobo mediano dell'edeago come in *pubescens*, ma leggermente più slanciato e con lamina superiore più arrotondata all'apice (Fig. 2). Parameri non significativamente diversi. Sclerificazione del sacco interno di forma del tutto particolare (Fig. 3). Per maggiori dettagli su *pubescens* rimando al mio lavoro citato in precedenza.

Lunghezza variabile da 6 a 9 mm.


La n. sp. è con tutta probabilità polifaga al pari delle altre specie del gruppo; gli esemplari noti sono stati raccolti in natura o allevati ex larva da *Nerium oleander*, *Astragalus* sp., *Euphorbia* sp.

Holotypus ♂: Creta, Ideon Antron, 12.6.85, ex l. *Astragalus*, P. Schurmann leg.

Paratipi ♂♂ ♀♀: Armeni, 9.7.74, M. Accordi leg. (1 ex.); Ida Ori, 10.6.81, ex l. *Astragalus*, Nida, S v. Billy legg. (4 exx.); Stroves, 6.84, J. & M. Slama legg. (3 exx.); 40 exx. ottenuti ex larva da *Nerium oleander*, *Euphorbia* sp., *Astragalus* sp., P. Schurmann leg., da varie località dell'isola di Creta: Elos, Kambos, Komitades, Kroustas, Chorafakion, Sfinari, Vahos, Ideon Antron. Holotypus e 2 Paratipi in mia collezione; i rimanenti Paratipi nelle collezioni M. Slama, P. Schurmann, Museo civ. St. nat. di Verona.

La nuova specie è dedicata all'amico Milan Slama di Praga che, inviandomi in studio gli esemplari in suo possesso, mi ha permesso di descriverla.

Ringrazio sentitamente l'amico Peter Schurmann di Klagenfurt che con la consueta cortesia mi ha permesso di studiare gli esemplari della sua collezione e Ivo Gudenz di Forlì autore dei disegni.



Didascalia delle figure

Parmena slamai ♂ n. sp.: parameri (Fig. 1); Edeago: lobo mediano (visione dorsale) (Fig. 2); sclerificazioni del sacco interno (Fig. 3);

Bibliografia

SAMA G., 1984 — Studi sul genere *Parmena* LATREILLE, 1829 (Coleoptera Cerambycidae). (Prima parte). Riv. Piem. St. Na., 5: 205 - 230.

SAMA G., 1985 (in stampa) — Studi sul genere *Parmena* Latreille, 1829 (Coleoptera Cerambycidae). (Seconda parte). Riv. Piem. St. Nat.

Indirizzo dell'autore Sama Gianfranco via Raffaello, 84
47023 CESENA ITALIA

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Coleopterologica](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Sama Gianfranco

Artikel/Article: [Studi sul genere Parmena LATREILLE, 1829. III - P. slamai n. sp. di Creta \(Coleoptera, Cerambycidae\) 23-24](#)