

**Ergebnis der Gemeinschaftsexkursion
 der Societas Coleopterologica e.V.
 in das Naturschutzgebiet "Oberes Isartal/Vorderriß"
 am 7. Juli und 4. August 1990
 (Coleoptera)
 von J. Roppel**

Diese Sammeliste wird der oberen Naturschutzbehörde (Regierung von Oberbayern) im Hinblick auf die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Verfügung gestellt. Es sind die derzeit verfügbaren Funddaten leicht zu determinierender Arten eingearbeitet worden. In Anbetracht des floristischen Reichtums und der geographischen Vielgestalt des gesammelten Gebietes wäre es außerordentlich lohnend, das damit verbundene Käfervorkommen auch in Zukunft weiter zu beobachten und zu dokumentieren.

Die Ziffern vor den Artnamen entstammen dem Katalogband des Werkes W. H. Lucht "Die Käfer Mitteleuropas" Verlag Goecke und Evers, Krefeld 1987. Ein Ausrufezeichen kennzeichnet die für das Gebiet besonders markanten und in Deutschland selten gewordenen Arten. Für Fundmitteilungen danke ich insbesondere den Kollegen und Herren B. Dries, Bad Tölz, K. Witzgall, Dachau, F. Wachtel, Grünwald, R. Waldert, München.

Artenliste

01-.000-.000.-	CARABIDAE
01-.004-.012.-	<i>Carabus granulatus</i> L., 1758
01-.004-.015.-	<i>Carabus cancellatus</i> Ill., 1798
01-.004-.017.-	<i>Carabus convexus</i> F., 1775
01-.005-.004.-	<i>Cychrus attenuatus</i> F., 1792
01-.007-.002.-	<i>Nebria picicornis</i> (F., 1801)
01-.009-.008.-	<i>Notiophilus biguttatus</i> (F., 1779)
01-.012-.005.-	<i>Elaphrus ullrichi</i> Redt., 1842
01-.017-.001.-	<i>Broscus cephalotes</i> (L., 1758)
01-.029-.001.-	<i>Bembidion striatum</i> (F., 1792)
01-.029-.009.-	<i>Bembidion nigricorne</i> Gyll., 1827
01-.029-.026.-	<i>Bembidion tibiale</i> (Dft., 1812)
01-.029-.031.-	<i>Bembidion tricolor</i> (F., 1801)
01-.029-.043.-	<i>Bembidion incognitum</i> Müll., 1931
01-.029-.077.-	<i>Bembidion schueppeli</i> Dej., 1831
01-.051-.051.-	<i>Pterostichus fasciatopunctatus</i> (Creutz., 1799)

01-.053-.005-. 01-.062-.003-. 01-.066-.006-. 01-.066-.007-. 04-.000-.000-. 04-.003-.002-. 04-.011-.002-. 04-.014-.003-. 04-.016-.003-. 04-.016-.004-. 04-.017-.001-. 04-.017-.002-. 04-.022-.001-. 04-.023-.0061.	<i>Abax ovalis</i> (Dft., 1812) <i>Agonum impressum</i> (Panz., 1797) <i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrk., 1781) <i>Chlaenius tibialis</i> (Dej., 1826) DYTISCIDAE <i>Bidessus delicatulus</i> (Schaum, 1844) <i>Graptodytes granularis</i> (L., 1767) <i>Deronectes latus</i> (Steph., 1829) <i>Potamonectes depressus</i> (F., 1775) <i>Potamonectes assimilis</i> (Payk., 1798) <i>Oreodytes borealis</i> (Gyll., 1827) <i>Oreodytes septentrionalis</i> (Gyll., 1827) <i>Platambus maculatus</i> (L., 1758) <i>Agabus nitidus</i> (F., 1801) 07-.000-.000-. 07-.005-.009-. 12-.000-.000-. 12-.003-.001-. 16-.000-.000-. 16-.007-.001-. 16-.008-.001-. 23-.000-.000-. 23-.032-.003-. 23-.032-.004-. 23-.041-.001-. 23-.050-.008-. 23-.050-.037-. 23-.050-.038-. 23-.059-.001-. 23-.088-.046-. 23-.088-.072-. 23-.095-.001-. 23-.097-.001-. 23-.099-.024-. 23-.111-.003-. 23-.198-.001-. 22	HYDRAENIDAE <i>Helophorus aquaticus</i> (L., 1758) SILPHIDAE <i>Thanatophilus rugosus</i> (L., 1758) LIODIDAE <i>Anisotoma humeralis</i> (F., 1792) <i>Liodopria serricornis</i> (Gyll., 1813) STAPHYLINIDAE <i>Lesteva longelytra</i> (Goez., 1777) <i>Lesteva nivicola</i> Fauv., 1872 <i>Deleaster dichrous</i> (Grav., 1802) <i>Bledius litoralis</i> Heer, 1838 <i>Bledius erraticus</i> Er., 1839 <i>Bledius fontinalis</i> Bernh., 1929 <i>Paederus ruficollis</i> F., 1781 <i>Philonthus splendens</i> (F., 1792) <i>Philonthus fulvipes</i> (F., 1792) <i>Platydracus fulvipes</i> (Scop., 1763) <i>Parabemus fossor</i> (Scop., 1772) <i>Ocypus melanarius</i> (Heer, 1839) <i>Bolitobius thoracicus</i> (F., 1777) <i>Atemeles emarginatus</i> (Payk., 1789)
--	---	--

25-.000-.000-.	LYCIDAE
25-.004-.001-.	<i>Platycis minutus</i> (F., 1787)
25-.005-.001-.	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (L., 1758)
27-.000-.000-.	CANTHARIDAE
27-.002-.014-.	<i>Cantharis obscura</i> L., 1758
27-.002-.026-.	<i>Cantharis livida</i> L., 1758
31-.000-.000-.	CLERIDAE
31-.009-.001-.	<i>Trichodes apiarius</i> (L., 1758)
34-.000-.000-.	ELATERIDAE
34-.001-.004-.	<i>Ampedus erythrogonus</i> (Müll., 1821)
34-.001-.026-.	<i>Ampedus nigrinus</i> (Hbst., 1784)
34-.018-.003-.	<i>Lacon fasciatus</i> (L., 1758)
34-.024-.001-.	<i>Actenicerus sjaelandicus</i> (Müll., 1764)
34-.034-.002-.	<i>Cidnopus aeruginosus</i> (Ol., 1790)
34-.037-.001-.	<i>Harminius undulatus</i> (Geer, 1774)
34-.045-.001-.	<i>Fleutiauxellus maritimus</i> (Curt., 1840)
36-.000-.000-.	EUCNEMIDAE
36-.012-.001-.	<i>Xylobius corticalis</i> (Payk., 1800)!
38-.000-.000-.	BUPRESTIDAE
38-.007-.005-.	<i>Dicerca moesta</i> (F., 1792)!
38-.009-.001-.	<i>Lampra dives</i> Guillb., 1889!
38-.010-.001-.	<i>Palmar festiva</i> (L., 1758)!
38-.012-.002-.	<i>Buprestis rustica</i> L., 1758
38-.012-.005-.	<i>Buprestis octoguttata</i> L., 1758
38-.014-.002-.	<i>Phaenops formaneki</i> Jacobs., 1913!
38-.015-.019-.	<i>Anthaxia helvetica</i> Stierl., 1868
38-.020-.001-.	<i>Agrilus guerini</i> Lac., 1835!
48-.000-.000-.	OSTOMIDAE
48-.004-.001-.	<i>Calytis scabra</i> (Thunb., 1784)!
48-.006-.001-.	<i>Zimioma grossum</i> (L., 1758)!
48-.007-.001-.	<i>Ostoma ferruginea</i> (L., 1758)
48-.009-.001-.	<i>Thymalus limbatus</i> (F., 1787)
50-.000-.000-.	NITIDULIDAE
50-.015-.001-.	<i>Pocadius ferrugineus</i> (F., 1775)
50-.016-.001-.	<i>Pocadiodes wajdelota</i> (Wank., 1869)

- 50-.018-.001-. *Cyllodes ater* (Hbst., 1792)
 50-.022-.001-. *Pityophagus ferrugineus* (L., 1761)
- 52-.000-.000-. RHIZOPHAGIDAE**
 52-.001-.013-. *Rhizophagus cribratus* Gyll., 1827
- 53-.000-.000-. CUCUJIDAE**
 53-.013-.001-. *Dendrophagus crenatus* (Payk., 1799)!
 53-.014-.001-. *Cucujus cinnaberinus* (Scop., 1763)!
 53-.020-.001-. *Prostomis mandibularis* (F., 1801)!
- 54-.000-.000-. EROTYLIDAE**
 54-.002-.001-. *Triplax aenea* (Schall., 1783)
 54-.002-.007-. *Triplax scutellaris* (Charp., 1825)
- 59-.000-.000-. MYCETOPHAGIDAE**
 59-.004-.008-. *Mycetophagus multipunctatus* F., 1792
- 62-.000-.000-. COCCINELLIDAE**
 62-.008-.009-. *Scymnus rubromaculatus* (Goez., 1777)
 62-.014-.001-. *Brumus oblongus* (Weidenb., 1859)
 62-.025-.004-. *Coccinella distincta* Fald., 1837
- 65-.000-.000-. CISIDAE**
 65-.001-.002-. *Octotemnus mandibularis* (Gyll., 1813)
- 67-.000-.000-. BOSTRYCHIDAE**
 67-.003-.001-. *Stephanopachys substriatus* (Payk., 1800)
- 70-.000-.000-. OEDEMERIDAE**
 70-.004-.002-. *Nacerda rufiventris* (Scop., 1763)
 70-.004-.004-. *Nacerda fulvicollis* (Scop., 1763)
 70-.010-.010-. *Oedemera virescens* (L., 1767)
- 71-.000-.000-. PYTHIDAE**
 71-.001-.001-. *Pytho depressus* (L., 1767)
- 72-.000-.000-. PYROCHROIDAE**
 72-.002-.001-. *Schizotus pectinicornis* (L., 1758)
- 80-.000-.000-. SERROPALPIDAE**
 80-.001-.001-. *Tetratoma fungorum* F., 1790

- 80-.012-.001-. *Serropalpus barbatus* (Schall., 1783)
- 83-.000-.000-. *TENEBRIONIDAE***
 83-.014-.001-. *Bolitophagus reticulatus* (L., 1767)!
 83-.018-.001-. *Hoplocephala haemorrhoidalis* (F., 1787)!
 83-.039-.001-. *Stenomax aeneus* (Scop., 1763)
 83-.040-.003-. *Cylindronotus convexus* (Küst., 1850)
- 85-.000-.000-. *SCARABAEIDAE***
 85-.006-.006-. *Geotrupes alpinus* (Hagenb., 1825)
 85-.019-.014-. *Aphodius depressus* (Kug., 1792)
 85-.019-.068-. *Aphodius constans* Dft., 1805
 85-.019-.069-. *Aphodius borealis* Gyll., 1827
 85-.050-.001-. *Gnorimus nobilis* (L., 1758)
- 86-.000-.000-. *LUCANIDAE***
 86-.003-.001-. *Platycerus caprea* (Geer, 1774)
 86-.004-.001-. *Ceruchus chrysomeloides* (Hochenw., 1785)
- 87-.000-.000-. *CERAMBYCIDAE***
 87-.005-.001-. *Tragosoma depsarium* (L., 1767)!
 87-.008-.001-. *Criocephalus rusticus* (L., 1758)
 87-.010-.001-. *Tetropium castaneum* (L., 1758)
 87-.010-.002-. *Tetropium fuscum* (F., 1787)
 87-.011-.004-. *Rhagium inquisitor* (L., 1758)
 87-.014-.001-. *Toxotus cursor* (L., 1758)
 87-.017-.001-. *Pachyta quadrimaculata* (L., 1758)
 87-.019-.001-. *Gaurotes virginea* (L., 1758)
 87-.020-.001-. *Acmaeops septentrionis* (Thoms., 1866)!
 87-.027-.011-. *Leptura rubra* L., 1758
 87-.027-.015-. *Leptura sanguinolenta* L., 1761
 87-.027-.016-. *Leptura dubia* Scop., 1763
 87-.027-.017-. *Leptura inexpectata* Janss., Sjöb., 1928
 87-.027-.018-. *Leptura Virens* L., 1758!
 87-.029-.002-. *Strangalia pubescens* (F., 1787)!
 87-.029-.008-. *Strangalia arcuata* (Panz., 1793)!
 87-.031-.001-. *Saphanus piceus* (Laich., 1784)!
 87-.039-.001-. *Molorchus minor* (L., 1758)
 87-.045-.001-. *Aromia moschata* (L., 1758)
 87-.046-.001-. *Rosalia alpina* (L., 1758)!
 87-.049-.001-. *Rhopalopus ungaricus* (Hbst., 1784)!
 87-.052-.001-. *Semanotus undatus* (L., 1758)!

J. ROPPEL

- 87-.053-.001-. *Callidium coriaceum* (Payk., 1800)!
- 87-.058-.003-. *Clytus arietis* (L., 1758)
- 87-.058-.004-. *Clytus lama* Muls., 1847!
- 87-.059-.001-. *Cyrtoclytus capra* (Germ., 1824)!
- 87-.069-.001-. *Lamia textor* (L., 1758)!
- 88-.000-.000-. *CHRYSOMELIDAE***
- 88-.012-.001-. *Clytra quadripunctata* (L., 1758)
- 88-.013-.002-. *Gynandrophthalma flavicollis* (Charp., 1825)
- 88-.016-.001-. *Pachybrachys hieroglyphicus* (Laich., 1781)
- 88-.017-.008-. *Cryptocephalus variegatus* F., 1781
- 88-.017-.017-. *Cryptocephalus biguttatus* (Scop., 1763)
- 88-.017-.032-. *Cryptocephalus nitidus* (L., 1758)
- 88-.017-.042-. *Cryptocephalus frenatus* Laich., 1781
- 88-.017-.048-. *Cryptocephalus flavipes* F., 1781
- 88-.023-.005-. *Chrysomela coerulans* Scr., 1791
- 88-.024-.001-. *Diochrysa fastuosa* (Scop., 1763)
- 88-.026-.005b. *Chrysochloa gloriosa pretiosa* (Suffr., 1851)
- 88-.026-.006-. *Chrysochloa variabilis* (Wse., 1883)
- 88-.026-.016-. *Chrysochloa speciosissima* (Scop., 1763)
- 88-.034-.004-. *Melasoma vigintipunctata* (Scop., 1763)
- 88-.034-.007-. *Melasoma tremulae* (F., 1787)
- 88-.035-.007-. *Phytodecta linnaeanus* (Schrk., 1781)
- 88-.036-.002-. *Phyllodecta tibialis* Suffr., 1851
- 88-.041-.002b. *Galeruca interrupta circumdata* Dft., 1825
- 88-.041-.003-. *Galeruca pomonae* (Scop., 1763)
- 88-.042-.001-. *Lochmaea capreae* (L., 1758)
- 88-.045-.008-. *Luperus lyperus* (Sulz., 1776)
- 93-.000-.000-. *CURCULIONIDAE***
- 93-.015-.037-. *Otiorhynchus armadillo* (Rossi, 1792)
- 93-.015-.130-. *Otiorhynchus rugifrons* (Gyll. 1813)
- 93-.015-.134-. *Otiorhynchus gemmatus* (Scop., 1763)
- 93-.049-.004-. *Chlorophanus gibbosus* (Payk., 1792)
- 93-.067-.001-. *Dryophthorus corticalis* (Payk., 1792)
- 93-.111-.006-. *Pissodes pini* (L., 1758)
- 93-.111-.007-. *Pissodes harcyniae* (Hbst., 1795)
- 93-.116-.002-. *Liparus glabrirostris* Küst., 1849
- 93-.138-.002-. *Limnobaris pilistriata* (Steph., 1831)

Anschrift des Verfassers:

Dr. Joachim Roppel, Obere Pfalzgrafstraße 6, 8050 Freising
26

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Coleopterologica](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Roppel Joachim

Artikel/Article: [Ergebnis der Gemeinschaftsexkursion der Societas Coleopterologica e.V. in das Naturschutzgebiet "Oberes Isarta/Norderriß" am 7. Juli und 4. August 1990 \(Coleoptera\) 21-26](#)