

**SEZNAM SLOVENSКИH IMEN V SLOVENIJI ŽIVEČIH PEDICEV
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)**Matjaž JEŽ¹ in Jernej LAVBIČ²¹Velika Mislinja 15, 2382 Mislinja; e-mail: matjaz.jez@gmail.com²Ljubljanska cesta 18, 3000 Celje; e-mali: jernej.lavbic@gmail.com

Izveček – Predstavljen je seznam pedicev (Geometridae) Slovenije z znanstvenimi in slovenskimi binarnimi imeni, ki obsega 168 rodov in 465 vrst. Izhodišče tega seznama je Hafnerjev seznam metuljev Kranjske iz leta 1910, ki je dopolnjen s Carneluttijevim seznamom iz leta 1992. Seznama sta favnistično dopolnjena ter taksonomsko posodobljena tudi z drugimi javno dostopnimi in lastnimi podatki. Osnovni namen članka je predstaviti slovenska imena pedicev (Geometridae) in kratko zgodovino njihovega nastajanja v Sloveniji. Določena so bila po načelu Linejeve binarne nomenklature ob upoštevanju etimologije latinskih imen in lastnosti metuljev.

KLJUČNE BESEDE: Geometridae, Lepidoptera, Slovenija, etimologija, pedici, slovenska imena.

Abstract – A CHECKLIST OF SLOVENIAN NAMES OF GEOMETRIDAE MOTHS LIVING IN SLOVENIA (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)

A checklist of geometer moths (Geometridae) of Slovenia with scientific and Slovenian binary names is presented, comprising 168 genera and 465 species. The list is based on Hafner's 1910 list of butterflies of Carniola, supplemented by Carnelutti's 1992 list. The two lists were updated faunistically and taxonomically using other publicly available and our own data. The main purpose of this paper is to present the Slovenian vernacular names of geometer moths and the method used to derive them. A brief history of the development of Slovenian names is also presented. Slovenian names were determined according to the principle of Linné's binary nomenclature, taking into account the etymology of the scientific names and a nature of Geometridae moths.

KEY WORDS: Geometridae, Lepidoptera, Slovenia, etymology, Slovenian vernacular names

UVOD

Ta prispevek je nadaljevanje prispevkov o slovenskih imenih sovč (Noctuidae) (Jež in Lavbič 2023a) in erebid (Erebidae) (Jež in Lavbič 2023b). Zato nekaterih poglavij iz uvoda ne ponavlja. Seznam znanstvenih imen v Sloveniji živečih pedicev (Geometridae) je pripravil drugo imenovani avtor na osnovi javno dostopnih faunističnih in taksonomskih podatkov. Prvo imenovani avtor je pripravil etimologijo znanstvenih imen in slovenska imena. Za lažje razumevanje posebnosti te družine sva dodala še kratki pregled značilnosti metuljev te velike in zanimive družine.

O RAZVOJU DRUŽINE GEOMETRIDAE

Izraz GEOMETRAE, kot sinonim za današnje GEOMETRIDAE, je uvedel že Linnaeus (C. Linnaeus, 1707 – 1778, v nadaljevanju Line) v deseti knjigi svojega znamenitega dela *Systema naturae* leta 1758. Vse nočne metulje je uvrstil v veliko skupino PHALAENA, kar danes razumemo kot nočnike ali Nocturna. Ime Phalaena je povzel po grški besedi *phalain* s katero je Aristotel označeval molje. Razdelil jih je na sedem manjših skupin: Bombyces, Noctuae, Geometrae, Tortrices, Pyralides, Tineae in Alucitae. Te skupine ali *falange* kot jih je imenoval, niso označevale taksonomskega položaja v današnjem pomenu besede, so pa najbližje rangu naddružin. Za Geometrae je poudaril, da plosko (horizontalno) zlagajo krila, razdelil pa jih je v dve skupini: na *Pectinicornes* (*pecto* glevnik, glavnikač), ki imajo glavnikačaste tipalnice in *Seticornes*, (*seta* ščetina, dlaka) ki imajo nitaste tipalnice (Emmet, 1991). Ime družine Geometridae, kot taksonomske kategorije v današnjem pomenu besede, je uvedel šele britanski zoolog W. E. Leach (1791 – 1836) leta 1815.

Med pri nas živečimi pedici jih je Line v omenjenem delu je opisal 52, ki so bili vsi v skupini Phalaena. V tem primeru je bilo ime Phalaena v funkciji rodovnega imena, čeprav formalno ni imelo tega taksonomskega položaja. To imenovanje je še danes vidno pri starejših sinonimih oziroma originalnih kombinacijah imen kot so: *Phalaena prunaria* za danes veljavno *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758), *P. pinaria* za *Bupalus pinaria* (Linnaeus, 1758) in *P. atomaria* za *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758). Pri imenovanju pedicev je Line naredil eno samo izjemo in sicer pi vrsti *Geometra papilionaria* Linnaeus, 1758, ki je ni uvrstil v Phalaena, ampak je za njo uvedel rodovno ime Geometra, vrsta pa je edina med našimi pedici, pri kateri se je ohranilo njegovo izvirno imenovanje. Linejevemu zgledu je že naslednje leto sledil K. A. Clerck (1710 – 1765), švedski entomolog in ilustrator metuljev, odlični Linejev učenec. Opisal je 11 vrst pri nas živečih pedicev, med njimi *Phalaena defoliaria*, danes *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759).

Med zgodnjimi imenovalci metuljev ne moremo prezreti Scopoli, ki je leta 1763 opisal tudi več pedicev s Kranjske, za 18 med njimi pa so še danes veljavna njegova imena. Tudi on je vse uvrstil v skupino Phalaena, danes pa so uvrščeni v 15 različnih rodov. Med njimi so *Phalaena exanthemata*, danes *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763), *P. cervinalis*, danes *Hydria cervinalis* (Scopoli, 1763) in *P. ochrata*,

danes *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763). Za tri med njimi, Scopolijev ledenikar, *Psodos alpinata* (Scopoli 1763), Scopolijev metlarček, *Scopula ornata* (Scopoli, 1763) in Scopolijev temnikar, *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763), smo se odločili, da jih imenujemo njemu v spomin.

Opisovanje novih rodov metuljev se je pričelo v večjem obsegu šele s Hübnerjem (Hübner J. 1761 – 1826), nemškim entomologom in ilustratorjem metuljev, ki je med leti 1799 in 1825 opisal veliko novih rodov in vrst. Med 168 rodovi pri nas živečih pedicev, jih kar 71 nosi njegov podpis, dodal pa je še opise 65 vrst. Najuspešnejša opisovalca pedicev naših krajev sta bila Dunajčana M. Denis in I. Schiffermüller, ki sta opisala 76 vrst, 60 vrst je Linejevih, 18 pa jih je prispeval Scopoli. Danes obsega družina Geometridae v svetu kakih 2000 rodov s 23.000 vrstami, za Evropo pa je število vrst konec leta 2023 ocenjeno na 1.126 (*Lepiforum* 2023).

Pedici so dobili svoje ime po lastnosti gosenic (Erjavec 1880). Večina gosenic metuljev ima osem parov nog: tri pare pravih nog na oprsju ter štiri pare trebušnih in en par zadkovih panožic; gosenice pedicev pa imajo le pet parov nog: po tri pare pravih nog na prsnem delu in po dva para panožic na koncu telesa. Ta anatomska značilnost jim omogoča posebni način gibanja, ki ga imenujemo pednjanje. Poteka tako, da gosenica vzdigne zadek in ga potegne naprej do prsnega dela telesa, kjer se oprime podlage, hrbet pa zvije navzgor v obliki značilnega loka. Potem vzdigne sprednji del telesa, ga iztegne naprej in se oprime podlage pred sabo (Erjavec 1864).

Tak način gibanja, pednjanje, s katerim *se meri zemlja* je uporabil že Line kot izhodišče za določitev imena skupine Geometrae in rodu Geometra (Emmet, 1991), uporabil pa ga je tudi Mayerick leta 1892 za imenovanje rodu Rhodometra (*rhodon* roža, *metron* mera, dolžina), kjer pa gosenice *merijo rože*. Pednjanje ali temu podobno gibanje, imajo tudi nekatere gosenice iz družine Erebiidae, kot na primer pri rodu Phytometra (*phuton* rastlina, *metron* mera, dolžina) kjer pa gosenice *merijo rastline*.

O RAZVOJU SLOVENSKIH ZNANSTVENIH IMEN PEDICEV

Pionirsko delo Frana Erjavca (1834 – 1887)

Ključna dela F. Erjavca, v katerih je uporabil slovenska imena nočnih metuljev so **Živalstvo, Prirodopis za nižje gimnazije in realke** (Pokorny/Erjavec 1864), **Naše škodljive živali v podobi in besedi** (Erjavec 1880) in **Prirodopis živalstva s podobami** (Pokorny/Erjavec 1881). V prvi izdaji »Živalstva« je navedel dve vrsti, velikega in malega zmrzlikarja. Pedice je tudi na kratko opisal in razložil še nastanek njihovih imen. Takole pravi: »Pedici so ponočnjaki z dolgimi nitkastimi tipalnicami, dolgim, tankim trupom in imajo primerno široka in tanka, v miru ravno sprosterta krila. Posebno čudne so gosenice in njihovo gibanje, in od tega gibanja so dobili tudi ime. Imajo namreč le šest persnih in štiri trebušne noge, ki so pa prav na koncu trupla, tako da v sredi trupa nimajo nikakršnih nog. Kedar hodijo, se zgerbančijo in se zdaj s sprednjimi, zdaj z zadnjimi nogami poprijemajo, ravno tako kakor če mi z roko ped merimo«.

Tabela 1: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen pedicev iz treh Erjavčevih del. Imena so napisana v izvirni obliki.

Znanstveno ime	Pokorny/Erjavec 1864	Erjavec 1880	Pokorny/Erjavec 1881
<i>Acidalia brumata</i>	Zimski pedic	Zmrzlikar mali	Mali zimski pedic
<i>Hibernia defoliaria</i>		Zmrzlikar veliki	Veliki zimski pedic
<i>Hibernia bajarija</i>		Zmrzlikar višnjev	
<i>Fidonia piniaria</i>		Pedic borov	
<i>Zerene grossulariata</i>	Kosmuljni pedic	Šarec, Harlekin	Šarec, kosmulji pedic
<i>Scopula margiaritalis</i> <i>Evergestia extimalis</i>		Vešča repična	

Schwentnerjevi »Metulji v podobah«

Naslednje delo, ki je pomembno za razvoj slovenskih imen pedicev, je Schwentnerjeva knjižica metulji v podobah. Izšla je leta 1907 (Anonimno 1907) kot prirejeni ponatis nemškega originala iz leta 1900 (Anonimno 1900) s slovenskimi, nemškimi in latinskimi imeni 129 vrst metuljev, med katerimi je 29 pedicev. V predhodnih člankih o slovenskih imenih sovk in erebid (Jež in Lavbič 2023a in b) je bila navedena domnevna letnica izida knjižice okrog leta 1920. Z odkritjem novih virov lahko zdaj navajava natančne podatke.

Tabela 2: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen pedicev iz knjižice Metulji v podobah. Imena so napisana v izvirni obliki.

Slovenska imena	Latinska imena
Brezov trakarček	<i>Brephos parthenias</i>
Bezgov pedic	<i>Urapteryx sambucaria</i>
Beli šarec	<i>Abraxas grossulariata</i>
Slivar	<i>Angerona prunaria</i>
Lipovček	<i>Pericallia syringaria</i>
Pasanček	<i>Biston zonarius</i>
Zelenček	<i>Geometra papilionaria</i>
Kovačnikov pedic	<i>Crocallis elinguaris</i>
Tigerček	<i>Venilia macularia</i>
Glogov pedic	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Lepotič	<i>Acidalia decorata</i>
Gozdni panterček	<i>Abraxas sylvata</i>
Škrlatar	<i>Rhodostrophia calabraria</i>
Leskov pedic	<i>Abraxas marginata</i>
Planinski pedic	<i>Psodos quadrifaria</i>
Veliki zimski pedic	<i>Hibernia defoliaria</i>
Črnivec	<i>Odezia atrata</i>
Valoviti pedic	<i>Eucosmia undulata</i>
Malinov pedic	<i>Larentia albicillata</i>

Brezov pedic	<i>Amphydasis betularia</i>
Šentjanževček	<i>Anaitis plagiata</i>
Mali zimski pedic	<i>Cheimatobia brumata</i>
Dvočrtnik	<i>Larentia bilineata</i>
Borov pedic	<i>Bupalus piniarius</i>
Suličar	<i>Larentia hastata</i>
Škrlatasti pedic	<i>Lythria purpuraria</i>
Lakotovec	<i>Larentia ocellata</i>
Mreževček	<i>Phasiana clathrata</i>
Žilavček	<i>Eupithecia venosata</i>

Metulji Slovenije, Jurij Kurillo

Pomemben prispevek k razvoju slovenskih imen metuljev je dal tudi dr. Jurij Kurillo v delu Metulji Slovenije (1992), ki je praktični priročnik za prepoznavanje in opazovanje naših metuljev. Izdala ga je Državna založba Slovenije leta 1992. V njej je predstavljenih v sliki in besedi 20 vrst pedicev.

Tabela 3: Seznam slovenskih in latinskih imen pedicev iz knjige Metulji Slovenije. Imena so napisana v izvorni obliki.

Slovenska imena	Latinska imena
Brezov pedic	<i>Biston betularia</i>
Leskov pedic	<i>Lomaspilis marginata</i>
Ščetinasti pedic	<i>Lycia hirtaria</i>
Jelšev pedic	<i>Cabera pusaria</i>
Smrekov pedic	<i>Thera variata</i>
Lakotni pedic	<i>Epirrhoe galiata</i>
Mreževček	<i>Chiasmia clathrata</i>
Tigerček	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Navadni škrlatar	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>
Slivar	<i>Angerona prunaria</i>
Navadni zobnik	<i>Ennomos erosaria</i>
Gozdni panterček	<i>Abraxas sylvata</i>
Srobotov zelenček	<i>Hemistola chrysoprasaria</i>
Somračni pedic	<i>Ectropis bistortata</i>
Valoviti pedic	<i>Calocalpe undulata</i>
Glogov ali rumeni pedic	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Gabrov pedic	<i>Campaea margaritata</i>
Oljčni pedic	<i>Peribatosed umbraria</i>
Veliki skalnik	<i>Gnophos fulvata</i>
Gorski skalnik	<i>Gnophos dilucidaria</i>

Kumulativna vsota vseh treh seznamov je 43 vrst, nobena pa ni skupna vsem trem seznamom.

Zanimiv primer med Erjavčevimi vrstami je *Scopula margiaritalis* ali *repična vešča*. Takrat so jo zmotno uvrščali med pedice, čeprav sodi v družino Pyralidae z današnjim imenom *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763). Zato vrsta ni vključena v kumulativni seštevek. Tudi pri Schwentnerjevih vrstah najdemo nekaj podobnega. *Brezov trakarček*, *Brephos parthenias* [danes brezov pomladnik, *Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761)] je upodobljen med sovkami, slovensko ime »trakarček« in nemško »birkeneule« pa potrjujeta, da so tega pedica takrat napačno uvrščali med sovke. Zanimiv primer je pasanček, *Biston zonarius*, [danes pasasti volčič, *Lycia zonaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)], ki pa ne živi v Sloveniji. To je povezano z dejstvom, da je bila knjižica izdana za območje takratne Avstro-Ogrske, kjer je bila vrsta prisotna. Po spremembi državnih meja po prvi svetovni vojni pa je območje razširjenosti pasančka ostalo v Avstriji, za Slovenijo pa o tej vrsti tudi danes nimamo nobenega podatka. Pri vrsti *Venilia macularia*, za katero Schwentner navaja slovensko ime *tigerček* in nemško *tigerchen*, se je zapletlo pri imenu. Značilni vzorec tигра so ozke temne črte na rumeni podlagi, naš metuljček pa nima črt ampak izrazite pege, ki so značilne za panterja, in na te pege se nanaša tudi latinsko vrstno ime *macularia*. Pri določitvi nemškega imena se je očitno zgodil spodrsrlaj, ki sta ga nekritično povzela tudi Schwentner in Kurillo. Zato smo se pri določitvi novega slovenskega imena, *rumeni panterček*, oprli na pomen znanstvenega imena *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758) in na dejanski vzorec metulja.

Podatkovne zbirke prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Pomembni vir slovenskih imen metuljev sta tudi *Imenik slovenskih imen nevretenčarjev* (Trilar in sodelavci 2023) in *Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev* (Trilar in Knapič, 2023), ki jih ureja Prirodoslovni muzej Slovenije. V obeh zbirkah je predstavljenih tudi veliko pedicev. Navedena so tudi slovenska imena, ki pa le izjemoma ustrezajo merilom binarnega imenovanja. Ne glede na pomanjkljivosti pa sta omenjeni zbirki najpopolnejši seznam slovenskih imen.

METODA DELA

Za določitev slovenskih znanstvenih imen pedicev (Geometridae) je bila uporabljena metoda postopnosti oziroma treh korakov.

Najprej je bila pridobljena etimološka razlaga veljavnih znanstvenih imen vseh obravnavanih rodov in vrst. Pri tem je bila uporabljena etimologija po A. Spulerju (1910) in A. M. Emmetu (1991). Za imena, za katera omenjena avtorja ne navajata etimologije, je bil pomen določen iz pomena latinskih imen s pomočjo grško-slovenskega (Dokler, 1999) in latinsko-slovenskega slovarja (Wiesthaler, 1993-2007). Tako so bila najprej določena slovenska imena rodov, ki so vedno samostalniki. V naslednjem koraku so bila na enak način določena slovenska imena vrst, ki so vedno pridevniki. Pri določanju rodovnih in vrstnih imen pedicev so bile upoštevane tudi njihove lastnosti kot so videz (barva, vzorec, oblika), hranilna rastlina, življenjsko

okolje, dnevni ali letni čas pojavljanja in podobno. V nekaterih primerih se ime nanaša tudi na lastnosti gosenic. Vsa rodovna in vrstna imena pedicev so slovnično moškega spola.

SEZNAM VRST

Rezultat dela je okvirni seznam v Sloveniji živečih pedicev (Geometridae) z znanstvenimi in slovenskimi imeni. Vsa slovenska imena so binarna in temeljijo na Linejevi definiciji binarnega imenovanja. Seznam obsega 168 rodov in 465 vrst. Ker domnevava, da obstajajo dodatni, še neobjavljeni podatki o pedicah Slovenije, ocenjujeva, da bi lahko bilo njihovo dejansko število višje. Seznam je urejen v obliki tabele, ki je prikazana v prilogi 1.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se Barbari Zakšek in Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije za pobudo za pripravo slovenskih binarnih imen pedicev ter vsem drugim, ki so kakor koli prispevali k nastanku tega članka. Zahvaljujeva se tudi dr. Tomiju Trilarju za posredovane podatke iz baze Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

VIRI

- Anonimno 1900:** Schmetterlings-Atlas in Taschenformat: 129 Abbildungen in Farbendruck mit Angabe der deutschen und lateinischen Namen, Mück's praktische Taschenbücher 3, Wien 1900: G. Szelinski & Comp. 32. str.
- Anonimno 1907:** Književne novosti. Metulji v podobah. Ljubljanski zvon, 27(6), 379.
- Carnelutti J. 1971:** IV. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 19: 169-180.
- Carnelutti J. 1978:** V. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 26(2): 175-182.
- Carnelutti J. 1989:** VI. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 37: 1-9.
- Carnelutti J. 1992a:** Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 17(17): 61-104.
- Carnelutti J. 1992b:** Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (Popravki/Errata). Varstvo narave 18(18): 189-190.
- Carnelutti J., Michieli Š. 1955:** Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 4: 43-55.
- Carnelutti J., Michieli Š. 1960:** II. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 7: 113-124.
- Carnelutti J., Bartol V., Sušec-Michieli Š. 1965:** III. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. Biološki vestnik 13: 69-76.
- Deutsch H. 2019:** Contribution to the Lepidopteran Fauna of Slovenia - Julian Alps,

Coastal Areas.:1-267.

- Dokler A. 1999:** Grško slovenski slovar. Cankarjeva založba Ljubljana, 848 str.
- Emmet A. M. 1991:** The scientific names of the British Lepidoptera – their history and meaning. Harley Books, Colchester, England, 288 str.
- Erjavec F. 1880:** Naše škodljive živali v podobi in besedi. Družba sv. Mohorja v Celovcu 1880, 336 str.
- Gomboc S. 1999:** Dva nova taksona v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 7(1): 69-71.
- Habeler H. 2011:** Paraboardia viertlii (Bohatsch, 1883), eine für Slowenien neue Geometride (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 19(2): 199-201.
- Habeler H., Gomboc S. 2005:** Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Slowenien mit erstnachweisen. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 13(1): 29-52.
- Hafner J. 1910:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 1(3/4): 243-262.
- Hafner J. 1911a:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 2(1): 58-73.
- Hafner J. 1911b:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 2(4): 290-309.
- Hafner J. 1911c:** Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. Carniola, Ljubljana 3(1): 43-75.
- Hoffmann F., Klos R. 1917:** Die Schmetterlinge Steiermarks IV. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermar 53 : 47-209.
- Jež M., Lavbič J. 2023a:** Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih sovč (Lepidoptera, Noctuidea). Acta entomologica Slovenica (Ljubljana), 31(1): 27 – 75.
- Jež M., Lavbič J. 2023b:** Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih erebid (Lepidoptera, Erebidae). Acta entomologica Slovenica (Ljubljana), 31(2): 163 – 184.
- Karsholt O., Razowski J. 1996:** The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist. Apoolo Books, Stenstrup 1996, 380 str.
- Kurillo J. 1992:** Metulji Slovenije. Državna založba Slovenije 1992, zbirka Narava Slovenije, stran 172 - 191.
- Lasan M. 1997:** Nekaj novih vrst v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 5(1): 51-58.
- Lasan M. 2000:** Nove vrste v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 8(2): 137-146.
- Leraut P. 2008:** Contribution à l'étude du genre *Sciadia* Hübner, 1822 (Lepidoptera, Geometridae). Bulletin de la Société entomologique de France 113(2): 177-182.
- Lesar T. 1998a:** *Lomographa dilectaria* Hübner, 1799, v severovzhodni Sloveniji (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 6(1): 46.
- Lesar T. 1998b:** *Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787), nova vrsta v slovenski favni metuljev (Lepidoptera: Geometridae). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 6(2): 143-144.
- Mladinov L. 1980:** Lepidoptera iz doline gornjeg toka rijeke Kupe IV. Geometridae. Acta entomologica Jugoslavica 16(1): 69-91.

- Pokorny A. 1864:** Živalstvo. Prirodopis za nižje gimnazije in realke. Spisal A. Pokorny, poslovenil F. Erjavec. Celovec, 93 – 97 str.
- Pokorny A. 1881:** Prirodopis živalstva s podobami. Za spodnje razrede srednjih šol. Izdelal dr. Alojzij Pokorny, poslovenil Erjavec F. Matica slovenska v Ljubljani, 191 – 199 str.
- Rennwald E., Rodeland J. 2021:** Lepiforums-Europaliste. 1.2. Version 8.3.: 20. 3. 2021.
- Spuler A. 1910:** Die Schmetterlinge Europas, Stuttgart. II. Band 385 str.
- Stauder H. 1929:** Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). 4. Abschnitt. Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae. Ent. Anzeiger Wien 9: 397-403.
- Sukič M., Kodran T. 2007:** *Lycia isabellae* (Harrison, 1914) (Geometridae) in *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809) (Noctuidae) - novi vrsti v favni metuljev Slovenije (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana), 15(2): 127-130.
- Štanta R. 2000:** Dve novi vrsti v slovenski favni metuljev (Lepidoptera). Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 8(1): 84-86.
- Trilar T., Knapič T. 2024:** Imenik slovenskih imen nevretenčarjev. Prirodoslovni muzej Slovenije <http://www1.pms-lj.si/imenik/imenik.php/>. Dostop 20.1.2024.
- Trilar T., Štangelj M., Sivec I. 2024:** Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev. Prirodoslovni muzej Slovenije. <http://www1.pms-lj.si/animalia/>. Dostop 20.1.2024.
- Wiesthaller F. 1993 – 2007:** Latinsko – slovenski slovar, del 1 – 6.
<https://fauna-eu.org>. Dostop 15.12.2023
<https://lepiforum.org>. Dostop 15.12.2023
<https://en.wikipedia.org>. Dostop 15.12.2023

PRILOGA 1:

Stolpec A – koda vrst po Karsholt & Razowski 1996; stolpec B – znanstveno ime družina/podružina/rod/vrsta in imena avtorjev latinskih imen po Rennwald & Dodeland 2021; stolpec C – viri; stolpec D – etimologija; stolpec E – slovensko ime. Okrajšave v stolpcu D pomenijo: S Spuler 1908 in 1910, E Emmet 1991, D Dokler 1999 in W Wiesthaler 1993–2007.

KR-Št.	Znanstveno ime	Vir	Etimologija	Slovensko ime
	<i>GEOMETRIDAE</i> Leach, 1815		E <i>geometreo</i> meriti zemljo; glede na pednjajčo premikanje gosenic.	PEDICI
	<i>Abraxas</i> Leach, [1815]		E <i>Abraxas</i> stara mistična figura; brez metuljarskega pomena; 2 <i>šarec</i> glede na pisani vzorec kril.	šarec
7522	<i>A. grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>Ribes grossulariata</i> ; bot. rod ribez, ena od hranilnih rastlin gosenic.	ribezov šarec
7525	<i>A. pantaria</i> (Linnaeus, 1767)	Carnelutti, 1971	E <i>panthera</i> panter; glede na lisasti vzorec kril.	lisasti šarec
7524	<i>A. sylvata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	E <i>sylva</i> , <i>silva</i> gozdi; glede na značilno življenjsko okolje.	gozdni šarec
	<i>Acasis</i> Duponchel, 1845		E <i>a-</i> brez, <i>kasis</i> brat; brez brata; edinček. 2 <i>gubarček</i> glede na kožno gubo ali krpo (halter) na bazi zadnjih kril samčkov.	gubarček
8682	<i>A. appensata</i> (Eversmann, 1842)	Carnelutti & Micheli, 1955	S <i>appendeo</i> obesen, povešen; glede na povešene krilne krpe samcev.	povešavi gubarček
8681	<i>A. viretata</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	E <i>viretum</i> zelena pika, zelen; glede na značilno barvo kril.	zelenkasti gubarček
	<i>Aethalura</i> McDunnough, 1920		E <i>aithalos</i> dim, <i>ouron</i> meja; glede na zlitje, zabrisanost prečnih črt na krilih. 2 <i>dimar</i> glede na dimasti, zabrisani vzorec kril.	dimar
7802	<i>A. punctulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>punctulum</i> majhne pike, lise. Glede na vzorec malih lis na sprednjih krilih.	drobnolisi dimar
	<i>Agriopsis</i> Hübner, [1825]		E - <i>agrios</i> - divji, neukročen; 2 <i>mrzarnik</i> glede na letni čas pojavljanja vrst tega rodu.	mrzarnik
7695	<i>A. aurantiaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911b	S <i>aurantiaria</i> oranžen, oranžni; glede na barvo, ki spominja na <i>Citrus aurantium</i> , bot. rod pomaranča.	oranžni mrzarnik
7694	<i>A. bajaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	S <i>baios</i> majhen, neznatni; glede na majhna, zakrnela krila samic; 2 <i>rjavi</i> glede na značilno rjavo barvo kril.	rjavi mrzarnik
7693	<i>A. leucophaea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	S <i>leucophaeos</i> belostiv; <i>belkasti</i> glede na značilno sivo belo lisasti vzorec kril.	belkasti mrzarnik

7696	<i>A. marginaria</i> (Fabricius, [1771])	Hafner, 1911b	<i>S. margo marginis</i> rob, obrobljen; glede na s črnimi pikami obrobljena krila.	obrobljeni mrzaznik
	<i>Alcis</i> Curtis, 1826		E <i>Alcis</i> hči Aegyptusa. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>rogovilar</i> glede na močne prečne črte na krilih, ki spominjajo na rogove.	rogovilar
7778	<i>A. deversata</i> (Staudinger, 1892)	Carnelutti, 1989	<i>S. deversus</i> različen, drugačen; se razlikuje od predhodnih. 2 <i>črnolisi</i> po značilnih črnih lisah in pasovih na krilih.	črnolisi rogovilar
7779	<i>A. jubata</i> (Thunberg, 1788)	Hafner, 1911b	E <i>jubatus</i> griva, greben; glede na rahli greben na opisu.	grebenasti rogovilar
7777	<i>A. repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>repandus</i> upognjeni, <i>krivočrti</i> ; glede na ukrivljeno zunanjo prečno črto na srednjih krilih.	krivočrti rogovilar
	<i>Alceus</i> Guenee, 1845		E <i>a-</i> zanikanje; <i>leucus</i> beli; tisti, ki ni bel, ne beli. 2 <i>tnar</i> po črnem trnu, <i>Prunus spinosa</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	tnar
7831	<i>A. distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Carnelutti, 1992a	E <i>distinctus</i> drugačen, različen. 2 <i>pomladni</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	pomladni tnar
	<i>Alsophila</i> Hübner, [1825]		E <i>alsos</i> log, gaj, hosta. 2 <i>prekrilnik</i> v sedečem položaju zlagla krila tako, da se prekrivajo.	prekrilnik
7954	<i>A. aceraria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	S <i>acer</i> javor bot. rod <i>Acer</i> sp.; <i>javorov</i> po značilni hranilni rastlini gosenic.	javorov prekrilnik
7953	<i>A. aescularia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>aesculus</i> izvorno hrast (<i>Quercus petraea</i>), <i>hrastov</i> po značilni hranilni rastlini gosenic.	hrastov prekrilnik
	<i>Angerona</i> Duponchel, 1829		E <i>Angerona</i> ime boginje tišine; brez metuljarskega pomena. 2 <i>vrbar</i> po vrbi, <i>Salix</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste.	vrbar
7665	<i>A. prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>Prunus spinosa</i> bot. <i>črni trn</i> , po hranilni rastlini gosenic. 2 <i>oranžni</i> glede na značilno barvo te zelo spremenljive vrste.	oranžni vrbar
	<i>Anticlea</i> Stephens, 1831		E <i>Anticlea</i> ime Odisejeve matere, brez metuljarskega pomena. 2 <i>šipkar</i> glede na šipek, <i>Rosa</i> sp., hranilno rastlino gosenic.	šipkar
8310	<i>A. derivata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>derivo</i> vijugav, vijuganje; glede na vijugasto črto v apikalnem delu krila.	vijugavi šipkar
	<i>Anticollix</i> Prout, 1938		E <i>anti</i> namesto <i>Collix</i> , namesto rodu <i>Collix</i> . 2 <i>pijavčničar</i> po pijavčnici, <i>Lysimachia vulgaris</i> , hranilni rastlini gosenic.	pijavčničar
8607	<i>A. sparsata</i> (Treitschke, 1828)	Hafner, 1911a	E <i>sparsata</i> z blatom poškropljen; glede na črne in bele lesketajoče luske na krilih.	lesketajoči pijavčničar
	<i>Apeira</i> Meyrick, 1892		E <i>apeiros</i> ki ne pride do konca; glede na osrednjo liso, ki se konča pred robom krila.	lipovkar
7630	<i>A. syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>Syringa vulgaris</i> španski bezeg, lipovka; po značilni hranilni rastlini gosenic.	belolisi lipovkar

	<i>Aplasta</i> Hübner, [1823]			E <i>aplastos</i> neoblikovan, preprost. 2 <i>gladežnikar</i> glede na gladežnik, <i>Ononis</i> sp. značilno hranilno rastlino gosenic.	gladežnikar
7961	<i>A. ononaria</i> (Fuessly, 1783)	Hafner, 1910		E <i>ononis</i> bot. rod <i>Ononis</i> gladežnik. 2 <i>preprosti</i> glede na vzorec sprednjih kril.	preprosti gladežnikar
	<i>Aplocera</i> Stephens, 1827			E <i>haplos</i> enostaven, preprost; <i>keras</i> rog, antene; glede na antene. 2 <i>krčničarpo</i> krčnici, <i>Hypericum</i> sp., hranilni rastlini gosenic.	krčničar
8622	<i>A. efformata</i> (Guenée, [1858])	Camelutti & Michieli, 1960		E <i>ex-</i> izven, izven format; drugačen kot prejšnja vrsta, še posebej glede velikosti zadka.	peščinski krčničar
8620	<i>A. plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910		E <i>plaga</i> proga, črta; glede na očitne proge na sprednjih krilih. 2 <i>veliki</i> glede na velikost, saj je največji med našimi krčničarji.	veliki krčničar
8624	<i>A. praeformata</i> (Hübner, [1826])	Hafner, 1910		E <i>prae-</i> visoko, na visokem nivoju; <i>formatus</i> dobre oblike ali kroja. 2 <i>gorski</i> glede na značilno življenjsko okolje.	gorski krčničar
8625	<i>A. simplicata</i> (Treitschke, 1835)	Hafner, 1911c		E <i>simplex</i> , <i>simplicis</i> enostaven; glede na poenostavljeni vzorec. 2 <i>visokogorski</i> glede na značilno življenjsko okolje.	visokogorski krčničar
	<i>Apochelima</i> Hübner, [1825]			E <i>apo-</i> po, pozneje <i>kheima</i> zima. 2 <i>zimnik</i> glede na zimo, značilni letni čas pojavljanja metuljev.	zimnik
7671	<i>A. hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Camelutti & Michieli, 1960		E <i>hispidus</i> dlakasti, kocinasti; glede na dolge, močne, kocinam podobne luske.	kocinasti zimnik
	<i>Archicaris</i> Hübner, [1823]			E <i>arkhe</i> , <i>arkhi-</i> pričetek; <i>ear</i> pomlad; glede na letni čas pojavljanja metuljev.	pomladnik
7517	<i>A. parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1910		E <i>parthenias</i> sin konkurbine; brez metuljarskega pomena. 2 <i>brezov</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	brezov pomladnik
	<i>Artiora</i> Meyrick, 1892			D <i>artios</i> pristojen, primeren; <i>orao</i> videti; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>podkrilnik</i> ker v mirovanju zloži zadnja krila pod sprednja.	podkrilnik
7645	<i>A. evonymaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b		S <i>Evonymus</i> , bot. rod trdoleska <i>Evonimus</i> ; po trdoleski, <i>Evonimus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	trdoleskin podkrilnik
	<i>Ascotis</i> Hübner, [1825]			E <i>a-</i> zankanje <i>scotis</i> tema, temno; ki ni temen. 2 <i>mesečar</i> glede na polmesečasto znanje na sprednjih krilih.	mesečar
7794	<i>A. selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b		E <i>selen</i> luna, mesec. 2 <i>svetli</i> glede na svetlo barvo kril.	svetli mesečar
	<i>Aspitates</i> Treitschke, 1825			E domnevno popravek po <i>aspilates</i> , arabski dragi kamen po Pliniju. 2 <i>okrar</i> glede na značilno okrasto barvo kril.	okrar
7926	<i>A. ochrearia</i> (Rossi, 1794)	Hafner, 1911b		E <i>ochra</i> okra, vrsta zemlje oker barve. 2 <i>pisani</i> glede na vzorec kril metuljev.	pisani okrar
	<i>Asthena</i> Hübner, [1825]			E <i>asthenes</i> slaboten, šibak. 2 <i>čipkarček</i> glede na nežno strukturo kril in vzorca, ki spominja na čipke.	čipkarček

8656	<i>A. albulata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	E <i>albulata</i> bel; glede na barvo kril.	beli čipkarček
8658	<i>A. anseraria</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	Hafner, 1911a	S <i>anserarius</i> gos, gosji; domnevno zaradi bele barve, ki spominja na barvo gosjega perja.	gosji čipkarček
	<i>Baptria</i> Hübner, [1825]		S <i>baptros</i> obarvan, potopljen v barvo? 2 <i>črnogar</i> glede na hranilno rastlino gosenic, <i>Actea spicata</i> , črnoga.	črnogar
8473	<i>B. tibiale</i> (Esper, 1791)	Hafner, 1910	S <i>tibialis</i> golen, noga, v obliki nogavice; po obliki bele lise na krilih. 2 <i>belolisti</i> glede na bele lise na črnih krilih.	belolisti črnogar
	<i>Biston</i> Leach, [1815]		E <i>Biston</i> Marsov sin. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>preprogar</i> po ploskem zlaganju kril, ki so razgrinjena kot preproga.	preprogar
7686	<i>B. betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>betula</i> breza; po brezi, <i>Betula</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic te poltfrage vrste.	brezov preprogar
7685	<i>B. strataria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>stratum</i> razširjeno, razprostrto; odedja, preproga. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	hrastov preprogar
	<i>Boudinotiana</i> Leraut, 2002		Jacques Boudinot (1947-1999), francoski entomolog. 2 <i>pomladin</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	pomladin
7518	<i>B. notha</i> (Hübner, [1803])	Hafner, 1910	S <i>notha</i> nezakonski; brez metuljarskega pomena. 2 <i>topolov</i> glede na topol, <i>Populus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	topolov pomladin
	<i>Bupalus</i> Leach, 1815		E <i>Bupalus</i> ime grškega kiparja; brez metuljarskega pomena. 2 <i>borovec</i> po boru, <i>Pinus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	borovec
7822	<i>B. piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>Pinus</i> bot. rod bor, <i>Pinus</i> sp.. 2 <i>lisasti</i> glede na lisasti vzorec na krilih.	lisasti borovec
	<i>Cabera</i> Treitschke, 1825		E <i>Cabera</i> hči Proteusa. 2 <i>belokrilnik</i> glede na mlečno bela krila vist tega rodu.	belokrilnik
7826	<i>C. exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	E <i>exanthema</i> razcveteti se, izbruhniti; po razpršenih temnih pikah po krilih. 2 <i>krivočrti</i> po obliki prečnih črt na krilih.	krivočrti belokrilnik
7824	<i>C. pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>pusa</i> malo dekle, deklica; glede na občutljivo barvo in videz. 2 <i>ravnočrti</i> po obliki prečnih črt na krilih.	ravnočrti belokrilnik
	<i>Campaea</i> Lamarck, 1816		E <i>campe</i> ovinkanje, spreminjanje smeri? 2 <i>biserovinar</i> glede na biserovinasto barvo in lesk kril.	biserovinar
7836	<i>C. margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1911b	E <i>margarita</i> biset, biserovina; glede na biserno belo barvo kril. 2 <i>zelenkasti</i> po zelenkastem odtenku barve kril.	zelenkasti biserovinar
	<i>Campogramma</i> Stephens, 1831		E <i>camptos</i> nagnjen, upognjen, poševen; <i>gramma</i> črta, linija; glede na ukrivljene, krive prečne črte na sprednjih krilih.	krivočrtar
8289	<i>C. bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	S <i>bi-</i> dva, <i>linea</i> črta; dvočrti, z dvema črtama; glede na značilni vzorec sprednjih kril, z dvojno belo črto na zunanjem robu.	dvočrti krivočrtar

8440	<i>C. scripturata</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911a	<i>S scriptura</i> pisava, spis; ki je popisan s poševnimi, krivimi črtami.	popisani krivoočtar
	<i>Cataclysm</i> Hübner, [1825]		<i>D kataklysmos</i> povodenj, potop; preplavljen z valovi, kodreči; glede na skodrane valovite črte, ki prekrivajo celotna krila.	skodranček
8224	<i>C. riguata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>S rigus</i> vodnat; glede na valovite črte na krilih, ki spominjajo na valovanje vode. 2 <i>grmiščni</i> glede na značilno življenjsko okolje.	grmiščni skodranček
	<i>Caturhoe</i> Herbulot, 1951		<i>E kata-tukaj?</i> ; nedoločna predpona; <i>rhoe</i> tok, tokovnica; glede na vijugave črte na krilih, ki spominjajo na vijugavi vodni tok.	vijugar
8269	<i>C. cucullata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	<i>E cucullus, cucullata</i> kapuca, kapuceast? 2 <i>rtjavkast</i> glede na rtjavkasti trak v zgornjem delu srednjega krila.	rtjavkasti vijugar
8268	<i>C. rubidatata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911a	<i>E rubidus</i> rdeč, rdečkast; "rdeča preproga"; glede na rdečkaste prečne pasove na sprednjih krilih.	rdečkasti vijugar
	<i>Cepphis</i> Hübner, [1823]		<i>E kepphos</i> morska ptica; brez metuljarskega pomena. 2 <i>borovničar</i> glede na borovnico, <i>Vaccinium myrtillus</i> , eno od hranilnih rastlin.	borovničar
7594	<i>C. advenaria</i> (Hübner, [1790])	Hafner, 1911b	<i>E advena</i> prišlek, tujec; domnevno, ker so Hübnerju pošiljali metulje iz raznih krajev. 2 <i>nazobčani</i> glede na zobce na robu kril.	nazobljeni borovničar
	<i>Charissa</i> Curtis, 1826		<i>Charissa</i> neznan metuljarski pomen. 2 <i>skalar</i> zaradi značilnega posedanja po skalah ali kamenju.	skalar
7862	<i>C. ambigua</i> (Duponchel, 1830)	Hafner, 1911b	<i>E ambigus</i> dvornjiv, negotov; glede na težavno določitev. 2 <i>visokogorski</i> po življenju v visokogorju do 2600 m visoko.	visokogorski skalar
7878	<i>C. glaucinaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911b	<i>E glaucus</i> modrosiv, modrikast; glede na značilno barvo kril.	modrikasti skalar
07859a	<i>C. graecaria</i> (Staudinger, 1871)	Lasan, 2000	<i>S graecarius</i> grški, glede na območje pojavljanja. 2 <i>balkanski</i> glede na geografsko razširjenost.	balkanski skalar
7875	<i>C. intermedia</i> (Wehrli, 1917)	Habeler & Gomboc, 2005	<i>D intermedius</i> srednji, vmesni; glede na vmesne taksonomske znake. 2 <i>črnočrti</i> glede na barvo prečnih črt na krilih.	črnočrti skalar
7857	<i>C. obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E obscurus</i> temni, mračnijaški. 2 <i>raznoliki</i> glede na raznoliko obarvanost primerkov te vrste.	raznoliki skalar
7870	<i>C. pullata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E pullus</i> temno obarvan, temni. 2 <i>temni</i> glede na pretežno temno obarvane primerke te vrste.	temni skalar
7876	<i>C. supinaria</i> (Mann, 1854)	Hafner, 1911b	<i>D supinare</i> prevračati, obrniti; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>južni</i> glede na geografsko razširjenost v južni Evropi.	južni skalar
7880	<i>C. variegata</i> (Duponchel, 1830)	Hafner, 1911b	<i>E variegatus</i> pisan, pester; glede na vzorec kril.	pisani skalar
	<i>Chesias</i> Treitschke, 1825		<i>E Chesias</i> vzdevek Diane. 2 <i>metlar</i> glede na metlo, <i>Sarothamnus scoparius</i> , eno od hranilnih rastlin gosenic.	metlar

8609	<i>C. legatella</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Camelutti et al., 1965	<i>E legatus</i> ambassador, guverner. 2 <i>jesenski</i> glede na značilni letni čas pojavljanja metuljev.	jesenski metlar
8610	<i>C. rufata</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1910	<i>E rufus</i> rdeč; glede na rdečerjavi preliv na sprednjih krilih. 2 <i>pomladni</i> glede na značilni letni čas pojavljanja metuljev.	pomladni metlar
	<i>Chiasmia</i> Hübner, [1823]		<i>D chiasmia</i> križišče, stikališče. 2 <i>mrežarček</i> glede na mrežasti vzorec na krilih.	mrežarček
7549	<i>C. aestimaria</i> (Hübner, [1809])	Camelutti & Micheli, 1960	<i>S aestimatus</i> cenjeni, vredni; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>tamarišin</i> po tamariši, <i>Tamarix</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	tamarišin mrežarček
7547	<i>C. clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	<i>E clathratus</i> opremljen z mrežo, rešetko. 2 <i>travniški</i> glede na značilno življenjsko okolje.	travniški mrežarček
	<i>Chlorissa</i> Stephens, 1831		<i>E khloros</i> svetlo zelen; glede na barvo kril metuljev.	zelenček
7983	<i>C. cloraria</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1910	<i>E cloraria, chloraria, khloros</i> svetlo zelen. 2 <i>gozdni</i> glede na življenjsko okolje.	gozdni zelenček
7982	<i>C. viridata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>E viridis</i> zelen, glede na barvo kril. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje.	stepski zelenček
	<i>Chloroclysta</i> Hübner, [1825]		<i>E khloros</i> zelenorumen; <i>kluzo</i> izprani; zaradi zelene barve, ki kmalu zbledi. 2 <i>olivar</i> glede na olivnozeleno osnovno barvo kril.	olivar
8342	<i>C. miata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	<i>S mi-</i> grška črka mi; glede na belo znamenje v obliki črke <i>mi</i> na sprednjih krilih? 2 glede na svetlosivo barvo zadnjih kril.	svetli olivar
8341	<i>C. siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	<i>E siteros</i> koruzast; glede na koruzo, ki je sprva zelena, ob zrelosti pa porumeni, zbledi. 2 <i>temni</i> glede na temnosivo barvo zadnjih kril.	temni olivar
	<i>Chloroclystis</i> Hübner, [1825]		<i>E khloros</i> svetlo zelen, <i>kluzt kluzosprati</i> , oprati; glede na minljivo obarvanost vrst tega rodu.	zelenkar
8601	<i>C. v-ata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	<i>E v-ata</i> v-jast. 2 <i>črnolisi</i> glede na črno znamenje v obliki črke “v” na krilih.	črnolisi zelenkar
	<i>Cidaria</i> Treitschke, 1825		<i>E vzdevek</i> Cereše, boginje poljedelstva; brez metuljarskega pomena. 2 <i>gizdalinček</i> zaradi izredno lepe barve in vzorca kril.	gizdalinček
8350	<i>C. fulvata</i> (Forster, 1771)	Hafner, 1910	<i>E fulvus</i> rjavorumen. 2 <i>rumenkasti</i> po osnovni barvi kril.	rumenkasti gizdalinček
	<i>Cleora</i> Curtis, 1825		<i>E Cleora</i> grško žensko ime, sijaj, slava; brez metuljarskega pomena. 2 <i>obročar</i> glede na beli prvi trupni segment.	obročar
7773	<i>C. cinctaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	<i>E cinctus</i> pas, obroč; glede na beli prvi segment trupa - pas ali obroč.	belopasi obročar
	<i>Cleorodes</i> Warren, 1894		<i>E Cleora</i> grško žensko ime; <i>eidos</i> podoben, ki je podoben Cleori. 2 <i>lišajar</i> glede na lišaje, značilne hranilne rastline gosonic.	lišajar

7790	<i>C. lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	<i>E lychen</i> lišaj, hranilna rastlina gosenic. 2 <i>rjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril.	jvarkasti lišajar
	<i>Coenocalpe</i> Hübner, [1825]		<i>E koinos</i> skupen, <i>kalpis</i> žila; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>zemljevidar</i> po črtah na krilih, ki spominjajo na izohipse na zemljevidu.	zemljevidar
8397	<i>C. lapidata</i> (Hübner, [1809])	Hafner, 1911a	<i>E lapis</i> , <i>lapidis</i> kamen; po barvi kril, ki spominjajo na kamnino peščenjak. 2 <i>bledi</i> glede na blede barvo kril.	bledi zemljevidar
	<i>Coenotephria</i> Prout, 1914		<i>E coinos</i> skupen; <i>tephra</i> pepelnat; glede na to, da ima pepelnato barvo kot jo imajo tudi drugi metulji rodu <i>Entephria</i> .	pepelar
08322b	<i>C. ablutaria</i> (Boisduval, 1840)	Hafner, 1911a	<i>S ablutus</i> spran, obledel; glede na svetli neizraziti vzorec kril.	bledi pepelar
8321	<i>C. salicata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1911a	<i>S salix salicis</i> bot. rod <i>Salix</i> , vrba; glede na domnevne hranilne rastline gosenic.	vrbov pepelar
8322	<i>C. tophecata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1911a	<i>S topheceus</i> tuf, lehnjak. 2 <i>naskalni</i> glede na petrofilni značaj te submontanske vrste.	naskalni pepelar
	<i>Colostygia</i> Hübner, [1825]		<i>E kolos</i> zakrnel; <i>Stugios</i> reka Styx? 2 <i>lakotar</i> po lakoti, <i>Galium</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic tega rodu.	lakotar
8370	<i>C. aptata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>S aptatus</i> prilagojen, primeren; glede na primerjavo s sorodnimi vrstami. 2 <i>gorski</i> glede na življenje v gorskem okolju.	gorski lakotar
8374	<i>C. aqueata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>S aqueus</i> iz vode obstoječ, voden. 2 <i>obledel</i> glede na izprano, obledelo barvo kril metuljev.	obledeli lakotar
8381	<i>C. austriacaria</i> (Herrich-Schäffer, [1852])	Hafner, 1911a	<i>S austriacus</i> avstrijski, iz Avstrije; glede na območje pojavljanja. 2 <i>naskalni</i> glede na petrofilni značaj metuljev te vrste.	naskalni lakotar
8379	<i>C. kollaria</i> (Herrich-Schäffer, [1848])	Hafner, 1911a	E V. Kollar (1797-1860), dunajski entomolog. 2 <i>špajkin</i> glede špajko, <i>Valeriana</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	špajkin lakotar
8376	<i>C. multistrigaria</i> (Haworth, [1809])	Carnelutti, 1971	<i>E multus</i> , <i>multi</i> mnogo, <i>striga</i> brazda, črta; glede na številne drobne črte in pike, na sprednjih krilih.	črčkasti lakotar
8371	<i>C. olivata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1911a	<i>E oliva</i> oliva; glede na olivno zeleno osnovno barvo kril.	olivni lakotar
8385	<i>C. pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Hafner, 1911a	<i>E pectinatus</i> nazoblen kot glavnik, glavnikast; glede na močno nazobljene tipalnice samecev.	nazobljeni lakotar
8377	<i>C. serviceata</i> (Schwingenschuss, 1926)	Carnelutti, 1992b	<i>E serviceus</i> svilen, svilnat; glede na svilnati videz kril.	svilnati lakotar
8383	<i>C. tempestaria</i> (Herrich-Schäffer, [1856])	Hafner, 1911a	<i>S tempestas</i> neurje; glede na "hitra" krila samecev. 2 <i>visokogorski</i> glede na visokogorsko življenjsko okolje, do višine 2500 m.	visokogorski lakotar
8378	<i>C. turbata</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911a	<i>S turbatus</i> viharjen; glede na vzorec kri? 2 <i>belokrili</i> glede na izstopajoča bela zadnja krila metuljev.	belokrili lakotar

					peresar
7663	<i>Colotois</i> Hübner, [1823]			E <i>colos</i> odrezati, zakneti; glede na reducirane labialne palpe. 2 <i>peresar</i> glede na izredno velike peresaste tipalnice samcev.	jesenski peresar
	<i>C. pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1911b		E <i>penna</i> peresa, peresasti. 2 <i>jesenski</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	nosáč
	<i>Comibaena</i> Hübner, [1823]			E <i>komus</i> sveženj, zavitek; <i>batino</i> iti, hoditi; glede na vedenje gosenic, da imajo pritrjene koščke rastlin na telesu, jih nosijo.	zeleni nosáč
7971	<i>C. bajularia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910		E <i>bajulus</i> nosáč. 2 <i>zelenkasti</i> glede na nežno zeleno barvo kril.	očesar
	<i>Cosmorhoe</i> Hübner, [1825]			E <i>cosmos</i> dobro urejen, okrašen; <i>rhoe</i> v odnosu do <i>Xanthorhoe</i> ; 2 <i>očesar</i> glede na očesom podobne črne pike na krilih kril.	črnopiki očesar
8319	<i>C. ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910		E <i>ocellatus</i> očesast, očesni; glede na eno do dve subapikalni črni piki na krilih.	krivorob
	<i>Costaconvexa</i> Agenjo, 1949			E <i>costa</i> rebro, rob; sprednji rob krila; <i>convexus</i> kriv, navzven ukrivljen; glede na ukrivljenost sprednjega roba kril.	mногоčrti krivorob
8287	<i>C. polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	Carnelutti & Micheli, 1955		E <i>polus</i> mnogo; <i>gramma</i> , <i>grammata</i> črta, črtast; glede na značilni vzorec sprednjih kril z mnogimi vzporednimi črtami.	žafnanar
	<i>Crocallis</i> Treitschke, 1825			E <i>Crocus</i> bot. rod žafnan, po rumeni barvi žafnana, žafnanast.	svetli žafnanar
7654	<i>C. elinguarua</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b		E <i>elinguis</i> nemi, brez jezika; glede na degenerirani haustelum. 2 <i>svetli</i> glede na svetlo rumeno barvo kril.	temni žafnanar
7652	<i>C. tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	Hafner, 1911b		S <i>tuscus</i> iz Tuscije, toskanski; glede na značilno lokacijo. 2 <i>temni</i> glede na temnejšo oker barvo kril.	snežkar
	<i>Crocota</i> Hübner, [1823]			Crocota - neznani metuljarski pomen. 2 <i>snežkar</i> glede na snežno belo barvo kril in telesa.	visokogorski snežkar
7707	<i>C. niveata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b		E <i>niveus</i> snežni, snežnobeli. 2 <i>visokogorski</i> glede na življenjsko okolje, travišča do nadmorske višine 2000 metrov.	krogarček
	<i>Cyclophora</i> Hübner, 1822			E <i>kuklos</i> krog; <i>phoreo</i> nositi; glede na okroglo diskalno liso na krilih.	belooki krogarček
8013	<i>C. albiocellaria</i> (Hübner, 1789)	Hafner, 1910		S <i>albus</i> bel; <i>ocellatus</i> okast; z belimi očesci. Glede na značilni vzorec kril metuljev.	obročkasti krogarček
8014	<i>C. annularia</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1910		E <i>annulus</i> majhen obroč, krogec; glede na obliko okrogle pege na krilih.	črtasti krogarček
8024	<i>C. linearia</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910		E <i>linea</i> črta; po močni prečni črti na sprednjih in zadnjih krilih.	povešavi krogarček
8012	<i>C. pendularia</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1910		E <i>pendularia</i> obešen, povešen, povešavi; se verjetno nanaša na povešavo brezo, <i>Betula pendula</i> , značilno hranilno rastlino.	

8019	<i>C. porata</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1910	<i>S pore</i> luknjica; glede na okrogle lise na sredini kril. 2 <i>lisasti</i> glede na lisasti vzorec kril.	lisasti krogarček
8022	<i>C. punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>E punctum</i> pika; glede na to, da imajo na postdiskalnem delu kril prečne nize črnih pik.	pikasti krogarček
8017	<i>C. pupillaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>E pupilla</i> zenica; glede na okroglo, zenici podobno liso na krilih.	zeničasti krogarček
8020	<i>C. quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	Hafner, 1910	<i>E quercus</i> bot. rod <i>Quercus</i> , hrast; <i>mons</i> gora; po nahajališču. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, značilni hranilni rastlini gosenic.	hrastov krogarček
8018	<i>C. ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	Hafner, 1910	<i>E rufus</i> rdeč; <i>cilia</i> rese, resice; glede na rdeče resice na zunanjem robu kril.	rdečeresi krogarček
8023	<i>C. supuncaria</i> (Zeller, 1847)	Hafner, 1910	<i>S sup- sub-</i> blizu, skoraj tak kot <i>punctaria</i> ; je podoben <i>punctariji</i> vendar ima manj izrazite pike in lise.	drobnopiki krogarček
	<i>Deileptenia</i> Hübner, [1825]		<i>E deile</i> popoldne, zgodnji večer; <i>pteros</i> krilo; ki leta proti večeru.	večernik
7775	<i>D. ribeata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911b	<i>E ribeata</i> bot. rod <i>Ribes</i> , ki pa ni dejanska hranilna rastlina gosenic te vrste. 2 <i>mahovni</i> glede na mahovom podobno barvo.	mahovni večernik
	<i>Dicrognophos</i> Wehrli, 1951		<i>D di-</i> dva, dvojni, dvobarvni? 2 <i>dvobarvnež</i> glede na dvobarvni vzorec na krilih, bele lise na sivi osnovni barvi.	dvobarvnež
7850	<i>D. sartata</i> (Treitschke, 1827)	Hafner, 1911b	<i>S sartus</i> pegasti, lisasti. 2 <i>belorobi</i> glede na bele lise ob zunanjem robu kril.	belorobi dvobarvnež
	<i>Dyscia</i> Hübner, [1825]		<i>E duo, du</i> dva, dve, <i>skia</i> senca; glede na temne pege na ledvenih lisah sprednjih kril.	dvolisar
7929	<i>D. raunaria</i> (Freyer, 1851)	Hafner, 1911b	<i>S raunaria</i> po nahajališču, locus typicus <i>Raunach</i> ? Ravne na Kranjskem?	pikčasti dvolisar
	<i>Dysstroma</i> Hübner, [1825]		<i>D dys-</i> ne, brez, slabo; <i>stroma</i> preproga, odeja. 2 <i>golič</i> ki je brez odeje, goli; glede na samo delno obarvana krila.	golič
8343	<i>D. citrata</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1911a	<i>E citrus</i> limonovec, oranževce; drevo z oranžnimi plodovi. 2 <i>dolgotraki</i> glede na dolgi srednji trak, ki sega do spodnjega roba kril.	dolgotraki golič
8348	<i>D. truncata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	<i>E trunco</i> kratko pokrit, oblečen; glede na kratki srednji trak, ki se navadno konča že pri okrogli pegi.	kratkotraki golič
	<i>Eaophila</i> Stephens, 1831		<i>E ear-</i> pomlad, glede na letni čas pojavljanja metuljev. 2 <i>jarnik</i> glede na jaro, pomladno pojavljanje metuljev.	jarnik
8309	<i>E. badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911a	<i>E badius</i> rdečerjav; glede na barvo kril.	rdečerjavi jarnik
	<i>Ecliptopera</i> Warren, 1894		<i>E ecleipo</i> manjkati; <i>oposobraz</i> ; ki nima obraza, vzorca? 2 <i>nedotikar</i> glede na nedotiko, <i>Impatiens</i> sp., hranilno rastlino gosenic.	nedotikar

8339	<i>E. capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Hafner, 1911a	S <i>caput</i> , <i>capitis</i> glava; glede na okrato obarvano glavo in zadek metuljev.	okrasti nedotikar
8338	<i>E. silacea</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>sil-</i> rumenkasta zemlja; glede na rumenkaste luske na korenu kril. 2 <i>svkasti</i> glede na sivo barvo glave in zadka metuljev.	sivkasti nedotikar
	<i>Ectropis</i> Hübner, [1825]		E <i>ectropos</i> ki je skrenil s prave poti; glede na zavito, valovito prečno črto. 2 glede na letanje v večernem mraku.	mračnik
7796	<i>E. crepuscularia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>crepusculum</i> mrak, glede na letanje v mraku. 2 <i>krivočrti</i> glede na obliko črt na krilih.	krivočrti mračnik
	<i>Electrophaes</i> Prout, 1923		E <i>electron</i> svetleči, jantar; <i>phaos</i> svetloba; glede na rumenkasto rjavkasto barvo kril, ki je podobna barvi jantarja.	jantarjevec
8368	<i>E. corylata</i> (Thunberg, 1792)	Hafner, 1911a	E <i>Corylus avellana</i> bot. rod leska; ena od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste.	leskin jantarjevec
	<i>Elophos</i> Boisduval, 1840		E <i>elaphos</i> jelen, z jelenjim srcem - plašen? Nejasen metuljarski pomen. 2 <i>gornik</i> glede na življenjsko okolje v visokih gorah.	gornik
7897	<i>E. caelibaria</i> (Heydenreich, 1851)	Hafner, 1911b	S <i>caelebs ehelos</i> različnost spolov; zaradi različnosti spolov, samice imajo zakrnela krila.	raznospolni gornik
	<i>Ematurga</i> Lederer, 1853		E <i>emar</i> , <i>ematos</i> iz <i>hemere</i> dan; <i>ergon</i> delo; ki dela, leta, podnevi. 2 <i>resavar</i> glede na življenjsko okolje.	resavar
7804	<i>E. atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>atomus</i> ker so krila pokrita s termimi luskami, kot bi bila posuta z drobnim prahom.	poprašeni resavar
	<i>Emmiltis</i> Hübner, [1825]		E <i>emmeles</i> harmoničnost, ljubkost. 2 <i>prtilikavček</i> glede na majhnost, saj je med najmanjšimi pedici.	prtilikavček
8191	<i>E. pygmaearia</i> (Hübner, [1809])	Hafner, 1910	E <i>pygmaeus</i> pigmejec, prtilikavec. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje.	stepski prtilikavček
	<i>Ennomos</i> Treitschke, 1825		E <i>ennomos</i> pravilen, pravi, skladen z zakonom, s pravilom. 2 <i>zobkar</i> glede na značilno zobasto zaključčen zunanji rob kril.	zobkar
7634	<i>E. alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Carnelutti, 1971	E <i>alniaria Alnus</i> bot. rod jelsa; po hranilni rastlini gosenic.	jelšev zobkar
7632	<i>E. autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	Hafner, 1911b	E <i>autumnus</i> jesen, glede na letni čas pojavljanja metuljev.	jesenski zobkar
7636	<i>E. erosaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>erosus</i> glodati, obglodati; kot bi bil zunanji rob krila obglodan. 2 <i>brezov</i> po eni od hranilnih rastlin gosenic.	brezov zobkar
7635	<i>E. fuscantaria</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911b	E <i>fuscas</i> zasenčen; glede na zasenčenost zunanjega roba kril.	zasenčeni zobkar
7637	<i>E. quercaria</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911b	E <i>Quercus</i> bot. rod hrast. Glede na značilno hranilno rastlino gosenic. 2 <i>južni</i> glede na območje razširjenosti v južni Evropi.	južni zobkar

7633	<i>E. quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>Quercus</i> bot. rod hrast. Glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastov zobkar
	<i>Entephria</i> Hübner, [1825]		E <i>entephros</i> pepelast, glede na barvo kril; <i>pepelikar</i> glede na podobnost s sivo barvo pepelike.	pepelikar
8302	<i>E. caesiata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>caesius</i> modrosiv; glede na osnovno barvo kril. 2 <i>rjavkasti</i> glede na prevladujoči rjavkasti odtenek naših primerkov.	rjavkasti pepelikar
8297	<i>E. cyanata</i> (Hübner, [1809])	Hafner, 1911a	S <i>cyanos</i> moder, modri; glede na osnovno modroso barvo kril.	modrikasti pepelikar
8296	<i>E. flavata</i> (Osthelder, 1929)	Habeler & Gomboc, 2005	E <i>flavus</i> rumen. 2 <i>alpski</i> glede na razširjenost v Alpah.	alpski pepelikar
8299	<i>E. flavicinctata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	E <i>flavus</i> rumen; <i>cinctatus</i> ; obročkast; glede na rumeno barvo, ki je razpršena preko osnovne sive barve.	rumenkasti pepelikar
8301	<i>E. infidaria</i> (De La Harpe, [1853])	Hafner, 1911a	S <i>infidus</i> nezanesljiv; glede na težavno določitev. 2 <i>zobčasti</i> glede na zobčasto notranjo črto osrednjega traku na krilih.	zobčasti pepelikar
8295	<i>E. nobiliaria</i> (Herrieh-Schäffer, [1852])	Hafner, 1911a	S <i>nobilis</i> ineniten, odličen; 2 <i>sivkasti</i> glede na osnovno sivo barvo kril.	sivkasti pepelikar
	<i>Epilobophora</i> Inoue, 1943		D <i>epi-</i> na, nad; <i>lobophora</i> kpar? 2 <i>smrdljivkar</i> po smrdljivem brinu, <i>Juniperus sabina</i> , hranilna rastlina gosenic.	smrdljivkar
8673	<i>E. sabinata</i> (Geyer, [1831])	Štanta, 2000	E <i>sabinata</i> se nanaša na smrdljivi brin, <i>Juniperus sabina</i> . 2 <i>primorski</i> glede na pojavljanje vrste v Sloveniji.	primorski smrdljivkar
	<i>Epione</i> Duponchel, 1829		E <i>Epione</i> žena Aesculapa, utemeljitelja medicine. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>obroblijenček</i> glede na široki zunanji rob na krilih.	obroblijenček
7615	<i>E. repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>repandus</i> nazaj upognjen. 2 <i>ravnocrti</i> glede na pretežno ravno robno črto, ki se konča v konici krila.	ravnocrti obroblijenček
7616	<i>E. vespertaria</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1911b	S <i>vespera</i> večer; večerno aktivnost metuljev. 2 <i>krivočrti</i> glede na ukrivljeno robno črto, ki se konča na sprednjem robu krila.	krivočrti obroblijenček
	<i>Epirrhoe</i> Hübner, [1825]		E <i>epi-</i> nad, <i>rrhoe</i> valovi, valovite črte na krilih. 2 <i>dremotar</i> po dremoti, starejšem imenu za lakoto <i>Galium</i> sp., hranilni rastlini gosenic.	dremotar
8275	<i>E. alternata</i> (Müller, 1764)	Hafner, 1911a	E <i>alternare</i> vrsiti se, menjavati se; glede na svetle in temne črte na krilih. 2 <i>sivotraki</i> glede na sivi prečni trak na krilih.	sivotraki dremotar
8279	<i>E. galiata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>Galium</i> bot. rod <i>lakota</i> . 2 <i>svetlorobi</i> glede na pretežno svetlo obarvani zunanji rob kril.	svetlorobi dremotar
8272	<i>E. hastulata</i> (Hübner, 1790)	Hafner, 1911a	E R. Hast (sredina 18. stoletja) finski entomolog, Linnejev učenec. 2 <i>obročkasti</i> glede na bele obročke na črnem zadku.	obročkasti dremotar
8278	<i>E. molluginata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	S <i>Galium mollugo</i> bot. <i>navadna lakota</i> , značilna hranilna rastlina gosenic.	lakotin dremotar

8277	<i>E. rivata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	E <i>rivus</i> reka, glede na valovite črte na krilih. 2 <i>belotraki</i> glede na beli prečni trak na krilih.	belotraki dremotar
8274	<i>E. tristata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>tristis</i> žalost; po črni, žalostni barvi kril. 2 <i>pikasti</i> glede na dvopiki vzorec na hrbtni strani zadka.	pikasti dremotar
	<i>Epirrita</i> Hübner, 1822		E <i>epi-</i> nad <i>rrhoe</i> teči, teči dalje, naprej (voda). 2 <i>zimar</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	zimar
8444	<i>E. autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>autumnus</i> jesen; glede na letni čas pojavljanja metuljev. 2 <i>pozni</i> glede na pojavljanje metuljev v pozni jeseni.	pozni zimar
8443	<i>E. christyi</i> (Allen, 1906)	Carnelutti & Michieli, 1955	E W. M. Chrysti (1863-1939), britanski entomolog. 2 <i>mali</i> glede na velikost, ja najmanjši med našimi vrstami tega rodu.	mali zimar
8442	<i>E. dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911a	E <i>dilutus</i> izpran, obledeli; glede na neizraziti, bledi vzorec kril.	bledi zimar
	<i>Erannis</i> Hübner, [1825]		E <i>erannus</i> ljubeč, očarljiv; 2 <i>zmrzlikar</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev, ko že zmrzuje.	zmrzlikar
7700	<i>E. ankeraria</i> (Staudinger, 1861)	Stauder, 1929	S po R. Anker (1824 - 1901), avstrijski entomolog. 2 <i>kraški</i> glede na območje pojavljanja v Sloveniji.	kraški zmrzlikar
7699	<i>E. defoliaria</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911b	S <i>de-</i> od, stran; <i>folium</i> list; razlístati; glede na značilnost gosenic, da odstranijo vse listje z drevoja. 2 <i>veliki</i> glede na velikost.	veliki zmrzlikar
	<i>Euchoeca</i> Hübner, [1823]		E <i>eu-</i> dobro, v redu; <i>khoikos</i> , ki je iz zemlje ali gline.	glinar
8654	<i>E. nebulata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911a	E <i>nebula</i> oblak, pooblačiti se, zasenčiti; glede na značilno barvo in vzorec kril.	zasenčeni glinar
	<i>Eulithis</i> Hübner, 1821		E <i>eulithos</i> eu- dober, v redu; <i>lithos</i> kamen; po podobnost vzorcev kril s peščenjakom.	peščenjakar
8334	<i>E. mellinata</i> (Fabricius, 1787)	Lesar, 1998b	E <i>mel</i> med, medeni; glede na medu podobno barvo.	medeni peščenjakar
8332	<i>E. populata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>Populus</i> bot. rod topol; ena od hranilnih rastlin gosenic.	topolov peščenjakar
8330	<i>E. prunata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>Prunus</i> bot. rod hruška; ena od hranilnih rastlin gosenic.	hruškin peščenjakar
	<i>Eumannia</i> Fletcher, 1979		E J. J. Mam (1804 - 1889) avstrijski entomolog. 2 <i>lišajnik</i> glede na lišaje, hranilne rastline gosenic.	lišajnik
7818	<i>E. oppositaria</i> (Mamm, 1864)	Carnelutti et al., 1965	S <i>oppositus</i> nasproten, ki se zopertavlja; ker se ne ujema z diagnozo rodu. 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v južni Evropi.	južni lišajnik
	<i>Euphyia</i> Hübner, [1825]		E <i>Euphia</i> boginja oblike, oblikovanja. 2 <i>vzorčar</i> se nanaša na lepo in značilno oblikovan vzorec na sprednjih krilih.	vzorčar

8437	<i>E. adumbraria</i> (Herrich-Schäffer, [1852])	Hafner, 1911a	<i>S. adumbratus</i> osenčen, zasenčen; glede na značilne temno sive, osenčene pasove na sprednjih krilih.	osenčeni vzorčar
8435	<i>E. biangulata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	<i>S. bi-</i> dva, <i>angulus</i> kot, vogal; dvokoti; glede na značilni vzorec na krilih v obliki dvozohe izbokline na sredini zunanje linije.	dvozobi vzorčar
8438	<i>E. frustata</i> (Treitschke, 1828)	Hafner, 1911a	<i>S. frustum</i> košček, koščkast; glede na to, da je vzorec sestavljen iz koščkov različne barve, sive, rumene in zelene.	pisani vzorčar
8439	<i>E. mesembrina</i> (Rebel, 1927)	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>Mesembrina</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>karavanški</i> glede na Karavnake, območje pojavljanja te endemne vrste.	karavanški vzorčar
8436	<i>E. unangulata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911c	<i>E. un-</i> en; <i>angulus</i> kot, vogal; enokoti, enozobi; glede na značilni vzorec na krilih v obliki enozobe izbokline na sredini zunanje linije.	enozobi vzorčar
	<i>Eupithecia</i> Curtis, 1825		<i>E. eu-</i> v redu, dobro; <i>pithex</i> , <i>pithecos</i> prtilikav, prtilikavec. 2 <i>sivček</i> glede na majhnost in na prevladujočo sivo barvo kril	pediček
8578	<i>E. abbreviata</i> Stephens, 1831	Hafner, 1911a	<i>E. abbreviatus</i> skrajšan, porezan; glede na kratka zadnja krila, ki so znatno krajša od sprednjih.	kratkokrnlji pediček
8481	<i>E. abietaria</i> (Goeze, 1781)	Hafner, 1911a	<i>E. Picea abies</i> glede na hramilno rastlino, smreko, kjer se gosenice hranijo s storži.	smrekov pediček
8527	<i>E. absinthiata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911a	<i>E. Arthemisia absinthium</i> , pelin; po pelinu, <i>Arthemisia absinthium</i> , eni od mnogih hramilnih rastlin te polifage vrste.	pelinov pediček
8515	<i>E. actaeata</i> Walderdorff, 1869	Hafner, 1911a	<i>S. Actaea</i> bot. rod črnoga; značilna hramilna rastlina. 2 <i>belopiki</i> glede na belo piko v spodnjem zunanem delu sprednjega krila.	belopiki pediček
8505	<i>E. alliaria</i> Staudinger, 1870	Lesan, 1997	<i>S. alium</i> čebula, luk, česen. Po <i>luku</i> , <i>Allium</i> sp., značilni hramilni rastlini, na kateri se gosenice hranijo s semeni.	lukov pediček
8482	<i>E. analoga</i> Djakonov, 1926	Carnelutti, 1992a	<i>D. analogos</i> skladnost, sorazmernost; nejasen metuljarski pomen; 2 <i>šiškin</i> gosenica živi v šiškah na smreki ali jelki.	šiškin pediček
8531	<i>E. assimilata</i> Doubleday, 1856	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. assimilis</i> podoben, je podoben zadnji vrsti. 2 <i>hmeljev</i> glede na hmelj, <i>Humulus lupulus</i> , značilno hramilno rastlino gosenic.	hmeljev pediček
8501	<i>E. carpophagata</i> Staudinger, 1871	Hafner, 1911a	<i>S. carpophagos</i> tisti, ki žre semena. 2 <i>lepničin</i> po kamnokrečni lepnici, <i>Silene saxifraga</i> , hramilni rastlini gosenice te gorske vrste.	lepničin pediček
8523	<i>E. cauchiata</i> (Duponchel, [1831])	Hafner, 1911a	<i>E. kaukhe</i> bahati se, ponašati se. 2 <i>nebinin</i> po nebinu, <i>Aster</i> sp., značilni hramilni rastlini gosenice te gorske vrste.	nebinin pediček
8509	<i>E. centaureata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. Centaurea</i> bot. rod glavnice; <i>glavinčev</i> glede na različne vrste hramilnih rastlin gosenic iz rodu glavnice.	glavinčev pediček
8521	<i>E. cretaceata</i> (Packard, 1874)	Hafner, 1911a	<i>E. cretaceus</i> apneni, ki živi na apnencu; je tudi apneno bele barve po kateri se loči od <i>E. veratraria</i> , ki je siva in tudi živi na čmeriki.	apneni pediček
8480	<i>E. cucullaria</i> (Rebel, 1901)	Hafner, 1911a	<i>E. cucullus</i> kapuca, čepica? Nejasen metuljarski pomen. 2 <i>sredozemski</i> glede na razširjenost v vzhodnem Sredozemlju.	sredozemski pediček

8536	<i>E. denotata</i> (Hübner, [1813])	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. denotatus</i> razločen, jasen, označen. 2 <i>repušev</i> po repušu, <i>Phyteuma</i> sp., eni od hranilni rastlini gosonic te vrste.	repušev pediček
8556	<i>E. distinctaria</i> Herrich-Schäffer, [1848]	Hafner, 1911a	<i>E. distinctus</i> razločen, jasen. 2 <i>timijanov</i> po timijanu, <i>Thymus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	timijanov pediček
8579	<i>E. dodoneata</i> Guenée, [1858]	Carnelutti, 1992a	<i>E. Dodona</i> , mesto v Grčiji s starim svetim hrastom. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	hrastov pediček
8554	<i>E. druentiata</i> Dietze, 1902	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. D. Drury</i> britanski entomolog (1752-1803). 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v gorah južne Evrope.	južni pediček
8507	<i>E. egenaria</i> Herrich-Schäffer, [1848]	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. egenus</i> reven, ubožen; glede na neizrazit vzorec. 2 <i>lipov</i> po lipi, <i>Tilia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	lipov pediček
8585	<i>E. ericeata</i> (Rambur, 1833)	Hafner, 1911a	<i>S. Erica arborea</i> hranilna rastlina; <i>resina</i> po resi, <i>Erica arborea</i> , značilni hranilni rastlini gosonic.	resin pediček
8491	<i>E. exigua</i> (Hübner, [1813])	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. exiguis</i> zelo majhen. 2 <i>kovačnikov</i> glede na kovačnik <i>Lonicera</i> sp. eno od hranilnih rastlin te polifage vrste.	kovačnikov pediček
8530	<i>E. expallidata</i> Doubleday, 1856	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. expallidus</i> izredno blede, svetlo; glede na blede osnovno barvo krl.	bledi pediček
8508	<i>E. extraversaria</i> Herrich-Schäffer, [1852]	Hafner, 1911a	<i>S. extra</i> iz, izredno; izredno obločen; glede na vzorec. 2 <i>rebrinčev</i> po rebrincu, <i>Peucedanum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosonic.	rebrinčev pediček
8558	<i>E. gemellata</i> Herrich-Schäffer, 1861	Hafner, 1911a	<i>S. gemellus</i> dvojini; glede na dvojno prečno črto. 2 <i>haljičin</i> po haljici, <i>Petrorhagia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	haljičin pediček
8528	<i>E. goossensata</i> Mabilie, 1869	Hafner, 1911a	<i>E. T. Goossens</i> (1827 - 1889), francoski naravoslovec. 2 <i>vresin</i> po vresi, <i>Calluna vulgaris</i> , značilni hranilni rastlini gosonic.	vresin pediček
8560	<i>E. graphata</i> (Treitschke, 1828)	Carnelutti, 1992a	<i>E. graphos</i> pisanje, znamenje; <i>pisani</i> glede na vzorec na krilih.	pisani pediček
8512	<i>E. gratiosata</i> Herrich-Schäffer, 1861	Carnelutti et al., 1965	<i>S. gratiosus</i> prijeten, privlačen. 2 <i>dežnov</i> po dežnu, <i>Heracleum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosonic.	dežnov pediček
8511	<i>E. gueneata</i> Millière, 1862	Hafner, 1911a	<i>E. A. Guenee</i> (1809 - 1880) francoski entomolog. 2 <i>rdečkasti</i> glede na rdečkasto barvo večjega dela sprednjih krl.	rdečkasti pediček
8477	<i>E. haworthiata</i> Doubleday, 1856	Hafner, 1911a	<i>E. A. H. Haworth</i> (1767 - 1833), britanski entomolog. 2 <i>srobotov</i> glede na srobot, <i>Clematis</i> sp., značilno hranilno rastlino gosonic.	srobotov pediček
8538	<i>E. icterata</i> (De Villers, 1789)	Hafner, 1911a	<i>E. icterus</i> , <i>icterus</i> rumena ptica, zlatenica. 2 <i>rjavkasti</i> po značilni barvi krl (naši primerki so pretežno rjavi do sivi, ne pa rumeni).	rjavkasti pediček
8478	<i>E. immundata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E. immundus</i> nejasen; glede na nejasen vzorec na krilih. 2 <i>črnogin</i> glede na črnogo, <i>Actaea spicata</i> , hranilno rastlino gosonic.	črnogin pediček
8541	<i>E. impurata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E. impurus</i> nečist, umazan; glede na zabrisan vzorec krl. 2 <i>zvončičin</i> po zvončici, <i>Campanula</i> sp., značilni hranilni rastlini gosonic.	zvončičin pediček

8565	<i>E. indigata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E indiges</i> reven; glede na neizrazit vzorec. 2 borov glede na bor, <i>Pinus</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic te polifage vrste.	borov pediček
8573	<i>E. innotata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	<i>E innotatus</i> neoznačen, nepoudarjen. 2 trnov glede na črni tm, <i>Prunus spinosa</i> , eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	trnov pediček
8493	<i>E. insigniata</i> (Hübner, 1790)	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E insignis</i> zaznamovan, označen. 2 sadni glede na razne vrste sadnega drevja, ki so hranilne rastline gosenic te polifage vrste.	sadni pediček
8519	<i>E. intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	Hafner, 1911a	<i>E intricatus</i> zamotan, težaven. 2 <i>drobnočrti</i> po velikem številu drobnih črt in lis na krilih.	drobnočrti pediček
8476	<i>E. inturbata</i> (Hübner, [1817])	Carnelutti, 1992a	<i>E inturbatus</i> ki ni zmeden, je urejen. 2 <i>javorov</i> glede na javor, <i>Acer</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	javorov pediček
8490	<i>E. irriguata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E irriguatus</i> valovit; glede na valovite črte na krilih. 2 <i>gradnov</i> po gradnu, <i>Quercus petraea</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	gradnov pediček
8592	<i>E. lanceata</i> (Hübner, [1825])	Hafner, 1911a	<i>E lancea</i> svetla sulica, kopje; glede na dolga in koničasta krila.	koničasti pediček
8486	<i>E. laquearia</i> (Herrich-Schäffer, [1848])	Hafner, 1911a	<i>S laquear</i> namizni prt, prekrit s prtom? glede na vzorec. 2 <i>smetlikin</i> po smetliki, <i>Euphrasia</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	smetlikin pediček
8595	<i>E. lariciata</i> (Freyer, [1841])	Hafner, 1911a	<i>E Larix</i> bot. rod macesen; po macesnu, <i>Larix decidua</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	macesnov pediček
8483	<i>E. linariata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911a	<i>E Linaria</i> bot. rod madronščica, <i>Linaria</i> sp., značilna hranilna rastlina gosenic, ki se hranijo s cvetovi in semeni v semenskih glavicah.	madronščičin pediček
08597b	<i>E. manniaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Carnelutti, 1992b	<i>E J. J. Mam</i> (1804 - 1889) avstrijski entomolog. 2 <i>velepiki</i> glede na veliko črno diskalno liso na sprednjih kril.	velepiki pediček
8551	<i>E. millefoliata</i> Rössler, 1866	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E Achillea millefolium</i> rman; po rmanu, značilni hranilni rastlini gosenic te monofage vrste.	rmanov pediček
8570	<i>E. nanata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E namus</i> zelo majhen, pritlikav. 2 <i>drobni</i> glede na velikost, saj je ena najmanjših vrst tega rodu.	drobni pediček
8574	<i>E. ochridata</i> Schütze & Pinker, 1968	Lasan, 2000	<i>Ohridski</i> , glede na nahajališče v okolici Ohridskega jezera v Makedoniji.	makedonski pediček
8543	<i>E. orphnata</i> Petersen, 1910	Deutsch, 2019	<i>S orphnos</i> temni, mračni; glede na obarvanost. 2 <i>skrklin</i> glede na skrko, <i>Picris</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic.	skrklin pediček
8587	<i>E. oxycedrata</i> (Rambur, 1833)	Lesan, 2000	<i>S Juniperus oxycedrus</i> rdečepločni brin; značilna hranilna rastlina gosenic. 2 <i>skorjasti</i> glede na vzorec temnih črt in prog na krilih.	skorjasti pediček
8568	<i>E. pauxillaria</i> Boisduval, 1840	Hafner, 1911a	<i>S pauxillus</i> zelo majhen; glede na velikost. 2 <i>zobničin</i> po zobnici, <i>Odontites</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	zobničin pediček
8525	<i>E. pernotata</i> Guenée, [1858]	Lesan, 1997	<i>E per-</i> po, preko; <i>nota</i> znak, znamenje. 2 <i>pikasti</i> glede na prečne črte na krilu, ki so deljene v kratke odseke ali pike.	pikasti pediček

8567	<i>E. pimpinellata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E. Pimpinella saxifraga</i> navadni bedrenec. 2 po navadnem bedrencu, značilni hranilni rastlini gosenic.	bedrenčev pediček
8479	<i>E. plumbcolata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	<i>E. plumbcolus</i> svinčev; glede na svinčeno sivo barvo. 2 črnilčev glede na hranilno rastlino gosenic, črnilček <i>Melampyrum</i> sp.	črnilčev pediček
8484	<i>E. pulchellata</i> Stephens, 1831	Carnelutti, 1992a	<i>E. pulchellus</i> čeden, ljubki malček; glede na vzorec kril. 2 naprstečev po naprstecu, <i>Digitalis</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	naprstečev pediček
8583	<i>E. pusillata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. pusillus</i> zelo majhen, droben. 2 brinov po brinu, <i>Juniperus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	brinov pediček
8485	<i>E. pyreneata</i> Mabilie, 1871	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>S. pyreneus</i> pirenejski, po nahajališču v Pirenejih.	pirenejski pediček
08560a	<i>E. riparia</i> Herrich-Schäffer, [1852]	Lesan, 2000	<i>S. ripa</i> obala, obrežje, po nahajališču na obali pri Reki (Hrvaška). 2 jadranski glede na pretežno območje razširjenosti.	jadranski pediček
8526	<i>E. satyrata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E. satyrus</i> satir, gozdno božanstvo; brez metuljarskega pomena. 2 gozdni glede na pretežno življenjsko okolje.	gozdni pediček
8503	<i>E. schieffereri</i> Bohatsch, 1893	Carnelutti, 1989	S M. Schiefferer (1828 - 1902) avstrijski entomolog. 2 sredozemski glede na geografsko območje razširjenosti.	sredozemski pediček
8516	<i>E. selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>S. Selinum</i> seljanka; po seljanki, <i>Selinum</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	seljankin pediček
8547	<i>E. semigraphata</i> Bruand, [1847]	Hafner, 1911a	<i>S. semi</i> -pol, na pol, <i>grape</i> napisano, opisano. 2 čobrov glede na čober, <i>Calamintha</i> sp., ena od hranilnih rastlin gosenic.	čobrov pediček
8499	<i>E. silenata</i> Assmann, 1848	Hafner, 1911a	<i>S. Silene</i> pokalica; po pokalici, <i>Silene vulgaris</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	pokalčin pediček
8553	<i>E. simplicata</i> (Haworth, [1809])	Carnelutti, 1992a	<i>E. simplex</i> , <i>simplicis</i> enostaven; glede na enostavni vzorec kril.	enostavni pediček
8557	<i>E. sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	Carnelutti, 1992a	<i>S. sinuosus</i> ovinkast, vogalast; glede na vzorec na krilih. 2 metlikin po metliki, <i>Chenopodium</i> sp., hranilni rastlini gosenic.	metlikin pediček
8537	<i>E. subfuscata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	<i>E. subfuscus</i> nekoliko senčen, mračen; glede na temnejšo barvo. 2 po bodeči neži, <i>Carlina acaulis</i> , eni od hranilnih rastlin gosenic.	nežin pediček
8546	<i>E. subumbata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. sub</i> -spodaj, pod, v manjši meri; <i>umbra</i> senčen; manj senčen, svetlejši, glede na svetlosivkasto do belo barvo kril.	svetlejši pediček
8539	<i>E. succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	<i>E. succenturiatus</i> v stonjijo sprejeti rekrut, novinec. 2 belolisi glede na značilne bele lise na sprednjih in zadnjih krilih.	belolisi pediček
8596	<i>E. tantillaria</i> Boisduval, 1840	Hafner, 1911a	<i>E. tantillus</i> zelo mali, drobni; glede na velikost.	mali pediček
8475	<i>E. tenuiata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	<i>E. tenuis</i> vitki, suhi; glede na velikost.	vitki pediček

8535	<i>E. tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, [1852]	Hafner, 1911a	E <i>tri</i> - tri, <i>punctum</i> pika: glede na zunanjo robo belo črto, ki je navadno razdeljena v tri pike.	tropiki pediček
8517	<i>E. trisignaria</i> Herrich-Schäffer, [1848]	Hafner, 1911a	E <i>tri</i> - tri; <i>signum</i> znamenje, znak; glede na veliko črno diskalno liso in dve črni pegi ob njej na kostalnem robu.	trilisi pediček
8496	<i>E. undata</i> (Freyer, [1840])	Hafner, 1911a	D <i>un</i> - en, <i>data</i> ? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>črvinkin</i> glede na črvinko, <i>Minuartia</i> sp., eno od hranilnih rastlin gosenic.	črvinkin pediček
8494	<i>E. valerianata</i> (Hübner, [1813])	Camelutti, 1992a	E <i>Valeriana</i> sp. špajka ali baldrijan. 2 <i>špajkin</i> po zdravilni špajki, <i>Valeriana officinalis</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	špajkin pediček
8502	<i>E. venosata</i> (Fabricius, 1787)	Hafner, 1911a	E <i>venosus</i> označen z venami, žilami; glede na vzorec. 2 <i>okrašeni</i> glede na vzorec na krilih, ki je izrisan z drobnimi črnimi črtami.	okrašeni pediček
8520	<i>E. veratraria</i> Herrich-Schäffer, [1848]	Hafner, 1911a	S <i>Veratrum</i> čmerika, hranilna rastlina. 2 <i>čmerikin</i> po čmeriki, <i>Veratrum album</i> , ki je značilna hranilna rastlina gosenic.	čmerikin pediček
8577	<i>E. virgaureata</i> Doubleday, 1861	Hafner, 1911a	S <i>Solidago virgaurea</i> zlata rozga. 2 <i>rozgin</i> po zlati rozgi, <i>Solidago virgaurea</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	rozgin pediček
8534	<i>E. vulgata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	E <i>vulgus</i> navaden. 2 <i>talinov</i> po talinu, <i>Thalictrum</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic.	talinov pediček
	<i>Eustroma</i> Hübner, [1825]		E <i>eu</i> - dober, pravi; <i>stroma</i> nekaj kar je razgumno, prepleteno. 2 <i>prepletene</i> glede na značilni vzorec kril.	prepletene
8366	<i>E. reticulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Camelutti & Micheli, 1955	E <i>reticulatus</i> mrežasti; glede na značilni vzorec kril.	mrežasti prepletene
	<i>Fagivorina</i> Wehrli, 1943		<i>Fagus</i> bot. rod <i>Fagus</i> . 2 po bukvi <i>Fagus sylvatica</i> ; <i>voro</i> žreti; po bukvi (in lišajih na bukvi?), eni od hranilnih rastlin gosenic.	bukvar
7792	<i>F. arenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>arena</i> pesek; glede na pesčeni vzorec kril. 2 <i>lisasti</i> glede na vzorec kril.	lisasti bukvar
	<i>Gagitodes</i> Warren, 1893		<i>Gagitodes</i> neznan metuljarski pomen. 2 <i>talinar</i> glede na talin, <i>Thalictrum</i> sp., ki je značilna hranilna rastlina gosenic.	talinar
8468	<i>G. sagittata</i> (Fabricius, 1787)	Hafner, 1911a	E <i>sagitta</i> puščica; glede na nazobljeno mediano liso, ki je podobna puščici.	puščasti talinar
	<i>Gandaritis</i> Moore, [1868]		D <i>ganao</i> svetiti, bleščati, lesketati se; glede na značilnosti vzorca kril.	bleščavec
8335	<i>G. pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	E <i>pyralis</i> plamenasti, krilato bičje, ki je živelo v ognju; glede na vzorec kril, ki spominja na plamene.	plamenasti bleščavec
	<i>Geometra</i> Linnaeus, 1758		E <i>geometreo</i> meriti zemljo; glede na pednjajče premikanje gosenic.	pedic
7969	<i>G. papilionaria</i> Linnaeus, 1758	Hafner, 1910	E <i>papilio</i> metulj; glede na podobnost z dnevnimi metulji.	metuljasti pedic

	<i>Gerinitia</i> Leraut, 2009		D <i>gerarus</i> domnevno častiljiv; postaven. 2 <i>naramničar</i> po podobnosti s častniško oznako naramnico ali epoleto.	naramničar
7837	<i>G. honoraria</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Carnelutti, 1989	D <i>honor-</i> častni, častno. 2 <i>dvočrti</i> po dveh prečnih črtah na krilih.	dvočrti naramničar
	<i>Gnophos</i> Treitschke, 1825		E <i>gnophos</i> tema, hudourni oblak. 2 <i>oblakar</i> glede na temne, mračne barve kril.	oblakar
7847	<i>G. furvata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911b	E <i>furvus</i> mrak, mračni, senčni; glede na značilno barvo kril. 2 <i>veliki</i> glede na velikost, je naš največji oblakar.	veliki oblakar
7848	<i>G. obfuscata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911b	E <i>obfuscus</i> zamažen; glede na sivkasto-rjavkasto barvo.	mračni oblakar
	<i>Gymnoscelis</i> Möbile, 1868		E <i>gymnos</i> goli, <i>skelos</i> noga, bedro; glede na to, da naoleni nima srednjih ostrog.	goličnik
8599	<i>G. rufifasciata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1911a	E <i>rufus</i> rdeč, <i>fascia</i> trak; glede na rdeči trak na sprednjih krilih.	rdečetraki goličnik
	<i>Helionata</i> Grote & Robinson, 1866		E <i>helios</i> sonce, <i>omos</i> hkrati, istočasno s soncem. 2 po detelji, <i>Trifolium</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic.	deteljar
7537	<i>H. glarearia</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911b	E <i>glareosus</i> peščeni, prodnati. 2 <i>stepski</i> glede na življenjsko okolje.	stepski deteljar
	<i>Hemistola</i> Warren, 1893		E <i>hemi</i> polovica; <i>stole</i> oblačilo; glede na tanko oluskanost kril. 2 <i>kalcedonik</i> po modro zeleni barvi kril, ki je podobna kalcedonu.	kalcedonik
8000	<i>H. chrysoprasaria</i> (Esper, [1795])	Hafner, 1910	E <i>chrysoprasus</i> kalcedonsko zeleno, <i>khrysos</i> zlato. 2 po modro zeleni prosojni barvi žlahnega kamna kalcedona.	modrikasti kalcedonik
	<i>Hemithea</i> Duponchel, 1829		E <i>hemitheos</i> polbog, spoštovan; brez metuljarskega pomena. 2 <i>poletnik</i> glede na letni čas pojavljanja.	poletnik
7980	<i>H. aestivaria</i> (Hübner, 1789)	Hafner, 1910	E <i>aestivus</i> se nanaša na poletje, poletni. 2 <i>zelenkasti</i> glede na zeleno barvo kril.	zelenksti poletnik
	<i>Horisma</i> Hübner, [1825]		E <i>horisma</i> meja; glede na temno črto na krilih. 2 <i>srobotar</i> po srobotu, <i>Clematis vitalba</i> , značilni hranilni rastlini večine vrst tega roda.	srobotar
8407	<i>H. aemulata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	E <i>aemulus</i> tekmovalen, primerljiv v odnosu do drugih vrst v rodu? 2 <i>enobarvni</i> glede na vzorec kril.	enobarvni srobotar
8409	<i>H. aquata</i> (Hübner, [1813])	Carnelutti, 1992a	E <i>aqua</i> voda; verjetno glede na krila, ki so videti kot da bi bila oprana, izprana z vodo.	izprani srobotar
8408	<i>H. calligraphata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Hafner, 1911b	E <i>kallos</i> lep, lepo; <i>graphis</i> stil, slog pisanja. 2 <i>pisani</i> glede na pisani vzorec kril.	pisani srobotar
8401	<i>H. corticata</i> (Treitschke, 1835)	Mladinov, 1980	E <i>cortex</i> lubje, skorja; glede na značilni vzorec kril.	skorjasti srobotar

8403	<i>H. radicularia</i> (De La Hampe, [1855])	Carnelutti, 1989	D <i>radix</i> korenina, korenit. 2 <i>porečni</i> glede na značilno življenjsko okolje v logih ob rekah.	porečni srobotar
8402	<i>H. tersata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911a	E <i>tersus</i> obrisan, čist, nejasen; <i>zabrisani</i> , glede na zabrisan, nejasen vzorec na krilih.	zabrisani srobotar
8400	<i>H. vitalbata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911a	E <i>Clematis vitalba</i> hranilna rastlina; po značilni hranilni rastlini gosenic. 2 <i>svetlolisi</i> glede na svetle lise na krilih.	svetlolisi srobotar
	<i>Hydrelia</i> Hübner, [1825]		E <i>hudrelos</i> voden; vejneto po valovitih črtah na krilih. 2 <i>jelšarpo</i> jelši, <i>Alnus</i> sp., hranilni rastlini gosenic tega rodu.	jelšar
8660	<i>H. flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	E <i>flemmeolus</i> ognjeni, plameneci. 2 <i>plamenasti</i> glede na rumeno do oranžno barvo črt in pasov na krilih.	plamenasti jelšar
8661	<i>H. sylvata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911a	E <i>syha</i> gozd, glede na značilno življenjsko okolje.	gozdni jelšar
	<i>Hydria</i> Hübner, 1822		E <i>Hydra</i> vodna kača v grški mitologiji? 2 <i>valovitež</i> glede na prevladajoče valovite črte v vzoreu kril obeh vrst.	valovitež
8421	<i>H. cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	E <i>cervinus</i> jelen; glede na barvo, ki spominja na barvo jelena.	jelenji valovitež
8423	<i>H. undulata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>undulatus</i> nakodran, kodrasti; glede na značilni vzorec na krilih.	kodrasti valovitež
	<i>Hydriomena</i> Hübner, [1825]		E <i>hudria</i> posoda za vodo; <i>meno</i> ostati? nejasen metuljarski pomen. 2 <i>vodnar</i> glede na vlažno do močvirno življenjsko okolje.	vodnar
8391	<i>H. furcata</i> (Thunberg, 1784)	Hafner, 1911a	E <i>furca</i> dvokraka vilica; glede na čmo znamenje na sprednjih krilih, ki zaradi variabilnosti vrste ni vedno vidno.	viličasti vodnar
8392	<i>H. impluviata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911a	E <i>impluvium</i> zbiralnik deževnice v rimskih hišah; gosenice naj bi hodile pit vodo na taka mesta, luže.	deževni vodnar
8393	<i>H. ruberata</i> (Freyer, [1831])	Hafner, 1911a	E <i>ruber</i> rdeč; glede na barvo kril, ki je lahko nekoliko rdečkasta, rdečerjava.	rdečkasti vodnar
	<i>Hylaea</i> Hübner, 1822		E <i>hulaios</i> ki pripadab gozdu, gozdovnik; glede na življenjsko okolje.	gozdovnik
7839	<i>H. fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>fascia</i> trak; glede na širok rjavi trak na sprednjih krilih pri rjavi obliki. 2 <i>dvobarvni</i> gozdovnik po pojavljanju rjave in zelene oblike.	dvobarvni gozdovnik
	<i>Hypomecis</i> Hübner, 1821		E <i>hypo</i> pod, manj kot; <i>mekos</i> velikost, dolžina? 2 <i>enoličnež</i> glede na enolični sivi vzorec kril.	enoličnež
7784	<i>H. punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	E <i>punctum</i> pika, lisa. 2 <i>krogasti</i> glede na bolj ali manj okroglo liso na sredini zadnjega krila, po kateri vrsto ločimo od sosednjih.	krogasti enoličnež
7783	<i>H. roboraria</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911b	E <i>Quercus</i> bot. rod <i>hrasti</i> , hrastov; glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastov enoličnež

	<i>Hypoxystis</i> Prout, 1915		<i>E hypo</i> pod, spodaj, <i>vislon</i> svetleče, zloženo; ki je manj bleščeč. 2 <i>poškropljenec</i> glede na vzorec drobnih pik in lis.	poškropljenec
7628	<i>H. pluvitaria</i> (Fabricius, 1787)	Carnelutti, 1971	<i>E pluvialis</i> deževen, od dežja poškropljen; glede na vzorec drobnih črnih pik, ki daje vtis, da je poškropljen. 2 <i>bledi</i> glede na barvo.	bledi poškropljenec
	<i>Idaea</i> Treitschke, 1825		<i>E Idaios</i> Ida, gora v Grčiji; brez metuljarskega pomena. 2 <i>zelikarček</i> po raznih zeleh, značilnih hranilnih rastlinah gosenic tega rodu.	zelikarček
8102	<i>I. aureolaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1910	<i>E auratus</i> zlat, glede na zlatorumeno obarvana krila.	zlatorumeni zelikarček
8184	<i>I. aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>E aversus</i> nasprotij; po diskalni pegi, vidni tudi na spodnji strani krila. 2 <i>dvolički</i> glede na dve formi, s širokim ali ozkim temnim pasom.	dvolički zelikarček
8132	<i>I. biselata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E bis-</i> dva, dvojni; <i>seta</i> ščetina, dlaka; glede na šope dlak na tibijah zadnjih nog samecev.	šopasti zelikarček
8164	<i>I. camparia</i> (Herrich-Schäffer, [1852])	Hafner, 1910	<i>S Campus</i> po nabajališču? <i>E kampe</i> upogniti se, po gibanju gosenic? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>drobnolisi</i> glede na vzorec kril.	drobnolisi zelikarček
8186	<i>I. degeneraria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>E degener</i> izrojen, nevreden svoje vrste; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>temnopasi</i> glede na značilni vzorec kril.	temnopasi zelikarček
8188	<i>I. deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Hafner, 1910	<i>S deversaria</i> drugačen, različen. Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>svetlokrili</i> glede na svetla krila (v primerjavi z <i>I. aversata</i>).	svetlokrili zelikarček
8136	<i>I. dilutaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>E dilutus</i> opran, izpran, zabrisani. 2 <i>zabrisani</i> glede na nejasni, zabrisani vzorec kril.	zabrisani zelikarček
8161	<i>I. dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E dimidio</i> razdeliti v dve polovici; glede na temne lise, ki so dobro razvite samo na spodnji polovici sprednjih kril.	temnolisi zelikarček
8176	<i>I. distinctaria</i> (Boisduval, 1840)	Hafner, 1910	<i>E distinctus</i> razločen, jasen, prepoznaven; verjetno glede na <i>I. pimpinellata</i> , od katere se jasno loči.	razločni zelikarček
8129	<i>I. elongaria</i> (Rambur, 1833)	Hafner, 1910	<i>S elongus</i> podaljšan; glede na podaljšana sprednja krila.	dolgokrili zelikarček
8183	<i>I. emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>E emarginatus</i> odveti, prikrajšati; se nanaša na izrezani stranski rob krila. 2 <i>krivorobi</i> glede na izrezani rob krila.	krivorobi zelikarček
8110	<i>I. filicata</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>S filix</i> , <i>filicis</i> prapro; domnevno po habitatu. 2 <i>klinčkov</i> po klinčku, <i>Dianthus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	klinčkov zelikarček
8103	<i>I. flaveolaria</i> (Hübner, [1809])	Carnelutti, 1992a	<i>S flavus</i> rumen; glede na značilno rumeno barvo.	rumeni zelikarček
8137	<i>I. fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Hafner, 1910	<i>E fuscus</i> mračen, temni; <i>venosus</i> žilnat; glede na temni pas med veno 11 (R1) in kostalnim robom.	temnožilni zelikarček
8140	<i>I. humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E humilis</i> majhen, skromni, nepomembni. 2 <i>temnorobi</i> glede na temni pas ob kostalnem robu.	temnorobi zelikarček

8134	<i>I. inquinata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	<i>E. inquinatus</i> zabrisani; glede na zabrisani vzorec. 2 <i>herbarijski</i> ker se gosenice hranijo s suhim rastlinami, tudi v herbarijih.	herbarijski zelikarček
8111	<i>I. laevigata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	<i>E. laevigo</i> prah, poprašen, s prahom posut; glede na značilno strukturo površine kril.	poprašeni zelikarček
8098	<i>I. macilentaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Camelutti, 1992a	<i>S. macilentus</i> suh, mršav; verjetno zaradi življenja na pustih, suhih travnikih.	mršavi zelikarček
8120	<i>I. moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	<i>S. monile</i> ogrlica, ovrtnik; glede na obliko valovite črte v robnem delu krila, ki spominja na ogrlico iz biserov.	biseri zelikarček
8104	<i>I. muricata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. murex</i> polž škrlatik iz katerega se pridobiva škrlatna barva. 2 <i>škrlatni</i> glede na škrlatne lise na krilih.	škrlatni zelikarček
8178	<i>I. nitidata</i> (Herrich-Schäffer, [1861])	Hafner, 1910	<i>E. nitidus</i> svetleč, sijoč, blesteč; glede na svetlečo, sijočo površino kril.	blesteči zelikarček
8131	<i>I. obsoletaria</i> (Rambur, 1833)	Hafner, 1910	<i>E. obsoletus</i> star, nejasen, obrabljen; glede na nejasni, zabrisani vzorec na krilih, ki je starikevega videza.	starikevi zelikarček
8099	<i>I. ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	<i>E. ochra</i> vrsta rumenkaste zemlje, okra; glede na barvo kril.	okrasti zelikarček
8168	<i>I. pallidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	<i>E. pallidus</i> svetli, bledi, medli; -ata nekdanja končnica za geometridae; glede na svetlo, bledo barvo kril.	bledi zelikarček
8142	<i>I. politaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>S. politus</i> poliratia, gladti, gladko; po gladkih, svetlečih luskah na krilih.	zloščeni zelikarček
8185	<i>I. rubraria</i> (Staudinger, 1901)	Hafner, 1910	<i>S. ruber</i> rdeč, rdečkast; glede na značilno rdečkasto rjavo barvo srednjega pasu na krilih.	rumenordeči zelikarček
8093	<i>I. rufaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>S. rufus</i> rdeč, rdeč; zaradi rdečkastega poprha po krilih metuljev.	rdečkasti zelikarček
8107	<i>I. rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	<i>E. rusticus</i> podeželski, preprosti, grobi; po življenjskem okolju. 2 <i>črnotraki</i> glede na prečni črni trak v srednjem delu krila.	črnotraki zelikarček
8155	<i>I. seriata</i> (Schrank, 1802)	Hafner, 1910	<i>E. series</i> niz, veriga, vrsta; glede na vzorec sprednjih kril za katerega je značilno, da prečne črte razpadejo v niz pik.	pikasti zelikarček
8097	<i>I. sericeata</i> (Hübner, [1813])	Camelutti, 1992a	<i>E. sericeus</i> svilen, svilnat; glede na svilnato lesketajoča krila metuljev.	svilnati zelikarček
8100	<i>I. serpentata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. serpens</i> kača; glede na vijugave, zavite črte na krilih.	kačasti zelikarček
8187	<i>I. straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Hafner, 1910	<i>E. stramen</i> slama, slamnat; glede na osnovno barvo krilj metuljev.	slamnat zelikarček
8167	<i>I. subsericeata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1910	<i>E. sub-</i> nekaj, nekoliko; <i>sericeus</i> svilen, svilnat; zaradi rahlega leska na krilih, je manj svilnat kot <i>I. sericeata</i> .	lesketavi zelikarček

8123	<i>I. sylvestriaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>E. sylvestris</i> gozdni; vrsta ni gozdna! Po I. Sylvestre, francoski entomolog? 2 timijanov po <i>Thymus</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic.	timijanov zelikarček
8174	<i>I. trigeminata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1910	<i>E. trigeminus</i> trodelni, trojni; glede na postdiskalno liso, ki je razdeljena v tri dele.	trodelni zelikarček
8116	<i>I. typicata</i> (Guenée, [1858])	Carnelutti, 1992a	<i>E. tupos</i> vzorec; <i>typicus</i> imeti določen vzorec, biti značilen.	značilni zelikarček
	<i>Isturgia</i> Hübner, [1823]		<i>E. historgia</i> tkanje; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>metuljničar</i> po metuljnicah (Fabaceae), značilnih hranilnih rastlinah gosenic.	metuljničar
7571	<i>I. arenacearia</i> ((Denis & Schiffmüller), 1775)	Carnelutti & Micheli, 1955	<i>S. arenaceus</i> pesek, peščen; peščene barve. 2 <i>lucernin</i> po lucerni (<i>Medicago sativa</i>) značilna hranilna rastlina gosenic.	lucernin metuljničar
7561	<i>I. limbaria</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. limbatus</i> obrobljen; glede na značilni vzorec kril. 2 <i>metlin</i> po metli (<i>Sarothamnus scoparius</i>) eni od hranilnih rastlin gosenic.	metlin metuljničar
7570	<i>I. murinaria</i> ((Denis & Schiffmüller), 1775)	Lesan, 2000	<i>E. murinus</i> mišje barve, mišji; 2 <i>sivorjani</i> glede na značilno barvo kril.	sivorjani metuljničar
7562	<i>I. roraria</i> (Fabricius, [1777])	Carnelutti, 1971	<i>S. rorare</i> rositi, orošen? Po črnih luskah po krilih. 2 <i>košeniččin</i> po košeničici (<i>Genista</i> sp.) eni od hranilnih rastlin gosenic.	košeniččin metuljničar
	<i>Jodis</i> Hübner, [1823]		<i>E. iodes</i> rjasti; glede na hitro spremembo zelenkaste barve v rjavkasto. 2 <i>obledelec</i> glede na obledelost, hitro izgubo barve.	obledelec
8002	<i>J. lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>E. lactus</i> mlečni; glede na mlečno belo barvo kril, ki se hitro spremeni v nežno rjavkasto.	mlečni obledelec
8003	<i>J. putata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>S. puto</i> čistiti, lepšati, bleščati se; glede na čisto, bleščečo površino kril.	bleščeči obledelec
	<i>Lampropteryx</i> Stephens, 1831		<i>E. lampros</i> svetlo, svetlikajoče; glede na izrazit lesk na površini kril.	svetlikar
8316	<i>L. suffumata</i> ((Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. sub-</i> nekoliko, nekaj; <i>fumatus</i> dimasti; glede dimasto obarvanost kril.	dimasti svetlikar
	<i>Ligdia</i> Guenee, [1858]		<i>D. lugatus</i> mračen, temen; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>trdoleskar</i> po trdoleski, <i>Euonymus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	trdoleskar
7530	<i>L. adustata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. adustus</i> opečen, zažgan; glede na značilni vzorec kril, temno liso na beli podlagi.	opečeni trdoleskar
	<i>Lithostegia</i> Hübner, [1825]		<i>E. lithos</i> kamen; <i>stegae</i> streha; sive luske na krilih so videti kot kamniti strešniki; <i>kamnar</i> glede na sive "kamnite" luske na krilih.	kamnar
8639	<i>L. farinata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. farina</i> moka; glede na mokast vzorec kril.	mokasti kamnar
	<i>Lobophora</i> Curtis, 1825		<i>S. lobos</i> krpa; <i>phoreo</i> nositi; glede na kožno krpo na hrbtani strani kril samcev, treje krilo.	krpar

8665	<i>L. halterata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E halter</i> utripača, telovadna ročka; po podobnosti krilne krpe z zakrnelim krilom pri dvokrilcih (Diptera).	sivi krpár
	<i>Lomaspilis</i> Hübner, [1825]			robkar
7527	<i>L. marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	<i>E loma</i> rob. meja; <i>spilas</i> umazan. z madeži; z umazanim, s črnim robom.	črnorobi robkar
	<i>Lomographa</i> Hübner, [1825]			belček
7828	<i>L. bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E loma</i> rob. meja; <i>graphe</i> risanje, risba; ki je po robu porisan. 2 <i>belček</i> glede na belo osnovno barvo kril.	dvopiki belček
7829	<i>L. tenerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E bi-</i> dva, <i>macula</i> pega, lisa. 2 <i>dvopiki</i> glede na značilni vzorec dveh pik na kostalnem robu sprednjih kril.	lisasti belček
	<i>Lycia</i> Hübner, [1825]			volčič
7675	<i>L. alpina</i> (Sulzer, 1776)	Hafner, 1911b	<i>E Lukeitos</i> volčji, ima dlako kakor volk; volčič.	alpski volčič
7677	<i>L. florentina</i> (Stefanelli, 1882)	Camelutti, 1992a	S Alpe, alpski; se nanaša na gorovje v Evropi; glede na geografsko območje razširjenosti.	visokogorski volčič
7676	<i>L. graecarius</i> (Staudinger, 1861)	Hafner, 1911b	D <i>Florentia</i> zgodovinska pokrajina v srednji Italiji, Toscana. 2 glede na pojavljanje v visokogorskem pasu.	južni volčič
7674	<i>L. hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911b	S <i>graeccarius</i> grški; glede na območje pojavljanja. 2 <i>južni</i> glede na razširjenost v južni Evropi.	dlakavi volčič
7679	<i>L. isabellae</i> (Harrison, 1914)	Sukič & Kodran, 2007	<i>E hirtus</i> dlakavi, kocinasti; glede na izrazito dlakavost telesa.	macesnov volčič
	<i>Lythria</i> Hübner, [1823]			škrlatnik
8222	<i>L. cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Camelutti, 1992a	S <i>Isabella</i> žensko ime; brez metuljarskega pomena. 2 <i>macesnov</i> glede na <i>Larix</i> sp., značilno hranilno rastlino.	kislčin škrlatik
8221	<i>L. purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	Camelutti & Micheli, 1955	S <i>luthron</i> kri, stijena krita; glede na barvo kril metuljev. 2 <i>škrlatnik</i> glede na škrlatno barvo vzorca na krilih.	dresnin škrlatik
	<i>Macaria</i> Curtis, 1826			vogalar
7540	<i>M. alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b	S <i>cruentus</i> s krvavimi madeži, krvav. 2 <i>kislčin</i> glede na kislco, <i>Rumex</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	premenjalni vogalar
7544	<i>M. artesiaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E porpureus</i> purpurne barve. 2 <i>dresnin</i> glede na dresen, <i>Polygonum</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	obrežni vogalar

7567	<i>M. brunneata</i> (Thunberg, 1784)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>brunneus</i> rjav, jvavkasti; glede na svetlo rjavo barvo.	jvavkasti vogalar
7588	<i>M. fusca</i> (Thunberg, 1792)	Hafner, 1911b	E <i>fuscus</i> senčen, mračen; glede na barvo. 2 <i>sivkasti</i> glede na temno sivkasto barvo kril.	sivkasti vogalar
7542	<i>M. liturata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911b	E <i>litura</i> madež, umazati. 2 <i>rumenolisi</i> glede na značilno rumeno liso v vogalnem delu krila.	rumenolisi vogalar
7539	<i>M. notata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>nota</i> znak, črka; glede na značilno temno piko v sredini obrobnege pasu.	velepiki vogalar
7541	<i>M. signaria</i> (Hübner, [1809])	Hafner, 1911b	E <i>signum</i> znak, znamenje. 2 <i>smrekov</i> po življenju v gorskih iglastih gozdovih, kjer se gosence hranijo predvsem z iglicami smreke.	smrekov vogalar
7543	<i>M. wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>vau</i> - ime črke "v". 2 <i>črnolisi</i> glede na vzorec črnih lis na krilih, ki so podobne črki "v".	črnolisi vogalar
	<i>Martania</i> Mironov, 2000		<i>Martania</i> ? neznani metuljarski pomen. 2 <i>pramenar</i> glede na prečne pramene ali trakove na sprednjih krilih.	pramenar
8454	<i>M. taeniata</i> (Stephens, 1831)	Carnelutti, 1971	E <i>taenia</i> trak, pramen. 2 <i>jvavkasti</i> glede na barvo sprednjih kril.	jvavkasti pramenar
	<i>Melanthia</i> Duponchel, 1829		E <i>melas</i> črn; <i>anthos</i> ; cvet, roža; 2 <i>grmiščar</i> glede na rgnišča in gozdne robove, ki so njegovo značilno življenjsko okolje.	grmiščar
8412	<i>M. alaudaria</i> (Freyer, 1846)	Hafner, 1911a	S <i>alauda</i> škrijanec?; brez metuljarskega pomena. 2 <i>gorski</i> glede na značilno življensko okolje v Alpah in Karpatih.	gorski grmiščar
8411	<i>M. procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1911a	E <i>procella</i> deževni vihar, nevihta; glede na skupine črnih lusk, ki so "poškopljene" po beli osnovni barvi kril.	poškropljeni grmiščar
	<i>Menophra</i> Moore, [1887]		E <i>mene</i> luna; <i>ophrys</i> resice; glede na obliko resic na robu kril. 2 <i>skorjar</i> po vzoru kril, ki sponinjajo na skorjo dreves.	skorjar
7724	<i>M. abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>abruptus</i> prelomljen, prekinjen; glede na prekinjeno temno liso na krilu.	temnolisi skorjar
	<i>Mesoleuca</i> Hübner, [1825]		E <i>mesos</i> srednji, sredina; <i>leucos</i> beli; glede na to, da je osrednji del krila bele barve.	belinar
8312	<i>M. albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>albus</i> bel; <i>cilla</i> rep?; domnevno glede na beli zadek. 2 <i>robidi</i> glede na robido, <i>Rubus</i> sp., hranilno rastlino gosenc.	robidin belinar
	<i>Mesotype</i> Hübner, [1825]		E <i>mesos</i> srednji; <i>typas</i> slika, vzorec; glede na podobnost vzorca kril z vrstami iz rodu <i>Perizoma</i> .	zeliščnik
8465	<i>M. didymata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>didymus</i> dvojen, dvojček, v paru; glede na dvojno piko v robnem pasu.	dvopiki zeliščnik
8471	<i>M. parallellolineata</i> (Retzius, 1783)	Hafner, 1911a	S <i>parallelolineatus</i> z vzporednimi črtami. 2 <i>dvočrti</i> glede na značilni vzorec dveh vzporednih črt na sprednjih krilih.	dvočrti zeliščnik

8470	<i>M. verberata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911a	S <i>verben</i> vrvice od biča, črtasti sledovi bičanja. 2 <i>visokogorski</i> glede na življenjsko okolje v Alpah do 2500 m visoko.	visokogorski zeliščnik
	<i>Minoa</i> Treitschke, 1825		E <i>Minous</i> Minojec, pripadnik minojске kulture na Kreti. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>mišjak</i> glede na miško barvo kril.	mišjakar
8663	<i>M. murinata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	E <i>murinus</i> miške barve; glede na barvo, ki je podobna mišji. 2 <i>rjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril.	rjavkasti mišjakar
	<i>Narraga</i> Walker, 1861		<i>Narraga</i> neznan metuljarski pomen. 2 <i>pelinar</i> po pelinu, <i>Artemisia campestris</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	pelinar
7556	<i>N. fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>fascia</i> pas, trak; glede na rjave prečne pasove na krilih.	pasasti pelinar
	<i>Nebula</i> Bruand, 1846		E <i>nebula</i> megla, oblak; glede na sivo, mračno obarvanost kril.	meglar
8327	<i>N. achromaria</i> (De La Harpe, [1853])	Hafner, 1911a	S <i>achromos</i> brezbarvni; glede na blede, obledelo barvo kril. 2 <i>sivkasti</i> glede na rahlo sivkasto barvo kril.	sivkasti meglar
8325	<i>N. nebulata</i> (Treitschke, 1828)	Hafner, 1911a	E <i>nebulata</i> meglen. 2 <i>rjavkasti</i> glede na rjavkasti odtенок barve kril.	rjavkasti meglar
	<i>Neognopharmia</i> Wehrli, 1953		<i>Neognopharmia</i> neznan metuljarski pomen. 2 <i>pustinjar</i> glede na življenjsko okolje v suhih in toplih območjih južne Evrope.	pustinjar
7581	<i>N. stevenaria</i> (Boisduval, 1840)	Hafner, 1911b	S <i>Steven</i> priimek? 2 <i>sivokrtli</i> glede na prevladujočo sivo barvo kril.	sivokrtli pustinjar
	<i>Nothocasis</i> Prout, 1936		E morda <i>nothos</i> noht; bastard, križanec, nepravil. 2 <i>javornik</i> , po <i>Acer pseudoplatanus</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	javornik
8679	<i>N. sericata</i> (Hübner, [1817])	Hafner, 1910	S <i>sertus</i> soditi skupaj, združiti, sortirati. 2 jesenski, glede na letni čas pojavljanja metuljev.	jesenski javornik
	<i>Nychiodes</i> Lederer, 1853		S <i>nychios</i> noč, nočni; <i>eidos</i> viden; ki ga vidimo ponoči, v temi.	temačnik
7720	<i>N. dalmatina</i> Wagner, 1909	Carnelutti, 1989	S <i>dalmatina</i> dalmatinski, glede na geografsko razširjenost. 2 <i>primorski</i> glede na območje pojavljanja v Sloveniji.	primorski temačnik
7715	<i>N. obscuraria</i> (De Villers, 1789)	Hafner, 1911b	S <i>obscurus</i> temni, nejasni. 2 <i>resinipo</i> resni, <i>Erica</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic.	resin temačnik
	<i>Odezia</i> Boisduval, 1840		E <i>hodos</i> cesta, pot; <i>hexomaisedeti</i> ; glede na lastnost metuljev, da se radi spretavajo ob poteh in posedajo na golo zemljo.	sprehajalec
8631	<i>O. atrata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>ater</i> črne barve, črn; glede na značilno črno barvo kril metuljev.	črni sprehajalec
	<i>Odontognophos</i> Wehrli, 1951		E <i>odous</i> <i>odontos</i> , zobje, zobati; <i>gnophos</i> oblakar. 2 <i>zobnjakar</i> glede na nazobčan zunanji rob krila.	zobnjakar

7852	<i>O. dumetata</i> (Tretschke, 1827)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>dumetum</i> goščava; glede na življenjsko okolje.	goščavski zobnjakar
	<i>Odontopera</i> Stephens, 1831		E <i>odous</i> , <i>odontos</i> zob. 2 <i>dvozob</i> glede na dva izrazita zobčka na zunanjem robu krila.	dvozob
7647	<i>O. bidentata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911b	E <i>bidentis</i> ki ima dva zoba, <i>dvozob</i> , glede na značilno zobato obliko zunanjega roba kril.	temni dvozob
	<i>Operophtera</i> Hbner, [1825]		E Oporophtera: <i>opora</i> sadje; <i>phthiuro</i> uničiti; uničevalalec sadnega drevja. 2 <i>mrazarček</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	mrazarček
8447	<i>O. brumata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>bruma</i> kratki, najkrajši; se nanaša na letni čas kratkega dne (zima); <i>hrastov</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastov mrazarček
8448	<i>O. fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>Fagus</i> bot. rod bukev; glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	bukov mrazarček
	<i>Opisthographis</i> Hübner, [1823]		E <i>opisthen</i> od zadaj, <i>grapto</i> spopisan; glede na to, da je močna rdeča pega dobro vidna tudi na zadnji strani krila.	rumenec
7613	<i>O. luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>luteolus</i> rumenkast; po značilni rumeni barvi kril. 2 <i>grmiščni</i> glede na značilno življenjsko okolje.	grmiščni rumenec
	<i>Orthonama</i> Hübner, [1825]		E <i>orthos</i> raven; <i>nama</i> tok, črta; glede na razmeroma ravne prečne črte na krilih v primerjavi z vijugavimi črtami sorodnih rodov.	ravnočrtar
8246	<i>O. obstripata</i> (Fabricius, 1794)	Hafner, 1911a	E <i>obstripus</i> vreči, posipati, poštropiti. 2 <i>selivski</i> glede na migrantski značaj vrste.	selivski ravnočrtar
8245	<i>O. vittata</i> (Borkhausen, 1794)	Carnelutti et al., 1965	E <i>vittata</i> trak, venec. 2 <i>močvirski</i> glede na življenjsko okolje.	močvirski ravnočrtar
	<i>Oureperyx</i> Leach, 1814		E <i>oura</i> rep, repati; <i>pterus</i> krilo; glede na obliko zadnjih kril, ki so podaljšana v rep.	repatec
7659	<i>O. sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	E <i>Sambucus</i> bot. rod bezeg; po eni od hranilnih rastlin gosenic.	bezgov repatec
	<i>Pachyernemia</i> Stephens, 1829		E <i>pachus</i> debel, močan, <i>kneme</i> goleni; ker je pri samcih zadnji del tibije razširjen. 2 <i>ozkokrilec</i> glede na obliko sprednjih kril.	ozkokrilec
7609	<i>P. hippocastanaria</i> (Hübner, [1799])	Carnelutti & Michieli, 1955	E <i>Aesculus hippocastanum</i> domnevena hranilna rastlina, ki pa dejansko ni. 2 <i>krepkonogi</i> glede na razširjene goleni samcev.	krepkonogi ozkokrilec
	<i>Parabornia</i> Krampl, 1994		E <i>para</i> poleg, pri, ob, <i>bous</i> vol, <i>harmos</i> skladnost; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>lubjar</i> ker je vzorec kril podoben drevesnemu lubju.	lubjar
7743	<i>P. viertlii</i> (Bohatsch, 1883)	Habeler, 2011	Adelbert Viertl, entomolog, 1831 - 1900. 2 <i>hrastov</i> po hrastu, <i>Quercus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	hrastov lubjar
	<i>Paradarisa</i> Warren, 1894		E <i>para</i> - poleg, pri, ob; je zelo podoben orientalskemu rodu <i>Darisa</i> Moore. 2 <i>deblar</i> ker metulji radi posedajo po deblih dreves.	deblar

7798	<i>P. consonaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911b	E <i>consus</i> primeren, ujemajoč se; ker se vzorec na deblu sedečega metulja ujema z vzorcem debla.	gladkokrtili deblar
	<i>Parectropis</i> Sato, 1980		E <i>par-</i> podoben, tak kot; glede na podobnost z rodом <i>Ectropis</i> . 2 <i>mračnikar</i> , ker je podoben mračniku.	mračnikar
7800	<i>P. similaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	E <i>similis</i> podoben, glede na podobnost s sosednjo vrsto. 2 <i>belolisi</i> glede na izrazito belo liso na robu krila.	belolisi mračnikar
	<i>Pareutype</i> Herboult, 1951		E <i>par-</i> podoben, tak kot; podoben, soroden rodu <i>Eutype</i> . 2 <i>česminar</i> glede na česmin, <i>Berberis vulgaris</i> , hranilno rastlino gosenic.	česminar
8414	<i>P. berberata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>berberis</i> česmin <i>Berberis</i> sp. 2 <i>temnočrti</i> glede na značilni vzorec temnih črt na krilih metuljev.	temnočrti česminar
	<i>Pusiphila</i> Mayerick, 1883		E <i>paseus</i> , <i>pascuana</i> pašnik, pašniški? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>zelenik</i> glede na zelenkasto barvo kril tega rodu.	zelenik
8604	<i>P. chloerata</i> (Mabille, 1870)	Hafner, 1911a	E <i>khloe</i> svetlo zelena brava pomladi; glede na tako barvo na krilih.	pomladni zelenik
8605	<i>P. debiliata</i> (Hübner, [1817])	Hafner, 1911a	E <i>debiliata</i> šibkost; glede na blede, svetlo zeleno barvo na krilih, ki hitro zbledi v rumenkasto.	obledeleli zelenik
8603	<i>P. rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>rectangulus</i> pravokotni; glede na pravokotno oblikovane pikčaste trakove na spodnji strani zadnjih kril.	pravokotniški zelenik
	<i>Pelurga</i> Hübner, [1825]		E <i>pelourgos</i> delavec z glino, glinar; glede na barvo kril. 2 <i>lobodar</i> po lobodi, <i>Atriplex</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	lobodar
8314	<i>P. comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>comitor</i> spremljajoč; ker se rad pojavlja s <i>Scotiopteryx chenopodiata</i> . 2 <i>glineni</i> glede na osnovno glineno barvo kril.	glineni lobodar
	<i>Pennithera</i> Viidalepp, 1980		E <i>penna pero</i> , <i>peresas</i> ; glede na tipalnice samcev. 2 <i>borovnik</i> glede na habitat borovih gozdov, kjer se hrani z iglicami bora <i>Pinus</i> sp.	borovnik
8354	<i>P. firmata</i> (Hübner, [1822])	Hafner, 1911a	E <i>firno</i> uvrstiti, potrditi; glede na variabilnost vrst in zahtevnost določanje vrst tega rodu. 2 <i>okrazi</i> glede na osnovno barvo kril.	okrazi borovnik
	<i>Perconia</i> Hübner, [1823]		E <i>peri-</i> okrog in okrog, <i>konios</i> prah; glede na poprašeno površino kril.	poprašenec
7939	<i>P. strigillaria</i> (Hübner, 1787)	Hafner, 1911b	E <i>strigilla</i> skovanka iz <i>striga</i> brazda, črta. 2 <i>tročrti</i> glede na vzorec treh črt.	tročrti poprašenec
	<i>Peribatodes</i> Wehni, 1943		E <i>peri-</i> okrog, okoli; <i>batodes</i> spreščen s tmi, morda glede na habitat. 2 <i>goščavar</i> glede na gosto zaraščeno življenjsko okolje	goščavar
7764	<i>P. correptaria</i> (Zeller, 1847)	Hafner, 1911b	S <i>correpus</i> združen, glede na potek prečnih črt. 2 <i>jasnočrti</i> glede na jasno izrisane prečne črte na krilih.	jasnočrti goščavar
7754	<i>P. rhomboidaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>rhomboides</i> rombasti, po rombu podobnemu znamenju na sprednjih krilih.	rombasti goščavar

7762	<i>P. secundaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>secundus</i> naslednji? po C. <i>Plinius Secundus</i> , avtorju <i>Naturalis historia</i> . 2 <i>mali</i> glede na velikost, saj je najmanjši v tem rodu.	mali goščavar
7761	<i>P. umbraria</i> (Hübner, [1809])	Carnelutti & Michieli, 1960	S <i>umbra</i> senca, osenčen; glede na osenčene, razmazane temne površine med in ob prečnih črtah.	osenčeni goščavar
	<i>Perizoma</i> Hübner, [1825]		E <i>perizoma</i> pas, obseg, opasati. 2 <i>glavičar</i> ker gosenice večine vrst živijo v semenskih glavicah in se hranijo s semeni rastlin.	glavičar
8455	<i>P. affinitata</i> (Stephens, 1831)	Hafner, 1911a	E <i>affinitatus</i> soroden; po sorodnosti s <i>P. alchemillata</i> . 2 <i>pokaličin</i> glede na pokalico, <i>Silene vulgaris</i> , hranilno rastlino gosenic.	pokaličin glavičar
8463	<i>P. albulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>albulus</i> belkast, bled; glede na značilno barvo kril.	belkasti glavičar
8456	<i>P. alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>Alchemilla</i> kamilica, domnevna hranilna rastlina gosenic. 2 <i>zebratov</i> po zebnatu, <i>Galeopsis</i> sp., eni od hranilnih rastlin gosenic.	zebratov glavičar
8459	<i>P. bifasciata</i> (Haworth, [1809])	Carnelutti & Michieli, 1955	E pravilno <i>bifasciata</i> ; bi- dva; <i>fascia</i> trak, pas. 2 po zobnici, <i>Odonitis</i> sp., značilni hranilni rastlino gosenic.	zobničin glavičar
8462	<i>P. blandiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>blandus</i> prijeten, vesel. 2 <i>smetlikin</i> glede na smetliko, <i>Euphrasia</i> sp., ki je značilna hranilna rastlina gosenic.	smetlikin glavičar
8464	<i>P. flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	Hafner, 1911a	E <i>flavus</i> rumen; <i>fascia</i> trak, pas; glede na značilnost vzorca.	rumenopasi glavičar
8457	<i>P. hydrata</i> (Treitschke, 1829)	Hafner, 1911a	S <i>hydratus</i> vodnat, vodast; glede na valovite prečne črte na sprednjih krilih. 2 po lepnic, <i>Silene</i> sp., hranilni rastlini gosenic.	lepničin glavičar
8469	<i>P. incultaria</i> (Herrich-Schäffer, [1848])	Hafner, 1911a	S <i>incultus</i> nelep, nečeden, neokrašen; glede na vzorec.	neokrašeni glavičar
8458	<i>P. lugdunaria</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	Carnelutti & Michieli, 1960	S <i>Lugdunum</i> rimsko mesto, današnji Lyon; nahajališče. 2 po rokavcu, <i>Cucubalus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	rokavčev glavičar
8461	<i>P. minorata</i> (Treitschke, 1828)	Hafner, 1911a	E <i>minor</i> najmanjši; ker je najmanjša vrsta tega rodu.	najmanjši glavičar
8467	<i>P. obsoletata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Hafner, 1911a	E <i>obsoletus</i> star, mračen, nejasen. 2 <i>sviščev</i> glede na to, da se gosenice hranijo s cvetovi in semeni svišča <i>Gentiana</i> sp.	sviščev glavičar
	<i>Petrophora</i> Hübner, [1811]		E <i>petros</i> sklada, <i>phoreo</i> nositi; po kameni barvi trakov na krilih. 2 <i>praprotnar</i> po praprotni, <i>Pteridium</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic	praprotnar
7596	<i>P. chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	E <i>chloros</i> svetlozelen, rumenozelen, svetli; glede na osnovno barvo kril.	svetli praprotnar
	<i>Phaioграмма</i> Stephens, 1831		D <i>phaeinos</i> svetel, bel, blesčeč; <i>gramma</i> črta, črta: ki je svetlo porisan. 2 <i>turkiznik</i> glede na turkizno zeleno barvo kril.	turkiznik
7984	<i>P. etruscaria</i> (Zeller, 1849)	Hafner, 1910	<i>Etrurija</i> zgodovinska pokrajina v srednji Italiji, Toskana. 2 <i>beločrti</i> glede na vzorec belih črt.	beločrti turkiznik

	<i>Phibalapteryx</i> Stephens 1831		<i>E. phibalos</i> ljubko, nežno, vitko; <i>peron</i> krilo. 2 <i>krilatec</i> glede na to, da ima krila.	krilatec
8227	<i>P. virgata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. virga</i> šiba, prot, palica; glede na šibast, črtast barvni vzorec na krilih; črtasti <i>krilatec</i>	črtasti <i>krilatec</i>
7672	<i>Phigalia</i> Duponchel, 1829		D <i>Phigalia</i> mesto v Grčiji? Brez metaljarskega pomena. 2 <i>snežnik</i> glede na pojavljanje v času ko je še sneg.	snežnik
	<i>P. pilosaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. pilosus</i> dlakast, kocinast; glede na dlakaste luske po telesu. dlakavi <i>snežnik</i>	dlakavi <i>snežnik</i>
	<i>Philereme</i> Hübner, [1825]		<i>E. phileremos</i> osamljeni; gosenice živijo v spetih listih. 2 <i>češnjičar</i> glede na kozjo češnjico, <i>Rhamnus</i> sp., hranilno rastlino gosenic.	češnjičar
8433	<i>P. transversata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. transversus</i> skozi potekajoč; glede na vzorec lis ali črt na krilih. 2 <i>veliki</i> glede na velikost v primerjavi s <i>P. vetulata</i> .	veliki <i>češnjičar</i>
8432	<i>P. vetulata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910	<i>E. vetulus</i> starejši, postaran; zaradi značilnega videza. 2 <i>mali</i> glede na velikost v primerjavi s <i>P. transversata</i> .	mali <i>češnjičar</i>
	<i>Plagodis</i> Hübner, [1823]		<i>E. plagios</i> poševen, <i>eidos</i> postava; glede na privzdigljen zadek pri počitku. 2 <i>hostnik</i> glede na življenjsko okolje.	hostnik
7607	<i>P. dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1911b	<i>E. dolabra</i> cepin, sekira; po vzorcu na krilih, po obliki kril? 2 <i>črčkasti</i> glede na vzorec kril, ki ga tvorijo drobne črtice.	črčkasti <i>hostnik</i>
7606	<i>P. pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	<i>E. pulvis</i> , <i>pulveris</i> ; prah, s prahom potrese; glede na značilnost vzorca na krilih, ki daje vtis poprašenosti.	poprašeni <i>hostnik</i>
	<i>Ptemyria</i> Hübner, [1825]		<i>E. ptemyris</i> poplava, plima; 2 <i>logarček</i> glede na značilno življenjsko okolje v logih, zlasti poplavnih logih ob rekah.	logarček
8352	<i>P. rubiginata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910	<i>E. rubigino</i> , <i>robigino</i> ; rja, rjaveti; glede na poprh rdečkastorjavih lusk na srednjih krilih.	rjasti <i>logarček</i>
	<i>Pseudopanthera</i> Hübner, [1823]		<i>E. pseudus</i> nepravil, lažni; <i>panther</i> panter; glede na temne lise na krilih, ki so podobne vzorcu panterja.	panterček
7620	<i>P. macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	<i>E. macula</i> madež, lisa, pega. 2 <i>rumeni</i> glede na rumeno osnovno barvo kril.	rumeni <i>panterček</i>
	<i>Pseudoterpna</i> Hübner, [1823]		<i>E. pseudus</i> nepravil, lažni; <i>terpnos</i> razveseljiv; zaradi varljive zelene barve, ki kmalu zbledi. 2 <i>bledičnik</i> zaradi blede barve kril.	bledičnik
7965	<i>P. pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner	<i>E. pruina</i> slana, zmrazil, po beleni lesketanju kril, ki spominja na slano. 2 <i>zelenkasti</i> zaradi zelenkaste barve svežih primerkov.	zelenkasti <i>bledičnik</i>
	<i>Psodos</i> Treitschke, 1825		<i>E. psodos</i> dim, saje; glede na temno, mračno barvo. 2 <i>ledenikar</i> glede na življenjsko okolje v območju ledenikov.	ledenikar
7911	<i>P. alpinata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	<i>S. alpinata</i> se nanaša na Alpe, kjer je bila vrsta opisana, pojavlja pa se tudi v nekaterih drugih gorstvih.	alpski <i>ledenikar</i>

7904	<i>P. alticolaria</i> Mann, 1853	Hafner, 1911b	E <i>alti</i> visoko, <i>colo</i> stanovati; glede na življenjsko okolje, visokogorje.	visokogorski ledenikar
7906	<i>P. canaliculata</i> (Hochenwarth, 1785)	Hafner, 1911b	E <i>cana</i> slana, slanst, sivkasti; glede na barvo temnih prečnih črt na krilih.	sivkasti ledenikar
7910	<i>P. coracina</i> (Esper, 1805)	Hafner, 1911b	S <i>koras</i> krokar, vran; glede na vrano podobno barvo.	vranji ledenikar
7909	<i>P. noricana</i> Wagner, 1898	Hafner, 1911b	S <i>Noricum</i> rimska provinca, ki je delno segala tudi na ozemlje današnje Slovenije.	norški ledenikar
7902	<i>P. quadrifaria</i> (Sulzer, 1776)	Hafner, 1911b	S <i>quadrifarium</i> štrikraten, četverni; glede na štiri rumene lise na krilih.	rumenolisi ledenikar
7905	<i>P. spitzii</i> Rebel, 1906	Hafner, 1911b	Robert Spitz (1859-1954) avstrijski entomolog. 2 <i>triglavski</i> glede na to, da je vrsta endemit tirlavskega pogoja.	triglavski ledenikar
	<i>Pterapherapteryx</i> Curtis, 1825		E <i>pteron</i> krilo; <i>phereo</i> nositi; tisti, ki nosi krila "krilonosi krilatec". 2 <i>krilar</i> tisti, ki ima krila.	krilar
8675	<i>P. sexualata</i> (Retzius, 1783)	Hafner, 1910	S <i>sex</i> šest; <i>ala</i> krilo; glede na velike krilne kpe na zgornji strani zadnjih kril samecev, ki delujejo kot tretji par kril.	šesterni krilar
	<i>Pungeleria</i> Rougemont, 1903		S Rudolf Pungeler (1857 - 1927) nemški lepidopterolog. 2 <i>jelkarpo</i> jelki, <i>Abies</i> sp. eni od hranilnih rastlin gosenic.	jelkar
7844	<i>P. capreolaria</i> (IDenis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>capreola</i> divja koza, gams? verjetno glede na podobno barvo.	ijavi jelkar
	<i>Rheumaptera</i> Hübner, 1822		E <i>rheuma</i> tok, reka; (podobno kot Hübnerjeve "rivulete"); <i>pteron</i> krilo. 2 <i>kopjar</i> glede na kopju podobno belo znamenje na krilu.	kopjar
8419	<i>R. hastata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	S <i>hasta</i> kopje, sulica, harpuna; glede na belo kopjasto znamenje na robu krila. 2 <i>veliki</i> glede na velikost v primerjavi z <i>R. subhastata</i> .	veliki kopjar
8420	<i>R. subhastata</i> (Noleken, 1870)	Camelutti, 1992a	E <i>sub</i> -pod, manj kot. 2 <i>mali</i> glede na velikost v primerjavi z <i>R. hastata</i> .	mali kopjar
	<i>Rhodometra</i> Mayerick, 1892		E <i>rhodon</i> roža, tudi v kompasu; <i>metro</i> meriti; morda prispodoba za potovanje. 2 <i>vandrovček</i> glede na migrantski značaj vrste.	vandrovček
8211	<i>R. sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1910	E <i>sacer</i> sveti; se nanaša na svečnice, varuhinje templja; brez metaljarskega pomena. 2 <i>rdečecrti</i> glede na rdečo črto na krilih.	rdečecrti vandrovček
	<i>Rhodostrophia</i> Hübner, [1823]		E <i>rhodon</i> roža, rožnatordeča barva; <i>strophos</i> povelj, zavoj. 2 <i>rdečnik</i> glede na rdeče pasove, trakove na krilih.	rdečnik
8207	<i>R. calabra</i> (Petagna, 1786)	Hafner, 1910	S <i>calabra</i> pokrajina Kalabrija; po tipičnem nahajališču. 2 <i>metlin</i> glede metlo, <i>Sarothamnus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	metlin rdečnik
8205	<i>R. vibicaria</i> (Clereck, 1759)	Hafner, 1910	E <i>vibex</i> sled biča, udarca. 2 <i>pasasti</i> glede na rdeče pasove na krilih.	pasasti rdečnik

	<i>Rhoptria</i> Guenee [1858]		<i>E rhops</i> grm, grmovje, <i>bosko</i> jesti, hraniti se. 2 <i>brškinar</i> glede na brškin, <i>Cistus</i> sp., hranilno rastlino gosenic.	brškinar
7583	<i>R. asperaria</i> (Hübner, [1817])	Hafner, 1911b	<i>S asper hrapav, raskav</i> ; glede na hrapavo, raskavo popviršno kril.	raskavi brškinar
	<i>Schistosteg</i> Hübner, [1825]		<i>S shiso</i> cepiti; po značilnosti vzorca, da se pasovi na krilih žarkasto cepijo. 2 <i>mlečkar</i> po mlečku, <i>Euphorbia</i> sp., hranilni rastlini gosenic.	mlečkar
8635	<i>S. decussata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910	<i>S decusso</i> navkrižno razdeliti. 2 žarkasto razdeljeno v vse smeri, <i>žarkasti</i> glede na značilnost vzorca na krilih.	žarkasti mlečkar
	<i>Sciadia</i> Hübner, 1822		<i>S skia</i> senca; nejasen metuljarski pomen. 2 <i>visokogornik</i> glede na življenjsko okolje v visokih gorah med 2000 in 4000 m.	visokogornik
7752c	<i>S. slovenica</i> Leraut, 2008	Leraut, 2008	<i>slovenski</i> glede na tipično lokaliteto Triglav in razširjenost v Sloveniji, delno tudi v Avstriji in Italiji; endemit triglavskega pogorja.	slovenski visokogornik
7752	<i>S. tenebraria</i> (Esper, [1806])	Hafner, 1911b	<i>E tenebrae</i> tema; <i>tenebratus</i> senčni; glede na temno, skoraj črno, barvo barvo kril.	temni visokogornik
7895	<i>S. zelleraria</i> (Freyer, [1836])	Hafner, 1911b	E P. C. Zeller (1808 - 1883), nemški lepidopterolog. 2 <i>alpski</i> glede na geografsko območje razširjenosti v Alpah.	alpski visokogornik
	<i>Scopula</i> Schrank, 1802		<i>E scopula</i> mala metla, metlica; zaradi šopov lusk na hrbtini strani golenic samcev nekaterih vrst tega rodu.	metlarček
8039	<i>S. caricaria</i> (Reutti, 1853)	Hafner, 1910	<i>S carex, caricis</i> ; bot. rod <i>Carex</i> , šaš; po močvirnem življenjskem okolju. 2 <i>svilnati</i> glede na značilno barvo kril.	svilnati metlarček
8079	<i>S. confinaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Carnelutti, 1992a	<i>S confinis</i> sosednji, podoben, soroden. 2 <i>južni</i> glede na geografsko razširjenost v južni Evropi.	južni metlarček
8038	<i>S. corvivalaria</i> (Kretschmar, 1862)	Gomboc, 1999	<i>S corvivalis</i> potočni, ki pripada potoku; glede na močvirne travnike, ki so življenjsko okolje te vrste.	močvirni metlarček
8051	<i>S. decorata</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Hafner, 1910	<i>E decoratus</i> , olepšan, okrašen; glede na značilni vzorec kril.	okrašeni metlarček
8072	<i>S. emutaria</i> (Hübner, [1809])	Carnelutti, 1971	<i>E emuto</i> spremeniti se; verjetno zaradi sprembe barve. 2 <i>primorski</i> glede na razširjenost v Sloveniji na obalnih slaniščih.	primorski metlarček
8068	<i>S. flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Hafner, 1910	<i>S flaccidus</i> medli, motni, kalni, brez leska. Glede na značilnosti vzorca kril.	motni metlarček
8069	<i>S. floslactata</i> (Haworth, [1809])	Hafner, 1910	<i>E flos</i> cvetlica, cvet; <i>lactis</i> mlečni; glede na osnovno barvo kril.	mlečni metlarček
8062	<i>S. imitaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1910	<i>E imitor</i> posnemanje, oponašanje; verjetno zaradi podobnosti z vrsto <i>Timandra griseata</i> . 2 <i>okrastr</i> glede na značilno barvo.	okrastr metlarček
8036	<i>S. immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	<i>S immoratus</i> ostali, preostali, ki je ostal iz rodu <i>Acidalia</i> . 2 <i>pepelasti</i> glede na pepelasto sivo barvo kril.	pepelasti metlarček

8064	<i>S. immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>immutatus</i> nespremenljiv; glede na to, da so krila na zgornji in spodnji strani enako obarvana.	enobarvni metlarček
8060	<i>S. incanata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>incanus</i> siv, sivkast; glede na osnovno barvo kril.	sivkasti metlarček
8061	<i>S. luridata</i> (Zeller, 1847)	Hafner, 1910	E <i>luridus</i> bledi, svetlo rumeni; glede na osnovno barvo kril.	bledi metlarček
8059	<i>S. marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	Hafner, 1910	E <i>margo, marginis</i> rob; <i>punctum</i> pika, pega; glede na izrazite temne pike na zunanjem robu kril.	robopiki metlarček
8040	<i>S. nemoraria</i> (Hübner, [1799])	Hoffmann & Klos, 1917	E <i>nemus, nemoris</i> gozd, gaj; glede na življenjsko okoljke metuljev. 2 <i>beli</i> glede na barvo kril.	beli metlarček
8042	<i>S. nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	E <i>niger</i> črn, <i>punctum</i> pika; <i>črnopiki</i> glede na značilni vzorec kril.	črnopiki metlarček
8045	<i>S. ornata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	E <i>ornatus</i> okrašen, olepšan. 2 <i>Scopolijev</i> glede na Scopolija, ki je vrsto opisal po primerkih s Kranjske.	Scopolijev metlarček
8054	<i>S. rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	E <i>robigo, rubigino</i> rjast; glede na osnovno rjasto barvo kril.	rjasti metlarček
8048	<i>S. submutata</i> (Treitschke, 1828)	Hafner, 1910	E <i>sub-</i> pod, ob, skoraj kot; <i>mutatus</i> sprememba, spremenjen; skoraj tak, podoben kot <i>mutata</i> . 2 <i>pisani</i> glede na pisani vzorec.	pisani metlarček
8070	<i>S. subpunctaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Hafner, 1910	E <i>sub-</i> pod, ob, skoraj kot; je podoben vrsti <i>punctaria</i> . 2 <i>kremasti</i> glede na svetlo kremasto barvo kril.	kremasti metlarček
8067	<i>S. ternata</i> (Schränk, 1802)	Hafner, 1910	E <i>terni</i> trojni, trikratni; glede na tri izrazite prečne črte na krilih.	tročrti metlarček
8041	<i>S. umbelaria</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1910	S <i>umbella</i> pomanjševalnica od <i>umbra</i> senca; <i>senčni</i> glede na kot senca rahle prečne črte.	sivočrti metlarček
8043	<i>S. virgulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	E <i>virgulatus</i> progasti, črtasti; 2 <i>rjavočrti</i> glede na značilni vzorec kril.	rjavočrti metlarček
	<i>Scotopteryx</i> Hübner, [1825]		E <i>scotos</i> tema, temačno; glede na temne, senčne barve na sprednjih krilih.	temnikar
8236	<i>S. bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	E <i>bi-</i> dva; <i>punctum</i> pika; glede na dve črni diskalni piki na krilih.	dvopiki temnikar
8239	<i>S. chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>Chenopodium</i> bot. rod metlika; glede na hranilno rastlino gosenic.	metlikin temnikar
8232	<i>S. coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hafner, 1910	S <i>coarctos</i> zožiti se, zožen; glede na ozki osrednji trak in ozke pasove na krilih.	ozkotraki temnikar
08243a	<i>S. ignorata</i> Huemer & Hausmann, 1998	Lasan, 2000	E <i>ignoratus</i> neznani, prezrti. Glede na to, da je bila vrsta dolgo prezrta in zelo pozno odkrita.	prezrti temnikar

8241	<i>S. luridata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910	<i>E. luridus</i> blede; svetli; glede na barvo sprednjih kril. 2 <i>sivkasti</i> glede na osnovno barvo kril.	sivkasti temnikar
8229	<i>S. moeniata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	<i>E. moenia</i> mestno obzidje, obzidan; glede na obrobjeno osrednje polje. 2 <i>Scopolijev</i> glede na Scopolija, ki je vrsto opisal na Kranjskem.	Scopolijev temnikar
8240	<i>S. mucronata</i> (Scopoli, 1763)	Carnelutti, 1992a	<i>E. mucronatus</i> koničasti, glede na koničasti vrh kril.	koničasti temnikar
	<i>Selenia</i> Hübner, [1823]		<i>E. selene</i> mesec, luna; glede na lunaste lise na krilih.	lunar
7641	<i>S. dentaria</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. dens, dentis</i> zob, glede na zobate konice kril. 2 <i>tročrti</i> glede na tri prečne črte na sprednjih krilih.	tročrti lunar
7642	<i>S. lunularia</i> (Hübner, 1788)	Hafner, 1911b	<i>E. lunaria</i> lunica, glede na lunicam podobne okrogle lise na krilih. 2 <i>dvočrti</i> glede na dve prečni črti na sprednjih krilih.	dvočrti lunar
7643	<i>S. tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911b	<i>E. tetra</i> štiri, <i>lunaria</i> lunica, glede na štiri lunasta znamenja na krilih.	četverni lunar
	<i>Selidosema</i> Hübner, [1823]		<i>S. selis</i> prazni prostor, <i>sema</i> znak, <i>znamenje</i> ? 2 <i>pasar</i> glede na široki temni zunanji rob ali pas na krilih.	pasar
7767	<i>S. brunnearia</i> (De Villers, 1789)	Hafner, 1911b	<i>E. brunneus</i> rjav, rjavkast, glede na osnovno barvo kril.	rjavkasti pasar
7768	<i>S. plumaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Carnelutti, 1992a	<i>E. plumbus</i> svinec; glede na svinčeno sivo barvo.	sivkasti pasar
	<i>Siona</i> Duponchel, 1829		<i>E. Sion</i> domnevno po gori Sion; S domnevno po bot. rodu <i>Siunsp.</i> , koščica. 2 <i>črtalar</i> po značilnih črnih črtah na belih krilih.	črtalar
7916	<i>S. lineata</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1911b	<i>E. linea</i> črta, linija; po značilnih črnih, žilah na belih krilih.	beli črtalar
	<i>Spargania</i> Guenee, [1858]		<i>E. Sparganium</i> bot. rod ježek? 2 <i>vrbovčar</i> glede na vrbovec, <i>Epilobium</i> sp., eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	vrbovčar
8417	<i>S. luctuata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. luctus</i> žalost, žalovanje. 2 <i>črni</i> glede na prevladujočo črno barvo kril.	črni vrbovčar
	<i>Stegania</i> Guenee, 1845		<i>E. stegamos</i> skriti, pokriti; ker gosenice živijo skrito življenje. 2 <i>topolar</i> glede na topol, <i>Populus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	topolar
7532	<i>S. cararia</i> (Hübner, [1790])	Hafner, 1911b	<i>S. carus</i> domnevno vreden, cenjen; glede na lep, "dragocen" vzorec na krilih.	lepi topolar
7534	<i>S. dilectaria</i> (Hübner, [1790])	Lesar, 1998a	<i>S. dilectus</i> cenjeni, dragoceni; verjetno glede na redkost metuljev te vrste.	dragoceni topolar
7533	<i>S. trimaculata</i> (De Villers, 1789)	Hafner, 1911b	<i>E. tri</i> - tri, <i>macula</i> pega, lisa; ki ima tri pege na sprednjem robu kril.	tropegi topolar

	<i>Synopsis</i> Hübner, [1825]		S. <i>synopsis</i> pregled; nejasen metuljarski pomen. 2. <i>rjavinar</i> glede na rjave prečne črte, ki tvorijo vrstno specifični vzorec.	rjavinar
7733	<i>S. sociaria</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911b	<i>S. socius</i> tovariš, sodrug; se nanaša na podobnost z vrstami iz rodu <i>Boarmia</i> . 2. <i>stepski</i> glede na stepsko, življenjsko okolje.	stepski rjavinar
	<i>Tephronia</i> Hübner, [1825]		<i>E. tephros</i> pepelne barve; glede na osnovno barvo kril. 2. <i>serec</i> , žival sive barve; glede na značilno barvo kril.	serec
7812	<i>T. sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	Carnelutti, 1992a	<i>S. septia</i> sipa, sipine barve. 2. <i>lišajski</i> glede na lišaje, hranilne rastline gosenic.	lišajski serec
	<i>Thalera</i> Hübner, [1823]		<i>E. thalerus</i> cvetoč, svež, mladosten. 2. <i>resarček</i> glede na šope resic na robovih kril.	resarček
7998	<i>T. fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910	<i>E. fimbriata</i> resice, resast, z resami obrobljen; glede na šope rdečkastih resic na robovih kril. 2. <i>zeleni</i> glede na barvo kril.	zeleni resarček
	<i>Thera</i> Stephens, 1831		E otok v Egejskem morju; brez metuljarskega pomena. 2. <i>igličar</i> ker se gosenice hranijo z iglicami iglastega drevja.	igličar
8358	<i>T. britannica</i> (Turner, 1925)	Carnelutti, 1989	<i>E. britannica</i> glede na nahajališče v Britaniji. 2. <i>nazobčan</i> glede na nazobčane tipalnice v primerjavi s <i>T. variata</i> .	nazobčani igličar
8361	<i>T. cognata</i> (Thunberg, 1792)	Hafner, 1911a	<i>E. cognatus</i> soroden po rojstvu; glede na sorodni vrsti <i>T. obeliscata</i> in <i>T. variata</i> . 2. <i>gorski</i> glede na gorsko življenjsko okolje.	gorski igličar
8364	<i>T. cupressata</i> (Geyer, [1831])	Carnelutti & Micheli, 1955	<i>E. Cupressus sempervirens</i> vednozeleni cipresa, značilna hranilna rastlina gosenic.	cipresin igličar
8362	<i>T. juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	<i>E. juniperata</i> brinov; glede na brin, <i>Juniperus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	brinov igličar
8356	<i>T. obeliscata</i> (Hübner, 1787)	Hafner, 1910	<i>S. obeliscos</i> obelisk, lok; glede na obliko mediane lise.	lokasti igličar
8357	<i>T. variata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910	<i>E. variatus</i> spremenljiv; glede na spremenljivi vzorec na krilih metuljev.	spremenljivi igličar
8360	<i>T. vetustata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910	<i>E. vetustus</i> star, staričav. 2. <i>črnolisi</i> glede na črne lise na pretežno belih krilih.	črnolisi igličar
	<i>Theria</i> Hübner, [1825]		<i>E. thereios</i> divja žival, divjak? 2. <i>črnotmar</i> po črnem trnu, <i>Prunus spinosa</i> , značilni hranilni rastlini gosenic.	črnotmar
7834	<i>T. primaria</i> (Haworth, [1809])	Lesan, 1997	<i>E. primarius</i> prvi, zgodnji. 2. <i>zimski</i> , glede na letni čas pojavljanja metuljev pozimi, že januarja ali februarja.	zimski črnotmar
7833	<i>T. rupicaparra</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. rupicapra</i> divja koza, gams; glede na podobno barvo. 2. <i>zgodnji</i> glede na letni čas pojavljanja v zgodnji pomladi.	zgodnji črnotmar
	<i>Thetidia</i> Boisduval, 1840		<i>E. Thetis</i> boginja morja; brez metuljarskega pomena. 2. <i>smaragdnik</i> glede na smaragdno zeleno barvo kril.	smaragdnik

7975	<i>T. smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	Hafner, 1910	E <i>smaragdus</i> smaragd, žlahtni kamen; glede na barvo kril. 2 <i>belopiki</i> glede na značilno belo piko na srednjih krilih.	belopiki smaragdnik
	<i>Timandra</i> Duponchel, 1829		E <i>Timandra</i> hči Tindareusa; brez metuljarskega pomena. 2 <i>kisličar</i> glede na eno od značilnih hranilnih rastlin.	kisličar
8028	<i>T. comae</i> A. Schmidt, 1931	Hafner, 1910	D <i>komao</i> z dolgimi lasmi, ponašati se? 2 <i>premočrti</i> glede na poudarjeno ravno črto preko vseh kril.	premočrti kisličar
	<i>Trichopteryx</i> Hübner, [1825]		E <i>trikhous</i> trojka, trojni; glede na dodatno krilno krpco, tretje krilo.	trokrilec
8668	<i>T. carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	Hafner, 1910	E <i>Carpinus</i> bot. rod gaber; ena od hranilnih rastlin gosenic.	gabrov trokrilec
8667	<i>T. polycommata</i> (Denis & Schiffermüller), 1775)	Hafner, 1910	E <i>polus</i> mnogo; <i>komma</i> proga, črta, vejica, znamenje; z mnogimi črtami.	mногоčrti trokrilec
	<i>Triphosa</i> Stephens, 1829		E <i>tri</i> - tri, trojni; <i>phaos</i> , <i>phos</i> blesk, sijaj; glede na močan lesket ali sijaj kril.	sijajnež
8428	<i>T. dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910	E <i>dubitatus</i> dvomljiv; ima dvomljiv taksonimski položaj. 2 <i>rjavkasti</i> glede na osnovno barvo kril.	rjavkasti sijajnež
8427	<i>T. sabaudia</i> (Duponchel, [1831])	Hafner, 1910	S <i>Sabaudia</i> Savoja, savojski, glede na geografsko območje nahajanja v Franciji. 2 <i>sivkasti</i> glede na osnovno barvo kril.	sivkasti sijajnež
	<i>Venusia</i> Curtis, 1839		E <i>Venus</i> boginja ljubezni in lepote. 2 <i>lepoticnik</i> po lepem in ljubkem videzu metuljev tega rodu.	lepoticnik
8650	<i>V. blomeri</i> (Curtis, 1832)	Camelutti & Micheli, 1955	E C. Blomer britanski zbiralec (1783 - 1835). 2 <i>brestov</i> po brestu, <i>Ulm</i> usp., značilni hranilni rastlini gosenic.	brestov lepoticnik
8652	<i>V. cambrica</i> Curtis, 1839	Hafner, 1911a	E <i>Cambria</i> Cymruinska pokrajina v Angliji, tipska lokaliteta. 2 <i>jerebikin</i> po jerebiki, <i>Sorbus</i> sp., značilni hranilni rastlini gosenic.	jerebikin lepoticnik
	<i>Xanthorhoe</i> Hübner, 1825		E <i>xanthos</i> rumen; <i>rhoe</i> tok (vodni), teči, potok. 2 <i>listarček</i> glede na lastnost metuljev tega rodu, da radi posedajo po listih.	listarček
8248	<i>X. biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	Hafner, 1911a	E <i>bi</i> - dva, dvojni; <i>rivus</i> tok, potok, vijuga; se nanaša na dve valoviti prečni črti v bazalnem delu krila.	dvočrti listarček
8249	<i>X. designata</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1911a	E <i>designo</i> označiti, določiti; glede na poudarjen vzorec sredinskega traku.	poudarjeni listarček
8253	<i>X. ferrugata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911a	E <i>ferrugo</i> železna rja; glede na barvo osrednjega traku.	rjasti listarček
8256	<i>X. fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911a	E <i>fluctus</i> val, valovit; glede na valovite prečne črte na krilih.	valoviti listarček
8259	<i>X. incursata</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911a	S <i>incursatus</i> utrujen, načet; glede na slabo vidne prečne črte.	sivkasti listarček

8255	<i>X. montanata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>montanus</i> gora, gorski; glede na značilno življenjsko okolje.	gorski listarček
8254	<i>X. quadrifasciata</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1911a	E <i>quadri</i> štiri; <i>fascia</i> trak; glede na obliko srednjega traku, ki lahko sopominja na število štiri.	četverni listarček
8252	<i>X. spadicearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911a	E <i>spadix</i> orehovorjav; glede na barvo osrednjega dela sredinskega traku.	rjavi listarček
	<i>Yezognophos</i> Matsumura, 1927		<i>Yezognophos</i> nejasni metuljarski pomen. 2 <i>naskalnik</i> glede na skalno življenjsko okolje v visokih gorah do 2800 m visoko.	naskalnik
7889	<i>Y. dilucidaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>dilucidaria</i> čist, jasen, razločen. 2 <i>modrikasti</i> glede na barvo kril.	modrikasti naskalnik
7891	<i>Y. serotinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1911b	E <i>serotinus</i> pozni, ki pozno pride; glede na letni čas pojavljanja? 2 <i>okrasti</i> glede na barvo kril.	okrasti naskalnik
7893	<i>Y. vitaria</i> (Thunberg, 1792)	Hafner, 1911b	S <i>vitta Binde</i> "živi rob"; glede na temni rob srednjega polja.	temnorobi naskalnik

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Entomologica Slovenica](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Jez Matjaz, Lavbic Jernej

Artikel/Article: [SEZNAM SLOVENSКИH IMEN V SLOVENIJI Å½IVECIH PEDICEV \(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE\) 67-112](#)