



**SEZNAM SLOVENSКИH IMEN V SLOVENIJI ŽIVEČIH NOČNIH
METULJEV ENAJSTIH DRUŽIN: LEPIDOPTERA: BRAHMAEIDAE,
CIMELIIDAE, DREPANIDAE, ENDROMIDAE, EUTELIIDAE,
LASIOCAMPIDAE, LIMACODIDAE, NOLIDAE, NOTODONTIDAE,
SATURNIIDAE IN SPHINGIDAE**

Matjaž JEŽ¹ in Jernej LAVBIČ²

¹Velika Mislinja 15, 2382 Mislinja; e-mail: matjaz.jez@gmail.com

²Ljubljanska cesta 18, 3000 Celje; e-mail: jernej.lavbic@gmail.com

Izvleček – Predstavljen je seznam nočnikov iz družin Brahmaeidae, Cimeliidae, Drepanidae, Endromidae, Euteliidae, Lasiocampidae, Limacodidae, Nolidae, Notodontidae, Saturniidae in Sphingidae Slovenije z znanstvenimi in slovenskimi binarnimi imeni, ki obsega 76 rodov in 131 vrst. Izhodišče tega seznama je Hafnerjev seznam metuljev Kranjske iz leta 1910, ki je dopolnjen s Carneluttijevim seznamom iz leta 1992. Seznama sta favnistično dopolnjena ter taksonomsko posodobljena tudi z drugimi javno dostopnimi in lastnimi podatki. Osnovni namen članka je predstaviti slovenska binarna imena nočnih metuljev teh enajstih družin in kratko zgodovino njihovega nastajanja v Sloveniji. Določena so bila po načelu Linnéjeve binarne nomenklature ob upoštevanju etimologije latinskih imen in lastnosti metuljev.

KLJUČNE BESEDE: Lepidoptera, Nocturna, Slovenija, etimologija, slovenska imena.

Abstract – A CHECKLIST OF SLOVENIAN NAMES OF ELEVEN FAMILIES OF MOTHS LIVING IN SLOVENIA: LEPIDOPTERA: BRAHMAEIDAE, CIMELIIDAE, DREPANIDAE, ENDROMIDAE, EUTELIIDAE, LASIOCAMPIDAE, LIMACODIDAE, NOLIDAE, NOTODONTIDAE, SATURNIIDAE AND SPHINGIDAE

A checklist of eleven small moths families of Slovenia with scientific and Slovenian binary names is presented, comprising 76 genera and 131 species. The list is based on Hafner's 1910 list of butterflies of Carniola, supplemented by Carnelutti's 1992 list. The two lists were updated faunistically and taxonomically using other publicly available and our own data. The main purpose of this paper is to present the Slovenian vernacular names of eleven small moths families and the method used to derive them. A brief history of the development of Slovenian names is also presented. Slovenian names were determined according to the principle of

Linné's binary nomenclature, taking into account the etymology of the scientific names and a nature of moths.

KEY WORDS: Lepidoptera, Nocturna, Slovenia, etymology, Slovenian vernacular names

UVOD

Ta prispevek je nadaljevanje prispevkov o slovenskih imenih sovč (Noctuidae) (Jež in Lavbič, 2023a), erebid (Erebidae) (Jež in Lavbič, 2023b) in pedicev (Geometridae) (Jež in Lavbič, 2024). Zato nekaterih poglavij iz uvoda ne ponavlja. Seznam znanstvenih imen v Sloveniji živečih nočnikov enajstih malih družin je pripravil drugo imenovani avtor na osnovi javno dostopnih favnističnih in taksonomskih podatkov. Prvo imenovani avtor je pripravil etimologijo znanstvenih imen in slovenska binarna imena. Za lažje razumevanje posebnosti teh družin sva dodala še kratki pregled njihovih značilnosti.

Skupina enajstih malih družin je neformalna skupina nočnikov, ki je nastala z združitvijo malih družin, ki so ostale po obravnavi velikih družin; sovč, erebid in pedicev. Med njimi ni večje taksonomske sorodnosti, saj sodijo v pet različnih naddružin. Prva so **Bombycoidea** ali prelci v širšem pomenu besede, ki so še najbližje Linnéjevimi Bombyces in obsegajo družine Endromidae, Saturniidae, Brahmaeidae in Sphingidae. Tukaj so tudi prelci v ožjem pomenu besede, družina Bombycoidea z rodом *Bombyx* in vrsto *B. mori* ali sviloprežko. Ker sta družina in rod izključno azijska, so »prelci« v ožjem pomenu besede izgubili domovinsko pravico v evropski favni. Naslednje naddružine so še **Noctuoidea** z družinami Euteliidae, Nolidae in Notodontidae, **Drepanidea** z družinama Drepanidae in Cimeliidae, **Lasiocampidea** z družino Lasiocampidae in **Zygaenoidea** z družino Limacodidae.

Po morfoloških znakih najbolj izstopajo večji (Sphingidae). Zato je že Linné v svojem temeljnem delu *Systema naturae* leta 1758 metulje razdelil na tri velike skupine; Papiliones (dnevnički), Sphinx (vešči) in Phalaenae (molji). Do danes se je obdržalo Linnéjevo rodovno ime *Sphinx* (Linnaeus, 1758), družino Sphingidae pa je uvedel Pierre-André Latreille (1762–1833) leta 1802. Ostala rodovna imena v tej družini so prispevali drugi avtorji; prvo, *Macroglossum*, že Joannes Antonius Scopoli (1723–1788) leta 1777, kar osem pa jih je dodal Jacob Hübner (1761–1826) leta 1819. V skupini *Phalaena*, ki jo je Linné delil na sedem oddelkov, je za današnji prispevek pomemben oddelek Bombyces, ki označuje prelce v širšem pomenu besede. Originalno Linnéjevo ime je danes ohranjeno na ravni naddružine Bombycoidea s številnimi evropskimi družinami, rodovi in vrstami.

Tradicionalna delitev metuljev te skupine na »vešče in prelce« se je še dolgo obdržala v strokovni literaturi. Tako v enem od klasičnih metuljarskih del, *Die Schmetterlinge Mitteleuropas* (Forster in Wohlfarth, 1960), obsega tretji del »Spinner und Schwärmer«, s podnaslovom Bombyces und Sphinges, prelci in vešči. Pod tema imenoma je predstavljenih 22 družin, od katerih jih osem uvrščamo med metuljčke (Microlepidoptera), dve, Lymantriidae in Arctiidae, pa med Erebidae. Preostale družine so ob manjši reorganizaciji in dopolnitvah združene v današnji skupini enajstih malih družin, ki so zelo heterogena skupina in jih obravnavamo skupaj zgolj iz praktičnih razlogov.

O RAZVOJU SLOVENSkih ZNANSTVENIH IMEN NOČNIKOV ENAJSIH MALIH DRUŽIN

Pionirsko delo Frana Erjavca (1834 – 1887)

Ključna dela Erjavca, v katerih je uporabil slovenska imena nočnih metuljev, so **Živalstvo, prirodoepis za nižje gimnazije in realke** (Pokorny/Erjavce, 1864), **Naše škodljive živali v podobi in besedi** (Erjavce, 1880) in **Prirodoepis živalstva s podobami** (Pokorny/Erjavce, 1881).

V prvi izdaji »Živalstva« omenja 10 vrst iz te skupine, kar je razmeroma veliko glede na njeno skromno številčnost v primerjavi s sovskimi ali pedici. To je povezano z dejstvom, da so ti metulji razmeroma veliki in kljub pretežno nočnemu življenju dovolj opazni in prepoznavni. Na prvem mestu so »somračniki« katerih ime uporablja v pomenu družine. Navede pet vrst vešcev za katera navede zanimiva slovenska imena. Tako uporabi *večernjak* kot sopomenko za rod *Sphinx* in *jezičar* za rod *Macroglossum*. Sledijo *prejci*, *obročar* ali *prsteničar* in *ponočni pavlinček*. Omenja tudi *svilnega prejca* ali *sviloprejko*, pri čemer se ponovno pokaže Erjavčeva prizadevanja za uvajanje enobesednih rodovnih imen. To je namreč ena od značilnosti slovenskega jezika, da skuša vsako stvar ali pojem izraziti z eno samo besedo. Leta 1880 omenja Erjavce v delu »Naše škodljive živali« samo pet vrst, saj med njimi ni veliko škodljivcev, leta 1881 pa se število poveča na 14, ker je Alois Pokorny (1826–1886) učbeniku dodal nekaj vrst. Zanimiv primer je *Sphinx ligustri*, ki ga 1864 imenuje po prevladujoči hranilni rastlini *kalinji večernjak*, leta 1881 pa zapiše enobesedno ime *kosteničar* po eni od hranilnih rastlin te polifage vrste.

Tabela 1: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen **nočnikov enajstih malih družin** iz treh Erjavčevih del. Imena so napisana v izvorni obliki.

Znanstveno ime	Pokorny/Erjavce 1864	Erjavce 1880	Pokorny/Erjavce 1881
<i>Sphinx Atrops</i>	smertoglavec		smrtoglavec
<i>Smerinthus ocellatus</i>	večerni pavlinček		večerni pavlinček
<i>Smerinthus tiliae</i>			lipov vešček
<i>Sphinx euphorbiae</i>	mlečkov večernjak		mlečkar, mlečkov vešček
<i>Sphinx ligustri</i>	kalinji večernjak		kosteničar
<i>Sphinx pinastri</i>		vešček borov	borov vešček
<i>Macroglossa stellatarum</i>	jezičar		velerilec
<i>Bombyx mori</i>	svilni prejec, sviloprejka		svilni prelec
<i>Gastropacha neustria</i>	obročar ali prstenica	prsteničar	prsteničar
<i>Gastropacha pini</i>	borovi prejec	prelec borov	borov prelec
<i>Cnethocampa pinivora</i>		sprevodnica borova	
<i>Gastropacha processionea</i> <i>Cnethocampa processionea</i>	prehodni prejec	sprevodnica hrastova	sprevodni prelec
<i>Saturnia pyri</i>	ponočni pavlinček		veliki nočni pavlinček
<i>Saturnia carpini</i>			mali nočni pavlinček
<i>Bombyx cinthia</i>			ajlantov prelec

Schwentnerjevi »Metulji v podobah«

Naslednje delo, ki je pomembno za razvoj slovenskih imen nočnikov, je Schwentnerjeva knjižica metulji v podobah. Izšla je leta 1907 (Anonimno 1907) kot prirejeni ponatis nemškega originala iz leta 1900 (Anonimno 1900) s slovenskimi, nemškimi in latinskimi imeni 129 vrst metuljev, med katerimi je 17 pripadnikov enajstih malih družin.

Tabela 2: Primerjalni prikaz latinskih in slovenskih imen **nočnikov enajstih malih družin** iz knjižice Metulji v podobah. Imena so napisana v izvorni obliki.

Slovenska imena	Latinska imena
srednji pujsek	<i>Sphinx Elpenor</i>
smrtoglavec	<i>Acherontia Atrops</i>
mlečkar	<i>Deilephila Euphorbiae</i>
večerni pavlinček	<i>Smerinthus Ocellatus</i>
topolov veščec	<i>Smerinthus Populi</i>
svetlinov veščec	<i>Pterogon Oenotherae</i>
velerilec	<i>Macroglossa Stellatarum</i>
čmrljevec	<i>Macroglossa Bombiliformis</i>
lunik ali lipov prelec	<i>Phalera Bucephala</i>
hrastolistni prelec	<i>Gastropacha Quercifolia</i>
borov prelec	<i>Gastropacha Pini</i>
mali nočni pavlinček	<i>Saturnia Carpini</i>
prsteničar	<i>Gastropacha Neustria</i>
hrastov prelec	<i>Lasiocampa Quercus</i>
topolov prelec	<i>Poecilocampa Populi</i>
travni prelec	<i>Cosmotriche Potatoria</i>
rujavi pavlinček ali beli T	<i>Aglia Tau</i>

Metulji Slovenije, Jurij Kurillo

Pomemben prispevek k razvoju slovenskih imen metuljev je dal tudi dr. Jurij Kurillo v delu Metulji Slovenije (1992), ki je praktični priročnik za prepoznavanje in opazovanje naših metuljev. Izdala ga je Državna založba Slovenije leta 1992. V njej je predstavljenih v sliki in besedi 21 vrst nočnikov iz enajstih malih družin.

Tabela 3: Seznam slovenskih in latinskih imen **nočnikov enajstih malih družin** iz knjige Metulji Slovenije. Imena so napisana v izvorni obliki.

Slovenska imena	Latinska imena
topolov veščec	<i>Laothoe populi</i>
lipov veščec	<i>Mimas tiliae</i>
borov veščec	<i>Hyloicus pinastri</i>
mali vinski veščec ali pujsek	<i>Deilephila porcellus</i>
velerilec	<i>Macroglossum stellatarum</i>
slakov veščec	<i>Herse convolvuli</i>
večerni pavlinček	<i>Smerinthus ocellata</i>
smrtoglavec	<i>Acherontia atrops</i>
veliki nočni pavlinček	<i>Saturnia pyri</i>
mali nočni pavlinček	<i>Eudia pavonia</i>
beli T ali rjavi pavlinček	<i>Aglia tau</i>
japonski prelec ali jamamaj	<i>Antheraea yamamai</i>
bukov prelec	<i>Stauropus fagi</i>
trepetlikova hrbtorožka	<i>Phoesia tremula</i>
kamelja hrbtorožka	<i>Ptilodon capucina</i>
javorjeva hrbtorožka	<i>Ptilodontella cuculina</i>
lunik ali mali lipov prelec	<i>Phalera bucephala</i>
rdečerepka	<i>Dasychira pudibunda</i>
slivova kokljica	<i>Odonestis pruni</i>
borov prelec	<i>Dendrolimus pini</i>
robidov prelec	<i>Macrothylacia rubi</i>

Kumulativna vsota vseh treh seznamov je 34 vrst, pet vrst pa je skupnih vsem trem seznamom: smrtoglavec, večerni pavlinček, velerilec in borov prelec.

Podatkovne zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Pomembni vir slovenskih imen metuljev sta tudi *Imenik slovenskih imen nevretenčarjev* (Trilar in sodelavci, 2023) in *Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev*

(Trilar in Knapič, 2023), ki jih ureja Prirodoslovni muzej Slovenije. V prvi zbirki je zbrana velika večina slovenskih imen metuljev objavljenih v literaturi, pri čemer je naveden tudi literaturni vir za vsako slovensko ime. V obeh zbirkah je predstavljenih tudi veliko nočnikov enajstih malih družin. Navedena so tudi slovenska imena, ki pa le izjemoma ustrezajo merilom binarnega imenovanja. Omenjeni zbirki sta najpopolnejši seznam slovenskih imen metuljev.

METODA DELA

Za določitev slovenskih binarnih imen nočnikov enajstih malih družin je bila uporabljena metoda postopnosti oziroma treh korakov.

Najprej je bila pridobljena etimološka razlaga veljavnih znanstvenih imen vseh obravnavanih družin, rodov in vrst. Pri tem je bila uporabljena etimologija po Spulerju (1908 in 1910) in Emmetu (1991). Za imena, za katera omenjena avtorja ne navajata etimologije, je bil pomen določen iz pomena latinskih imen s pomočjo grško-slovenskega (Dokler, 1999) in latinsko-slovenskega slovarja (Wiesthaler, 1993-2007). Tako so bila najprej določena slovenska imena družin, ki so vedno samostalniki v množini. Sledila je določitev rodovnih imen, ki so vedno samostalniki v ednini. V naslednjem koraku so bila na enak način določena slovenska imena vrst, ki so vedno pridevniki v ednini. Opisana metoda postopnosti določanja binarnih imen, tako da najprej določimo imena višjih taksonomskih skupin (družin, rodov), in šele potem imena vseh vrst določenega rodu, je tudi edina možna metoda določanja binarnih imen. Pri določanju imen družin, rodov in vrst so bile upoštevane tudi lastnosti metuljev kot so videz (barva, vzorec, oblika), hranilna rastlina, življenjsko okolje, dnevni ali letni čas pojavljanja in podobno. V nekaterih primerih se ime nanaša tudi na lastnosti gosenic.

REZULTATI

Rezultat dela je okvirni seznam v Sloveniji živečih nočnikov enajstih malih družin z znanstvenimi in slovenskimi binarnimi imeni. Vsa slovenska imena so binarna in temeljijo na Linnéjevi definiciji binarnega imenovanja. Seznam obsega 76 rodov in 131 vrst. Ker domnevava, da obstajajo dodatni, še neobjavljeni podatki o nočnikih iz te skupine, ocenjujeva, da bi lahko bilo njihovo dejansko število višje. Seznam je urejen v obliki tabele, ki je prikazana v prilogi 1.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se Barbari Zakšek in Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije za pobudo za pripravo slovenskih binarnih imen pedicev ter vsem drugim, ki so kakor koli prispevali k nastanku tega članka. Zahvaljujeva se tudi dr. Tomiju Trilarju za posredovane podatke iz podatkovnih zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

VIRI

- Anonimno**, 1900: *Schmetterlings-Atlas in Taschenformat: 129 Abbildungen in Farbendruck mit Angabe der deutschen und lateinischen Namen*, Mück's praktische Taschenbücher 3, Wien 1900: G. Szelinski & Comp. 32. str.
- Anonimno**, 1907: Književne novosti. Metulji v podobah. *Ljubljanski zvon*, 27 (6): 379.
- Carnelutti J.**, 1971: IV. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 19: 169-180.
- Carnelutti J.**, 1978: V. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 26 (2): 175-182.
- Carnelutti J.**, 1989: VI. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 37: 1-9.
- Carnelutti J.**, 1992a: Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. *Varstvo narave* (Ljubljana), 17 (17): 61-104.
- Carnelutti J.**, 1992b: Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji (Popravki/Errata). *Varstvo narave* (Ljubljana), 18 (18): 189-190.
- Carnelutti J., Bartol V., Sušec-Michieli Š.**, 1965: III. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 13: 69-76.
- Carnelutti J., Michieli Š.**, 1955: Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 4: 43-55.
- Carnelutti J., Michieli Š.**, 1960: II. Prispevek k favni lepidopterov Slovenije. *Biološki vestnik* (Ljubljana), 7: 113-124.
- Dokler A.**, 1999: *Grško slovenski slovar*. Cankarjeva založba Ljubljana, 848 str.
- Emmet A. M.**, 1991: *The scientific names of the British Lepidoptera – their history and meaning*. Harley Books, Colchester, England, 288 str.
- Erjavec F.**, 1880: *Naše škodljive živali v podobi in besedi*. Družba sv. Mohorja v Celovcu 1880, 336 str.
- Gomboc S.**, 2008: *Nočni metulji Ljubljanskega barja*. Pavšič J., (ur.), Ljubljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo: 67-74.
- Habeler H.**, 2010: Drei für Slowenien neue Schmetterlings-Arten aus den Gattungen Caloptilia, Catoptria und Earias (Lepidoptera: Gracillariidae, Pyralidae, Crambinae und Noctuidae). *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 18 (1): 66-70.
- Hafner J.**, 1910a: Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. *Carniola* (Ljubljana), 1 (1): 52-71.
- Hafner J.**, 1910b: Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. *Carniola* (Ljubljana), 1 (2): 136-155.
- Hafner J.**, 1910c: Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. *Carniola* (Ljubljana), 1 (3/4): 243-262.
- Hafner J.**, 1911a: Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. *Carniola* (Ljubljana), 3 (1): 43-75.
- Hafner J.**, 1911b: Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Großschmetterlinge. *Carniola* (Ljubljana), 2 (4): 290-309.

- Hoffmann F., Klos R.**, 1917: Die Schmetterlinge Steiermarks IV. *Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermar*, 53: 47-209.
- Jež M., Lavbič J.**, 2023a: Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih sovk (Lepidoptera, Noctuidae). *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 31 (1): 27 – 75.
- Jež M., Lavbič J.**, 2023b: Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih erebid (Lepidoptera, Erebidae). *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 31 (2): 163 – 184.
- Jež M., Lavbič J.**, 2024: Seznam slovenskih imen v Sloveniji živečih pedicev (Lepidoptera, Geometridae). *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 32 (1): v tisku.
- Karsholt O., Razowski J.**, 1996: *The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist*. Apoolo Books, Stenstrup 1996, 380 str.
- Kurillo J.**, 1992: *Metulji Slovenije*. Državna založba Slovenije 1992, zbirka Narava Slovenije, 220 str.
- Lasan M.**, 1997: Nekaj novih vrst v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 5 (1): 51-58.
- Lasan M.**, 2000: Nove vrste v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 8 (2): 137-146.
- Lesar T., Jež M.**, 2006: Drugi prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Lepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske. *Acta entomologica slovenica* (Ljubljana), 14 (2): 183-204.
- Pokorny A.**, 1864: *Živalstvo. Prirodopis za nižje gimnazije in realke*. Spisal A. Pokorny, poslovenil F. Erjavec. Celovec 1864, str. 92 – 97.
- Pokorny A.**, 1881: *Prirodopis živalstva s podobami. Za spodnje razrede srednjih šol*. Izdelal dr. Alojzij Pokorny, poslovenil Erjavec F. Matica slovenska v Ljubljani, str. 191 – 199.
- Rennwald E., Rodeland J.**, 2021: *Lepiforums-Europaliste. 1.2. Version 8.3.*: 20. 3. 2021.
- Spuler A.**, 1908: *Die Schmetterlinge Europas. I. Band*, Stuttgart 1908, 385 str..
- Spuler A.**, 1910: *Die Schmetterlinge Europas. II. Band*, Stuttgart 1910, 523 str..
- Stauder H.**, 1929: Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). 4. Abschnitt. Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae. *Ent. Anzeiger*, Wien 9 : 397-403.
- Trilar T., Knapič T.**, 2024: *Imenik slovenskih imen nevretenčarjev*. Prirodoslovni muzej Slovenije <http://www1.pms-lj.si/imenik/imenik.php/>. Dostop 20.1.2024.
- Trilar T., Štangelj M., Sivec I.**, 2024: *Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev. Prirodoslovni muzej Slovenije*. <http://www1.pms-lj.si/animalia/>. Dostop 20.1.2024.
- Wiesthaler F.**, 1993–2007: *Latinsko slovenski slovar, del 1–6*, Ljubljana: Kres. <https://fauna-eu.org>. Dostop 15.12.2023
<https://lepiforum.org>. Dostop 15.12.2023
<https://en.wikipedia.org>. Dostop 15.12.2023

PRILOGA 1:

Stolpec A – koda vrst po Karsholt & Razowski 1996; stolpec B – znanstveno ime družina/rod/vrsta in imena avtorjev latinskih imen po Rennwald & Dodeland 2021; stolpec C – viri; stolpec D – etimologija; stolpec E – slovensko ime. Okrajšave v stolpcu D pomenijo: S – Spuler (1908 in 1910), E – Emmet (1991), D – Dokler (1999) in W – Wiesthaler (1993-2007).

KR-Št.	Znanstveno ime	Vir	Etimologija	Slovensko ime
	BRAHMAEIDAE Swinhoe, 1892		<i>Brahma</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>S lemonios</i> tisti, ki se pojavljajo na vlažnih travnikih, travničarji; glede na značilno življenjsko okolje.	TRAVNIČARJI
	<i>Lemonia</i> Hübner, [1820]		<i>S Lemonia</i> ime rimskega plemena. Tudi <i>lemonios</i> , tisti, ki se pojavlja na vlažnih travnikih. 2 <i>travničar</i> glede na značilno življenjsko okolje.	travničar
6805	<i>L. dumi</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1910a	<i>S dumus</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>škržoličin</i> glede na škržolico, <i>Hieratium</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	škržoličin travničar
6806	<i>L. taraxaci</i> ([Denis & Schiffemüller], 1775)	Hafner, 1910a	<i>S Taraxacum</i> bot. rod regrati; glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	regratov travničar
	CIMELIIDAE Chretien, 1916		<i>Axia</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>mlečkarji</i> glede na razne mlečke, <i>Euphorbia</i> sp., značilne hranilne rastline gosenic; večine vrst te družine.	MLEČKARJI
	<i>Axia</i> Hübner, [1821]		<i>Axia</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>mlečkar</i> glede na mleček, <i>Euphorbia</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic tega rodu.	mlečkar
6872	<i>A. margarita</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1911b	<i>S margarita</i> perla, biser; glede na bisemasti lesk svetlečih lis na krilih.	bisemi mlečkar
	DREPANIDAE Boisduval, 1828		<i>S drepanon</i> srp, lunin krajec; glede na spasto ukrivljene konice sprednjih kril nekaterih rodov te družine.	SRPARJI
	<i>Achlya</i> Billberg, 1820		<i>E achlya</i> pridevniška izpeljanka iz <i>akhlus</i> megla, mrak; se nanaša na čas letanja v pogojih slabe vidljivosti. Sopomenka z <i>Noctua</i> .	meglenček
7498	<i>A. flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910c	<i>S flavus</i> rumen, <i>cornus</i> rog; glede na rumenkaste ipalnice.	rumenkasti meglenček
	<i>Asphalia</i> Hübner, [1821]		<i>S asfakes</i> trdno, zanesljivo? 2 <i>rdečkar</i> glede na rdeččrjavo obarvan ovrtnik in tudi take barvne lise na krilih.	rdečkar
7496	<i>A. ruficollis</i> ([Denis & Schiffemüller], 1775)	Hafner, 1910c	<i>S rufus</i> rdeč, <i>collum</i> vrat, grlo; se nanaša na rdeččrjavo obarvan vrat; <i>hrastov</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastov rdečkar
	<i>Citix</i> Leach, [1815]		<i>S xylix</i> vol z ukrivljenimi rogi? <i>E Citix</i> sin Agenora, kralja Fenicije. 2 <i>srebrnikar</i> glede na srebrne lise na sprednjih krilih.	srebrnikar
7512	<i>C. glauca</i> (Scopoli, 1763)	Hafner, 1910a	<i>E glaucus</i> modrosiv, glede na barvo lis na krilih; <i>-ata</i> končica za Geometridae, kamor je bila vrsta prvotno umesčena. 2 <i>lesketavi</i> glede na svetlikajoč vzorec na krilih.	lesketavi srebrnikar

	<i>Cymatophorina</i> Spuler, 1908		E iz <i>Cymatophora</i> - <i>tuma</i> val; <i>phoreo</i> nositi; tisti, ki nosi valove, je valovit; glede na valovite črte na krilih.	valovitež
7492	<i>C. diluta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Carnelutti & Micheli, 1955	E <i>dilutus</i> opran, spran; glede na bledo, sprano barvo kril. 2. <i>jezenski</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev te vrste.	jezenski valovitež
	<i>Drepana</i> Schrank, 1802		S <i>drepanon</i> srp, lunin krajec; glede na spasto oblikovane konice sprednjih kril.	srpar
7507	<i>D. curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	Hoffmann & Klos, 1915	S <i>curvatus</i> upognjen, ukrivljen; glede na obliko konic sprednjih kril. 2. <i>jelštin</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	jelštin srpar
7508	<i>D. falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	S <i>fals</i> , <i>falcis</i> srp, kljukar; glede na spasto obliko konice sprednjih kril. 2. <i>svetli</i> glede na svetlo obarvana krila v primerjavi z ostalimi vrstami tega rodu.	svetli srpar
	<i>Falcaria</i> Haworth, 1809		E <i>falcarius</i> srpar, izdelovalec sprov. 2. <i>kljukar</i> glede na kljuki ali spru podoben konec sprednjih kril.	kljukar
7501	<i>F. lacerinaria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>lactera</i> kuškar; zaradi domnevne podobnosti gosenice s kuščarjem. 2. <i>brezov</i> glede na brezo, <i>Betula</i> sp. značilno hranilno rastlino gosenic.	brezov kljukar
	<i>Habrosyne</i> Hübner, [1821]		E <i>habrosune</i> krasen, sijajen, bleščeč; glede na lepoto metuljev; <i>krasotee</i> glede na lep, krasen vzorec na krilih metuljev te vrste.	krasotee
7483	<i>H. pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Hafner, 1910c	E <i>purites</i> ognjeni, glede na mineral bakrov prst, ki povzroča ogenj ali lesk, tudi glede na rumenkasto barvo v vzorcu kril; ognjeni.	ognjeni krasotee
	<i>Ochropacha</i> Wallengren, 1871		E <i>okhros</i> svetlo rumen, bledi; pakhus debel, širok; verjetno glede na širok bledi prečni trak na krilih. 2. <i>sovkar</i> glede na sovkan podobno obliko telesa.	sovkar
7490	<i>O. duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1910c	E <i>duplaris</i> ki vsebuje dve enoti; <i>dvopiki</i> , glede na dve črni piki na sprednjih krilih.	dvopiki sovkar
	<i>Polyplaca</i> Hübner, [1821]		E <i>polus</i> mnogo, <i>ploke</i> plesti, sukati, zaplesti se; glede na številne zavite prečne črte. 2. <i>mahovnik</i> glede na značilno sivozelenkasto barvo ki spominja na mahove.	mahovnik
7494	<i>P. ridens</i> (Fabricius, 1787)	Hafner, 1910c	S smeječ, srečen? Nejasni metuljarski pomen. 2. <i>sivozeleni</i> glede na barvo kril.	sivozeleni mahovnik
	<i>Sabra</i> Bode, 1907		E <i>Sabra</i> neologizem, dubioza; beseda brez metuljarskega pomena. 2. <i>kavljar</i> glede na kavljasto oblikovane konice prednjih kril.	kavljar
7510	<i>S. harpagula</i> (Esper, [1786])	Hafner, 1910a	E <i>harpago</i> lovilni kavelj, sidro. 2. <i>lipov</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	lipov kavljar
	<i>Tethys</i> Oelsenhaimer, 1816		E <i>tethys</i> pridevniška izpeljanka iz Tethys, morska nimfa; brez metuljarskega pomena. 2. <i>sovar</i> glede na nočno življenje, ki spominja na sove.	sovar
7485	<i>T. ocellaris</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1910c	E <i>ocularis</i> očesni, okati, glede na obliko stigme na sprednjih krilih.	okati sovar
7486	<i>T. or</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1910c	E glede na obliko stigme na sprednjih krilih, katere oblika spominja na grški črki O in R. 2. <i>topolov</i> glede na hranilno rastlino gosenic.	topolov sovar

	<i>Tettheila</i>			<i>E tettheila</i> pomanjševalnica od <i>Tethea</i> ; <i>sovarček</i> .	sovarček
7488	<i>T. fluctuosa</i> (Hübner, [1803])	Carnelutti & Micheli, 1955		<i>E fluctuosa</i> valoviti, glede na obliko vzorca na sprednjih krilih.	valoviti sovarček
	<i>Thyatira</i> Ochsenheimer, 1816			<i>E Thyatira</i> antično mesto v Mali Aziji; brez metuljarskega pomena. <i>2 malinjakar</i> glede na malinjak, <i>Rubus idaeus</i> , eno od hranilnih rastlin gosenic.	malinjakar
7481	<i>T. batia</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910c		<i>E batia</i> robida, bot. rod <i>Rubus</i> . <i>2 rožnati</i> glede na značilno barvo vzorca na krilih.	rožnati malinjakar
	<i>Watsonalla</i> Minet, 1985			Watson primček (verjetno Watson J. R. 1874 - 1946). <i>2 kljunar</i> glede na kljunasto oblikovane konice sprednjih kril.	kljunar
7503	<i>W. binaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hafner, 1910a		<i>E bini</i> dvojica, par, glede na dve piki na sprednjih krilih.	dvopiki kljunar
7505	<i>W. cultraria</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1910a		<i>E culter</i> nož, rezilo, lemež pri plugu; <i>-aria</i> končnica za geometridae. <i>2 bukov</i> glede na bukev, <i>Fagus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	bukov kljunar
7504	<i>W. uncinula</i> (Borkhausen, 1790)	Lesan, 2000		<i>E uncus</i> kavelj, kljuka. <i>2 južni</i> glede na geografsko razširjenost v južni Evropi.	južni kljunar
	ENDROMIDAE Boisduval, 1828			<i>S endromis</i> ogrinjalo. Glede na vzorec kril, ki je videti, kot da so ogrinjani s pisanim volnenim ogrinjalom.	OGRINJALARJI
	<i>Endromis</i> Ochsenheimer, 1810			<i>S endromis</i> debela volnena obleka, ogrinjalo. Glede na vzorec kril, ki je videti, kot da je ogrinjen s pisanim volnenim ogrinjalom.	ogrinjalar
6784	<i>E. versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a		<i>S versicolor</i> raznobarven, pisan, barvit. <i>2 brezov</i> glede na brezo, <i>Betula</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	brezov ogrinjalar
	EUTELIIDAE Grote, 1882			<i>S euteles</i> nejasni metuljarski pomen. <i>2 rujevinarij</i> glede na rujevino, <i>Pistacia</i> sp., eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	RUJEVINARJI
	<i>Eutelia</i> Hübner, [1823]			<i>S euteles</i> nejasni metuljarski pomen. <i>2 rujevinar</i> glede na rujevino, <i>Pistacia</i> sp., eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	rujevinar
9023	<i>E. adularix</i> (Hübner, [1813])	Hafner, 1910b		<i>S adularix</i> laskavec, prilizovalec; glede na lep videz.	lepi rujevinar
	LASIOCAMPIDAE Harris, 1841			<i>E lasios</i> lasast, z lasmi; <i>kampe</i> larva; se nanaša na kosmate, lasate gosenice. <i>2 kofljice</i> se nanaša na podobnost sedečih metuljev s kokoljami.	KOKLJICE
	<i>Cosmotriche</i> Hübner, [1820]			<i>S cosmos</i> okras, nakit; trikhos lasje, dlake; ki je lepo dlakava, z lepimi dlakami.	dlakarka
6769	<i>C. lobulina</i> (Denis & Schiffmüller), 1775)	Carnelutti et al., 1965		<i>S lobulus</i> krpica, režanj. <i>2 lunolisi</i> glede na lunasto belo liso na sprednjih krilih (sinonim <i>C. lunigera</i> Esper, 1784).	lunolisa dlakarka
	<i>Dendrolinus</i> Germar, 1812			<i>E dendron</i> drevo; <i>linos</i> lakota, glad; glede na možnost skupinsko živečih gosenic, da ogolijo drevo. <i>2 prelka</i> glede na značilne zapredke gosenic.	prelka

6763	<i>D. pini</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>pinus</i> bor; glede na značilno hranilno rastlino gosenice te vrste.	borova prelka
	<i>Eriogaster</i> Gemar, 1810		E <i>erion</i> volna <i>gaster</i> trup, zadek. 2 volnortika glede na to, da imajo zlasti samice, izrazito dlakav zadnji del tupa.	volnortika
6741	<i>E. catax</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	S <i>catax</i> hromi, šepavi. Domnevno glede na slabo gibljivost metuljev, kar pa se ne ujema z njihovim dejanskim obnašanjem.	hroma volnortika
6738	<i>E. lanestrus</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>lanestrus</i> volhen, volhati; zaradi zelo dlakavega zadka samic. 2 <i>spomladanski</i> zaradi pojavljanja metuljev v zgodnji pomladi.	spomladanska volnortika
6740	<i>E. rimicola</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910a	S <i>rima</i> razpoka, raza; <i>colo</i> živeti, bivati; glede na gosenice, ki se skrivajo v razpokah na deblih. 2 <i>hrastov</i> glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic	hrastova volnortika
	<i>Euthrix</i> Mögen, 1830		E <i>eu</i> - v redu, dobro, zelo; <i>thrix</i> lasje, dlake; ki je zelo dlakava; se nanaša na izrazito dlakave gosenice. 2 <i>vodopivka</i> glede na to, da gosenice rade pijejo vodo na listih.	vodopivka
6767	<i>E. potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>potatorius</i> tisti, ki pije, pivce; glede na obnašanje gosenic, ki pijejo vodo dežnih ali rosinh kapljic na listih hranilnih rastlin. 2 <i>rjava</i> glede na barvo kril metuljev.	rjava vodopivka
	<i>Gastropacha Ochsenheimer, 1816</i>		E <i>gaster</i> trebuh, trup; <i>pachus</i> debel, močan; ki ima velik, močan trup. 2 <i>veletrupka</i> se nanaša na nesorazmerno velik trup metuljev te vrste.	veletrupka
6778	<i>G. populiifolia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910a	S <i>populus</i> bot. rod <i>Populus</i> topol; <i>folium</i> list; ker metulji v sedečem položaju po obliki spominjajo na topolov list.	topolovolistna veletrupka
6777	<i>G. quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>cuercus</i> hrast, bot. rod <i>Quercus</i> ; <i>folium</i> list; ker metulji v sedečem položaju po obliki spominjajo na hrastov list.	hrastovolistna veletrupka
	<i>Lasioampa</i> Schrank, 1802		E <i>lasios</i> lasast, z lasmi; kampe larva; se nanaša na kosmate gosenice. 2 <i>kokljica</i> se nanaša na podobnost sedečih metuljev s kokljjo.	kokljica
6752	<i>L. quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>quercus</i> hrast; bot. rod <i>Quercus</i> , glede na hrast, ki je ena od hranilnih rastlin te polifage vrste.	hrastova kokljica
6749	<i>L. trifolii</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910a	E <i>trifolii</i> detelja; bot. rod <i>Trifolium</i> , glede na deteljo, eno od hranilnih rastlin te polifage vrste.	deteljina kokljica
	<i>Macrothylacia</i> Rambur, [1866]		E <i>macros</i> velik, velik; <i>thulacos</i> vreča, torba; se nanaša na velik zapredek ali kokon.	zapredkarka
6755	<i>M. rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>rubi</i> , robida; bot. rod <i>Rubus</i> , značilna hranilna rastlina po navedbi Linneja.	robidova zapredkarka
	<i>Malacosoma</i> Hübner, [1820]		E <i>malacos</i> mehko, nežno; <i>soma</i> telo, trup; tisti, ki ima mehko ali nežno telo. 2 <i>prsteničarka</i> glede na način odlaganja jajčec na stebela rastlin.	prsteničarka
6746	<i>M. alpicola</i> (Staudinger, 1870)	Carnelutti, 1989	E <i>Alpes</i> - Alpe, gorovje v Evropi; <i>-colo</i> prebivati, stanovati; ki živi v Alpah, alpski.	alpska prsteničarka
6744	<i>M. castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>castrensis</i> izpeljanka iz camp laborišče, laboriti; se nanaša na šotarste zapredke ali gnezda v katerih živijo mlade gosenice.	gnezdeča prsteničarka

6745	<i>M. francoica</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Camelutti, 1971	<i>S. francoica</i> frankovski, francoski; glede na območje razširjenosti. 2 <i>rijav</i> glede na značilno barvo krl.	rijava prstenčarka
6743	<i>M. nevustria</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>E. nevustria</i> staro ime za del zahodne Francije; glede na območje razširjenosti. 2 <i>pisani</i> glede na pisane vzorce krl v primerjavi z ostalimi vrstami tega rodu.	pisana prstenčarka
	<i>Odonestis</i> Germar, 1812		<i>S. odous</i> zob. zobati; glede na nazorččen zunanji rob krl. 2 <i>slivarka</i> glede na značilne hranilne rastline iz rodu <i>Prunus</i> , sliva.	slivarka
6780	<i>O. pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>S. prunus</i> bot. rod <i>Prunus</i> ; se nanaša na črni tim, značilno hranilno rastlino gosenic te poltarge vrste, ki se hranijo tudi listi sliv in drugega sadnjega drevja.	nazorččana slivarka
	<i>Phylloidesma</i> Hübner, [1820]		<i>E. phyllon</i> list, <i>desmos</i> vez, <i>povezava</i> ; 2 listarka glede na podobnost sedečih metuljev z listi.	listarka
6773	<i>P. tremulifolia</i> (Hübner, [1810])	Hafner, 1910a	<i>E. tremulifolia</i> - <i>tremula</i> trepetlika (<i>Populus tremula</i>); <i>folia</i> list; glede na podobnost z listi trepetlike.	trepetlikina listarka
	<i>Poecilocampa</i> Stephens, 1820		<i>E. poikilos</i> spremenljiv, <i>kampe</i> gosenica; glede na spremenljive gosenice. 2 <i>ozinka</i> glede na letni čas pojavljanja metuljev.	ozinka
6729	<i>P. alpina</i> (Frey & Wulschlegel, 1874)	Hafner, 1910a	<i>E. alpina</i> Alpe, gorovje v Evropi; se nanaša na območje pretežne geografske razširjenosti. 2 <i>macesnova</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	macesnova ozinka
6728	<i>P. populi</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>E. populi</i> bot. rod <i>Populus</i> topol, značilna hranilna rastlina gosenic.	topolova ozinka
	<i>Trichiura</i> Stephens, 1828		<i>E. thrix</i> , <i>trichos</i> lasje, <i>diak</i> ; <i>aura</i> rep, zadnji del telesa, <i>zadek</i> ; <i>diakorepka</i> glede na šope dolgih diak po telesu.	diakorepka
6731	<i>T. crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>E. Crataegus</i> bot. rod glog; glede na glog, značilno hranilno rastlino gosenic.	glogova diakorepka
	LIMACODIDAE Duponchel, 1845		<i>E. Limax</i> polž, glede na sploščene gosenice s kratkimi nogami, ki so podobne polžem.	POLŽARJI
	<i>Apoda</i> Haworth, 1809		<i>E. a-</i> zanikanje nečesa, brez, <i>pous</i> <i>podos</i> , noga, stopalo; ki je brez nog ali stopal. 2 <i>polžar</i> glede na sploščene gosenice s kratkimi nogami, ki so podobne polžem.	polžar
3907	<i>A. limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	Hafner, 1911a	<i>E. Limax</i> polž, glede na sploščeno gosenico s kratkimi nogami, ki je podobna polžu. 2 <i>hrastov</i> glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	hrastov polžar
	<i>Heterogenea</i> Knoch, 1783		<i>E. heteros</i> drugačen, drugi; <i>genus</i> <i>genus</i> rod; drugačen, drugega rodu. 2 <i>prasičkar</i> glede na podobnost gosenic s prasički, izopodnimi raki (Isopoda).	prasičkar
3912	<i>H. asella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911a	<i>E. Oniscus</i> <i>asellus</i> , prasiček, izopodni rak, Isopoda; glede na gosenice, ki so podobne prasičkom. 2 <i>rijavkasti</i> glede na barvo krl.	rijavkasti prasičkar
	NOLIDAE Brandt, 1847		<i>Nola</i> mesto v Campaniji, brez metuljarskega pomena. 2 <i>svilenke</i> , glede na svilnati lesk kokonov, ki so pritrjeni na podlago.	SVILENKE
	<i>Bena</i> Billberg, 1820		<i>Bena</i> brezpomenski neologizem; brez metuljarskega pomena. 2 <i>zelenokrilka</i> glede na značilno zeleno barvo srednjih krl.	zelenokrilka

10449	<i>B. bicolorana</i> (Fuesslin, 1775)	Hafner, 1911b	<i>E. bicolorana</i> bi- dva, <i>coloratus</i> obarvan; dvobarvni; glede na obarvanost kril. 2 <i>hrastova</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenci.	hrastova zelenokrilka
	<i>Eurias</i> Hübner, [1825]		<i>E ear-</i> pomlad; se nanaša na svetlo zeleno pomladno barvo lisja.	pomladinka
10456	<i>E. clorana</i> (Linnaeus, 1761)	Hafner, 1911b	<i>E chloros</i> svetlo zelen, <i>-ana</i> končnica za Tortricidae; kamor jo je Linne uvrstil. 2 <i>enobarvna</i> glede na enovito obarvanost sprednjih kril.	enobarvna pomladinka
10460	<i>E. insulana</i> (Boisduval, 1833)	Habeler, 2010	<i>E insula</i> otok; glede na tipično lokaliteto, otok v Indijskem oceanu; <i>-ana</i> končnica za Tortricidae; kamor jo je Boisduval uvrstil.	lisasta pomladinka
10459	<i>E. vernana</i> (Fabricius, 1787)	Carnelutti & Michieli, 1960	<i>S vernana</i> spomladanski, glede na svetlozeleno, pomladno barvo. 2 <i>črtasta</i> glede na značilni vzorec kril.	črtasta pomladinka
	<i>Meganola</i> Dyar, 1898		<i>E mega-</i> velik, velika nola; velika svilencičica; glede na velikost v primerjavi z rodom svilenciča.	svilenka
10425	<i>M. albulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>E albus</i> belkast; glede na osnovno barvo kril.	belkasta svilenka
10425a	<i>M. kolbi</i> (Daniel, 1935)	Lesar & Jež, 2006	<i>Kolb</i> primsek. 2 <i>rjavkasta</i> glede na osnovno bno barvo kril.	rjavkasta svilenka
10423	<i>M. strigula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1911b	<i>E strigula</i> majhna črta, črtica; glede na črtice na sprednjih krilih.	črtkasta svilenka
10422	<i>M. togantalis</i> (Hübner, 1796)	Carnelutti & Michieli, 1955	<i>S toga</i> , rimsko oblačilo, plašč. Biti oblečen v togo; ogrnjen, oplašen. 2 <i>dvopolna</i> glede na značilni vzorec sprednjih kril, ki je deljen v dva različno obarvana dela.	dvopolna svilenka
	<i>Nola</i> Leach, [1815]		<i>E Nola</i> mesto v Campaniji; brez metuljarskega pomena. 2 svilenčica glede na svilnati videz kokona.	svilenčica
10431	<i>N. aerugula</i> (Hübner, 1793)	Hafner, 1911b	<i>E aerugo</i> bakreni volk, zeleni volk; naj bi se nanašalo za zeleno barvo, ki pa je ti metulji nimajo. 2 <i>lisasta</i> glede na značilni vzorec sprednjih kril.	lisasta svilenčica
10437	<i>N. chlamitulalis</i> (Hübner, [1813])	Lesan, 1997	<i>E khlamus</i> plašč, prikrit; <i>tule</i> rame; nejasni metuljarski pomen. 2 <i>zobničina</i> glede na značilno hranilno rastlino, rumeno zobnico, <i>Odonites luteus</i> .	zobničina svilenčica
10430	<i>N. caricetis</i> (Treitschke, 1835)	Hafner, 1911b	<i>E caricis</i> brazgotina, praska; <i>-alis</i> je končnica za pyralidae. 2 <i>lišajski</i> glede na lišaje na deblih listnatih dreves, s katerimi se hranijo gosenci.	lišajski svilenčica
10429	<i>N. confusalis</i> (Herrich-Schäffer, [1847])	Hafner, 1911b	<i>E confusus</i> zmeden, zbežano; se verjetno nanaša na nejasni taksonomski položaji. 2 <i>gozdna</i> glede na listnat gozd, ki je značilno življenjsko okolje te vrste.	gozdna svilenčica
10435	<i>N. cristatula</i> (Hübner, 1793)	Hafner, 1911b	<i>E cristatus</i> greben, griva. 2 <i>šopkasta</i> glede na pokončne šopke lusk na sprednjih krilih.	šopkasta svilenčica
10427	<i>N. cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b	<i>E cucullus</i> kapuca, oglavnica; glede na termi bazalni del kril, ki v sedečem položaju metulja daje vtis kot da je pokrit s kapuco.	kapucasta svilenčica
10436	<i>N. subclamydula</i> Staudinger, 1870	Gomboc, 2008	<i>E sub-</i> nekaj, nekoliko; ki je podobna vrsti <i>chlamitulalis</i> . 2 <i>vrednikova</i> glede na navadni vrednik, <i>Teucrium chamaedrys</i> , značilno hranilno rastlino gosenci.	vrednikova svilenčica

	<i>Nyctea</i> Hübner, 1822			E <i>nux nuctos</i> noč; domnevno tudi svil, mrak; <i>večernica</i> glede na letanje v večernem mraku.	večernica
10444	<i>N. asiatica</i> (Krulikovskiy, 1904)	Carnelutti et al., 1965		S <i>asiatica</i> azijska, se nanaša na območje razširjenosti.	azijska večernica
10443	<i>N. degenerana</i> (Hübner, [1799])	Hafner, 1911b		E <i>degenerana</i> izrojena, zaradi prvotne napačne uvrstitve v Tortricide.	pisana večernica
10441	<i>N. revayana</i> (Scopoli, 1772)	Hafner, 1911b		E Revay M., priimek, francoski entomolog (18. stoletje). 2 <i>spremenljiva</i> glede na izredno spremenljivost vzorca kril metuljev te vrste.	spremenljiva večernica
10445	<i>N. siciliana</i> (Fuchs, 1899)	Sicilije.		S <i>siculus</i> sicilski, siciljanski, ki izvira iz Sicilije. Se nanaša na nahajališče. 2 <i>južna</i> glede na prevladujočo razširjenost v Evropi.	južna večernica
	<i>Pseudips</i> Hübner, 1822			E <i>pseudus</i> napačni, lažni; <i>ips</i> črv, ki žre popke vinske trte. Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>bukovka</i> glede na bukev, <i>Fagus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	bukovka
10451	<i>P. prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1911b		E <i>prasinus</i> svetlozelen; glede na barvo sprednjih kril.	zelenkasta bukovka
	NOTODONTIDAE Stephens, 1829			E <i>notos</i> hrbet, <i>odontos</i> zob; glede na šop lusk na zadnjem robu sprednjih kril, ki raktat, ko so zložena, daje videz zoba na hrbtu. 2 <i>glede</i> na izraske na hrbtu gosenic.	HRBTOROŽKE
	<i>Cerura</i> Schrank, 1802			E <i>cerura</i> rog, <i>oura</i> rep; glede na gosenice, ki imajo na zadku razcepljene izraske v obliki rogov, vil ali vilic.	vilarka
8706	<i>C. erminea</i> (Esper, [1783])	Hafner, 1910a		S <i>Mustela erminea</i> hermelin; glede na belo - črno barvno kombinacijo, značilno za zimske barve hermelina.	hermelinska vilarka
8704	<i>C. vinula</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a		E <i>vinum</i> vino; glede na vinsko rdečo barvo nekaterih delov telesa gosenic.	rdečkasta vilarka
	<i>Clostera</i> Samouelle, 1819			E <i>closter</i> vreteno, steblo; glede na vilki zadek, ki se zoži v analnem segmentu. 2 <i>prirezanka</i> glede na kratka, ravno prirezana krila, značilnost metuljev tega rodu.	prirezanka
8700	<i>C. anachoreta</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a		E <i>anachoretex</i> puščavnik; glede na osamel način življenja gosenic v sprednjih listih vtih, značilnih hranilnih rastlin gosenic. 2 <i>rjavkasta</i> glede na značilno barvo kril.	rjavkasta prirezanka
8701	<i>C. anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a		S <i>anastomosis</i> povezava, spojitev; glede na povezanost dveh črt v vzorcu na sprednjih krilih. 2 <i>velika</i> glede na velikost v primerjavi z ostalimi vrstami tega rodu.	velika prirezanka
8698	<i>C. curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a		S <i>curtula</i> pomanjševalnica od <i>curtus</i> kratek, skrajšan, kratko prirezan; glede na kratka sprednja krila metuljev. 2 <i>sivkasta</i> glede na osnovno barvo kril.	sivkasta prirezanka
8699	<i>C. pigra</i> (Hufnagel, 1766)	Hafner, 1910a		E <i>piger</i> upirati se, upravic, počasnež; glede na larve, ki živijo v sprednjih listih in se malo gibajo ali premikajo. 2 <i>mala</i> glede na velikost, je najmanjša prirezanka.	mala prirezanka
	<i>Dicranura</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)			Dicranura neznan metuljarski pomen? 2 <i>dvorožka</i> glede na gosenice, ki imajo na zadku dva rožčkom podobna izraske.	dvorožka
8714	<i>D. ulmi</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a		S <i>Ulmus</i> brest, bot. rod <i>Ulmus</i> . Glede na brest, značilno hranilno rastlino gosenic te južnevropske vrste metuljev.	brestova dvorožka

	<i>Drymonia</i> Hübner, [1819]		E <i>drumus</i> mlado hrastje, hrastova goščava; glede na dob, <i>Quercus robur</i> , eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic vrst tega rodu.	dobovka
8721	<i>D. dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller), 1775	Hafner, 1910a	E <i>Dodona</i> , mesto v Epiru; brtez metuljarskega pomena. 2 <i>sivotraka</i> glede na značilni vzorec na srednjih krilih.	sivotraka dobovka
8723	<i>D. oblitterata</i> (Esper, [1785])	Carnelutti & Micheli, 1955	S <i>oblitteratus</i> ugasnjen, obrabljen; glede na obledelo rjavo barvo srednjih krlj, 2 <i>črnokota</i> glede na značilni vzorec črnega trikotnika na zgornjem robu srednjih krlj.	črnokota dobovka
8724	<i>D. querna</i> (Denis & Schiffermüller), 1775	Carnelutti & Micheli, 1955	S <i>quernus</i> pripadajoč hrastu, s hrastom povezan, hrastov. 2 <i>belolisa</i> glede na značilni vzorec na srednjih krilih.	belolisa dobovka
8722	<i>D. ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	Hafner, 1910a	E <i>rufus</i> rdeč, <i>cornus</i> rog; glede na svetlordečo barvo tipalnic.	rdečeroğa dobovka
8725	<i>D. velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	Hafner, 1910a	S <i>velites</i> neznan metuljarski pomen? 2 <i>južna</i> glede na prevladujočo razširjenost v Evropi.	južna dobovka
	<i>Furcula</i> Lamarck, 1816		E <i>furcula</i> majhne vilice; glede na dva izrasika na zadku gosenic.	vilčarka
8709	<i>F. bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	Hafner, 1910a	E <i>bi</i> -dva, <i>cuspis</i> ostra konica; glede na dva izrasika na zadku gosenic. 2 <i>brezin</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	brezina vilčarka
8710	<i>F. bifida</i> (Brahm, 1787)	Hafner, 1910a	E <i>bifidus</i> razklati, razcepiti; glede na dva izrasika na zadku gosenic. 2 <i>trepelikin</i> glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	trepelikina vilčarka
8708	<i>F. furcula</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1910a	E <i>furcula</i> majhne vilice; glede na dva izrasika na zadku gosenic. 2 <i>bukvin</i> glede na eno od hranilnih rastlin gosenic.	bukvina vilčarka
	<i>Gluphisia</i> Boisduval, 1828		E <i>gluphis</i> zarez na puščici, sedlo; neznan metuljarski pomen. 2 <i>logarka</i> glede na značilno življenjsko okolje obrečnih ali močvirskih topolovih logov.	logarka
8747	<i>G. crenata</i> (Esper, [1785])	Carnelutti & Micheli, 1955	S <i>crena</i> zarez; glede na narezane, prečne črte na srednjih krilih. 2 <i>sivkasta</i> glede na osnovno barvo krlj.	sivkasta logarka
	<i>Harpia</i> Ochsenheimer, 1810		E <i>Harpia</i> <i>Harpia</i> ; grška miološka pošast z glavo dekleta in telesom ujeđe. 2 <i>pošastnica</i> glede na značilni vzorec metuljev.	pošastnica
8760	<i>H. milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Hafner, 1910a	E J. A. Milhauser (18. stoletje), ki je vrsto upodobil. 2 <i>črna</i> glede na prevladujočo barvo krlj in telesa.	črna pošastnica
	<i>Leucodonta</i> Staudinger, 1892		E <i>leukos</i> bel, <i>odontos</i> zob; glede na beli šop lusk na zadnjem robu srednjih krlj, ki pri zloženih krilih tvori navidezni beli hrbtni zob.	belezobka
8736	<i>L. bicoloria</i> (Denis & Schiffermüller), 1775	Carnelutti, 1978	E <i>bi</i> -dva, <i>color</i> barva; dvobarvna, glede na bela krila na katerih je dvobarvni, oranžni in črni vzorec.	dvobarvna belezobka
	<i>Notodonta</i> Ochsenheimer, 1810		E <i>notos</i> hrbet, <i>odontos</i> zob; glede na šop lusk na zadnjem robu srednjih krlj, ki v mirujočem položaju daje videz "zoba" na hrbtu.	hrbtoroška
8716	<i>N. dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Hafner, 1910a	E <i>dromedarius</i> dromedar, kamela; glede na šope lusk na zadnjem robu srednjih krljih, ki v mirujočem položaju dajejo videz grbe.	grbasta hrbtoroška

8717	<i>N. torva</i> (Hübner, [1809])	Hafner, 1910a	<i>E. torvus</i> resen, strog, temen, mrk; glede na temno barvo kril.	temna hrbtorožka
8718	<i>N. tritophus</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a	<i>E. tritophus</i> tipkarska napaka, pravilno bi bilo <i>trilophus</i> , <i>tri-</i> tri, <i>lophos</i> čop, šop: s tremi čopi, tremi grbami.	trogrba hrbtorožka
8719	<i>N. ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>E. ziczac</i> latinizirano iz nemško <i>zickzack</i> ; <i>cickak</i> se nanaša na cikcakast videz gosenice v stranskem pogledu.	cikcakasta hrbtorožka
	<i>Odontostia</i> Hübner, [1819]		<i>E. odatus</i> , <i>odontos</i> zob, <i>osis</i> poriniti; glede na šop lusk na zadnjem robu sprednjih kril, ki se v zloženem položaju kažejo kot "zob".	nazobljenka
8741	<i>O. carmelita</i> (Esper, [1798])	Carmelutti, 1971	<i>E. carmelita</i> karmeličani, menhi, ki se oblačijo v rjava oblačila; brez metuljanskega pomena. 2 <i>gorska</i> glede na značilno življenjsko okolje.	gorska nazobljenka
	<i>Paradyrmonia</i> Kiriakoff, 1967		<i>E. para</i> poleg, blizu, ob; ki je podobna rodu <i>Drymonia</i> . 2 <i>gradnoka</i> glede na gradn, <i>Quercus petraea</i> , eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	gradnoka
8730	<i>P. vittata</i> (Staudinger, 1892)	Hafner, 1910a	<i>E. vitia</i> trak, pas; trakasta; se nanaša na temno črto vzdolž zadnjega roba sprednjih kril. 2 <i>vipavska</i> glede na pojavljanje v Vipavski dolini.	vipavska gradnoka
	<i>Peridea</i> Stephens, 1828		<i>E. perideus</i> zelo plašen, boječ; glede na značilno vedenje gosenic in metuljev te vrste, ki se ob dotiku tresejo ali trepetajo.	potresavka
8754	<i>P. anceps</i> (Goeze, 1781)	Hafner, 1910a	<i>E. anceps</i> negotovo, dvomljivo; glede na plašno vedenje. 2 <i>hrastova</i> glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastova potresavka
	<i>Phalera</i> Hübner, [1819]		<i>E. phaleros</i> , <i>phalaros</i> ; tisti, ki ima belo liso. 2 <i>lunoliska</i> se nanaša na luni podobno svetlo liso na zunanjem delu sprednjih kril.	lunoliska
8750	<i>P. bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	<i>E. boukephalos</i> ki ima bikasto glavo. 2 <i>hrastova</i> glede na eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	hrastova lunoliska
8752	<i>P. bucephaloides</i> (Ochsenheimer, 1810)	Hafner, 1910a	<i>E. bukephaloides</i> ki je podoben vrsti <i>bucephala</i> . 2 <i>vzhodna</i> glede na pretežno razširjenost v vzhodni Evropi.	vzhodna lunoliska
	<i>Pheosia</i> Hübner, [1819]		<i>E. pheos</i> tmasta rastlina, bodica, tm; glede na klinasto oblikovane lise na krilih, po katerih se ločita obe vrsti tega rodu.	klinarka
8728	<i>P. gnoma</i> (Fabricius, [1777])	Hafner, 1910a	<i>E. gnoma</i> znak, znamenje. 2 <i>širokočrta</i> glede na široke črte na krilih.	širokočrta klinarka
8727	<i>P. tremula</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1910a	<i>E. tremulus</i> tresti se, tresoč; glede na trepetliko, <i>Populus tremula</i> , hranilno rastlino gosenic. 2 <i>ozkočrta</i> glede na ozke črte na krilih.	ozkočrta klinarka
	<i>Pterostoma</i> Gernar, 1812		<i>E. pteron</i> pero, <i>stoma</i> usta, gobec; glede na velike labialne palpe, ustnice.	ustničarka
8732	<i>P. palpina</i> (Clerck, 1759)	Hafner, 1910a	<i>E. palpus</i> labialni palpi; glede na velike, peresasto oblikovane labialne palpe.	peresasta ustničarka
	<i>Ptilodon</i> Hübner, 1822		<i>E. ptilon</i> pero, krilo; <i>odontos</i> zob; glede na šop lusk v obliki zoba na zadnjem robu sprednjih kril.	zobnica

8738	<i>P. capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>cappa</i> kapa, kapuca; glede na poudarjeni šop belih dlak na hrbtni strani oprasja, ki spominja na kapuco. 2 <i>belokapa</i> glede na beli hrbtni del oprasja.	belokapa zobnica
8739	<i>P. cucullina</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a	E <i>cucallus</i> kapuca, oglavnica. 2 <i>belokrila</i> glede na številne bele črtice na zunanjem robu kril.	belokrila zobnica
	<i>Ptilophora</i> Stephens, 1828		E <i>pilon</i> pero, <i>phoreo</i> nositi; grška različica imena te vrste. 2 <i>peresarka</i> glede na zelo široke peresaste tipalnice.	peresarka
8734	<i>P. plumigera</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a	E <i>pluma</i> pero, <i>gero</i> nositi; ki nosi pero; se nanaša na zelo široke peresaste tipalnice. 2 <i>jesenska</i> glede na pozno jesenski čas pojavljanja metuljev te vrste.	jesenska peresarka
	<i>Spatalia</i> Hübner, [1819]		E <i>spatiale</i> razkošje, potratna okrašenost; S zapestnica. 2 <i>srebrninka</i> glede na srebrne lise na krilih.	srebrninka
8762	<i>S. argentina</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a	S <i>argentina</i> srebrna, srebrnkasta. 2 <i>razkošna</i> se nanaša na razkošni srebrni vzorec na srednjih krilih.	razkošna srebrninka
	<i>Stauropus</i> Germar, 1812		E <i>stauros</i> križ, <i>pous</i> noga; domnevno glede na navkrižno postavljene dolge noge gosenic. 2 <i>nogarka</i> glede na nenavadne noge gosenic te vrste	nogarka
8758	<i>S. fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>fagi</i> - <i>Fagus sylvatica</i> hraniha rastlina gosenic. 2 <i>dolgonoga</i> glede na izredno dolge sprednje noge gosenic.	dolgonoga nogarka
	<i>Thaumetopoea</i> Hübner, [1820]		E <i>Thaumetopoea haematopoeos</i> čudodelno, čodavomo? (Glede na posebno obnašanje gosenic, ki se premikajo v sprevodu).	sprevodnica
8691	<i>T. pityocampa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Hafner, 1910a	E <i>pituo</i> n borov gozd, <i>kampe</i> gosenice; gosenice borovega gozda; glede na življenjsko okolje.	borova sprevodnica
8689	<i>T. processionea</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>processio</i> korakati, hoditi naprej, pohod. 2 <i>hrastova</i> glede na hrast, <i>Quercus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastova sprevodnica
	SATURNIIDAE Bouisduval, 1837		E Saturn, rimski bog, povezan z boginjo Juno, ki jo spremlja pav. 2 <i>pavlini</i> glede na podobnost krogov na krilih s krogi na peresih pava.	PAVLINI
	<i>Aglaia</i> Ochsenheimer, 1810		S <i>aglaia</i> sijajen, bleščeč, čeden; <i>aglaia</i> neznani metuljarski pomen.	beli T
6788	<i>A. tau</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	S tau ime grške črke T; glede na bele lise sredi očesnih znamenj na krilih, ki so podobne črki tau.	beli T
	<i>Antheraea</i> Hübner, [1819]		<i>Antheraea</i> neznani metuljarski pomen.	jamamaj
6799	<i>A. yamamai</i> (Guérin-Ménéville, 1861)	Hafner, 1910a	<i>yamamai</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>japonska sviloprejška</i> ali <i>jamamaj</i> .	jamamaj
	<i>Samia</i> Hübner, [1819]		<i>Samia</i> neznani metuljarski pomen. 2 <i>pajesenovec</i> ; glede na veliki pajesen, <i>Ailanthus altissima</i> , značilno hranilno rastlino gosenic.	pajesenovec
6802	<i>S. cynthia</i> (Drury, 1773)	Hafner, 1910a	S <i>cynthia</i> vzdevek boginje Artemide, brez metuljarskega pomena. 2 <i>pajesenovec</i> glede na veliki pajesen, <i>Ailanthus altissima</i> , značilno hranilno rastlino gosenic.	veliki pajesenovec

	<i>Saturnia</i> Schrank, 1802		E <i>Saturn</i> , rimski bog, povezan z boginjo Juno, ki jo spremlja pav. 2 <i>pavlin</i> glede na podobnost krogov na krilih s krogi na pertesih pava.	pavlin
6797	<i>S. caecigena</i> Kupido, 1825	Hafner, 1910a	S <i>caecigenus</i> sleporojeni, slepi; glede na slabo razviti očesni vzorec na krilih. 2 <i>kraši</i> glede na območje pojavljanja v Sloveniji.	kraški pavlin
6794a	<i>S. pavonitella</i> (Scopoli, 1763)	Scopoli, 1763	<i>pavonitella</i> pomanjševalnica od <i>pavonia</i> . 2 <i>Scopolijev</i> po G. A. Scopoliju, ki je vrsto opisal leta 1763.	Scopolijev pavlin
6793	<i>S. pyri</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Hafner, 1910a	S <i>pyri</i> hruškin, glede na bot. rod <i>Pyrus</i> , hruška, ki je značilna hranilna rastlina gosenic. 2 <i>veliki</i> glede na velikost, saj je naš največji pavlin.	veliki pavlin
	SPHINGIDAE Latreille, 1802		E <i>Sphinx</i> pošast, navadno upodobljena z ženskim oprsem in telesom leva. 2 <i>večji</i> nočni metulji, katerih gosenice v vzdraženem stanju spominjajo na sfinogo.	VEŠCI
	<i>Acherontia</i> Laspeyres, 1809		E Acheron reka bolečin in trpljenja v podzemlju; brez metuljarskega pomena. 2 smrtoglavec glede na svetle lise na hrbtni strani oprisa.	smrtoglavec
6830	<i>A. atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>atropos</i> ena od treh boginj usode; brez metuljarskega pomena. 2 <i>smrtoglavec</i> glede na svetle lise v obliki lobanje na hrbtni strani oprisa.	smrtoglavec
	<i>Agrius</i> Hübner, [1819]		E <i>Agrius</i> ime enega od gigantov, ki so borili proti bogovom; brez metuljarskega pomena. 2 <i>slakovci</i> glede na hranilno rastlino gosenic.	slakovci
6828	<i>A. convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Convolvulus arvensis</i> povezan s slakom, slakov; glede na slak, značilno hranilno rastlino gosenic.	slakovci
	<i>Daphnis</i> Hübner, [1819]		E <i>Daphnis</i> ime Hermesovega sina, ki je bil pesnik in glasbenik. Brez metuljarskega pomena. 2 <i>oleandrovec</i> glede na hranilno rastlino.	oleandrovec
6845	<i>D. nerii</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>nerii Nerium</i> oleander; glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	oleandrovec
	<i>Deilephila</i> Laspeyres, 1809		E <i>deile</i> večer, <i>phileo</i> ljubiti; večernik, somračnik. 2 <i>vinovec</i> glede na vinsko rdečo barvo kril in telesa.	vinovec
6862	<i>D. elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Elpenor</i> ime enega od Odisejevih tovarišev, ki ga je čarovnica Kirka spremenila v svinjo. 2 <i>veliki</i> glede na mali vinovec <i>D. porcellus</i> .	veliki vinovec
6863	<i>D. porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>porcellus</i> pomanjševalnica od prašič, prašiček; brez metuljarskega pomena. 2 <i>mali</i> glede na veliki vinovec <i>D. elpenor</i> .	mali vinovec
	Hemaris Dalman, 1816		E <i>hemera</i> dan, glede na pretežno dnevno aktivnost metuljev tega rodu. 2 <i>čmriljevec</i> glede na podobnost s čmrliji.	čmriljevec
6841	<i>H. croatica</i> (Esper, 1800)	Carnelutti, 1971	E <i>croatica</i> se nanaša na življenjsko območje na hrvaškem. 2 <i>zelenkasti</i> glede na prevladujočo barvo kril in telesa.	zelenkasti čmriljevec
6840	<i>H. fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>fucus</i> , brenčič, trtar; glede na podobnost z opomkrici (<i>Hymenotera</i>). 2 širokorobi glede na široki temni rob na krilih v primerjavi z vrsto <i>H. titysus</i> .	širokorobi čmriljevec
6839	<i>H. titysus</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Titysus</i> ime enega od gigantov; brez metuljarskega pomena. 2 <i>ozkorobi</i> glede na ozki temni rob na krilih v primerjavi z vrsto <i>H. fuciformis</i> .	ozkorobi čmriljevec

	<i>Hippotion Hübnr, [1819]</i>		<i>E Hippotion</i> ime grškega prince, junačka pred Trojo; brez metuljarskega pomena. 2 <i>presejvalec</i> glede na migrantski značaj vrste.	presejvalec
6865	<i>H. celerio</i> (Linnaeus, 1758)	Carnelutti & Micheli, 1955	E Celerio domnevno antični junaček ali božanstvo; S domnevno hiter, tisti ki hitro leta? Nejasni metuljarski pomen. 2 <i>hitri</i> glede na način letanja.	hitri presejvalec
	<i>Hyles Hübnr, [1819]</i>		E <i>Hyles</i> ime enega od Kentavrov, pol človeka in konja; brez metuljarskega pomena. 2 <i>večerec</i> glede na čas letanja v večernem mraku (iz <i>večernjak</i> Erjavec 1864).	večerec
6853	<i>H. euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Euphorbia</i> bot. rod mleček; glede na mleček, <i>Euphorbia</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	mlečkov večerec
6855	<i>H. gallii</i> (Rottemburg, 1775)	Hafner, 1910a	E <i>Galli</i> bot. rod lakota; glede na lakoto, <i>Galium</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	lakotin večerec
6859	<i>H. hippophaeae</i> (Esper, [1789])	Hafner, 1910a	E <i>Hippophaeae rhamnoides</i> rakitovec; glede na rakitovec, značilno hranilno rastlino gosenic.	rakitovčev večerec
6860	<i>H. livornica</i> (Esper, [1780])	Hafner, 1910a	E <i>Livorno</i> mesto v Italiji; glede na območje pojavljanja? 2 <i>črtasti</i> glede na puščarjeno črto na srednjih krilih.	črtasti večerec
6858	<i>H. vespertilio</i> (Esper, [1780])	Hafner, 1910a	S <i>vespertilio</i> netopir; glede na podobno barvo ali na čas letanja? 2 sivi glede na značilno sivo barvo srednjih kril.	sivi večerec
	<i>Laothoe Fabricius, 1807</i>		E <i>Laothoe</i> ime gospodarice Priama, kralja Troje; brez metuljarskega pomena. 2 <i>topolovec</i> glede na topol, <i>Populus</i> sp., značilno hranilno rastlino gosenic.	topolovec
6824	<i>L. populi</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Populus</i> bot. rod topol; po značilni hranilni rastlini gosenic. 2 <i>širokokrtili</i> , glede na značilno kratka in široka krila.	širokokrtili topolovec
	<i>Macroglossum Scopoli, 1777</i>		E <i>macros</i> velik, dolg; <i>glossae</i> jezik; se nanaša na zelo dolg sesalni rtiček.	velerilec
6843	<i>M. stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>stellatarum Stellatae</i> sinonim za <i>Rubiaceae</i> bot. družina broščevke, domnevne hranilne rastline gosenic.	velerilec
	<i>Marumba Moore, 1882</i>		D <i>Marumba</i> domnevno afriška boginja glasbe, brez metuljarskega pomena. 2 <i>hrastovec</i> hrast, <i>Quercus</i> sp., glede na značilno hranilno rastlino gosenic.	hrastovec
6817	<i>M. quercus</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Hafner, 1910a	S <i>quercus</i> bot. rod hrast; glede na hrast, <i>Quercus</i> . 2 <i>okrasti</i> glede na značilno barvo kril tega metulja.	okrasti hrastovec
	<i>Mimas Hübnr, [1819]</i>		E <i>Mimas</i> ime enega od gigantov, ki se borili proti bogovom; brez metuljarskega pomena. 2 <i>lipovec</i> glede na eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	lipovec
6819	<i>M. tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E <i>Tilia</i> bot. rod lipa; se nanaša na značilno hranilno rastlino. 2 <i>dvoharvni</i> glede na pojavljanje v rjavem in zelenem barvnem različku, kar je značilnost vrste.	dvoharvni lipovec
	<i>Proserpinus Hübnr, [1819]</i>		E <i>Proserpinus</i> ime hčere Jupitra in Cerese; brez metuljarskega pomena. 2 <i>svedlinovec</i> glede na svetlin, <i>Oenothera biennis</i> , eno od značilnih hranilnih rastlin gosenic.	svedlinovec
6849	<i>P. proserpina</i> (Pallas, 1772)	Hafner, 1910a	E <i>Proserpina</i> ime hčere Jupitra in Cerese; brez metuljarskega pomena. 2 <i>zelenkasti</i> glede na značilno barvo kril in dela telesa.	zelenkasti svedlinovec

	<i>Smerinthus</i> Latreille, [1802]		E <i>smerinthus</i> nit, v pomenu "nit življenja" kijo je predla sojenica Fates; brez metuljarskega pomena. 2 pavlinec glede na vzorec "pavjih oči" na zadnjih krilih.	pavlinec
6822	<i>S. ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Hafner, 1910a	E ocellata okati, z očmi; se nanaša na očesni vzorec na zadnjih krilih metuljev, ki spominja na vzorec na pavjih peresih.	okati pavlinec
	<i>Sphinx</i> Linnaeus, 1758	Scopoli, 1763	E <i>Sphinx</i> pošast, običajno upodobljena z ženskim oprijem in levim telesom; domnevno glede na gosenice, ki so podobne egipčanski sfingi, kadar privzdignejo oprsje.	veščec
6832	<i>S. ligustri</i> Linnaeus, 1758	Hafner, 1910a	E <i>Ligustrum</i> bot. rod kalina; se nanaša na hranilno rastlino gosenic.	kalinji veščec
6834	<i>S. pinastri</i> Linnaeus, 1758	Hafner, 1910a	E <i>Pinus</i> bot. rod bor; se nanaša na značilno hranilno rastlino gosenic te vrste.	borov veščec

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Acta Entomologica Slovenica](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Jez Matjaz, Lavbic Jernej

Artikel/Article: [SEZNAM SLOVENSКИH IMEN V SLOVENIJI Å½IVEÈIH NOÈNIH METULJEV ENAJSTIH DRUÅ½IN: LEPIDOPTERA: BRAHMAEIDAE, CIMELIIDAE, DREPANIDAE, ENDROMIDAE, EUTELIIDAE, LASIOCAMPIDAE, LIMACODIDAE, NOLIDAE, NOTODONTIDAE, SATURNIIDAE IN SPHINGIDAE 139-160](#)