© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Plantae Kronenburgianae.

Botanische Ausbeute von Reisen A. Kronenburgs im Kaukasus, in Persien und Centralasien aus den Jahren 1901—1904.

Von A. Kneucker.

Orchidaceae.

120. *Gymnadenia conopea R. Br.* Bei Hadschykend im Kreise Elisawetpol im Kaukasus im schattigen Walde; 900 m; 27. Mai 02.
121. *Cephalanthera rubra Rich.* In schattigen Hochwaldungen des Käbäs-Dagh im Kaukasus, Kreis Elisawetpol; 1800 m; 8. Juli 02.
122. *Cephalanthera pallens Rich.* Am Sarjal-Dagh im Kreis Elisawetpol im Kaukasus in schattigen Wäldern; 1000 m; 12. Juni 02.

Dicotyledones.

Salicaceae.

123. *Salix Tianschanica Rgl.* Auf der Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3000 m; Mai 04.

Nach Mitteilung A. Kronenburgs ist die Weide in der unteren Region des Gebirges bis ca. 2700 m baumartig und erreicht eine Höhe von 3—4 m; in höheren Lagen wird die Pflanze strauchartig kriechend und nur etwa 1 m hoch.

Polygonaceae.

124. *Atraphaxis spinosa L.* An sonnigen, steinigen und berasten Hügeln bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 20. Sept. 02.
125. *Polygonum lapathifolium L.* An kiesigen Bachufern des Canschja bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 14. Sept. 02.

Caryophyllaceae.

126. *Gypsophila pseudoverticillata Komarow.* An trockenen Orten im Kieselsand des Flussbettes des Kizil-su auf dem Alaiplateau; 2400 m; Ende Juni 04.
127. *Gypsophila intricata Franchet.* Auf trockenen, graslosen Hügeln der Nordseite des Kizil-kurgan im südöstl. Fergana: 1620 m; Mai 04.
128. *Dianthus capitatus DC.* An grasigen, sonnigen Abhängen unter Gesträuch am Sarjal-Dagh bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 1000 m; Juni 02.
129. *Dianthus superbus L.* Auf Waldboden an der Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 2700 m; Aug. 04.

Ranunculaceae.

130. *Paeonia anomala L. var. intermedia (C. A. Mey.) B. Fedtsch.* Im Khanat Kuliab zw. Muminabad und Langar (Dera) in der östl Buchara in hohem Gebüsch; 2100 m; 15. Juni 03.
131. *Trollius Songaricus Rgl.* An den Nordabhängen des Terek-Dawan im südöstlichen Fergana auf Alpenwiesen; 3000 m; Ende Mai 04.
132. *Trollius lilacinus Bge.* Auf Geröll in der Transalai-Kette am Fusse des 6900 m hohen Pik Kaufmann; 3900 m; Mitte Juli 04.
133. *Eranthis longistipitata Ryl.* Auf trockenen, steinigen Abhängen im Khanat Hissar in der Buchara; 600 m; Ende März u. Anf. April 03.
134. *Isopyrum grandiflorum Fisch.* In Felsspalten am Perewal Taldyk im südöstlichen Fergana; 3540 m; Ende Mai 04.
135. *Aquilegia vulgaris L. v. Karelini Baker.* Im Walde auf der Nordseite des Perewal Taldyk in der südöstl. Fergana; 2700 m; Mai 04.
136. *Aquilegia Olympica Boiss.* An feuchten Stellen und an Gebirgsbächen im Walde am Käbäs-Dagh im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 1900 m; Juni 02.
137. *Delphinium hybridum W.* In hohem Grase auf Alpenwiesen am Waldrande bei Helenendorf im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 800 m; 8. Juli 02.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

138. *Delphinium hybridum W. ssp. laxiusculum Busch.* *) Zwischen dornigem Gebüsch und im Grase auf Mergelboden im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 19. Juni 02.
139. *Delphinium dasyanthum Kar. et Kir.* An Bächen auf dem rechten Ufer des Kizil-su am Südabhange der Gebirgskette auf dem Alaiplateau; bis 3000 m; Mitte August 04.
140. *Aconitum Orientale M. B.* An schattigen, feuchten Orten in Hochwald auf dem Käbäs-Dagh im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 1700 m; 8. Juli 02.
141. *Anemone coronaria L. var. Bucharica lutea Rgl.* An trockenen, steinigen Abhängen zwischen Kalei-Chum und Dscharf im Khanat Darwas in der östl. Buchara; 900—2100 m; Mai 03. Zw. Kalei-Chum und Robod, im Khanat Kuliab in der östl. Buchara; bis 2100 m; 7. Juni 03.
142. *Anemone Kostyczewi Korsh.* Zw. Kieselgestein und Sand am Flusse Zum-Akin im Trans-Alai; 3000 m; Juni 04.
143. *Clematis Orientalis L.* Zwischen Gebüsch an sonnigen Orten im Kalksteingebiet bei Helenendorf, Kreis Elisawetpol, im Kaukasus; 400 m; Sept. u. Okt. 02.
144. *Ranunculus ficaria L.* Feuchte Wiesen bei Helenendorf, Kreis Elisawetpol, im Kaukasus; 500 m; 15. Februar 02.
145. *Ranunculus cymbalaria Pursh.* Sumpfige Alpenwiesen auf der Südostseite des Perewal Tschigirtschik im südöstl. Fergana; 1800 m; Aug. 04.
146. *Ranunculus Illyricus L* Zwischen hohem Grase auf trockenen Wiesen im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 800 m; 8. Juli 02.

Berberidaceae.

147. *Berberis vulgaris L.* In Wäldern und an trockenen Abhängen des Sarjal-Dagh im Kaukasus; 900 m; 27. Mai 02.

Papaveraceae.

148.**) *Papaver commutatum F. u. M.* Auf trockenem, grasigem Hügel (Mergelboden) im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 700 m; 16. Juni 02.
149. *Papaver paroninum F. u. M.* Auf trockenen Wiesen bei Muminabad im Khanat Kuliab in der östl. Buchara; 4000 m. Juni 03.

Cruciferae.

150. *Dilophia salsa Thoms.* Im Kieselsande des Flusses Kizil-su auf dem Alaiplateau; 2400 m; Juni 04.
151.***) *Aethionema cristatum DC.* In sonnigen Lagen auf Kalkgeröll des Prischansch-Dagh in der Prov. Aderbeidschjan in Persien; 2200 m; 16. April 02.
152. *Sisymbrium irio L.* An Wegen und Mauern bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 28. März 02.
153. *Dentaria quinquefolia M. B.* Auf feuchten Wiesen bei Helenendorf im Kaukasus; 500 m; 15. März 02.
154. *Smelowskia sisymbrioides (Rgl. u. Herd.) B. Fedtsch. = Hutchinsia sisymbrioides Rgl. u. Herd.* Trockene Abhänge im Transalai; 3000 m; Juli 04. — Am Flusse Terek-su, östlich vom Piket Sufi-kurgan im südöstlichen Fergana; 2400 m; Mai 04.
155. *Smelowskia calycina (Steph.) C. A. Meyer.* Auf trockenen Alpenwiesen am Flusse Zum-Akin im Trans-Alai; 3600 m; Mitte Juli 04.
156. *Arabis auriculata Lam.* Auf Bergwiesen in niedrigem Grase bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 19. Mai 02.
157. *Erysimum aureum M. B.* Unter Gebüsch an trockenen, grasigen Abhängen bei Helenendorf im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 4. Nov. 02.
158. *Erysimum canescens Roth.* Auf dem rechten Ufer des Flusses Gulscha im südöstl. Fergana; bis 2100 m; Mai 04.

---

*) Determiniert von N. A. Busch, ebenso Nr. 140.

**) Nr. 148 und 149 bestimmte Dr. Fedde in Berlin.

***) Nr. 151 und 161 bestimmte J. Bornmüller in Weimar.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

159. *Erysimum Altaicum C. A. Meyer.* Auf Alpenwiesen des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3540 m; Ende Mai 04.
160. *Alyssum tortuosum W. u. K.* Auf trockenem Kalkboden zwischen niedrigem Grase bei Helenendorf im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 700 m; 7. Nov. 01.
161. *Alyssum hirsutum M. B.* Auf Kalkgeröll bei Khoi in der persischen Prov. Aderbeidschjan; 2200 m; 10. April 02.
162. *Braya rosea Bge. var. albiflora Bge.* Im Kieselsande des Flussbettes des Kizil-su auf dem Alaiplateau; 2400 m; Juni 04.
163. *Hesperis matronalis L.* In Felsspalten am r. Ufer des Flusses Dschilü-su im südöstl. Fergana; 1500 m; Ende Mai 04.
164. *Hesperis matronalis L. var. α. Ledeb. siliquis glabris.* An Waldrändern der Bergwiesen des Sarjal Dagh im Kaukasus im Kreis Elisawetpol; 1200 m; 8. Juni 02.
165. *Sterigma torulosum DC.* Trockene, steinige Hügel (Mergelboden) bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 900 m; 18. März 02.
166. *Parrya exscapa C. A. Mey.* Auf Kieselgestein und Sandboden im Flussbett des Kizil-su im oberen Alai (Alaiplateau); 2700 m; Juni 04.
167. *Parrya pinnatifida Kar. et Kir.* An Felsen auf der Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3000 m; Mai 04.
168. *Parrya flabellata Rgl.* An graslosen, steilen Abhängen des 6900 m hohen Pik Kaufmann im Trans-Alai; 3900 m; Juli 04.

Crassulaceae.

169. *Umbilicus Semenovi Rgl. et Herd.* Am l. Ufer des Flusses Taldyk auf dem Alaiplateau; 2700 m; August 04.

Saxifragaceae.

170. *Saxifraga hirculus L.* In der Nähe der Nordseite des Karakulsee's auf dem Pamirplateau an etwas feuchten Orten zw. dichtem, niedrigem Grase; 3720 m; 23. Juli 04.

Rosaceae.

171. *Spiraea filipendula L. = Filipendula hexapetala Gilib.* Auf trockenen Bergwiesen bei Helenendorf im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 1000 m; 4. Juli 02.
172. *Mespilus Germanica L.* In einem 5 m hohen Busche in den Hochwäldern des Sarjal-Dagh im Kaukasus, Kreis Elisawetpol; 1200 m; 10. Juni 02.
173. *Alchimilla sericea W.* In Kalkfelsenspalten des Berges Oschtew im Lande der Abazeken im nordwestl. Kaukasus; 2900 m; 26. Juli 02.
174. *Rosa Webbiana Wall.* An trockenen Abhängen am Nordabhang des Terek-Dawan im südöstl. Fergana; 2100 m; Juni 04.
175. *Rosa Iberica Stev.* An Waldrändern und sonnigen Abhängen des Käbäs-Dagh im Kaukasus, Kreis Elisawetpol; 1900 m; 8. Juli 02.
176. *Prunus prostrata Labill.* Steinige Abhänge des l. Ufers des Dschilü-su-Flusses in 1 m hohem Strauche, südöstl. Fergana; 1500—1800 m; Mai 04.

Leguminosae.

177. *Kostyczewa ternata Korsh.* Auf trockenen Alpenwiesen auf d. r. Ufer des Flusses Gulscha im südöstl. Fergana; 1800 m; Ende Mai 04.
178. *Colutea arborescens Lam.* Auf trockenen Hügeln der Nordseite des Piket Kizil-kurgan auf dem r. Ufer des Flusses Gulscha im nordöstl. Fergana; 1800 m; Mai 04.
179. *Caragana tragacanthoides Pall.* Auf Alpenwiesen in der Transalai-Kette zw. dichtem Graswuchs südwestlich vom Militärposten Bordaba; 3300 m; 17 Juli 04.
180. *Astragalus macropterus DC.* An steinigen Abhängen auf dem r. Ufer des Flusses Gulscha nördl. vom Piket Kizil-kurgan im südöstlichen Fergana; 1800 m; Mai 04.
181.*) *Astragalus Candolleanus Boiss. = A. latifolius DC. ex p.* Auf salzhaltigem Gerölle bei dem Urmiasee in der persischen Provinz Aderbeidschjan; 1900 m; 25. April 02.

*) Nr. 181. 188. 189. 191—197 wurden von J. Bornmüller in Weimar bestimmt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

182*) ***Astragalus Kronenburgii B. Fedtsch. n. sp.*** Auf dem l. Ufer des Gulschaflusses auf trockenen Alpenwiesen westl. vom Piket Kizil-kurgan im südwestl. Fergana; 1740 m; Mai und Juni 04.

Radix indurata. Caudex multiceps, caules brevissimos petiolorum vestigiis obtectos edens. Stipulae parvae, lanceolatae, inter se liberae, petiolo parte inferiore adnatae. Folia dense adpresse subargenteo sericea, erecta, foliola 9—13 lineari lanceolatae. Scapi erecti, folia quintuplo superantes. Racemus sub anthesi densus, tunc demum laxior. Bracteae scariosae, pedicellos brevissimos superantes. Calyx longe campanulatus, dentes calycini tubo multoties breviores. Corolla violacea. Vexillum oblongolanceolatum, apice paulo emarginatum, alas carinamque multo superans. Alarum lamina angusta, basi auriculata, apice longe emarginata, bifida. Ovarium sessile oblongolanceolatum, albido puberulum.

183. *Oxytropis integripetala Bge.* Auf trockenen Abhängen des r. Ufers des Gulschaflusses im südöstl. Fergana; 1600 m; Mai 04.

184. *Hedysarum plumosum Boiss. u. Hausskn.* Auf Kieselsteinen und an trockenen Orten des r. Ufers des Flusses Kara-kawak; 2550 m; Ende Juli 04.

185. *Hedysarum pumilum (Ledeb.) B. Fedtsch.* Steinige, trockene Orte am rechten Ufer des Kizil-su, Alaiplateau; 2670 m; Anf. Juni 04.

186. *Vicia sativa L* Unter Dornengebüsch und zw. hohem Grase im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 400 m; 13. März 02.

187. *Vicia Narbonensis L.* An grasigen, trockenen Abhängen des Sarjal-Dagh bei Helenendorf im Kaukasus; 800 m; 7. Juni 02.

Rutaceae.

188. *Haplophyllum villosum (M. B.) Juss., Jaub. et Sp.* Auf trockenen Hügeln zw. hohem Grase auf Mergelboden bei Helenendorf im Kaukasus; 700 m; 18. Juni 02.

Anacardiaceae.

189. *Rhus cotinus L.* Am Sarjal-Dagh im Kaukasus im Kreise Elisawetpol, zw. hohem Gebüsche 3—4 m hohe Sträucher bildend; 700 m; 19. Juli 02.

Violaceae.

190.**) ***Viola Kronenburgii W. Becker n. sp.*** Zwischen dichtem, niedrigem Graswuchs auf der Südostseite des Perewal Kizil-Art, Pamirplateau; 4020 m; 17. Juli 04.

Umbelliferae.

191. *Astrantia helleborifolia Salisb.* Schattige Orte der Hochwaldungen des Käbäs-Dagh im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 1800 m; 8. Juli 02.

192. *Pimpinella magna L.* Wie Nr. 191; 1700 m; 8. Juli 02.

Cornaceae.

193. *Cornus mas L.* Im Hochwald des Sarjal-Dagh im Kaukasus bei Helenendorf; 1700 m; 25. Febr. 02.

Pirolaceae.

194. *Ramischia secunda (L.) Boiss.* An schattigen Orten auf Laub in den Wäldern des Sarjal-Dagh im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 1700 m; 17. Nov. 01.

Primulaceae.

195. *Androsace maxima L.* Auf Kalksteingeröll in der persischen Provinz Aderbeidschjan; 2000 m; 12. April 02.

196. *Androsace villosa L.* An felsigen und trockenen Abhängen des Käbäs-Dagh im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 2200 m; 11. Juni 04.

197. *Lysimachia punctata Jacq. β verticillata (M. B.) pro sp.* An Wasserläufen zw. hohem Grase bei Helenendorf im Kaukasus; 500 m; 17. Sept. 02.

Gentianaceae.

198. *Gentiana barbata Fröl.* Auf Alpenwiesen an den Ufern des Kaschka-su am r. Ufer des Kizil-su auf dem Alaiplateau; 3000 m; August 04.

---

*) Nr. 182—185 wurden von Boris Fedtschenko beschrieben bezw. bestimmt.

**) Die Pflanze wurde p. 26 (1905) der „Allg. bot. Z." beschrieben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Asclepiadaceae.

199.*) *Vincetoxicum scandens Somm. et Lev.* An waldigen, schattigen Orten des Sarjal-Dagh bei Helenendorf im Kaukasus; 1000 m; 10. Juni 02.

Convolvulaceae.

200. *Convolvulus lineatus L.* Auf Wiesen und an trockenen Orten des Sarjal-Dagh im Kaukasus bei Helenendorf; 700 m; 8. Juni 02.

Borraginaceae.

201. *Nonnea lutea Lam.* Auf trockenen, steinigen Hügeln (Mergelboden) bei Helenendorf im Kaukasus; 400 m; 18. März 02.
202. *Macrotomia perennis (Schrank) Boiss.* An Felsen des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3540 m; Juni 04.
203. *Arnebia Olgae Rgl.* Im unteren Alai (Alaiplateau) an trockenen, grasfreien und felsigen Orten auf dem r. Ufer des Kizil-su; 2400 m; Ende Juni 04.

Labiatae.

204. *Scutellaria filicaulis Rgl.* Im Flussbett des Kizil-su zw. Kieselsand an trockenen Stellen; Alaiplateau; 2400 m; Ende Juni 04.
205. *Lagochilus diacanthophyllus (Pall.) Benth.* Auf trockenen, steinigen Hügeln am r. Ufer des Flusses Gulscha im südöst. Fergana; bis 1400 m; Ende Mai 04.
206. *Ostostegia Olgae (Rgl.) Korsh.* Auf dem r. Ufer des Flusses Gulscha im südöstl. Fergana an steilen, trockenen Abhängen; 1800 m; Ende Aug. 04.
207. *Betonica grandiflora W.* An schattigen, feuchten Orten im Hochwalde auf dem Käbäs-Dagh im Kaukasus im Kreis Elisawetpol; 1700 m; 8. Juli 02.
208. *Satureja spicigera C. Koch.* An trockenen, steinigen Orten bei Helenendorf im Kaukasus; 500 m; 11. Nov. 01.

Scrophulariaceae.

209. *Veronica gentianoides Vahl var. latifolia Boiss.* An trockenen Abhängen von Bergwiesen im Kreis Elisawetpol im Kaukasus; 1300 m; 27. Mai 02.
210. *Lagotis decumbens Rupr.* In trockenen Flussbetten auf der Nordseite des Karakul-see zw. Kieselsteinen auf dem Pamirplateau; 3900 m; 22. Juli 04.
211. *Pedicularis Oederi Vahl = P. versicolor Wahlbg.* An feuchten Orten zw. dichtem Grase an der Südseite des Perewal Kizil-Ard auf dem Pamirplateau; 4020 m; 20. Juli 04.
212. *Rhynchocoris Orientalis (L.).* Auf Bergwiesen des Sarjal-Dagh im Kaukasus unter Gesträuch; 1200 m; 20. Juni 02.

Orobanchaceae.

213. *Anoplanthus coccineus Walp.* Auf dem Sarjal-Dagh im Kaukasus im schattigen Walde bei Hadschju-kend im Kaukasus; 10. Juni 02.

Caprifoliaceae.

214. *Lonicera hispida Pall.* Auf Waldboden auf der Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 2700 m; Anfang Juni 04.

Campanulaceae.

215. *Campanula alliariaefolia Willd.* An trockenen, steinigen Waldlichtungen im Hochwalde des Käbäs-Dagh im Kaukasus; 1800 m; 8. Juli 02.
216. *Campanula latifolia L.* Feuchte, schattige Orte der Hochwälder des Käbäs-Dagh im Kaukasus; 1600 m; 8. Juli 02.
217. *Campanula rapunculoides L.* Auf Bergwiesen des Sarjal-Dagh im Kaukasus; 1000 m; 13. Juni 02.
218. *Campanula glomerata L.* Auf Alpenwiesen zw. hohem Grase bei Elisawetpol im Kaukasus; 1800 m; 8. Juli 02.
219. *Symphiandra Armena Stev.* In schattigen Felsspalten der Hochwaldungen des Käbäs-Dagh im Kaukasus im Kreise Elisawetpol; 1800 m; 8. Juli 02.
220. *Podanthum campanuloides (M. B.) Boiss.* Alpenwiesen zw. hohem Grase auf dem Käbäs-Dagh im Kaukasus im Kreise Elisawetpol; 1800 m; 8. Juli 04.

*) Nr. 199—201, 207—209, 212, 215—220, 223, 227, 230 und 231 determiniert J. Bornmüller in Weimar.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

221. *Codonopsis ovata Benth.* Auf Alpenwiesen zw. hohem Grase an der Südostseite des Perewal Tschgirtschik im südöstl. Fergana; 1500 m; Anf. Mai 04.

Compositae.

222. *Aster flaccidus Bge.* Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3000 m; Ende Mai 04.
223. *Galatella punctata Cass.* Auf trockenen Wiesen zwischen hohem Gebüsch auf Mergelboden in sonnigen Lagen bei Helenendorf im Kaukasus; 700 m; 29. September 02.
224. *Erigeron pulchellus (Willd.) DC.* Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 3000 m; Ende Mai 04.
225. *Erigeron uniflorus L.* Auf Waldboden an der Nordseite des Perewal Taldyk im südöstl. Fergana; 2700 m; Ende Mai 04.
226. *Leontopodium alpinum Cass. var. subalpinum Ledeb.* Auf grasreichen Wiesen und Weideplätzen des Alaiplateau's und des Pamir; 2700 m; Juni 04.
227. *Inula glandulosa W.* Auf Alpenwiesen des Käbäs-Dagh im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 1900 m; 8. Juli 02.
228. *Inula oculus Christi L.* An trockenen Abhängen zw. Gras und Gesträuch bei Helenendorf im Kreise Elisawetpol im Kaukasus; 600 m; 8. Juni 02.
229. *Inula rhizocephala Schrenk.* Auf trockenen Alpenwiesen am Ufer des Zum-Akinflusses im Transalai; 3000 m; Anfang Juli 04.
230. *Xeranthemum squarrosum Boiss.* An kultivierten Orten auf Mergelboden bei Helenendorf im Kaukasus; 600 m; 9. Juni 02.
231. *Serratula quinquefolia M. B.* Im Hochwald bei Helenendorf im Kaukasus; 800 m; 12. September 02.

Botanische Litteratur, Zeitschriften etc.

Schinz, Prof. Dr. Hans u. Keller, Dr. Rob., Flora der Schweiz. II. Teil. Kritische Flora. Verlag v. Alb. Raustein in Zürich. 1905. 400 S. Preis 5 M.

Der gelegentlich der Besprechung des I. Teils der Schinz-Keller'schen Flora der Schweiz („Allg. bot. Z." 1905 p. 91) angekündigte II. Teil ist nun erschienen. Wie die Verfasser gleich im Anfang ihres Vorwortes bemerken, tritt die Ungleichheit der Bewertung der Formen und Varietäten in dem II. Teil der betr. Flora noch stärker zutage, als im I. Teil. Sie geben als hauptsächl. Grund für diese Erscheinung an, dass sie sich ohne zwingende Gründe nicht für berechtigt hielten, in die Auffassung ihrer Mitarbeiter korrigierend einzugreifen und sagen, diese Ungleichheit sei eine Folge der Arbeitsteilung. Die Nummern der nur namentlich aufgeführten Hauptarten entsprechen den Nummern des I. Teils. Ein grosse Anzahl von Hybriden sind ebenfalls nur namentlich aufgeführt. Besonders umfangreich ist die Bearbeitung der Gattung *Hieracium* von H. Zahn, die nahezu die Hälfte des ganzen Buches umfasst. Die aus der Feder unseres hervorragenden Hieracienforschers stammende, gründliche Arbeit verleiht dem Buche einen besonderen Wert, da es zur Zeit an einer Bearbeitung der Schweizer Hieracien nach den neuesten wissenschaftlichen Gesichtspunkten noch fehlt. A. K.

Römer, Julius, Unsere wichtigsten essbaren und giftigen Pilze. Verl. von H. Zeidner in Kronstadt in Ungarn. Mit einer farbigen Doppeltafel. Preis 20 Heller. 15 Seiten. 1905.

Eingangs der Schrift gibt Verfasser eine kurze Charakteristik der Pilze, beschreibt dann 25 der wichtigsten essbaren und giftigen Pilze, von denen 14 auf einer kolorierten Tafel dargestellt sind und bringt dann am Schlusse wertvolle Winke über das Sammeln und die Zubereitung derselben, über ihren Wert als Nahrungsmittel und über Verhaltungsmassregeln bei Pilzvergiftungen. Die kleine Schrift eignet sich schon wegen ihres billigen Preises zur Massenverbreitung. A. K.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 11_1905

Autor(en)/Author(s): Kneucker Andreas

Artikel/Article: Plantae Kronenburgianae. Botanische Ausbeute von Reisen A. Kronenburgs im Kaukasus, in Persien und Centralasien aus den Jahren 1901-1904. 168-173