© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nr. 634. ***Deschampsia flexuosa (L.) Trin. forma.***

Auf einer grossen, abgeholzten Tannenwaldfläche bei Vöhrenbach im südlichen Schwarzwald in Baden: Granit. Begleitpflanzen: Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Holcus mollis L., Senecio silvaticus L., Galium saxatile L., Jasione montana L. etc.

Ca. 990 m ü. d. M.; Anf. Aug. 1906. leg. A. Kneucker.

Die auffallend gelb überlaufene Pflanze kam auf der weiten, abgeholzten Fläche, wo die typische Pflanze in ungeheurer Menge wuchs, nur in 2 grossen, schon von ferne kenntlichen Stöcken vor. Um D. flex. II Legei (Aschers. u. Graebn.) Syn. II p. 287 handelt es sich nach Hackel nicht. Auch ist von der auffallend gelben Färbung an den getrockneten Exemplaren nicht mehr viel zu sehen. A. K.

Nr. 635. ***Deschampsia flexuosa (L.) Trin. var. Buchenavii*** Asch. u. Graebn. Syn. II, p. 288 (1899).

Auf einem Heidemoor bei Schiffdorferdamm im Kreis Geestemünde in der Prov. Hannover. Begleitpflanzen: Myrica gale L., Andromeda polifolia L., Erica tetralix L., Calluna vulgaris Sal.

1—2 m ü. d. M.; 5. Juni 1906. leg. Fr. Plettke.

Die Individuen sind leider nicht alle mit der kurz kriechenden Grundachse gesammelt, doch ist die zarte Heidemoorpflanze auch an den knickig aufsteigenden Halmen und den schlaffen, zusammengezogenen Rispen zu erkennen. A. K.

Nr. 636. ***Deschampsia caespitosa (L.) P. B. forma inter f. altissimam (Moench.) et v. auream Winm. u. Grab.***

Am Bache im Vallée des Sciernes-Picats über Flendruz auf dem rechten Ufer der Sarine (Schweiz) unter Erlen, Weidengebüschen und Himbeeren; Kalk. Andere Begleitpflanzen: Agropyron caninum (L.) P. B., Ulmaria pentapetala Gil. etc.

Ca. 110 m ü. d. M.; 22. Aug. 1906. leg. H. Zahn u. A. Kneucker.

Die Pflanze hat die Tracht und hohe Wuchsform der f. altissima, steht aber in der Färbung der f. aurea nahe, darum habe ich obenstehende Bezeichnung angewendet. Hackel sagt über die Pflanze: „Dies ist eine der var. aurea sehr nahestehende Form, die man schon derselben beizählen kann. Die echte aurea des Riesengebirges ist von niedrigerem Wuchs, hat kürzere Blätter und ist meist noch etwas lebhafter gelb gefärbt.“ A. K.

Botanische Literatur, Zeitschriften etc.

Ascherson, Dr. P. u. Graebner, Dr. P., Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Verl. v. W. Engelmann in Leipzig. 1906. Lief. 44—46. Preis à 2 Mark.

Lief. 44—45 (p. 1—160 des VI. Bandes) enthalten die Unterfamilie der *Pomoideae* vollständig und von den *Prunoideae* einen Teil der Gattung *Prunus*. Auch die bei uns im Freien kultivierten Arten werden behandelt. Dadurch werden wohl für die meisten Besitzer der Ascherson'schen Synopsis dendrologische Spezialwerke entbehrlich.

Lief. 46 bringt den Schluss der Gattung *Iris* und die Bearbeitung der Iridaceengenera *Moraea, Marica, Tigridia, Ferraria, Nematostylis, Homeria, Diplarrhena, Libertia, Bobartia, Belemcandia, Sisyrinchium, Paterronia, Orthrosanthus, Cleanthe, Aristea, Witsenia, Nivenia, Schizostylis, Geissorrhiza, Hesperantha, Ixia, Dierama, Tritonia, Sparaxis, Acidanthera, Babinia, Gladiolus.* Der grössere Teil der genannten Genera hat bei uns nur kultivierte Vertreter. A. K.

Hegi, Dr. Gust. u. Dunzinger, Dr. Gust., Illustrierte Flora v. Mitteleuropa J. F. Lehmann's Verlag in München. 2. Lief. 1906. p. XXV—XXXII u. 25—48. Preis 1 M.

Die erste Lief. dieser neuen illustrierten Flora wurde schon p. 164 Nr. 10 dieser Zeitschrift besprochen. Die 2. Lief. enthält die Genera *Asplenium, Athy-*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

rium, Scolopendrium, Blechnum, Allosorus, Pteridium, Pteris, Adiantum, Notochlaena, Gymnogramme, Polypodium, Osmunda, Ophioglossum, Botrychium, Salvinia und *Marsilea.* Der Lieferung sind die kolorierten Tafeln 5—8 und die Textabbildungen 11—20 beigegeben. A. K.

Magyar Botanikai Lapok. 1906. Nr. 8—10. Witasek, J., Studien über einige Arten aus der Verwandtschaft von Campanula rotundifolia L. — Péterfi, M., Beiträge zur Sphagnumflora Ungarns. — Murr, Dr. J., Pflanzengeographische Studien aus Tirol. Die pontisch-illyrischen Elemente der Tiroler Flora. — Hayek, Dr. Aug. von, Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Sandschak's Novipazar. — Domin, Dr. K., Koeleria aliquot novae in collectione Doctoris A. de Degen a. 1904—1905 observatae. — Györffy, J., Ueber die Entdeckung des Amphidium Lapponicum (Hedw.) Schimp. in der Hohen Tátra. — Peterfi, M., Bryum Hazslinszkyanum n. sp., eine neue Laubmoosart der ungarischen Flora. — Kövessi, Dr. Franz, Das Gesetz des Volumen-Wachstums der Bäume. — Prodán, Gyula, Neuere Standorte der Daphne Blagayana Freier in Rumänien.

Bulletin de l'académie internationale de Géographie Botanique. 1906. Nr. 205/206. Christ, Dr. H., Filices Cavalerianae et Esquirolianae. — Olivier, l'abbé, Les principaux parasites de nos lichens français. — Fourès, P., Notes sur quelques plantes nouvelles de l'Aveyron. — Varde, Potier de la, Note sur une anomalie de l'Atrichum undulatum P, B.

Eingegangene Druckschriften. Ascherson, Dr. P. u. Graebner, P., Synopsis der mitteleurop Flora. Verl. v. W. Engelmann in Leipzig. Lief. 44—46. 1906. — Hegi, Dr. Gust. u. Dunzinger, Gust., Illustrierte Flora v. Mitteleuropa. Verl. v. J. F. Lehmann in München. 2. Lief. 1906. — Schinz, Dr. H., Beiträge zur Kenntnis der afrikan Flora u. Bär, Joh., u. Binz, Aug., Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora in „Mitteilungen aus dem bot. Museum der Univ. Zürich." XXXII. 1906. — Dingler, Herm., Vicia orobus DC. auf der Weikertswiese im Spessart (Sep. aus d. „Mitteil. des naturwissensch. Ver. Aschaffenburg" V. 1906). — Derselbe, Ein Beitrag zur Kenntnis der Gruppe der Rosa Rhaetica Gremli, sowie einiger anderer Rosenformen der Alpen (Sep. wie vorstehend). — Derselbe, Ueber Asymmetrie in der Drüsenanordnung u. Rotfärbung bei den Fiederblättchen mancher Rosen (Sep. wie vorstehend).

The Philippine Journal of Science Vol. I. Nr. 8 u. Supplement IV. — Bulletin de l'academie internationale de Géographie Botanique. 1906. Nr. 205/206. — The Botanical Magazin. 1906. Nr. 235. — Journal of Mycologie 1906 Nr 85. — Zeitschrift für angewandte Mikroskopie. XII. Bd. 1906 Nr. 6. — Magyar Bot. Lapok 1906. Nr. 8—10. — Association Pyrénéenne, Liste générale des doubles. 1906/7 — Hieraciotheca Europaea v. H. Zahn. Schedae ad Centuriam I. Karlsruhe 1906. — Bulletin du Jardin impérial botanique de St. Petersbourg. Tome VI. Livr. 4. 1906. — Repertorium novarum specierum regni vegetabilis. Nr. 33—37. Bd. III. 1906. — Cobin, Armand, 5 rue de Mézières in Paris. Catalog u. Prospekt. — Junk, W., Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201, Bulletin 1 u. 2, Antiquariatskatalog.

Botanische Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen etc.

Deutscher Lehrerverein für Naturkunde. Aus einem Rundschreiben „Entwickelung des deutschen Lehrervereins für Naturkunde" entnehmen wir, dass der Verein 1887 mit 110 Mitgliedern gegründet wurde und nach 2· jähr. Tätigkeit auf 26 000 Mitglieder angewachsen ist. Alle zwei Monate erscheint eine Nummer von „Aus der Heimat" mit populär wissenschaftlichen Abhandlungen aus dem Gebiete der Natur. U. a. hat der Verein auch die illustrierte Sturm'sche Flora in mehreren Bänden neu herausgegeben und den Mitgliedern unentgeltlich überreicht. Leider lässt, wie schon in verschiedenen Besprechungen in der „Allg. bot. Z." betont wurde, die von Herrn Dr. E. Krause in Strassburg besorgte Bearbeitung des Textes zu wünschen übrig. Nach Beendigung der Herausgabe dieser Flora soll mit der Publikation eines Käferwerkes begonnen werden, dessen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 12_1906

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Botanische Literatur, Zeitschriften etc. 205-206