

Auf die Farbe der Korolle, welche in der Wiener Gegend (so auch um Regensburg) bei *M. cristatum* meist blassgelb, bei *M. solstitiale* gewöhnlich purpurrot und nur am Saume gelb ist, möchte Ronniger keinen Wert legen, weil er von beiden Formen bereits anders gefärbte Exemplare sah.

Bezüglich des Standortes bemerkt er, dass *M. cristatum* in der Gegend von Wien stets unter niedrigem Buschwerk auftritt, während *M. solstitiale* auf grossen, von Wald rings umgebenen Wiesen, welche alljährlich gemäht werden, wächst und daselbst bedeutend früher zur Blüte gelangt, als ersteres (ähnlich auch an dem bayerischen Fundorte bei St. Gilla).

Funde von seltener verwildernden Zier- und Nutzpflanzen im Gebiet der Flora von Freiburg i. B.

Von Dr. A. Theilung (Zürich).

Tritonia crocosmiflora (Lemoine) Voss [Gartenbastard aus *T. aurea* (Planchon) Poppe (*Crocosma aurea* Planchon) und *Tr. Pottsii* (Baker) Voss; beide Stammarten aus S.-Afrika]. Auf Schutt am Rennweg in Freiburg. 1903, 1 Exemplar.

Polygonum perfoliatum L. [Zierpflanze aus S.O.-Asien und Indonesien]. Schutt beim Rennweg in Freiburg 1906 (kultiviert auch in Badenweiler angetroffen).

Phytolacca decandra L. [Gartenpflanze aus N.-Amerika, im Mittelmeergebiet eingebürgert]. Schutt beim Rennweg in Freiburg 1902—06.

Eschscholtzia californica Hort. europ. [an Cham. ?; Zierpflanze aus dem westl. N.-Amerika]. Schutt am Rennweg in Freiburg 1903.

Oxalis corniculata L. var. *purpurea* Parl. (*O. tropaeoloides* Hort.). Wiehre (Schwaighofstr.) bei Freiburg auf Schutt 1905.

Citrus Aurantium L. [bekannte Kulturpflanze der wärmeren Gegenden, heimisch im südlichen Himalaya]. Keimpflanzen auf Schutt am Dreisamufer unterhalb Freiburg 1905.

Ailanthus glandulosa Desf. [Zierbaum aus China]. Junge Exemplare auf Schutt und Kies im alten Güterbahnhof Freiburg und am Dreisamufer unterhalb der Stadt 1906.

Ricinus communis L. [Kulturpflanze der wärmeren Gegenden, stammt angeblich aus NO.-Afrika]. 1 Exemplar in der Kiesgrube an der Baslerstr. in Freiburg 1906.

Monarda didyma L. [Gartenpflanze aus N.-Amerika]. Kappel bei Freiburg 1901 verwildert.

Solanum sisymbriifolium Lam. [trop. Amerika]. Schutt beim Rennweg in Freiburg 1902 (in den Mitteil. Bad. bot. Ver. Nr. 184 [1903] p. 295 irrig als *S. citrullifolium* A. Br.?* publiziert), rechtes Dreisamufer unterhalb der Stadt 1905/6, Wiehre (Schwaighofstr.) 1906.

Mimulus moschatus Dougl. [N.-Amerika]. Günterstal bei Freiburg 1902.

Symphoricarpos racemosus Michx. [N.-Amerika]. Dreisamufer bei der Fabrikbrücke in Freiburg auf Schutt 1903.

Ageratum conyzoides L. [*A. mexicanum* Sims; Zierpflanze aus den Tropen]. Schutt am Rennweg in Freiburg 1904.

Aster Novae-Angliae L. [N.-Amerika]. Merzhäuser bei Freiburg 1902, Wiehre (Schwaighofstr.) 1906.

Aster dumosus L. [N.-Amerika]. Schutt in der Wiehre (Schwaighofstr.) bei Freiburg 1905—06.

Callistephus chinensis (L.) Nees [China, Japan]. Kiesgrube an der Baslerstr. in Freiburg 1902.

Helianthus debilis Nutt. [*H. cucumerifolius* Hort.; N.-Amerika]. Dreisamufer bei der Ganter'schen Brauerei in Freiburg 1903.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [13_1907](#)

Autor(en)/Author(s): Thellung Albert

Artikel/Article: [Funde von seltener verwildernden Zier- und Nutzpflanzen im Gebiet der Flora von Freiburg i. B. 60](#)