

10. — — *var. subvirens* Keller et Wiesb. — Mähr.-Weisskirchen: Feldränder bei der Tuchwalke besonders in der Nähe der Mündung des Mühlbaches; Feld- und Waldränder bei der Skalka!

11. — *incana* Kit. — Mähr.-Weisskirchen: An einem Feldwege zwischen der Skalka und Kunzendorf in der Nähe eines kleinen Föhrenwäldchens ein kleiner Strauch.

12. — *coriifolia var. Jahniana* H. Braun *nov. var.!* — Rami dense et saepe subverticillate aculeati. Petioli dense pubescentes, glandulis raris et aculeolis flavescentibus praediti. Folia mediocria elliptica vel elliptico-oblonga, apicem versus acuta basin versus sensim attenuata vel hinc inde subrotundata, subtus dense pilosa, supra pilosula, in margine argute glanduloso-serrata vel irregulariter serrata. Pedunculi circiter 8 mm longi. Petala magna, 22—25 cm longa, 14—18 mm lata, saturate rosacea. Styli villosi. Receptacula ovoidea vel ovoideo-globosa. Differt a typo: Petiolis armatis, foliorum forma, petalis magnis etc. — H. Braun.

Böhmen: Eger: Bahndamm bei Konradsgrün (Jahn).

13. — — *var. Egerensis* H. Braun *nov. var.!* Rami dense aculeati, aculeis geminatis vel plerumque dense verticillatis (3—5). Petioli dense pilosi, aculeolis flavescentibus et hinc inde glandulis raris praediti. Foliola rotundata ut in forma typica, simpliciter serrata supra subtusque pilosa. Pedunculi 10—12 mm longi. Receptacula ovoidea. Petala amoene, sed non saturate rosacea. Styli villosi.

Durch die wirtelige Bestachelung der Aeste, die bestachelten Blattstiele, die verhältnismässig langen Blütenstiele, die schön, aber nicht so wie bei der typischen Form, satt rosenroten Petalen und durch die eiförmigen Rezeptakel sehr ausgezeichnet! — H. Braun!

Böhmen: Eger: Feldrain bei Konradsgrün (Jahn).

14. — *dumetorum* Thuill. *var. platyphylla* (Rau) f. *glabrata* (Déségl.). — Mähr.-Weisskirchen: Am Waldrande bei Hrabuvka an der Strasse nach Radelsdorf, ein Strauch.

## Zweiter Nachtrag zur Flora des Kantons Solothurn.

Von Hermann Lüscher in Zofingen.

*Thalictrum aquilegifolium* L. *var. flore luteo*. Emme bei Bleichenberg und Zuchwil. — *minus* L. *var. Jacquinianum* Koch. Birs b. Dornach (E. Suter, wie alle andern Angaben von D. u. Umgebung).

*Anemone Hepatica* L. Allerheiligen u. Bann ob Grenchen.

*Ranunculus divaricatus* Schrk. Aare b. Grenchen. — *Lingua* L. Meienried, Egelsee b. Staad-Grenchen. — *nemorosus* DC. *forma nana*. Weissenstein, Rumpel. — *Adv. sardous* Cr. Solothurn.

*Trollius europaeus* L. Allerheiligen 600 m, Obergrenchenberg.

*Nigella arvensis* L. Aesch, Kt. Basel.

*Aconitum Napellus* L. Mümliswil, Birs b. Dornach.

*Nasturtium silvestre* R. Br. Grenchen.

*Arabis arenosa* Scop. Birskies bei Dornach. — *alpestris* Rchb. Heiterwaldfluh; Weissenstein (1867 Duc., 1886!).

*Sisymbrium austriacum* Jacq. Klus b. Oensingen, in Felsspalten u. auf Schutt (Binz!).

*Erucastrum obtusangulum* Rchb. Bahndamm bei Solothurn.

*Alyssum montanum* L. Hofstetter Köppli ob Flühen, Pelzmühlethal.

*Draba muralis* L. Dornach im Lolibach.

*Thlaspi alpestre* L. Stierenberg ob Grenchen, Ende April blühend; *var. ramosum* Lüscher *var. nov.* (1904). Stengel ästig. Rosegg bei Solothurn.

*Iberis saxatilis* L. *var. rubella* Lüscher *var. nov.* Blüten rötlich. Ravelle.

*Lepidium virginicum* L. Dornach.

*Capsella bursa pastoris*  $\times$  *rubella*. Hägendorf.

*Senecioia Coronopus* Poir. Dornach, Dornachbrugg.

*Myagrum perfoliatum* L. Im Kanton (Guthnik 1830, im Herb. Brown); Solothurn (Godet).

*Helianthemum Fumana* Mill. Alfermée, Kt. Bern. — *vulgare* DC. *var. rosmarinifolium*. Tiefenthal ob Dornach.

*Viola epipsila* Ledeb. 1904 von Pr. mit Sperrdruck publiziert, 1905 von Sch. u. K. u. nachher von Rickli widerrufen, wird von R. neuerdings wieder publiziert. Von mir schon 1901 als *palustris* gehalten. — *canina* L. *var. lucorum* Rehb. Enge, Gärrisch (Duc!). — *stagnina* Kit. *var. Billotii* F. Schultz. Bruggmoos bei Biel. — *elatior* Fr. Lengnan, Kt. Bern; bei Grenchen mit *Puccinia Violae* (Schum.) DC. — *alba*  $\times$  *hirta*. Dornach. — *alba*  $\times$  *odorata*. Pieterlen, Dornach. — *hirta*  $\times$  *odorata*. Dornach. — *mirabilis*  $\times$  *silvatica*. Arlesheim, Kt. Basel.

*Drosera rotundifolia* L. Bolkensee, mit *anglica* Huds.

*Polygala Chamaebuxus* L. Schwengimatt, St. Wolfgang, Oberberg, Ramiswil, Oberbuchsiten, *var. rhodopteroides* Lüscher *var. nov.* Flügel rötlich. Ravelle, 1883, 1892. — *depressa* Wendr. Harzer u. Tiefmatt, Kt. Bern, hart an der Grenze. — *comosa* Schk. v. fl. albo. Alfermée. — *alpestris* Rehb. Oestlich vom Chasseral zuerst nachgewiesen: Montoz (1867 Tieche, 1906 Charpié) u. Stalfluh 1904!; 1908 Charpié).

*Dianthus superbus* L. Balsthal, Roggen, Holderbank. — *Carthusianorum* L. Olten? Oberbuchsiten, Dornach.

*Saponaria ocymoides* L. Grenchen.

Adv. *Silene dichotoma* Ehrh. Zuchwil, Grenchen.

*Melandrium noctiflorum* Fr. Pieterlen, Grenchen, Lommiswil, Oensingen.

*Sagina Linnaei* Presl. Montoz, Bruggli, Müren östlich der Stalfluh.

*Alsine tenuifolia* Cr. Dornachbrugg.

*Arenaria leptoclados* Guss. Luterbach, Grenchen, Bellach.

*Cerastium semidecandrum* L. Bellach, Dornach. — *glutinosum* Fr. Bahndamm bei Arch, Kt. Bern.

*Tilia platyphylla* Scop. Grenchen; mit gallenartiger Wucherung durch Blattmilben; die Haarbüschel durchsetzen vielfach die ganze Blattfläche und erscheinen auch ob der Oberseite (Dr. Binz). — *var. vitifolia* Host. Ingelsteinfluh, Liestal.

*Hypericum Desetangii* Lamotte. Soll im Sol. Jura quadr. vertreten sein (Rickli), dies ist ein Irrtum.

*Acer pseudoplatanus* L. *var. angustisectus* Lüscher *var. nov.* Bl. tief und schmal gelappt, unterseits in der Jugend behaart. Klus bei Oensingen (Binz:!). — *platanoides* L. Kestenholz, Mümliswil. — *opulifolium* Vill. Vorberg von Rothmund bis Bettlach, 620—1010 m.

*Geranium silvaticum* L. Schwengimatt, Hochwald, Gempen. — *var. flore albo*. Wandfluh, Schwelli, Schauburg. — *var. brachystemon* God.? Hasenmatt (Jessler); Wandfluh.

Adventiv *Erodium moschatum* L'Héril. Obergrenchenberg 1360 m.

*Impatiens glanduligera* Royle. Birs bei Dornach.

*Staphylea pinnata* L. Ob Dornach.

*Rhamnus pumila* Turr.? Brugglibergflühe.

*Genista pilosa* L. Tiefenthalflühe ob Dornach.

*Trifolium arvense* L. *var. flore albo*. Ob Biel. — *striatum* L. Mit *scabrum* L. am Bözinger Vorberg.

*Coronilla montana* Scop. Hofstetterköppli, Bürenfluh. — *scorpioides* Koch. Selzach unter Avena, Solothurn, als Adventivpflanze.

Adv. *Lathyrus sphacricus* Retz. Aesch, Kt. Basel. — *hirsutus* L. Bellach, von Dr. Probst als *tuberosus* ausgegeben. — *montanus* Bernh. Born, Dornach; *var. tenuifolius* Roth. Dornach-Gempen. — *vernus* Bernh. v. *flore albo*. Engloch, St. Niklaus. *var. flaccidus* Radius. Pieterlen, Engloch ob Bettlach.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [16\\_1910](#)

Autor(en)/Author(s): Lüscher Hermann

Artikel/Article: [Zweiter Nachtrag zur Flora des Kantons Solothurn. 72-73](#)